



27405/c



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30413758_0006

ELEMENTA
PHYSIOLOGIÆ

CORPORIS HUMANI

AUCTORE

ALBERTO V. HALLER

DOMINO IN GOUMOENS LE JUX, ET FEUDI ECLAGNENS.

PRÆSIDE SOCIETATIS REG. SCIENT. GÖTTING.

SODALI ACADD. REG. SCIENT. PARIS. REG. CHIR. GALL.

IMPER. BEROLIN. SUECIC. BONONIENS. ARCAD. BAVAR.

SOCIET. SCIENT. BRITANN. UPSAL. BOT. FLOR. HELVET.

BATAVIC. OECONOM. BERNENS.

IN SENATU SUPREMO BERNENSI DUCENTUMVIRO.

TOMUS SEXTUS.


DEGLUTITIO. VENTRICULUS. OMENTA.
LIEN. PANCREAS. HEPAR.



LUGDUNI BATAVOR.










Apud C. HAAK.

MDCCLXIV.






P R Æ F A T I O.




 Tsi ad sextum tomum hic videor præfata, per



 orationem tamen ad universum opus tradidit



 quod mense februario anni 1764. a me absol-
 tum, & ad prelum paratum sit. Annus omnino, a quo
 phyfiologica scribere primum sum molitus, effluxit tri-
 cesimus quintus: a commentariorum in BOERHAAVII præ-
 lectiones libro ultimo annus vigesimus. Hoc tempus non li-
 cuit mihi totum huic dare labori. Multam partem ab his
 decem annis sibi res publica vindicavit, aliam amor planta-
 rum, & enumerationis stirpium Helveticarum emendandæ
 & augendæ cupido, quam nunc continuo pariter ad prelum
 perficiam.

Multos vides annos, LECTOR BENEVOLE, impenfos
 legendis scriptoribus, incidendis cadaveribus, & vivorum
 animalium numerosissimis incisionibus. Non ideo velim
 spem Tuam promissis meis nimium augere. Multa fuerunt,
 quæ hominem veri cupidum, neque parcum laboris, ta-
 men non fiverunt, eam operis sui perfectionem adtin-
 gere, quam mente facile concepias.

Cadaverum humanorum defectus multo mihi impedi-
 mento fuit. De iis incidendis, postquam inter patriæ
 magistratum locum occupavi, ne cogitari quidem poterat.
 Ergo, quæ viginti & septem annorum incisionibus, ab
 anno 1728 ad 1753. fatis certe frequentibus videram, &
 in tabulas retuleram, iis me oportuit esse contentum; sæpe



tamen hæsi in aliqua parte descriptionis. Sæpe de meis dubitavi, quando cum summorum virorum vocibus meas videbam non posse conciliari.

Supererat, ut, quæ mihi deessent, ex optimis adstruerem auctoribus. Si quæ haberem contraria placitis virorum in re anatomica exercitatorum, ita cedere malui, ALBINO aliquoties, etiam aliis præcipuis scriptoribus, etiam ZINNIO olim meo, meisque præferre, quæ ipsi viderentur melioribus adminiculis, minutius, & frequentius vidisse.

Hoc summum vitium est, reliqua paulo tolerabiliora. Primum non evitavi, quin subinde eadem repeterem. Longo in opere non utique prævidebam, num alio loco non aptius de iisdem esset dicendum. Parui præsentī necessitati; & dum cordis dabam historiam, multa præmisi, de cerebello, de cerebro, de vi irritabili, quæ suis locis necesse esset retractare, & fufius dicere. Hoc vitium in nova editione vitari potest, nunc quidem non potuit. Non tamen credo extra propositum, & ἀδύνατος aliqua me dixisse, etsi poterant ad alium locum fervari. Certe anno 1756. dum negabam nervos a cerebello in cor missos peculiariter vitæ præesse, nisi fallor, justæ me exposuissem expostulationi, si fidem mihi ideo voluissem dari, quod promitterem, anno 1762. me editurum esse quartum tommum, in quo demonstratio eorum foret proditura, quæ nunc mihi sumebam.

Nimia passim aliqua video. Etiam in hoc VI. tomo in comparata anatome puto me luxuriasse, nimiumque indul-

cisse enumerationi animalium, in quibus hoc, aut alio modo, se aut hepar haberet, aut pancreas. Potuisssem longi catalogi tædium occupare, si in classem contraxissem eas bestias, quarum fabrica consentiret. Non ausus tamen sum absque inductione fidem a lectore sperare: adeoque me permisi arido labori, enumerandorum singulorum animalium, in quibus communis esset fabrica. Possunt etiam errores intercessisse, potissimum in avium ventriculis, quorum paucos vidi.

Nimium numerum citationum tertio loco pono. Visum est mihi, aperiendum esse tironibus aditum ad Cl. Virorum testimonia, ut quæ brevissimis verbis mihi postulassem, ea per integras historias viderent confirmari. Et tamen bene multa loca omisi, quæ in adversaria receperam.

Inter eos locos scriptorum adeo nimis numerosos, possunt esse qui vel alienis cum numeris citentur [a], neque adeo eo loco reperiantur, quo sunt indicati: aut in quibus aliquid aliud sit, quam lector sibi promiserit. Utrumque vitiosum; primum ne tunc quidem excusabile, quando idem auctor vere quidem, sed alia tamen pagina, ea protulit, ob quæ citatur. Alterum non semper adeo obnoxium est condemnationi; sæpe enim de industria auctorem citavi, qui alia dixisset a meis. Non semper indicat citatio auctoritatem mearum vocum; remittit

[a] Quæ Cl. *Antonius de HARN* in VII. L. *rat. medend.* carpsit, ea loca omnia relegi, neque quidquam inveni, in quo non recte citassem.

tit unice lectorem ad scriptoris locum, quem credam cum libro meo conferendum esse.

Si præter ista vitia errores anatomici, si non veræ descriptiones intercefferunt, tunc quidem veniam ne peto quidem. Potuit id tamen vitium in longo opere, vel ideo mihi obrepfisse, quod paucas, aut negligentes meas dissectiones describam, cum meliora mihi non innotuissent; vel quod auctorem sim secutus, qui & ipse humanis obnoxius erroribus, eum locum male tractasset. Non tamen spero, multa fore ejusmodi menda, cum nihil simile hactenus viderim mihi exprobrari, cum tot habeam viros, nunquam certe a me læsos, quibus tamen dignum videatur suis laudibus mihi facere convitium.

Peculiariora aliqua loca his in tribus tomis, qui edendi supersunt, non potui ad perfectionem perducere, ut plenam vasorum lymphaticorum historiam, musculorum urethræ uberiores descriptiones, si quid plenius ALBINIANIS desideratur: deinde in magno illo & intricatissimo negotio generationis, mulorum, & hybridum accuratam descriptionem, & experimentorum in conceptione speculanda numerum, quem desiderarem ipse. Illud quidem vitium tollet forte insignis vir, & noster peculiaris amicus, RASTIUS junior, qui in *veterinaria schola* adulteria bestiarum conciliare, fetusque ex diversis parentibus missos incidere recepit. Prægnantes, aut quæ marem admisissent, bestias varii generis ad nauseam usque ipse incidi, neque tamen a die 1. ad 12. aut 18. quadrupedum primordium

mordium satis frequenter videre potui. Est in his experimentis molestia incredibilis, cum sæpissime animalia non concipiant, quæ pro fetis emeris, cum contra feta vendantur pro virginibus, & quæ sunt alia id genus.

Atque ita accipe lætus CANDIDE LECTOR vitæ meæ integræ laborem, coque utere, fidenter, si amor veri in auctore fiduciam potest inspirare: caute, siquidem is auctor peccasse potuit, neque omnia conjunxit præsidia, quæ ad operis perfectionem pertinent. Existet utinam alius, cui par sit veritatis amor, & par constantia laboris, cum melioribus ad eruendum verum præsidiis. Habebit me primum laudatorem; &, qui tamen meminerim, quantum in his voluminibus sit laboris, feliciorum solertiam non ignarus prædicabo.

Interim, cum *compilatoris* famosum titulum videam a summis viris mihi impingi, qui putant idem esse colligere & compilare, da, quæso, LECTOR dolori meo hoc levamen, ut separes a collectore, cui nihil est proprium, eum auctorem, qui sua cum alienis comparat. Mea vero esse, quæ telam totius operis faciunt, crede vel diuturnis laboribus, in illustri Academia tot coram testibus sustentatis: & pene quadringentis mea manu dissectis hominum cadaveribus; crede discipulis in arte sua summis, qui de schola mea prodierunt: crede iconibus anatomicis, pene centum, omnibus ad præsens cadaver factis, quarum plerasque edidi, aliquas mecum fervo, non perinde bonis omnibus, sed certe meis; crederes, si videres, viginti voluminibus adnotationum anatomicarum mea manu ad præsens

sens cadaver descriptarum, quibus a prima juventute, quæ vidi, continuo conservanda tradidi: crederes denique voluminibus gallice editis [a], in quibus nihil non meum est. Da demum dolori meo, quod idem summi viri [b], nemine provocante, sibi indulserunt, enumerationem, quam subjicio, eorum, quæ aut noviter a me visa, & in anatomen, vel physiologiam introducta sunt: aut certe post breviores priorum scriptorum voces minutius elaborata; aut post dubias & labantes opiniones per experimenta constituta sunt, quæ, si pauca quis putaverit, si levia, tamen nemo negaverit nata esse ex propriis incisionibus, neque a compilatore potuisse proficisci. Si vana hæc Tibi cura videtur, lege quæso convitia, quæ passus sim, & æquus judica, annon ad vindicandum me ipsum ab ipsa necessitate compellar, quæ omnia excusat, quæcunque nobis extorsit.

Rupe Veragrica 11. Mart. 1764.

[a] *Sur les parties irritables & sensibles.*

Sur le mouvement du sang.

Sur la formation du poulet.

Sur la formation des os.

Sur la respiration.

[b] *Jac. DOUGLAS in myolog. compar. spec. B. S. ALBINUS in musculorum historia.*

P R O P R I A A U C T O R I S.

Fabrica pene totius corporis animalis ex cellulosa tela per experimenta evicta [a].

Pericardii vera historia & adhæſiones [b].

Constitutus anulus venosus valvularum cordis continuus [c], & minutæ earum valvularum adfectiones.

Cordis evolutio [d]. Primigenius sinister ventriculus est; post eum sensim subnascitur dexter: auris communis primum extra cor est, tunc in cor retrahitur, & in duas aures discedit.

De cordis motu: non pallere [e]; idem & de aliis ejus adfectionibus.

Cordis maxima irritabilitas [f], & inde natus motus perpetuus per vim stimuli continuatus.

Experimentum, quo ostenditur, ablato sanguine venoso dextro sinistras cordis partes supervivere ultimas [g].

Sanguinis motus non multum tardatur in minimis [h] vasis: per experimenta.

Ponderis

[a] *Elem.* I. p. 19. 22. Non ita ALBINUS; sed cuique parti suam substantiam præter vasa. *Adnot.* L. III. p. 11.

[b] I. p. 269. seq.

[c] *Ann.* 1737. in disp. de mot. sang.

[d] *Ibid.* form. du poulet T. II. Sect. VI.

[e] *Oper. min.* p. 171.

[f] *Oper. min.* T. I. p. 169. in experim. & in *Comm. Gott.* T. II.

[g] *Comm. Gott.* T. I.

[h] L. VI. p. 195.

Ponderis vis in sanguinem venosum [*i*].

Vasa minima non sunt contractilia [*k*].

Vis derivationis & revulsionis [*l*].

Motus sanguinis a morte superstes ab adtractione [*m*] natus.

Ancurysma verum & varix, artificio parari possunt [*n*].

Major crassities tunicarum arteriosarum a debili sanguinis motu: minor crassities a plethora [*o*].

Pulsus venosus ab inspirationis viribus [*p*] natus, qui sanguinem in pulmones invitat.

Pulsus venæ pulmonalis [*q*].

Musculos intercostales omnes costas levare demum per experimenta evictum [*r*].

Costarum rotatio [*s*] &c.

Mammariarum arteriarum rami magni ad diaphragma [*t*].

Earum pulcherrimi anuli, & anastomoses cum vasis thoracis externis [*u*].

Trunci

[*i*] *Oper. min.* T. I. p. 129.

[*k*] L. VI. p. 210. *Oper. min.* I. p. 88.

[*l*] L. VI. p. 214. post aliqua experimenta Cl. de HARNET.

[*m*] *Oper. min.* I. p. 128. seq.

[*n*] *Oper. min.* p. 85. 99.

[*o*] *Oper. min.* p. 88.

[*p*] *Conf.* L. VI. p. 332. *Oper. min.* I. p. 131. seq.

[*q*] *Oper. min.* I. p. 144.

[*r*] *Oper. min.* T. I. p. 283. seqq.

[*s*] *Ibid.* p. 288. seqq.

[*t*] *Fascic.* VI. In venis aliquid simile FALLOPIUS habet.

[*u*] *Ibid.*

Trunci quatuor arteriosi thoracici constituti [w].

Aerem nullum esse in thorace [x] per experimenta ita evici, ut neminis nunc meminerim, qui contrariam opinionem tueatur.

Tendines sunt insensiles [y].

Et ligamenta [z].

Et dura cerebri membrana [a].

Cerebri piscium fabrica [b].

Arteriæ cerebelli & cerebri pleræque constitutæ [c].

Et arteriæ medullæ spinalis [c*].

Emissaria pluscula [d].

Constitutus. Motus cerebri, qui respirationi obedit [e].

Cerebelli nulla major dignitas [e*], nec callosi corporis [et].

Nervi molles ab intercostali [f] ganglio primo, post aliquas LANCISII voces.

Thyreoi-

[w] Ibid.

[x] Oper. min. I. p. 301.

[y] Oper. min. I. p. 332. seq. Comm. Gott. T. II. p. 113.

[z] p. 341.

[a] p. 343.

[b] Elem. physiol. IV. fin.

[c] Fascic. VII.

[c*] Ibid.

[d] Fascic. I. & Elem. T. IV. p. 166. 167.

[e] Comm. Gott. T. II. & Elem. T. IV. p. 171. &c.

[e*] Element. T. IV. p. 353.

[et] Etiam eo loco.

[f] Art. max. tab. ad fin. Orig. nerv. intercost. n. 17. Elem. T. IV. p. 256.

Thyreoidea arteria inferior pene tota [*f**].

Vis insita musculorum per suos limites constituta [*g*].

Vis nervosa non eget continuitate cum cerebro [*g**].

Vasa vitrei corporis in piscibus [*b*].

Et campanula lentis cristallinæ [*i*].

Zona ciliaris avium [*k*].

Arteria ophthalmica pene tota [*l*].

Iris non irritabilis [*m*].

Arteriæ dentales pleræque [*n*].

Ductus ad STENONIANUM Accessorius [*o*].

Sublinguales ductus, longi & brevès [*p*].

Arteriæ œsophageæ pleræque [*q*].

tum palatinæ [*r*].

pharyngeæ [*r**].

Ventriculi fabrica musculosa & stratum intimum [*r***].

Ventri-

[*f**] Fascic. III.

[*g*] Comm. Gott. T. II. Elem. IV. p. 449. seq.

[*g**] Elem. IV. p. 364.

[*b*] Elem. physiol. V. p. 391. 392.

[*i*] p. 39.

[*k*] Form. du poulet. T. II.

[*l*] Fascic. VII.

[*m*] Oper. min. p. 372.

[*n*] Tab. art. maxill. & Fascic. VIII. & Elem. T. V. p. 30.

[*o*] Fascic. III. tab. art. lab.

[*p*] Elem. phys. VI. p. 48.

[*q*] Fascic. III.

[*r*] Fascic. II. tab. art. maxill. Fascic. III. tab. art. pharyng.

[*r**] Comm. BOERHAAV. T. II. & Fascic. III.

[*r***] Cl. FOUCHY *hist. de l'Acad.* 1761. p. 32. Cl. BERTINO tribuit, qui anno 1746. cum de equi ventriculo ageret, ejus inventi fecerit mentionem, cum ego anno demum

Ventriculi cellulosa tela post paucas voces priorum [s].

Omentum colicum [t].

Omenti lamina posterior veterum, verum est mesocolon [u].

Arteriæ pancreaticæ pleræque [w].

Vena umbilicalis in fetu [x] ramos dat in hepar, qui in homine adulto fiunt rami venæ portarum.

Intestinorum tela cellulosa tertia [y] post paucas voces priorum.

Mechanismus quo coli facies mutatur [z].

Valvularum coli mensuræ, & varietates [a].

Arteriarum capsularium tres classes [b].

Uretericæ [c].

Hæmorrh-

demum 1751. eadem descripserim.) Non recte. Descripsi ann. 1747. Voces enim ejus editionis *prim. lin.* n. 624. eadem sunt cum vocibus editionis ann. 1751. Deinde tomus *Commentariorum* ann. 1746. anno demum 1751. aliquot adeo post meas primas lineas annis prodiit: Quæ ita dicta volo, nihil ut inde decedat Cl. BERTINI laudibus.

[s] *Elem.* T. VI. p. 132.

[t] *Progr.* anni 1742.

[u] *Ibid.*

[w] *Fascic.* II. & *Elem.* T. VII. p. 431. seq.

[x] *De fetu bicipite* ann. 1739. tum in *prim. lin.* n. 833.

[y] *Prim. lin.* n. 705.

[z] *Prim. lin.* n. 730.

[a] *Progr.* anni 1742.

[b] *Fascic.* III.

[c] *Ibid.*

Hæmorrhoidæ media [d].

Perforantes magnæ femoris, utræque præter aliqua priorum [e] vestigia.

Articulares genu præter aliqua verba priorum [f].

Anastomoses ramorum superiorum cum inferioribus sub genu, præter priorum paucas voces [g].

Sic arteria tarsea [h].

Perforantes tarfi &c. [i].

Arteriarum superiorum cubiti cum inferioribus pleræque stomoses [l].

Arcus dorsalis cubiti [m].

Arcus carpeus [n].

Perforantes carpi [o].

Interosseæ dorsales [p].

Interosseæ mediæ [q].

Herniæ

[d] Fascic. IV.

[e] Fascic. V.

[f] p. 23.

[g] Ibid.

[h] Ibid.

[i] Ibid.

[l] Fascic. VI.

[m] Ibid.

[n] Ibid.

[o] Ibid.

[p] Ibid.

[q] Ibid.

Herniæ congenitæ : vagina pro teste præparata [r].

Testis in peritonæi cavea est, dum homo in utero geritur [r*].

Vascula efferentia testis; & rete testis [s] cellulosum vasculosumque.

Vesicula seminalis est intestinum ramosum [t].

Corpus luteum oritur ex conceptione [u].

Urachus est apertus ductus ad vesicam usque, quem replere facile fit [w].

Foraminis ovalis & ductus arteriosi proportiones, & causa commutationis [x].

Fabrica vitelli [y].

Incrementa ossium [z].

Mutatio ex cartilagineo gelu, rimæ, opacitas &c. [a].

Vasa ossis longa [b].

Circuli vasculosi [c].

Hæmis-

[r] Progr. ann. 1749. *Elem. physiol.* T. VI. p. 373. T. VII. & *opusc. pathol.* p. 53.

[r*] Ibid.

[s] Progr. ann. 1745. edit. & *Phil. trans.* Tum *Elem. physiol.* T. VII.

[t] Ibid.

[u] *Præf.* ad T. II. operis BUFFONIANI versionem Germanicam.

[w] *Prim. lin.* n. 837.

[x] Progr. de valv. EUSTACH. in *Fascic.* IV. tum *Elem.* T. VIII.

[y] Ibid. *Seçl.* XI.

[z] *Traité de l'accroissement des os.*

[a] Ibid.

[b] *Seçl.* VI.

[c] Ibid.

Hemisphærium vasculosum [d].

Vascula cartilaginum [e].

Formatio partis alveolaris [f].

Et nuclei ossei [g].

[d] Ibid.

[e] p. 201. &c.

[f] Sect. V.

[g] Ibid.



ELEMENTA PHYSIOLOGIÆ

TOMUS SEXTUS

LIBER XVIII.

CIBI ITER IN VENTRICULO

SECTIO I.

MANDUCATIO.

§. I.



Actenus humani corporis ea membra descripsimus, quæ vel motus ad vitam tuendam necessarios, vel animæ imperia exsequuntur. *Vitalem facultatem*, & *animalem* Veteres dixerunt. Sequitur, ut ad ea transeamus membra, quæ vel fluxum hominis corpus & sponte caducum sustentant, vel novos homines generi alioquin interlapsuro substituunt. *Naturalem* illam *facultatem* dixerunt veteres, hanc *genitalem*.

Ostendimus magnam partem humorum nostrorum per cutem difflari (a): non minimam per pulmonem (b): ostendetur subinde, & jam indicatum est, non minorem portionem per lotium eliminari (c); supersunt aliæ per sputum, per alvum, aliasque vias jacturæ. Eæ universæ, cum in die 24. horarum non sint multo pauciores sex libris, hominem celeriter consumerent, nisi nova materies id detrimentum sarciret. Hæc interim, etsi satis novimus, alias multo vehementiores famis sitisque causas, atque adeo necessitates esse, propter quas non possumus esse absque cibo & potu. Sed ea omnia non bene intelliguntur, nisi descriptis organis, in quibus uterque *instinctus* habitat. Sufficit interim recepisse, ut

(a) L. XII. Sect. II.

(b) L. VIII. p. 353.

(c) L. XXVI. & L. XII. Sect. II. p. 68.

ut in universum dolor (*d*), & voluptas corpus humanum regunt, ita etiam ad cibum potumque capiendum nos saporis gratia invitari (*e*), cogi vero a crudelissima industriæ matre fame, cogi a magis inexorabili promtiusque enectura siti, & intolerabili a miseria urgeri, ut utrumque præsidium corpori nostro suppedamus. Oportet autem eas corporis partes describere, per quas cibus, aut potus subit, ut destinatum auxilium ruituro corpori præstent.

§. II. *Cibus in os recipitur.*

Animalia pleraque potum lingua sua excavata, inque haustrum formata sumunt, & aquam in os adtrahunt, cujus aerem per inspirationem debilitaverint: insecta etiam per cavos aculeos (*f*), cavosve tubos (*g*), quos motus peristalticus ultra cibum dilatat, post cibum constringit. Cibus animalia fere maxillis ipsis comprehendunt, nam pauca aliquid habent manuum simile, eaque necessitas recit, ut maxilla omnium animalium quadrupedum, quam homini longior, & anterieus in gracilitatemeducta sit, quo altius os aperiri, & facilius, subque angulis rectis, cibus comprehendiqueat. Homini manuum ministerium cibus (*b*) in os suggerit; potumque infundit, quem tamen etiam iugendo possumus adducere. Prima vero via in os est, quod alias descripsimus quantum necesse est in parte, quam oculis suis quisque potest usurpare.

§. III. *Cibi subactio in ore.*

Sed plurimi cibi duriores sunt, majoribusque buccis in os suggeruntur, ut omnino deglatiri nequeant, aut certe ventriculo molesti forent, nisi in minores particulas, & massam molliorem reformarentur. Deinde etiam molles qui sint, ipsaque potulenta, debent tamen a labiis ad gulam iter percurrere, quod ut legere possit, suis egent organis. Huc ergo dentes pertinent, & maxillæ, tum varii muscoli, qui vel regunt ea ossa, aut cibum in varias oris sedes promovent.

§ IV.

(*d*) L. XVII. p. 577.

(*e*) L. XIII. p. 123.

(*f*) Pediculus SWAMMERDAM *bibl.* p. 78. Per cavum dentem vermis aquaticus *ibid.* p. 316.

(*g*) Per proboscidem papilio SWAMMERDAM p. 598. & 449.

(*b*) Conf. BUFFON *histoire naturelle*. T. IV. p. 197.

§. IV. *Maxilla superior.*

In homine, quadrupede, ave & pisce, non ita vero in tribu (i) insectorum, machina, quæ os fundat, & eadem cibos terit, duabus fit maxillis, quarum inferior superiori innititur: hanc enim stabilem esse necesse fuit, quæ cerebrum contineat. In lacertarum equidem genere (k) superior maxilla non valde major, neque multo stabiliior est, quam quidem inferior, & eadem, dum vasto rictu os diducitur, cum toto capite retrorsum elevatur (l): non tamen ut ideo inferior motu destituatur (m). Id in lacerta majori viridi, pulcherrimo animale, accurate vidi. In psittaco (n), alcyone (o), hirundine (p), alauda (q), aliisque avibus (r), maxilla superior a cranio distincta, & seorsim mobilis est, eademque videtur in serpentibus esse fabrica (s), in quam non inquisivi. Sed etiam in homine, quando maxilla inferior firmiter columnæ (t) incumbit, universum caput, & una superior maxilla retrorsum elevatur, & adeo os hætenus aperiri potest. Et absque columna, caput tamen, dum os aperitur, super condylos maxillæ inferioris retrorsum move-

A 2

tur

(i) His enim vel plerisque maxillæ laterales sunt REAUMUR *Mémoires sur l'histoire des insectes* I. p. 120. V. p. 283. vel omnibus LYONNET *Théolog. des insect.* p. 79.

(k) Crocodilus solus maxillam superiorem movet ARISTOTELES *hist. anim.* L. I. c. 2. L. III. c. 7. part. IV. c. 1. PLINIUS L. VIII. c. 25. Moveri etiam JESUITÆ in *obs. de mathem. & de physique* p. 15. 42. O. BORRICHIVS *hermet. ægypt. sup.* p. 270. HAMMÆ *de crocod.* p. 105. 106. tum in *tockaye* ex eodem genere iidem JESUITÆ. Add. FERREIN p. 518.

(l) VESLING *epist. posth.* V. BARTHOLIN *hist.* III. n. 86. PLUMIER *Mém. de Trévoux* 1705. fevrier. Hinc negant vere maxillam superiorem in Crocodilo moveri DUVERNEY apud *siamenses Jesuitas* p. 15. 42. du HAMEL *hist.* p. 193. PERRAULT *ess.* T. III. p. 191. cum eadem, quæ in aliis animalibus sit articulatio GREW *mus.* p. 42.

(m) ARISTOTELES *hist. anim.* L. III. c. 7. *Isag. anat.* c. 56. PHILE p. 297. SEBASTES. L. I. p. 168.

(n) MEYER *squelet der Thiere* t. 40. Tom. 2. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1746. p. 171. 172. add. ALDROVAND *ornitholog.* I. p. 639. 640. 642. VERDUC *usage des part.* I. p. 142. SEVERIN *vip. pyth* p. 239. BUFFON *hist. natur.* T. II. p. 528.

(o) FRISCH *Miscell. Berol. Contin.* II.

(p) ALBERTI *kleine Schriften* p. 517.

(q) IDEM *ibid.* & in aliis avibus.

(r) Plerisque *Mém. de l'Acad.* 1748. p. 346.

(s) In caudifona vipera TYSON *Phil. transf.* n. 144. MEAD *of poisons* p. 59. 60. MEYER *squelet* T. II. t. 17.

(t) BOERHAAVE *Prælect.* T. I. p. 148. ALBIN *de ossib.* p. 209. MONRO *Essays of a Societ. at Edimb.* T. I. p. 139. 140.

4 LIB. XVIII. CIBI ITER AD VENTRICULUM.

tur (*u*), per novem (*x*) omnino lineas , & sextam , quintam , quartamve (*y*) partem longitudinis , quæ ab inferiori maxilla percurritur , Cl. vir ostendit.

Sed tamen homini præcipuum fulcimentum in eo toto motu est in maxilla superiori , motus liberior in inferiori.

Ea pars maxillæ superioris , quæ ad os pertinet , margine suo terminatur , qui dentes recipit (*z*) , & parabolæ habet speciem , cujus vertex & medius est , & anterior , crura retrorsum recedunt. Hujus ad marginem descendens maxillæ facies anterior , quæ & sub naso est , & sub jugo , planitiem habet eminentibus colliculis (*a*) , sed in medio magis conspicuis , distinctum , quæ sunt dentium alveoli. Quæ vero pars inferior est , & respicit inferiorem maxillam , qua parabolam plenam (*b*) efficit , ea marginem habet deorsum insigniter eminentem , dum intima maxillæ pars multo minus deorsum producitur , ut tota valleculam efficiat , vallo comprehensam. Eam in osse sicco linea media bipartit (*c*) , quæ vestigium est duorum ossium , similium & æqualium , in quæ hæc maxilla dissoluta secedit.

Est in ea linea canalis (*d*) in sceletto cavus , & apertus (*e*) , antè in planitiem eductus , posterius in angulum resectus , qui dum adscendit , in duos abit tubulos (*f*) , quorum quisque suam in narem , inque naris meatum infimum , aperitur. Sed in homine integro membrana hos tubulos replet , nullo pervia canali ; quæ unice vasa (*g*) a palatinis arteriis in nares adscendentia admittat. Quare neque lacrumam

(*u*) FERREIN *Mémoire de l'Acad.* 1744. p. 514. 517. 538. 544. 545. Conf. SOULIER *conspectus physiol.* p. 3. & ipse MONRO *Essays &c.* T. III. ed. IV. p. 226. Hic emenda in L. XI. hujus nostri operis p. 419. l. 3. & pro *ventre secundo* , lege *primum*.

(*x*) p. 512. 514.

(*y*) p. 516. per experimenta.

(*z*) Conf. ALBIN. *tab. off.* T. I. f. 13. SUE T. V. t. 2. f. 1.

(*a*) ALBIN l. c. SUE t. V. f. 1. 2. t. X. f. 3.

(*b*) SUE t. 9. f. 2.

(*c*) Conf. ALBIN. t. I. f. 2. t. 2. f. 1.

(*d*) Ostium SUE t. 9. f. 2. ALBIN. *ibid.* VINK t. 3. f. 2.

(*e*) Apertum esse DUVERNEY in *icone posth.* tab. 14. f. 1. 4. KULMUS *anat.* p. 64. tab. II. G. BIDLOO *tab.* 14. f. 2. 4. RUYSCH *Thes.* VI. n. 3. WENKER *ulc. ventric. cor.* 7. Transmittere liquorem PALFYN *anat. Chir.* T. II. p. 63. *nouv. osteolog.* p. 170.

(*f*) STENONIUS nonnunquam. MORGAGN. *adv. anat.* VI. p. 116. 117. SANTORIN c. 5. n. 13. CHESLDEN *osteogr.* c. 2. la CHARRIERE. p. 120.

(*g*) *Fascic. anat.* II. & VIII. BERTIN *osteol.* T. II. p. 419. Nervos etiam COWPER l. c. Primus verum vidit SCULTETUS *armam. obs.* 24. Rami ab his vasculis ad alveolos incisivos eunt BERTIN II. p. 396.

nam (*b*) transmittit, neque a naribus aliquid ad os adfert (*i*), neque ullo modo in numerum canalium salivalium potest admitti. In bestiis patere non recuso (*k*), qui nondum quæsierim; in homine Cl. viri ante me viderunt non patere (*l*), ego vero sæpe, & de industria inquisivi. Ad latus hujus foraminis transversa sæpe futura (*m*) in teneris corporibus palatum dividit (*n*), quæ per ætatem evanescit.

Postrema pars parabolæ ab anteriori linea dentata antrorsum convexa separatur, cum ad aliud os, *palatinum* (*p*), pertineat. Eadem versus fauces æquabili, solidoque margine terminatur (*q*), cujus media pars, qua duo ossa paria coalescunt, in mucronem (*r*) producitur. A latere utroque processus ad cunei modum inter maxillæ finem posteriorem, & processum pterygoideum interiorem se interponit (*s*).

§. V. *Maxilla inferior.*

Universa hæc maxilla in homine ex duobus (*t*) pariter ossibus coalescit, quæ in medio membranaceis (*u*) primo vinculis unita, demum in homine adulto in unam continuam (*x*) osseam naturam abeunt.

A 3

Ejus

(*b*) STENONIUS *obs. anat.* p. 107. HOYER *de saliv.* p. 9. la CHARRIERE p. 120. DEIDIER *physiolog.* p. 54.

(*i*) BARTHOLIN. *specim. anat.* p. 40. MUCUM RAV. *osteolog.* p. 37. & olim SANCTORIUS *method. vitand. error.* p. 181. 182. qui ab eorum ductuum amplitudine traucos fieri suspicatur.

(*k*) In bove COWPER. ad BIDL. t. 14. f. 3. In equo BERTIN. II. p. 419. in ruminantibus I. B. *cephalot.* p. 413. In homine SANTORIN. p. 94. KURELLA *de saliv. var. secret.*

(*l*) HEISTER *comp. anat.* n. 59. BERTIN p. 421. NOGUEZ *abregé* p. 321. J. B. I. c. PETIT ad PALFYN p. 83. HEUERMANN III. p. 259. GORTER *Chir.* n. 842. Obscure patere RUYSCH *Tbes.* VI. n. 21. & MORGAGNUS I c.

(*m*) BERTIN II. ALBIN. t. 2. f. 1.

(*n*) Cl. JANKE, diligentissimus incisor *diff.* I. de pueri septennis maxillæ ante septimum annum evanescere docet.

(*p*) ALBINUS *tab.* 2. f. 1.

(*q*) IDEM T. I. f. 2. SUE t. 9. f. 2.

(*r*) SUE *ibid.*

(*s*) IDEM *ibid.* ALBIN t. 2. f. 1.

(*t*) BERTIN. T. II. p. 219. VESAL. L. I. c. XI. & de *rad. Chin.* KERKRING *osteog.* c. 9. INGRASSIAS. ALBIN. *Id. off. fet.* XLIII. Ad primum annum FALLOP. *obs. anat.* p. 52.

(*u*) RUYSCH *Mus. rar.* p. 110. NESBIT p. 94. FERREIN *Mém. de l'Acad.* 1744. p. 428.

(*x*) Raro exemplo unica recens nato RUYSCH *Cat. Mus.* p. 187. Non bene adeo veteres duo distincta ossa describunt ARISTOT. *hist. anim.* III. c. 7. GALEN. *de off. c.* 5. text. ORIBAS. p. 144. quod maxilla cœcta in duo ossa solveretur. Unicum os fuisse in fracta per pugnam plateensem maxilla pro re rara habuerunt HERODOTUS p. m. 540. Inter conjuncta ossa supernumerarium ossiculum vidit RUYSCH *tbes.* V. *locul. magn.*

Ejus maxillæ figura in universum parabolæ (y) est, cujus anterior pars, simplex, & duabus pene parallelis lineis comprehensa, longitudinem eandem habet, quæ est maxillæ superioris, cui parallela adoptatur.

Ejus ipsius partis facies anterior in universum æquabilis, tamen alveolis dentium mediorum, & eminentia (z), quæ est in ima symphyssi, vicinaque utrinque vallecule distinguitur (a).

Eadem posterius levis, & cava, sub dentibus longam eminentem lineam (b) habet, pene oræ parallelam, subque ea excavatam levemque (c) vallem, quam in symphyssi eminens processus distinguit (d).

Sed qua dentium alveoli desinunt, maxilla inferior inflexa quasi sursum dilatatur, & retrorsum, duobusque finitur processibus.

Eorum anterior (e), jugo protectus, planus, hinc convexo fine terminatur, inde sinu exscinditur, qui in alterum processum continuatur *Coronoidæum* vocant.

Posterior (f) iste, durior, & solidior, sursum in crassitiem abit, quæ capitulo articulari finitur. *Condylodæus* dicitur.

Ejus latus, in universum, est finis, & duobus, non altis, eminentibus colliculis terminatur, ita positus, ut terminus exterior paulo anterior sit (g), interior idem paulum posterior. In ejus capituli facie superiori, cartilaginea crusta est, convexa (h), & retrorsum planior.

Cæterum universum os lamina exteriori utrinque levi, & media cellulosa reticulata natura constat. In ejus crassitie canalis exsculpitur, cujus lacerum (i), & amplum ostium est, sub secessu duorum processuum, in facie interna ossis, aque ea vestigium per ossis superficiem antrorsum descendit (k).

(y) SUE T. 10. f. 14.

(z) IDEM T. 5. f. 1. 2. WINSLOW n. 450.

(a) SUE ibid.

(b) ALBIN. tab. 1. f. 2. BERTIN p. 220.

(c) BERTIN p. 221.

(d) IDEM p. 220.

(e) WINSLOW n. 455.

(f) IDEM n. 456.

(g) Confer & MONRO p. 127. WINSLOW n. 456. BERTIN p. 228.

(h) CASSER L. II. T. 7. f. 2. post SPIGELIUM.

(i) BERTIN p. 221. SUE f. 30.

(k) MONRO Ed. 2. p. 161.

In senibus maxilla inferior figuram mutat, & inanibus alveolis contractis (1), & quasi concrefcentibus, multum nunc de sua altitudine amittit, fitque continuus levis & tenuis pro alveolis margo.

§. V I. *Articulatio maxillæ inferioris.*

In osse temporum utrinque ad radicem jugi eminentia est (m); pene transversa, hinc in jugum curvata, inde ab alæ pterygoideæ majoris extremo fine comprehensa.

Hæc eminentia, qua posteriora respicit, in ipso suo margine habet facieculam articulare, crustatam (n) cartilagine, non in medio, sed paulo anterieus depressam, sine utroque eminentem, interiori, & exteriori. Hæc faciecula in fetu major, fere horizonti parallela est, & deorsum respicit; in adulto retrorsum, & aliqua anteriori parte deorsum (o).

Ultra eam, parvam cerre, facieculam, retrorsum cavea insignis (p) intercipitur, inter articulare, quam descripsi, crustam, & eminentem colliculum, qui in adulto homine finem anteriorem meatus auditorii limitat. In ea cavea membranæ (q) sunt rubentes, crustæ vero cartilagineæ nihil quidquam, deque ea cavea pars minima, quam modo dixi, capsula articulationis continetur, multo minor, quam quæ condylo maxillæ recipiendo sufficiat.

Ad eam tamen facieculam articulare condylus maxillæ inferioris non (r) adaptatur. Interponitur enim meniscus (s) naturæ ex cartilagine & ligamento mixtæ (t) ovali longior, utrinque cavus: versus maxillam tamen inferiorem magis æquabili (u) sinu, ambitu paulatim rotunde

(1) RUYSCH *obs.* f. 65. 66. LEMERY *de la nourriture des os.*

(m) SUE T. VII. f. 3.

(n) WEITBRECHT *Syndesmol.* f. 31. b.

(o) Uti condyli maxillæ pars cartilaginea antrorsum & sursum FERREIN p. 430.

(p) WEITBRECHT f. 31. c. ALBIN. *tab. off.* t. 2. f. 1. m. SUE l. c.

(q) Membranæ FERREIN *Mém. de l'Acad.* 1744. p. 429. Glandulosam in ea naturam reperiri MONRO *Ess. of a Societ. at Edimb.* T. I. p. 125. 126. WALTHER *de oscit.*

(r) TARIN p. 114.

(s) Jam habet C. STÉPHANUS L. I. c. ult. p. 37. & iconem VIDUS T. 17. f. 5. 6. 7. nuper descripsit WINSLOW n. 348. Duos esse meniscos WEITBRECHT p. 80. Sed tamen fatetur alias in unum conasci.

(t) VERSAL. L. I. c. XI Membranam pene cartilagineam vocat RUYSCH *thes.* IV. n. 69. Ligamentosum quid esse mavult FERREIN

(u) Exprimit MONRO l. c. f. dextr. nimis fere COURCELLES t. 3. f. 2. 3.

rotunde intumefcente, versus os temporum (x) ora utrinque magis ultra mediam depressionem in cylindri speciem eminente instructus. Crassas habet oras, media pars tenuis est, & pene pellucet, & demum nonnunquam foramine (z) patet. Hæc cavitas respondet soli facieculæ, quam diximus marginem eminentem ante caveam oblinire in osse temporum; limbi vero eminentes menisci, & ante tuberculum, & pone idem adaptantur, quando nihil mutatum est. Quando vero maxilla retrorsum ducitur, ut dentes inferiores retro superiores ducantur (a), tunc meniscus in ipsam caveam, alioquin non ad dearticulationem natam, & inanem, eminente suo margine posteriori subit. Sibi relicta maxilla sedem in tuberculo ossis temporum repetit. Sic etiam condyli maxillæ pars sola prior cartilaginem habet, nullam posterior (b).

Ad capsulam articulare hic meniscus fortiter innascitur (c), & ea sede laterali anteriori, innatas sibi fibras (d) pterygoidei externi musculi recipit. Capsula articularis ex anteriori sede, totoque ambitu caveæ articularis ossium temporum nata, condylum maxillæ continet (e).

De hac articulatione multum pugnatum est, cum veteres (f) maxillam inferiorem in posteriorem ossis temporis caveam se inmittere docerent; J. *Jacobus RAVIUS* vero primus (g), ad tuberculum ossis temporum adaptari scriberet. Eum *BOERHAAVIUS* (h) secutus est, & alii (i) clari viri; dissenserunt alii (k); ego vero ita describo, ut frequenter

(x) MORGAGN. *Adv.* II. f. 1. 3. CHESLDEN *osteogr.* T. 38. f. 2. Expressit figuram MONRO l. c. lat. fin.

(z) Vidit etiam WINSLOW n. 348. & Cl. HEUERMAN *physiol.* T. III. p. 270. & olim C. STEPHANUS.

(a) WALTHER p. 8.

(b) FERREIN p. 429.

(c) MONRO l. c. p. 126. 127. WEITBRECHT p. 80. WINSLOW l. c. n. 353.

(d) COURCELLES *tab.* 3. B. p. 58. MONRO p. 127. WALTHER p. 8. Addit MONRO, etiam temporalis & masseteris fibras.

(e) WEITBRECHT p. 81. 82. f. 31. d. d. f. 32. h. MONRO p. 126. BERTIN p. 237.

(f) ORIBAS. p. 144.

(g) Apud ERNDL. *it. Angl. bat.* p. 96. ALBIN. *Catal. leg. Rav. ARDINOIS de med. fund. anat.* p. 18.

(h) I. R. M. n. 59.

(i) VOLKERSHOVEN *de juncturis ossium* p. 13. CANT *impet.* p. 41. *Diff. au sujet du lio de la maladie des os* II. p. 41. J. LUDOLF *de mirabili fabrica articulationis maxillæ inferioris cum osse temporum* Erford. 1749. 4. PETIT edit. PALFYN p. 96. BÖTTICHER p. 20. BERTIN II. p. 229. Siquidem radicem solam transversam jugi cartilagine ait incrustari.

(k) HEISTER *Masticat.* p. 9 FERREIN p. 429. 430. ALBINUS *de ossib.* n. 30. & 110. BOHLIUS *de morfu* p. 19. HEYMAN *Comm.* T. I. p. 452. HEUERMAN T. III p. 275. *Johannes PALFYN* in editione libri sui *van de beenderen* anni 1702. RAVIUM secutus, ab ALBINO aliter doctus, anno 1727. priorem descriptionem abrogavit.

quenter inspectas partes, veris cum cartilaginibus integras reperi. Sed etiam qui contra R A V I U M sentiunt, illustres viri, ita tamen rem interpretantur, ut & cum sinu, & cum tuberculo maxillam ajant dearticulari (1).

§. VII. *Ligamenta ejus articulationis.*

Præter capsulam articulis omnibus communem, est in maxillæ inferioris articulo ligamentum insigne, laterale (m), ortum ab osse temporum, exque ejus fine, quem diximus, posterius & inferius, quam articulatio inferioris maxillæ, & insertum in condyli maxillæ inferioris marginem posteriorem, inter angulum & condylum, supra musculus pterygoideum internum. Super hoc ligamentum arteria maxillaris interna subit.

Duo ligamenta alia describit Cl. FERREIN (n), nova & peculiaria, nata ab eminentia transversali, cui maxilla adaptatur, interius aliud, alterum exterius, & inserta in extremum condylum. Ea videntur alii Cl. viri cum capsula numerasse.

Glandula etiam mucilaginosa in glena (o) ossis temporum, & glebulæ juxta menisci ambitum muciferæ (q) in ea articulatione reperiuntur.

Pertinent ad frictionem impediendam. Ob perpetuum enim in loquendo & edendo motum, hæc articulatio magnam adtritionem patitur, neque solum meniscum perforatum, sed omnino crustam cartilagineam ossis temporum in vetula detritam vidi, inque viginti fere glebularum collectam, quæ capsula articuli comprehendebantur.

Ligamentum ab angulo maxillæ inferioris in musculus styloglossum demissum (r), latum, membranaceum, alterius naturæ est.

§. VIII.

(1) ALBINUS, MONRO, WEITBRECHT, FERREIN.

(m) WEITBRECHT p. 82. f. 32. i. An idem WINSLOW IV. n. 557.

(n) p. 430. An non hoc ligamentum BERTINI T. II. p. 238.

(o) PITSCHER *axung artic* p. 9.

(q) WEITBRECHT p. 80. PITSCHER n. 5. p. 9. MORGAGN. *Ado*. II. p. 52. COWPER *append.* f. 8.

(r) WEITBRECHT f. 32. i. EUSTACH. t. 41. f. 11. GAUTIER.

§. VIII. *Motus maxillæ inferioris.*

Multum & subtiliter nuper inprimis ab ILL. collega nostro FERRENIUS de hoc motu est disputatum. Mihi quidem integro in capite, ita est visum. Maxilla inferior a superiori deducitur, & os aperitur, duobus modis. Vel quiescunt sua in sede condyli, & solus anterior parabolæ vertex (s) descendit: vel in majori motu, una condyli antrorsum moventur (t), quantum ipsis capsula articulationis permittit, ipseque meniscus paulo ultra faciem cartilagineam antrorsum migrat (u).

Potest etiam maxilla diducta recto, & ad horizontem parallelo, motu antrorsum duci (x). Si is motus nimius fuerit, poterit maxilla antrorsum luxari, ut ante eminentiam transversalem delabatur.

Retrosum facile adparet, ut moveatur, modice quidem (y), ut maneat in eminentia transversali, sed in ea parte, quæ respicit glenam ossis temporum, & fere ad perpendicularum descendat. Vehementer demum retrorsum duci potest, ut meniscus in caveam ossis temporum innitatur, posteriori sua eminentia (z).

Motus lateralis & molitorius fit, dum apertæ maxillæ & deorsum ductæ (a) alter condylus in sua sede manet, alter antrorsum de eminentia promovetur, & una ad eam partem, ad quam eum volumus ire. Ita certe in recente cadavere reperi, & fusius ostendit ILLUST. FERRENIUS. Potest etiam maxilla antrorsum ducta (b) ad latus duci, ut alter una retrorsum cedat, versus quem maxilla ducitur.

Adde denique motum, quo os aperitur, maxilla inferiori non mota, sed capite retrorsum ducto, per biventrem (c).

Restitutio est contraria priorum.

§. IX.

(s) FERRENIUS videtur admittere l. c. p. 442. 447.

(t) IDEM p. 439. 440. 445.

(u) Conf. FERREIN. p. 447.

(x) IDEM p. 440 & c.

(y) Ad semilineam ultra situm sibi nativum FERREIN p. 433.

(z) p. 7.

(a) FERREIN p. 435. 436. 437. ad quinque lineas p. 436. *Diff. sur le Livre de la maladie des os* p. 20.

(b) FERREIN p. 443. 444. 447.

(c) p. 3. FERREIN p. 543. seqq.

§. I X. *Instrumenta hujus motus. Temporalis musculus.*

Magnus musculus (*d*), sed in animalibus carnivoris (*e*) major, quibus insignem cranii partem tenet, & comprimit, ut media crista (*f*) sola nuda emineat, in homine, quam in ullo quadrupedum debilior, oritur a magna parte laterali cranii, ex arcu circuli, qui in ipso nudo cranio distinguitur, ab orbitæ fine exteriori futuraque ossis frontis & malæ, retrorsum per partem ossis frontis lateralem nondum infimam, perque ossis sincipitis insignem arcum, ad angulum fere, quem inter os squamosum temporum & mammillare idem interponit (*g*). Deinde infra hunc arcum late ab osse temporum, frontis, & sphenoide, & aliqua parte ossis malæ, ipsoque jugo (*h*).

Ab eo arcu, quo hujus musculi origo circumscribitur, membrana cellulosa (*i*) firma, tamen vera, in laminas resolubilis, undique nascitur, & temporalem musculum protegit, in jugum late innata & in marginem orbitæ externum. Ab eo etiam involucro (*k*) undique fibræ ad temporalem faciendum accedunt, paulo supra jugum potissimum: Adeps etiam subest, qua caro deficit (*l*).

Ipse vero musculus fibras suas radiatas colligit, ut anteriores paulum retrorsum (*m*), posteriores paulum antrorsum, sed pene rectæ (*n*) eant. Eæ fere in tendinem radiatum (*o*), ut stellæ pingi solet, mediis in carnibus anterioribus & posterioribus interceptum, conveniunt, cui transmittendo in jugi parte posteriori sulcus proprius (*p*), de temporum parte squamosa, effoditur.

B 2

Descen-

(*d*) Veteribus hinc proprio nomine dictus *κροταφίτης* Rufo appell. I. p. 95.

(*e*) In genere canum, felium, leone, civetta, etiam in serpentum genere, & testudine, chamæleonte PARISINI.

(*f*) IDEM. PERRAULT *Ess. de phys.* T. III. p. 191. in leone, tigride, urso, lynce. In leone BUFFON *hist. nat.* T. IX. inque tigride IDEM T. X. Conf. BARTHOLIN. *Cent.* IV. *hist.* 100.

(*g*) Conf. ALBINUM t. 2 WINSLOW n. 832. 836.

(*h*) WINSLOW *Expos.* T. II. *trait. des muscl.* n. 836.

(*i*) ARANTIUS *obs.* p. 86. VERDIER p. 209. Conf. L. XVI.

(*k*) WINSLOW n. 838.

(*l*) IDEM *ibid.*

(*m*) ALBIN. *tab.* 12. f. 12. SANTORIN. t. I.

(*n*) IDEM *ibid.*

(*o*) Conf. ALBIN. p. 172. t. 12. f. 12. 13. & t. 2. WINSLOW n. 834. 839. 840. ARANT. l. c. Ideo forte duplicatos musculos temporales credit se vidisse MASSA *Isagog.* p. 77.

(*p*) Conf. ALBIN. p. 173. SANTORIN p. 35.

Descendit adeo jugo (*q*) tectus, a quo sæpe multis fibris (*r*) carneis augeatur, ea sede crassissimus, tum tendineus, tum aliqua parte carneus; inferitur demum in processum coronoidæ inferioris maxillæ, tum in exteriorem (*s*), tum in interiorē faciem (*t*), minus in marginem posteriorem, longius in marginem anteriorem, & in continuatam partem anteriorem semilunaris incisuræ (*u*), quæ processum coronoidæ a condyloide separat. In eam sedem caro, in apicem processus coronoidæ magis tendo inferitur.

Dum agit, maxillam inferiorem elevat ad superiorem, ad mordendum ergo servit. Quando solus operatur, una maxillam inferiorem retrorsum (*x*) ducit, & antrorsum dimotam suam in situm restituit.

Una cum Massetere agens recta magis maxillam elevat.

§. X. *Masseter* (*y*).

Unici musculi numerum tenent duo (*z*), aut tria (*a*) musculorum strata, satis distincta, quibus commune est, a jugo ossis temporum in maxillam inferiorem descendere, & ipsa crassa, etiam in homine, in animalibus magis, ut feli, & cani molosso, rotundum caput is ipse musculus faciat, quod excarni in sceleto longum est.

Cæterum, quando duo sunt masseteres, tunc *Exterior* (*b*), sive subcutaneus, major, oritur ab osse maxillæ superioris, qua malarum os sustinet (*c*), a quo eo malarum osse, ejusque margine inferiori (*d*), & a continuo processu temporum jugali (*e*).

Fortior

(*q*) COURCELLES *tab.* 3. ALBIN. *t.* 12. *f.* 13.

(*r*) HEISTER *de massic.* n. XI. SPIEGEL *p.* 93. 94. COWPER. Negat SANTORINUS.

(*s*) Conf. ALBIN. *l. c.* *f.* 12. *h. i.* WINSLOW *n.* 840. SANTORIN *p.* 36. COURCELLES *tab.* 5.

(*t*) ALBIN. *f.* 12. *g.* COURCELLES *tab.* 5.

(*u*) DOUGLAS *p.* 54. BIDLOO *tab.* 5. *f.* 12. COURCELLES *t.* 3. *n. n.* ALBIN. *f.* 12.

(*x*) ALBIN. WINSLOW *n.* 1220. Negat quidem FERRIN *p.* 547. Verum sulcus jugi utique ostendit fibras ejus musculi antrorsum inclinari.

(*y*) Hinc etiam apud Veteres nomen habent *μασσητηρων* RUFO *l. c.* ORIBAS. *p.* 182.

(*z*) ALBINUS. VERDIER *p.* 210. KAAUW. Le CLERC *osteol.* *p.* 100. 101. J. B. Cephal. *p.* 273. Caput duplex C. BARTHOLIN. *p.* 304. RIOLAN *Enchir.* *p.* 339. ut facile in duos separetur IDEM.

(*a*) Tres WINSLOW. DOUGLAS.

(*b*) ALBIN. *p.* 169. 170. *t.* 12. WINSLOW *n.* 828. seqq. COURCELLES *t.* 1. 2. N. COWPER *f.* 35.

(*c*) ALBIN. *p.* 169. *t.* 12. *f.* 20. SANTORIN *T. I.*

(*d*) ALBIN. *p.* 169. 170. WINSLOW *n.* 829. DOUGLAS *p.* 55. SANTORIN *l. c.*

(*e*) ALBIN. *p.* 170.

Fortior paulum retrorsum (*f*) tendit, tendine tectus, mistusque (*g*), & inferitur maxillæ inferiori, ab hoc ipso musculo depressæ & inæquali (*h*), pene a sede dentis molaris postremi ad angulum maxillæ (*i*).

Interior (*k*), five *profundior* Masseter, oritur ab osse jugi, quod ad temporum os pertinet (*l*); & ab osse malæ, ex margine & ex parte cava ejus ossis, sed minori portione (*m*), & a temporalis musculi involucro (*n*). Obductus splendido tendine, descendit retrorsum, sed minus quam prior (*o*), aliquando antrorsum (*p*), & super priorem brevior inferitur, in condyli maxillæ partem inferiorem, & in coronoidei processus radicem, & late sub eo (*q*) processu.

Pars ejus posterior detracta cute nuda eminet (*r*), reliqua priori masseteris parte tegitur, hætenus distincta, ut tamen non penitus ad marginem maxillæ separari possit.

Hujus nunc posterioris partis portio *Exterior* (*r**) nervo intermedio separata nonnunquam peculiare, ob suum proprium, quo tegitur tendinem, fere nomen tuetur, & a jugo (*s*) in spatium semilunare totum, atque condylum maxillæ inferioris inferitur (*t*).

Cum temporali musculo nonnihil confunditur (*u*). Maxillam recta elevat, compensatis fibrarum suarum contrariis ductibus. Caput ad maxillam depressum, & firmatum deprimit (*x*).

B 3

§. XI.

- (*f*) IDEM ibid. WINSLOW n. 829. SANTORIN. KAAUW n. 280.
 (*g*) ALBIN. f. 20. 22. b. b. COWPER.
 (*h*) WINSLOW n. 829.
 (*i*) ALBIN. p. 170. f. 20. COURCELLES t. 3. E.
 (*k*) ALBIN. p. 169. 170. tab. 12. f. 21. 22. c. t. 2. o. p. KAAUW n. 281. *Moyenne* portion WINSLOW n. 830. Second DOUGLAS p. 56. Habet COURCELLES tab. 4. seqq.
 (*l*) WINSLOW n. 830. ALBIN f. 21. & 20. DOUGLAS.
 (*m*) WINSLOW n. 830. ALBIN. p. 170.
 (*n*) ALBIN. KAAUW.
 (*o*) Chiasmum faciunt fibræ RIOLAN.
 (*p*) WINSLOW n. 830.
 (*q*) ALBIN. p. 170. conf. f. 21.
 (*r*) IDEM f. 21.
 (*r**) *Troisième portion* WINSLOW n. 831. ALBIN. f. 22. d. Third DOUGLAS p. 56.
 (*s*) WINSLOW n. 831.
 (*t*) Conf. EUMD. ibid.
 (*u*) LIEUTAUD p. 192.
 (*x*) ALBIN. p. 171.

§. XI. *Pterygoideus internus* (y).

Oppositus Masseteri, similis, minor tamen, & nonnunquam trans maxillæ marginem connexus, musculus est, *internus* (z) *Pterygoideus*, non tamen *externo* profundior, sed quod alter a lamina externa processus externi pterygoidei (a) prodeat.

Nascitur a fossa (b) utrique processui interjecta, pene tota; tum a lamina interna processus externi; porro a lamina externa processus interni (c), & ab hamuli inde nati radice, & ab osse palati (d) complente utriusque processus hiatum. Descendit pene rectus, pone maxillam inferiorem, paulum tamen extrorsum, sive retrorsum, ejusque fere margini & parti (e) fauces respicienti, & in initium condyloidis processus, ad usque sedem dentis molaris postremi inseritur.

Elevat, ut priores maxillam; & cum extrorsum aliquantum descendat, dexter eam paulum ad sinistra promovet, aut vicissim.

Perinde, ut reliqui levatores, caput potest ad maxillam deductam & firmatam deprimere (f).

§. XII. *Vis horum musculorum magna.*

Conjunctum momentum duorum musculorum temporalium, duorum masseterum, duorum pterygoideorum internorum maxillam inferiorem ad superiorem adducit: id *mordere* dicitur, quoties inter dentes utriusque maxillæ aliquid intercipitur, in quod ipsum maxillæ inferioris sursum ductæ motus infumitur.

Nunc quidem leonum, ferro suos dentes imprimentium (g): murium, qui ferrum, quique argenteos clypeos roserunt (h), exempla omitto. Etiam lucius piscis, non ponderosior duabus libris, vigenas
libras

(y) Musculi, qui ore continentur ORIBAS. p. 184.

(z) COURCELLES tab. 6. A. A. tab. 7. A. EUSTACHIUS t. 41. f. 13.

(a) I. G. PAULI ad V. v. HORNE *microsc.* p. 20.

(b) ALBIN. p. 261. t. 12. f. 15. 17. WINSLOW n. 843.

(c) Conf. ALBIN. p. 261. WINSLOW n. 843.

(d) ALBIN p. 262.

(e) IDEM I. C. EUSTACHIUS.

(f) ALBIN. p. 262.

(g) *Phil Transf.* n. 310.

(h) PLINIUS L. VIII. c. 57. ÆLIAN L. XVII. c. 17. Plumbum rodere ob dulcedinem BORRICH *de nat. dulced.* p. 76.

libras dentibus elevavit (*i*). Silices mandebat miser puer, quem nuper vidimus a circulatorum circumduci. Orbem stanneum perforavit alius (*k*). Vidit VESALIUS (*l*), qui ferreum palum, viginti quinque libras pendentem, morficus adprehensum retro se conjecit, ut ad triginta & novem pedum distantiam trahi infixus hæreret.

Alius malum elevavit dentibus (*m*), & rectum in humerum constituit; & alius scabellum ingens dentibus sublevavit (*n*), & dolium alius (*o*), equidem inane, prehensum super caput suum projecit. Alius vas duabus vini mensuris plenum, & elevavit suis dentibus, & ebibit (*p*), & retro se projecit; tum stanneas patinas 12. (*q*). Ejusmodi cantharum 116. unciiis (*r*) vini plenum fuisse vidit Vir eruditissimus, quem dentibus potor elevavit. Sed etiam 50. (*s*), & 56. l. (*t*) pondo alii elevaverunt, & demum pondo 160. (*u*), 200. (*x*), 240. 300. (*y*). Mensam sex pedum cum 50. l. extremo fini adpensis alius sustulit (*z*). Amygdali officula, quæ a 200. (*a*) libris demum rumpebantur, & perfici etiam duriora, 300. (*b*) lib. demum pondere superanda officula, sunt qui frangunt, ipseque junior fregit.

Hi conatus, calculis positis, multo sunt majores cum muscoli morfus ministri omnes ad articulationis, sive hypomochlii, viciniam inferantur, morsus vero vel incisivis, vel certe molaribus dentibus ab hypomochlio remotioribus peragatur.

Quare

- (*i*) RICHTER *ichthyolog.* p. 142.
- (*k*) PLEMP l. c.
- (*l*) L. II. c. 15. Conf. hæc jam relata L. XI. p. 486.
- (*m*) CARDAN *subtil.* p. 358.
- (*n*) RHODIUS *Cent. I. obs* 97. add. BAGLIV. p. 591.
- (*o*) PLEMP. *van spieren* p. 44. BOERHAAVE *Prælect.* T. I. p. 157.
- (*p*) ROLFINK *diss. anat.* p. 524.
- (*q*) RZASZYNSKI *hist. natur. Polon.* T. II. p. 455.
- (*r*) J. ANT. v. der LINDEN *physiolog.* p. 340.
- (*s*) RHODIUS l. c.
- (*t*) PLOT *natural history of Staffordshire* p. 293.
- (*u*) BORELLUS L. I. *prop.* 87.
- (*x*) PLOT.
- (*y*) BORELL.
- (*z*) DESAGULIERS *Course of natur. Phil.* T. I. p. 290.
- (*a*) HEISTER *de masticat.* n. 16.
- (*b*) IDEM *ibid.*

Quare vires impensæ ad 900. 1000. & 1300. (c) libras ex hac speculatione æstimantur, etsi vires efficaces infra id pondus subsistunt; & multo major foret calculus, qui Cl. DESAGULIERS experimento innititur.

Adparet adeo, etiam hominem a natura ad cibos dividendos egregie armatum esse, etsi minori vi eget, in tanto instrumentorum adparatu, majori longe feræ, quibus & prædam dentibus potissimum occidere, deinde ipsa ossa in fragmenta dividere necesse sit, ne pars alimenti pereat.

§. XIII. *Pterygoideus externus* (d).

Biceps est musculus, & aliquanto, quam continuo videatur, grandior.

Caput *inferius* (e), vulgo notius, crassius nascitur ab alæ exterioris pterygoideæ lamina externa (f); ab osse palati, quod huic alæ & sinus maxillaris parieti se interponit (g); aque osse sphenoide ad fissuram sphenomaxillarem pertinente, & a vicino osse maxillari (h). Hoc caput potius partim paulum adscendit, quæ ex ala oritur, partim antrosum fertur. Inmittitur in cavam foveam condyli, sub capite maxillæ (i), & parte aliqua in principium semilunaris incisuræ (k).

Ab eo interposito arteria nasali separatur caput alterum *superius* (l), *temporale*, potius descendens, natum a spina pterygoidea, seorsumque fere ad dimidiæ lunæ modum, a fossa temporali, pertinente ad alam pterygoideam, ad tuberculum usque in ea fossa positum, & ab eo tuberculo, cum temporali musculo connexum. Fibre inferiores transversim magis decurrunt: superiores descendunt paulum & antrosum feruntur, &

(c) BORELLUS Conf. Prop. 34.

(d) Novi musculi ab alæ facie exteriori, & ab apice acuto sphenoidis FALLOP. p. 73. Ad temporalem refert VESALIUS Exam. obs. p. 63.

(e) *One tendineo carneous* DOUGLAS p. 58. Add. ALBIN. t. 12. f. 16. a. b. c. k. &c.

(f) COURCELLES Tab. 7. H. ALBIN. p. 263. WINSLOW, n. 322. EUSTACHIUS s. 47. f. 13.

(g) Habet etiam ALBINUS.

(h) DOUGLAS. ALBIN.

(i) DOUGLAS. COURCELLES t. 3. B. ALBIN. in icon. WINSLOW n. 847. COWPER tab. 24. f. 70.

(k) EUSTACH. COWPER. VIDUS t. 38. f. 24. Q.

(l) *The other* DOUGLAS p. 58. Conf. WINSLOW n. 846. *en remplissant* &c. ALBIN. t. 12. f. 16. g. g.

& sub condylo in foveam ibi sitam, inque semilunarem incisuram inmittuntur, tum in meniscum (*m*), & in capsam articuli maxillæ (*n*).

Hic musculus motui laterali præficitur. Cum ejus directio in universum retrorsum, & paulum extrorsum sit, hinc maxillam antrorsum (*o*) ducit, & inprimis ad suum latus, ut sinister ad sinistra maxillam trahat (*p*), sic ad dextra cogat alterum condylum eminere. Motus autem antrorsum major, ad latera exiguus est.

Iterum, ut priores ad firmatam maxillam caput detrahit (*q*).

§. XIV. *Latissimus colli.*

Ad maxillam quidem deducendam, & os aperiendum multi musculi operas conferunt: biventer etiam potissimum, alias dictus: tum musculus, qui ab osse hyoide in maxillam feruntur, Geniohyoideus, & genioglossus: deinde qui os hyoides (*r*) deorsum ducunt, sternohyoideus, coracohyoideus, hyothyreoideus, denique qui laryngem, ut sternothyreoideus.

Neque abest ab hac actione vis musculorum, qui os hyoides retrorsum ducunt, ut stylohyoidei utriusque. Quæcunque nempe carnes in maxillam, vel in os aliquod cum maxilla connexum ita inferuntur, ut eam partem deducant deorsum, aut ad os hyoides adtrahant, ii etiam os aperiunt (*r**).

Peculiariter etiam maxillam, antrorsum a Pterygoideis externis ductam, retrorsum restituunt Geniohyoidei, genioglossi, digastrici, stylohyoidei, ut qui posterius quam media maxilla nati, eam retrorsum ducant (*s*).

Est tamen etiam alius musculus, qui peculiariter & carnes lateri maxillæ instratas deprimit, & una ipsam maxillam. Et si enim debilior videtur,

(*m*) Vid. p. 8. ALBIN. p. 263. DOUGLAS.

(*n*) ALBIN. WINSLOW n. 847.

(*o*) ALBIN. FERREIN *Mém. de l'Acad.* 1744. p. 549.

(*p*) ALBIN. &c.

(*q*) IDEM. Conf. FERREIN p. 538.

(*r*) Conf. MONRO l. c. p. 140. 145. WALTHER p. 9. Hinc os hyoides conatur descendere, quando maxilla inferior deprimitur FERREIN l. c. p. 536.

(*r**) Una ergo agunt Digastrici venter posterior & stylohyoideus FERREIN p. 538.

(*s*) IDEM l. c. p. 547. 549. MONRO p. 142.

videtur, cujus fibræ valde teneram & latam in laminam explicentur, tamen & magnitudine, qua omnes alios maxillæ musculos superat, tenuitatem compensat, & præterea tangitur, & percipitur ejus per ipsam pectus conatus, dum maxilla diducitur, uti quidem nunc, dum scribo, experior.

Latus, ut nomen fert, & tenuis musculus est, cuti, & porro adipi subjectus, cujus inferiores fines disjecti per summum pectus oberrant (*t*), ad aliquot sub clavicula uncias, per superficiem pectoralis, deltoidis, & trapezii. A sterno aliqui (*u*), & a clavicula oriri dixerunt. Id non vidi.

Inde colliguntur, in unum continuum stratum, & sursum, introrsum, antrorsum feruntur, subjectasque carnes, & vasa colli protegent, ut exigua sedes intima in inferiori parte colli nuda superfit (*x*). In mento dexter sinistram attingit & decussat (*y*).

Denique in facie fibræ quidem extimæ pene transversæ trans masseterem ante parotidem incedunt, & dissipatæ evanescunt (*z*). Earum interiores cum musculo risorio veniunt in angulum labiorum, interius quam triangularis. Proximæ cum triangulari (*a*) labiorum intertextæ ad angulum labiorum definunt. Aliquæ intimarum ad membranas margini maxillæ impositas hætenus adhærescunt (*b*), a symphysi pene ad triangularem, & e regione triangularis. Iterum interiores triangulari tectæ ad quadratum (*c*) menti tendunt, ibique definunt.

Ita factus musculus poterit maxillam deducere (*d*), magis tamen labium inferius, angulumque labiorum. Est adeo ex musculis, qui trititiæ characterem (*d**) faciunt. Potest vicissim, firmatis musculis, cum quibus superius cohæret, eandem cutem elevare (*e*).

Fasci-

(*t*) EUSTACH *tab.* 30. VESAL. L. II. *tab.* 3. WINSLOW n. 570. ALBIN. p. 193. *Tab.* I. & XI. f. 16. JENTY *tab.* I. f. 1. COWPER *tab.* 21. 18.

(*u*) DOUGLAS p. 24.

(*x*) C. Aug. a BERGEN *pentas obs.*

(*y*) WINSLOW n. 571. LIEUTAUD p. 165. 166. DOUGLAS p. 24.

(*z*) EUSTACH. *tab.* 30. ALBIN. l. c. COWPER l. c. PARSONS l. c. p. 30.

(*a*) WINSLOW n. 572. 573. ALBIN. *ic. cit. d.* & *tab.* I. p. 193. COURCELLES t. I. p. EUSTACH. *tab.* 30.

(*b*) DOUGLAS p. 24. WINSLOW n. 570. ALBIN. l. c. & *ic. cit. g. g.* & *tab.* I. COURCELLES *tab.* I. m.

(*c*) Conf. SANTORINUM *tab.* I. ad Y. WINSLOW. n. 572. & ALBIN p. 193. BERGEN *pentas obs.*

(*d*) DOUGLAS.

(*d**) In aponeurosin abire, quæ faciei varietates faciat VERDIER.

(*e*) ALBINUS p. 194.

Fasciculum nonnunquam ad auriculam aberrantem & ILL. Viris visum, hic omitto (f).

§. XV. *Dentes in universum.*

Maxilla sola manducationi sufficit in teneris infantibus (g), quibus cibi mollissimi soli offeruntur, inque senibus, quibus post delapsos dentes alveoli contracti evanescent, & maxilla utraque in aciem quamdam abit, callosa (h) gingivarum membrana tectam.

Quandoquidem vero maxillæ membrana, tamen sentiente & molli, obducuntur, non potest homo fructuum officula frangere, neque ossa animalium, neque duriores quamcunque crustam dividere; ita cibus parum adtritum in ventriculum descendit, quem vires multo molliores ejus sacci minime valeant adterere. Et a multis adeo cibis excluderemur, & plerosque parum recte subigeremus, nisi DENTIUM præsidium Natura nobis addidisset. Animalia præterea dentibus & armorum loco ad occidendam prædam, seque ipsa tuenda utuntur: aliqua etiam ad retinendam eam prædam, ne ore recepta fugiat, viva quæ sit, & sensim demum gulam subeat: id in piscibus (i) fere locum habet, ut in lucio, cui curvi dentes retrorsum respiciunt, prædamque de ore fugituram mira tenacitate retinent infixi. Demum cavi dentes aliorum animalium, aut venenum funestum in prædam instillant (k), aut tubi loco sunt, per quem animal succum nutritium sugat (l).

Quare natura universis fere animalibus dentes dedit: quadrupedibus calidis, puto, omnibus: frigidis plerisque; aut certe asperas, ferratas-
C 2
que

(f) Lib. XV.

(g) Non valde rarum est *dentatos* nasci infantes M. CURII exemplo, qui ab ea fabrica nomen accepit, & C. PAPIRII CARBONIS, & VALERIE apud PLINIUM L. VII. c. 16. Puer cum dentibus molaribus natus RZASCYNSKI *hist. nat. Pol.* T. II. p. 455. Adde RHODIUM *Cent. obs.* 92. L'ECLUSE I. 25. 26. STORCH *Kinderkrankh.* II. p. 242. Etiam in abortu sex mensium dentes Eph. Nat. Cur. Dec. III. Ann. 5. 6. obs. 268. & septem HELWIG obs. 28.

(h) MOUTON. p. 24. 25.

(i) CARDAN. p. 264. J. SYLVIVS. RONDELET L. III. c. 7. VALISNERI T. III. p. 448. KLEIN *Miss* IV. p. 4. In angue HODIERNA apud SEVERINUM *viper.* p. 255. In rana piscatrice *Phil. transf.* n. 492.

(k) In vipera caudifona BIRCH I. p. 479. 480. &c.

(l) SWAMMERDAM in verme sicario *tab.* 28. f. 5. Cochleæ *Kamboul* denticuli 20000. in maxilla inferiori, & sex series dentium in superiori ADAMSON p. 17.

que maxillas, dentium (*m*) similes, ipsasque etiam linguas dentibus armavit, & palata. Sic in piscibus se habet; his innumerabiles fere dentes in lingua (*n*), in palato (*o*), in pharynge (*p*), inque maxillis dedit, multorum sæpe ordinum (*q*). Etiam in microscopico vorace animalculo totum os ferris asperis intus echinatum est (*r*).

Avibus cartilagineum durumque & insensibile rostrum dentium locum hactenus tenet; in multis ferratum (*s*), & in lingua (*t*), palatoque (*u*) demum dentes pariter retinendæ prædæ causa Natura paravit.

Insectis plerisque dentes dati sunt, forte omnibus. Nam etiam polypi prædam retinent, quæ semel os subiit.

In cochlea (*x*), limace (*y*), loligine (*z*), lepade (*a*), aranea (*b*), cancro (*c*), monoculo (*d*) os dentatum est.

Sic

(*m*) Ranæ JACOBÆUS p. 80. ROESSEL *Frösche* p. 35. Testudini CALDESI p. 18. Etiam manati duo ossa solida fulcata habet pro dentibus Nov. Comm. Acad. Petr. T. I. p. 302.

(*n*) Salmoni GRONOV. *Act. Upsal.* 1741. BONGER p. 10. Lucio stratum exiguum denticulorum in media lingua est Vulpis PERRAULT III. p. 173. troctæ p. 172.

(*o*) CARDAN *variet.* p. 264. ARISTOTELES *part. anim.* III. c. 5. ALDROVAND. *paralip.* p. 86. in lucio COLLINS p. 214. SEVERIN 2002. p. 368. in muræna. In xiphia BARTHOLIN. *Cent. II. hist.* 16. Conf. du HAMEL p. 158. In palato duos majores in rana dentes addit JACOBÆUS p. 80. Palatum dentatum habent, qui testis vivunt *Nouv. obs. sur l'osteol.* p. 23.

(*p*) Troctæ SYLV. *Isag.* p. 76. aselli PERRAULT III. p. 174. In oesophago sepia NEEDHAM l. c.

(*r*) Tres in Raja PERRAULT III. p. 174 sex in cane carcharia ALDROVAND. p. 381. 382. In eodem a duobus ad sex TOWNE apud RAI *epist.* Tres & quatuor ordines, in quorum quovis dentes 30. SPORI in *itiner.* Novem in sepia NEEDHAM p. 26. 27. Dentes fasciculati in rana piscatrice *Phil. transf.* n. 492. Per os in spiram, dispositi in lampetra COLLINS p. 63. f. 4.

(*s*) HILL. *microsc. eff.* p. 275.

(*t*) Vulturi Grifoni PARISINI, anati PEYER in multis speciebus.

(*u*) Anseri ALDROVAND L. 19. p. 107. phoenicoptero PARIS. tardæ HARDER.

(*n*) In pico *Phil. transf.* n. 350. in avibus latirostris COLLINS p. 220 in gallopavone GRW *rarit.* p. 64. t. 6. f. 4. in aquila HARDER *obs.* 19. in milvo *bustard* COLLINS t. 6.

(*z*) Dentes habet ARISTOTELES *part. anim.* L. IV. c. 5. PLINIUS L. XI. p. 625. Dens unicus, octo striis & cuspidibus asper LISTER *cochl.* p. 68. Unus dens semimultiplex BRADLEY *account.* 23. Dentes ferratos connexos in unum vocat SWAMMERDAM p. 108.

(*y*) Tricuspis LISTER p. 70. *tab.* 3. f. add. HOOKE t. 25. f. 1.

(*z*) Dentes duo curvi LISTER *conchyl. bivalv.* p. XXIII.

(*a*) Maxillæ dentes numerosi decem ordinum ADAMSON p. 29. SWAMMERDAM p. 198.

(*b*) Habet dentes SWAMMERDAM p. 50. Septem GAUTHIER *obs.* p. 199. Maxillas dentatas CLERCQ *Svenska Spindlar.* p. 10.

(*c*) Duo validi ROESSEL *Insect. Belust.* T. III. p. 314 t. 56. f. 5. In cancello eremita FANTON *anat.* Ed. nov. p. 114. Add. WELCH *hesatoz.* l. *obs.* 6. 7.

(*d*) SCHÆFFER *Wasserfloh* p. 34.

Sic vespis (e) & apibus (f), bombylio (g) grylloque (h), & formicæ (i) duo sunt dentes. Bombyci duæ dentium series (k); locustæ duæ (l), vel tres (m); libellæ quatuor (n); hiruini tres secures corneæ (o). Eruca habet maxillam dentatam (p), duosque dentes, dentesque duos sicarius vermis (r), ipsis informibus animalibus echinis (s), bernaculæ (t), & hydræ sui dentes sunt (u), & lepori marino tamen gingiva dentata (x).

Sed in his animalibus etiam alio præter os loco dentes reperiuntur. In ipso astacorum ventriculo dentes tres (y), ferrati propriis musculis recti: tum in lerneæ ventriculo (z), & in verme asili (a).

Videtur latius dentium imperium, quam cordis esse; uti latissime per animalia intestinum regnat.

§. XVI. Fabrica dentium.

Fundamentum dentis, in fetu (b) nudum, in adulto homine folliculus

C 3

(e) DUO RE'AUMUR *Mém. de l'Acad.* 1719. p. 233. t. 12. f. 1. *Mém. pour servir à l'histoire des insectes* T. VI. p. 160.

(f) SWAMMERDAM p. 387.

(g) RE'AUMUR *Mém. pour servir à l'histoire des insect.* t. VI. tab. 4. f. 4. 5.

(h) Gior. di Parma 1687. p. 64

(i) GOULD *englis hants* p. 4. SWAMMERDAM *bloodlooz diertj* II. p. 23.

(k) K. Sw. *wetensk handl.* 1745. p. 256. Duo dentes MALPIGH. t. 7. f. 2.

(l) KUNDMANN p. 8. ARISTOTELES l. c.

(m) ZINANNI *cavallette* tab. 4. RAHTLER I. p. 184.

(n) RE'AUMUR *ibid* p. 400.

(o) MURALT *vademec.* p. 579. RONDELET p. 227. Sexaginta notatæ denticulis *Mém. de l'Acad.* 1739. p. 260.

(p) LYONNET p. 46.

(r) SWAMMERDAM t. 28. f. 5.

(s) PLINIUS L. XI. p. 621. RONDELET p. 528. Quinque dentes canini KLEIN *Echinoderm.* tab. 31.

(t) Sex laminæ dentatæ. NEEDHAM *discov.* p. 99. 100.

(u) BOHADSCH p. 92. Anulus 5. dentium connexorum ossorum IDEM p. 90.

(x) SCHÖNEVELD *ichthyogr* p. 41.

(y) ROESBL *Insect. Betust* T. III. p. 325. t. 58. f. 12. WELSCH l. c. HANOW. *Sel. tenb.* I. p. 514. In cancello eremita tres dentes ferrati, & duo alii SWAMMERDAM *bibl.* p. 202.

(z) BOHADSCH *anim. marin.* p. 19. idem enim est lepus marinus.

(a) SWAMMERDAM p. 660.

(b) HIPPOCR. *περι αρχων η σαρκων.* FALLOP. *obs.* p. 52. 53. EUSTACH. *de dentibus* c. 17. RIOLAN. *tract. isag.* p. 106. GAGLIARDI *de offib.* p. 88. DUVERNEY *Journ. des Sav.* 1689. n. 19. *posth.* p. 551. ZOD. II. p. 130. RUYSCH *thes.* I. *aff.* 2. n. 18. NESBIT p. 97. In nympha apis similis natura est SWAMMERDAM p. 429.

lus est (c), qui aliquam dentis similitudinem habet, & in radices productus, & in coronæ eminentias (d), aut aciem. Fit membrana rubra (e), vasculis plenissima, quæ cum muco (f), in fetu magis conspicuo, nervum (g), arteriam (h), venamque recipit, pluresve nervos, pluraque vascula, ubi plures (i) radices subsunt. Adeunt ea per propria in radice foramina (k), quæ exigua in adulto homine, in fetu maxima fuerunt, inque puero. Sensus in eo nervo acerrimus est, ut etiam per crustam osseam vitreamve doleat (l), quando ea justam crassitiem amisit. Nudus nervus ipsam auram reformidat. Convulsiones ex discisso nervo supervenerunt, cum dens secaretur (m): & ea vulgo nota sunt.

Ex superficie hujus folliculi succus fudat sub ultima gestationis tempora, qui paulatim crustam facit (n), qua pars dentis ab alveolo eminens operitur, tenuis eadem, & multo suo dente brevior. In molari circulus primo ferratus, tunc pene plana bractea: in incisivis dentibus cavum quasi digitale est, in fine ferratum (o).

Sed & ea crusta paulatim succrescit, & molles dentis radiculae (p) natura ossea comprehenduntur, quæ in alveoli ima parte manent, & demum duplex in dente maturies se distinguit.

Interior

(c) MALPIGH. *posthum.* p. 53. EUSTACH. c. 2. INGRASSIAS ad *text.* V. GALENI *de ossib.* VOLKERSHOVEN *junctur. off.* SERMES *Eph. Natur. Cur. Cent.* III. IV.

(d) GAGLIARDI p. 63. UNGERBAUER *dentit. sec.* f. IV. a.

(e) RUYSCH. MONRO p. 167. 168. DUVERNEY p. 551.

(f) SWAMMERDAM. JANKE *diff.* I. *de maxill. puer. septenn.* p. 29. RUYSCH. DUVERNEY. EUSTACH. c. 17. 18.

(g) MALPIGH. HAVERS p. 87. COLUMBUS. EUSTACH. c. 21. GALEN. *de off. text.* 5. BERTIN. l. c.

(h) EUSTACH. c. 21. MALPIGH. RUYSCH. *thes.* X. n. 27. RAU apud ERNDL. in *uin. Angl. bat.* FALLOP. *obs.* p. 52. 53. COLUMBUS p. 34. VERHEYEN p. 497. FAUCHART *chirurg. dentist.* p. 20. DUVERNEY p. 557. BERTIN. l. c.

(i) HAVERS. EUSTACH. c. 10. INGRASSIAS ad *text.* V.

(k) EUSTACH. *Syllab. part. corp. hum. petrop.* tab. 2. f. 9. DUVERNEY p. 559. *Eph. Nat. Cur. Cent.* III. *obs.* 95. NUCK *Chir.* p. 50. f. 5. WINSLOW n. 480. HAVERS *ibid.* MONRO *of the bones* p. 268. BERTIN. II. p. 242.

(l) FALLOPIUS *de off.* p. 126. a. in se ipso *obs.* p. 52. Conf. de dente fisso RABUM *de dentib.*

(m) C. BARTHOLIN. *anat.* p. 466. T. BARTHOLIN. *anat.* p. 727. Conf. COWPER ad BIDE. l. 91. f. 7.

(n) EUSTACH. JANKE I. p. 29. NESBIT *osteogen.* p. 53. t. 3. f. 14. 15. ALBIN. *adnot.* L. II. T. I. f. 5. 7. t. 2. f. 1. &c.

(o) Conf. ALBIN. *ic. cit.* t. 2. f. 23. 48. 49.

(p) Conf. GAGLIARDI p. 64. UNGERBAUER p. 7. DUVERNEY p. 553. *Journ. des Sav.* l. c. ALBIN. t. 1. f. 13. add. 19. &c. t. 2. & olim add. RIOLAN. *tract. Isag.* p. 107.

Interior pars dentis tota osseam (q), qualis in universo corpore est naturam retinet, laminatam.

Pars exterior (r), quæ de alveolo nuda eminent (r*), obducitur peculiari materie, multo quam ossa duriori, ut & limæ (s) nonnunquam, & igni (t) resistat, & in antiquissimis cadaveribus sola se sustineat, quando ossa in pollinem collabuntur (u), neque ab oleo vitrioli patiatur sibi materiem calcariam eripi, ut quidem pars ossea (x). Vitri, albi, metallici, simile quid habet, pariter in angulosas particulas fragilis, adeo dura, ut ignem subinde cum chalybe collisa elicuerit (y).

Fabrica ei fibrosa (z) est, ut in dentibus potissimum animalium mariorum vidi, quales in caverna Schartzfeldiensi reperta Gottingæ inter thesauros academicos reliqui. Videas in iis præmagnis curvisque dentibus albam lapideam materiem, cum altera alternantem, quæ cinerea, striarum parallelarum modo de axi dentis (a) extrorsum fertur. In ossea parte eadem fibræ firmanur (b). In grandibus animalibus vesiculæ adparent, quæ mucum continent, in id ipsum dentium vitrum abiturum (c).

Cæterum alveolus in fetu amplissime patulus circa confirmatum dentem connivet (c*), ejusque partem unicam, quæ radix est, contracta continet, dum vitrea nuda & absque periosteo eminent. Etiam in sceletis hominis

(q) Habet MALPIGH. t. I. f. 3. In brutis laminata est DUVERNEY Journ. des Savans l. c. & HAVERS p. 84. Non in homine GAGLIARDI p. 58. 59.

(r) BERTIN. T. II. p. 242. add. WINSLOW n. 480. HAVERS p. 83.

(r*) In radice suprema aliqua est, sed tenuis BERTIN. T. II. p. 242.

(s) ARISTOTELES hist. anim. L. III. c. 7. HAVERS p. 78. DUVERNEY p. 568.

(t) PLINIUS L. VII. c. 16.

(u) In catacombis Voyag. histor. T. II. p. 153. (Et in puella, cui costæ emollitæ, ossa ceræ similia, firmi fuerunt dentes.

(x) LUDWIG de cort. dent.

(y) GAGLIARDI p. 62. RHOD Cent. I. obs. 96. In crocodilo JESUITES Siam. p. 12.

(z) WINSLOW n. 481. HAVERS p. 79. GAGLIARDI p. 60. tab. 2. f. 3. MALPIGH. posthum. p. 53. t. I. f. 4. Histoir. de l'Acad. 1699. p. 41. 43. Fibras habet in lupo, urso, castore ROBERG off. tuberos.

(a) Transversim GAGLIARDI p. 60. Mém. l. c. p. 41. 43. NUERIUS. In molaribus cæ fibræ transversæ sunt, in acutis dentibus ad apicem tendunt HAVERS p. 79.

(b) GAGLIARDI p. 60. Mém. l. c. p. 41.

(c) Mém. de l'Acad. 1754. p. 433. Pasta mollis in bobus BOUDET Recherches T. I. p. 23.

(c*) FAUCHART p. 15. DUVERNEY p. 565. Journ. des Sav. l. c.

minis adulti, sublati omnibus aliis vinculis, plerumque dentes suis in alveolis fixi manent: & ab eodem elatere fit, ut dens alienus aut proprius in alveolum sibi aptum nuper inanem repositus comprehendat (*d*). Superest etiam post confirmatum dentem hæc natura contractilis alveoli. Nam ubicunque dens amissus est, ibi alveolus evanescit (*e*), etiam omnes in senibus, unde illa maxillæ, quam diximus, senilis angustia. Sed & gingiva (*f*) contracta dentem comprehendit, & aliquantum, sed multo minus, nervuli, & arteriolæ radices subeuntes sua cum cellulosa tela (*g*) ad dentem fundandum faciunt.

§. XVII. *Classes dentium. Incisores.*

In maxilla utraque hominis eo modo hi dentes firmanantur, ut in profundo osseo utriusve maxillæ alveolo radix defigatur; & corona, sive pars nuda dentis radici ad perpendiculum insideat. Ita vires in morfu integræ explicantur. Tantum adnotatum est, maxillam inferiorem paulum intra superiorem se recipere (*h*), ut dentes superiores una aliquanto anteriores sint: in chinensibus, ut passim lego, etiam magis, & in nonnullis faciebus, qualem matronam coram video.

Mobiles sunt in paucis animalibus, insectis, rana piscatrice (*i*), tursione (*k*) dentibus veneniferis serpentum (*l*); in piscibus fere ejusdem cum maxilla continuatæ naturæ. In homine & quadrupede diversi a maxilla, sed ei cum firmitate infixi.

Eorum

(*d*) VERDIER p. 71. FAUCHANT. PRAPP. DUVERNEY p. 563. LA MOTTE I. p. 99.

(*e*) RUYSCH obs. 82. DUVERNEY p. 563. CHESTERDEN osteogr. t. 6. f. 4. 5. C. BARTHOLIN. instit. anat. p. 463. la HIRE Hist. de l'Acad. 1699. p. 42.

(*f*) BERTIN. T. II. p. 241. HAVERS p. 85. 86. MONRO edit. II. p. 165.

(*g*) Fibras vocat DUVERNEY p. 567. & tendineas p. 568.

(*h*) EUSTACH. c. 13. BERTIN. T. II. p. 246. ALBIN. de oss. p. 5. tab. I. f. 3. SUBT. 5. f. 1. 3. MOUTON odontotechn. p. 135. Etiam in carnivoris DUVERNEY Nouvelles découvert. sur l'osteol. p. 10. BUFFON T. VI. in fele. Et in herbivoris, ut in castore Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs. 251. DUVERNEY Nouv. obs. sur l'osteol. p. 17.

(*i*) ENT. apud CHARLETON onomast. p. 74. Phil. trans. n. 492.

(*k*) TYSON p. 33.

(*l*) KLEIN herpetolog. p. 13. 44. In ceraste HASSELQUIST Palestin. p. 321.

Eorum in aliis & aliis animalibus alia est fabrica. Sunt, quibus unicum dentium est genus; sunt, quibus plura. Homini tria sunt, incisorum, caninorum, molarium (*m*).

Incisivi dentes (*n*) homini cum animalibus & herbivoris (*o*), & carnivoris (*p*) communes sunt, cum suo robore tamen dentium minimi, & debilissimi, in maxilla superiori (*q*) majores, interiores etiam maximi (*r*). Numerus in quavis maxilla (*s*) quatuor (*t*).

Commune est ipsis radicem habere unicam, conicam, compressam (*u*), recta depactam; coronam vero, quæ in aciem scindentem sensim attenuatur.

In eo porro corpore anterior facies plana pene, & modice convexa (*x*) est, figura fere quæ parabolæ, cujus axis deorsum respiciens aciem facit.

Posterior, quæ linguam respicit, triangularis est, & excavata, sulcisque nonnullis secundum longitudinem percurfa.

Natura in mordendo est cunei. Cum enim ea acies, quæ cibum dividit, tenuior sit, crassior ea pars omnis, quæ ab acie ad radicem pergit, tanto acies plus itineris faciet, quanto tenuior est parte crassa, quæ radici est propior, eruntque vires incisoris dentis in acie, ad vires radici resistentes, ut semidiameter baseos ad dentis longitudinem (*x**).

Tamen

(*m*) Habet eas classes ARISTOTELIS *part. anim.* L. III c. 1. RUFUS L. I. p. 27. L. II. p. 49.

(*n*) TOMAS GALEN. *text.* 3.

(*o*) Ruminantibus in inferiori maxilla, dentes ut homini, in superiori nulli FABRIC. *variet. ventric.* p. 118.

(*p*) Urso, cani &c. incisivi sex DUVERNEY *Nouv. obs. sur l'osteol.* p. 9.

(*q*) WINSLOW n. 468. ALBIN. p. 4 *tab.* I. f. 1. SUE t. 5. f. 1. Add. BERTIN. l. c. p. 246. ANDRY *orthoped.* II. p. 270. 271.

(*r*) BERTIN. p. 247. WINSLOW l. c. ALBIN. l. c. In maxilla inferiori quatuor incisivi dentes potius æquales sunt.

(*s*) Tantum duo, sed latiores PALFYN c. 9. GENGIA *Anat. Chir.* p. 84.

(*t*) Perinde simiæ BLAS. PARIS. TYSON p. 65.

(*u*) BERTIN. p. 245.

(*x*) IDEM p. 244. ALBIN. f. 3.

(*x**) DESAGULIERS *Course of exper. phil.* I. p. 114. 117. S' GRAVEZANDE *Philos. Newton. Instit.* II. 288. VARIGNON *Mécan.* T. II. p. 161. SWAMMERDAM *bibl.* p. 145.

Tamen cum parvi sint, & tenuis acies, & obnoxia ruptioni, solent ad ea corpora dividenda adhiberi, quæ minus resistunt, ad carnes adeo, & similia discindenda.

Incisivorum in loquendo princeps est utilitas, neque absque iis liquide pronuntiatur.

§. XVIII. *Canini.*

Homini dentium fabrica magis ad herbivora animalia accedit.

Caninus primo in utrovis maxillæ utriusve latere unicus est, ut in universum Caninos quatuor homo habeat. Neque ii satis sunt similes eorum, qui eodem cum nomine sunt in quadrupedibus de raptu viventibus (*y*). Neque enim aut longiores (*z*) adeo reliquis sunt, aut curvi. Herbivora (*a*) animalia ruminantia hac tota classe carent; carnivora ea prædam potissimum enecant, & retinent, in piscibus, in serpentibus vulnus venenant (*b*).

Homini media eorum inter molares & incisores natura est, minor nempe corona, quam molaribus magnis, quam parvis potius major, crassior quam incisoribus, non tamen in aciem, sed in coni compressi speciem fastigiata, quem verum acumen terminat, facie anteriori plana (*c*), & triangulari; posteriori rhomboidea (*d*), & sulcis inscripta.

Radix longior (*e*) quam reliquis, & potissimum superioribus, ut in sinum HIGHMORI (*f*) nonnunquam penetret; simplex eadem (*g*).

Robur, quam incisivis, majus est ob teretem naturam, & crassitiem in verticem contractam, ut tota vis denti impressa in unum punctum uniatur.

§. XIX.

(*y*) EUSTACH. c. 7. Simiæ jam longiores sunt DUVERNEY p. 20. PARIS & numero superant TYSON p. 65. In pygmæo similiter ut in homine se habent TYSON ibid.

(*z*) DUVERNEY l. c. p. 9.

(*a*) IDEM p. 12. Neque elephas p. 20.

(*b*) SEVERIN. *viper.* p. 235. 240. 418. COITEE p. 126.

(*c*) SUE f. 15. s.

(*d*) IDEM ibid. f. 6.

(*e*) BERTIN. II. p. 248. WINSLOW n. 471.

(*f*) BERTIN. II. p. 309. WINSLOW ibid.

§. XIX. *Molares (h).*

Ejusmodi dentes pisces aliquot habent, ut cyprinus (*i*), scarus (*k*), fargus, aurata, dentex (*l*); tum quadrupeda herbivora (*m*); qui enim in carnivoris molares dicuntur, ii vere trifidi (*n*), omnino ab humanis dissident: iis enim coronæ facies, qua sodalem alterius maxillæ quisque dens respicit, plana est omnino, & pene quadrangularis. Frigidis quadrupedibus dentes ferrati sunt (*o*), ut carnivoris, aut certe acuti.

In homine molaribus quidem commune est, latas habere coronarum superficies, & aliquot scrobibus & eminentiis exsculptas, corpus pene parallelopipedon (*p*), radices sæpissime plures. Est tamen inter eos dentes non obscurum discrimen.

Anteriores five *minores* (*q*) *molares* latera habent conplanata, & coronam transversim, ab anterioribus ad posteriora latiore, naviculæ similem, duabus (*r*) eminentiis distinctam, anteriori & posteriori, vallicula divisis (*s*). Exigui sunt iidem, & caninis potius minores (*t*). Radices in superiori primo una (*u*), rarius duæ (*x*), in inferiori primo

D 2

una

(*g*) Raro duplex, triplex FAUCHART T. II. t. 27. f. 12. 13.

(*h*) Γουφίος GALEN. text. 2.

(*i*) PERRAULT *eff* T. III. p. 175.

(*k*) ARISTOTELES *part. anim.* III. c. 14. PLIN. L. XL p. 621. RONDELET p. 164. reliquis ferrati.

(*l*) *Phil. transact.* n. 219.

(*m*) DUVERNEY l. c. p. 12. In equo IDEM *Nouv. obs.* &c. p. 15. elephante MOULINS p. 40. DUVERNEY p. 20. Recte adeo cornua habentium nullum dentes ferratos habere PLINIUS edixit L. XI. p. 621.

(*n*) Leoni PARIS. DUVERNEY *ibid.* Leoni, tigris, canis, urso DUVERNEY l. c. p. 9. Lynxi ALDROV. *quadruped.* I. p. 93. uncia CAIUS *can. britann.* urso DUVERNEY *ibid.* mustelæ ALDROV. l. c. p. 311. Sorici LINN. *anim. suec.* p. 12. mus ALDROVAND. *quadruped.* L. II. c. 442. vespertilionis LINN. l. c. p. 8. phocæ EPH. Nat. Cur. Dec. I. ann. 9. 10. *obs.* 98. ALBIN. *adnot.* L. III. p. 67. etiam simia RIOLAN. *simia osteol.* c. 6. TYSON p. 65. ut foli pygmæo sint humanorum similes TYSON *ibid.*

(*o*) ARISTOTELES *part. anim.* L. IV. c. 11.

(*p*) WINSLOW n. 474.

(*q*) IDEM n. 473. BERTIN. T. II. p. 251.

(*r*) WINSO n. 475. EUSTACH. c. 8. PALFYN *tab.* I. f. 4. C. Internam & externam BERTIN. II. p. 251. eadem puto nobiscum sensu. Nonnunquam tres WINSLOW.

(*s*) EUSTACH c. 8.

(*t*) JANKELL. p. 13.

(*u*) PALFYN *tab.* I. f. 4. C. EUSTACH. c. 10. Una omnibus, certe plerumque BERTIN p. 251.

(*x*) ALBIN. p. 4. EUSTACH. t. 47. f. 10. pro perpetuo VESAL. I. c. XI. INGLASS. t. 2. WINSLOW n. 477. Tres pro raro exemplo FAUCHART p. 9.

una (*y*), vel rarius etiam duæ (*z*). In superiori altero una (*a*), rarius duæ (*b*). In secundo inferiori una (*c*), vel duæ (*d*). Eæ radices in alveoli sui peculiare recessus divaricantur, & frequentius in sinum maxillarem penetrant (*e*).

Posteriores & grandiores molares tres (*f*) sunt, quando os dentibus plenum est, satis sui similes omnes, plana quadrangulari parte, quæ vitro illo tegitur, pyramidibus quatuor, breviter conicis, distincta, & interjectis foveis (*g*), aliquando etiam quinis (*h*).

Radices horum dentium sunt duæ (*i*), tres (*k*), etiam quatuor (*l*) in superiori maxilla, denique quinque (*m*), divaricatæ secundum naturam, tamen etiam convergentes, ut curvitate sua se respiciant. In superiori maxilla numerus radicum sæpe (*n*) unitate superat radicum in maxilla inferiori numerum.

Ultimus, qui fero (*o*) cum sæpe erumpat, *Sapientiae dens* dictus est, aliquando (*p*) unicam radicem habet.

Hi

- (*y*) ALBIN. EUSTACH. c. 12. f. 12. perpetuo INGRASSIAS. VESAL.
 (*z*) EUSTACH. f. 12. INGRASSIAS text. II.
 (*a*) ALBIN. EUSTACH. c. 10. pro perpetuo c. 12.
 (*b*) EUSTACH. T. 47. f. 10. c. 10. pro raro VESALIUS. Duæ confusæ, vel unitæ radices MONRO ed. nov. p. 164.
 (*c*) EUSTACH. f. 12. IDEM pro rariori c. 12. INGRASSIAS. VESAL. MONRO itidem.
 (*d*) EUSTACHIUS
 (*e*) BERTIN. T. II. p. 309. Inde morbus fistulosus FAUCHART I. p. 350.
 (*f*) BERTIN. T. II. p. 252. WINSLOW &c.
 (*g*) BERTIN. l. c.
 (*h*) IDEM II. p. 253. WINSLOW n. 475. Etiam in fetu vidi. Adde MALPIGHI. *postb.* p. 5.
 (*i*) In maxilla inferiori EUSTACH. tab. 47. f. 12. VESAL.
 (*k*) EUSTACH. tab. 47. f. 10. Tertius fere ita se habet EUSTACHIUS.
 (*l*) In quarto molari ALBIN. p. 4. EUSTACH. INGRASS.
 (*m*) LABINI de *dentib.* p. 55. f. 5. EUSTACH. FAUCHART p. 10. t. 27. f. 7. 8.
 (*n*) JANUS DAMASCEN. p. 498. ORIBAS. p. 142. AVICENNA p. 96. VESAL. l. c. XI. EUSTACHIUS tab. 47. f. 10. 12. CÆP. *Isag.* p. 43. L'ECLUSE p. 33. CHESSELDEN *osteogr.* c. 2. PAV in CÆLSUM. Non constanter WINSLOW n. 478. EUSTACH. c. XI.
 (*o*) Vigesimo anno, vel demum in senio ARISTOTELIS de *gener.* L. V. c. 8. Vigesimo quinto SEVERIN. *nov. obs.* c. 17. VESALIO anno 26. dens sapientiae erupit. Id. l. c. Quadragesimo anno FAUCH. I. p. 155. Quadragesimo tertio CARDAN. in L. *τροφις* PETRO della VALLE in *ægypto Voyag.* T. I. p. 404. Quinquagesimo sexto FAUCHART I. p. 31. Septuagesimo BÖHMER *osteol.* p. 185. Octogesimo *Isag. anat.* c. 57. & 81. anno HOFMANN *Idea* p. 300. Octogesimo tertio BARTHOLIN. p. 730.
 (*p*) WINSLOW n. 478. BERTIN. II. p. 254. EUSTACH. FAUCHART T. 27. f. 20. Duas tamen vel tres, equidem unitas & conjunctas vidit L'ECLUSE p. 32. quatuor ALBIN. p. 4.

Hi dentes lati cum sint, & vicini, peneque subjecti hypomochlio maxillæ, fortiter durissima quæque conterunt, moluntque: iidem tamen longe, quam reliqui citius carie corrumpuntur, & decidunt. Etiam prius detritis mucronibus complanantur (*q*).

Itaque in homine adulto triginta & duo (*r*) dentes sunt, de quo numero non raro unus alterve deest, de serotina classe, rarius aliquid accedit (*s*), quando sex molares sunt. Est etiam ubi duo pluresve dentes, succo osseo effuso conferruminantur (*t*) in unum, manifesto exemplo, non ex periosteo, quod hic nullum est, dentes vegetare. Est ubi omnes dentes dicuntur in unum coaluisse (*u*). Reliqua rariora exempla omittimus, dentium in palato (*x*) natorum, duplicisve (*y*) seriei, dentium cum duabus (*z*), & tribus (*a*) coronis, dentium ima parte sui rotundorum (*b*), inversorum, ut corona seorsum respiceret (*c*): & alia id genus.

§. XX. *Arteriæ venæque dentium superiorum.*

Cuique radici una arteria (*d*) data est, quæ per proprium foramen folliculum subit, & per periosteum internum, quod fuit folliculus, ramis suis dividitur. Trunci horum ramorum nuper satis innotuerunt.

D 3

In

(*q*) BERTIN. T. II. p. 253.

(*r*) POLLUX p. 200.

(*s*) Dentes 33. COLUMBUS p. 34. Dentes 33. & 34. vidit FAUCHART Ed. II. T. I. p. 3. Dentes 36 & molares 14. caninos duos, incisivos duos, præter numerum BOURDEU *recherch.* p. 25. Dentes 36. & molares 24. INGRASSIAS *text.* 2.

(*t*) Tres quatuorve connati EUSTACH. c. 29. Multi ut tres tantum in maxilla superiori dentes essent GRINGA *Anat. Chir.*

(*u*) PYRRHO dentem fuisse unicum lineis inscriptum, & EURYPTOLEMO cyprorum regi, & aliis hominibus PLUTARCHUS & POLLUX p. 201 & PRUSTIA R. filio PLINIUS L. VII. c. 16. In elephante multæ coronæ & multæ radices in unam massam coalescunt *Phil. transact.* n. 345.

(*x*) RZASZYNSKI II. p. 455. PLIN. L. XI. p. 622. RUYSCH *cat. rar.* p. 177. EUSTACH. I. c. BODING *disp.* p. 401. qui in porcis funestos esse monet.

(*y*) DAMPIER I. p. 437. In utraque maxilla MUNNIK p. 144. PLINIUS L. XI. p. 623. in Timarcho NICOCLES f. In LUDOVICO XIII. C. BALTHOLAN. p. 464. Habet etiam MEZANCHTHON apud RIOLANUM p. 482.

(*z*) SUE *tab.* f. 15.

(*a*) FAUCHART II. t. 27. f. 15.

(*b*) LARIN p. 18.

(*c*) POLLICH *increm. off.* p. 25. ALBIN. c. 9. PALTYN. c. 9.

(*d*) Solæ inter ossa maxillæ habent venas HIPPOCRATES *περί αρτην. & φλεβων.*

In maxilla superiori plures sunt, *alveolares* posteriores arteriæ, tum *infraorbitalium* rami.

Alveolaris arteriæ alter truncus in osse maxillæ & gingiva antrorsum procedit: alter, qui huc pertinet ramus *posterior* (e), *dentalis*, in parte posteriori sinum maxillarem faciente (f) canalem in osse invenit, inque eo super dentium postremorum radices antrorsum tendit, & ad alveolos eorum, & in radices dentium (g) furculos dat, minime obscuros, molarium, caninorum, incisivorum. Pergit idem per canalem super dentes incisivos, & iis pariter furculos dat, & denique in nares exit (h). Ab eadem arteria furculi sinum HIGHMORI subeunt (i), in cujus fundo nudus nonnunquam nervus adparet. Est ejus etiam cum palatina arteria anastomosis (k).

Infraorbitalis arteria furculum unum (l), duos, tres (m) per proprium canalem secundum sinum HIGHMORI deorsum mittit, nonnunquam in eo sinu nudos, cui ramulos dant. Idem cum dentali (m*) arteria conjunguntur, & eorum aliquando prior solus anteriorem dentalem edit, quæ incisores [n] adit; alias & ad molares ramos misit [o], quem quidem ramum non reperi, neque ideo rejicio.

Inferiorum dentium unica est arteria, a maxillari nata interna [p]. Ea trunco suo inter pterygoideos descendit, emittit ramum, comitem buccinatoris musculi; alium ad pterygoideum internum [q], alium furculum per sulcum maxillæ inferioris [r], cum nervo ad mylohyoideum musculum iturum [s]. Demum ejus truncus per canalem ejus ossis
posterior

(e) *Fascic. ic. II tab. art. max. intern. Add. not. t. & GUNZ art. maxill. p. 31. breviter iste & BERTIN. II. p. 269. 270 398. & JANKER II. p. 33. & DUVERNEY posth. p. 558. & FAUCHART p. 20. & ILL. MEKEL de nerv. Quint. Par. n. 72. p. 65.*

(f) *Fascic. VIII. p. 17.*

(g) *BERTIN. p. 270 264.*

(h) *Fascic. VIII. l. c. L. XIV. p. 149.*

(i) *Fascic. VIII. p. 17*

(k) *Fascic. II l. c.*

(l) *Fascic. VIII. p. 18. BERTIN. p. 176. 268. 414. DUVERNEY posthum. p. 558. FAUCHART.*

(m) Tres facit Cl. JANKER, & anteriores duos IDEM *off. max. septenn. p. 33. 34.*

(m*) *Fascic. VIII. l. c.*

[n] *BERTIN. p. 269. JANKER. DUVERNEY.*

[o] Posterioriorem ad molarem tertium, quartum JANKER *ibid. f. 6. f. p. 34.*

[p] *L. X p. 115.*

[q] *GUNZ p. 25. Fascic. II. l. c.*

[r] *BERTIN. T. II. p. 221.*

[s] *Fascic. II. l. c.*

posterius subit [*t*], subque dentibus antrorsum migrat, deque foramine mentali ad dentem molarem anteriorem primum quidem trunco suo ad faciei mentique musculos exit cum labiali varie inosculatus [*u*]; ramo autem minori [*x*] sub incisoriis dentibus ad mediam synchondrosin pervenit, obscuriori, perque diploen eunte canali suscepta. Non est exigua arteria, & divulsa periculi plenas hæmorrhagias fecit [*y*].

Ad radices dentium molarium, caninorum & incisivorum, uti de superiori maxilla dictum est, suos emitit furculos.

Venæ arteriarum sunt comites, nondum a quoquam pro dignitate descriptæ. In maxilla inferiori vena proprio canali sub arteria utitur.

Nervi in universum arteriarum comites, nisi quod subinde alio, vicino tamen canali continentur, veniunt in maxilla superiori, & a secundo ramo quinti paris, sodales arteriæ dentalis posterioris [*z*]: & ab eodem trunco, quando jam orbitam subiit, sive ab infraorbitali [*a*], & anterior nempe ramus [*b*], comes arteriæ, quam diximus, & posterior [*c*] ad molares dentes.

Rami dentales inferiores sunt a trunco tertio [*d*] quinti paris. Canalis, quam arteriosus superior, vicinus alveolorum, inque ipsis aliquando alveolus nudus est [*e*]; rami, ut arteriæ, dentes adeunt.

§. XXI. *Buccæ.*

Non potest manducatio plane intelligi, nisi muscoli cogniti habeantur, qui cibum dentibus subministrant, sunt autem ii, præter linguales [*f*] dudum dictos, muscoli potissimum, qui *buccas* gubernant. Eo nomine intelligimus hemisphærium fere, cute & extus tectum, & intus, inter-

[*t*] COLUMBUS p. 181. FALLOP. p. 132. DUVERNEY p. 557. *Fasc. II. tab. art. maxill. int.* A. d. not. n

[*u*] *Fascic. II. l. c. tab. art. lab. Q. Fascic. VIII. p. 16.* COLUMBUS. LIEUTAUD. WINSLOW n. 62.

[*x*] JANKE II. p. 32. MONRO p. 159.

[*y*] SOLINGEN *operat.* p. 322. & forte CHRISTINUS *Cent. III. obs. 12.*

[*z*] L. X. p. 214. 215.

[*a*] p. 215.

[*b*] Ibid.

[*c*] Ibid.

[*d*] p. 217.

[*e*] BERTIN. T. II. p. 278.

[*f*] L. IX. p. 422. seqq.

interque utramque cutem carneum, mobile, varieque figurabile. Id velum ab osse malæ jugoque, & a nasi radice, septoque, & a naribus descendit. Dentes utrosque prætendit, ut mobile distet, demumque in maxilla inferiori late secundum ejus marginem inferiorem in cutem redit.

Media fissura finditur, quæ dentibus brevior, cæterum parallela, respondet concursui utriusque seriei.

Pars genarum, proxima utique dentium ordini, tenerrima cute rubraque tegitur, & molliter tumida *labii* nomine venit; labium vero vocant totam mobilem partem, cutaneam, carneamque, quæ hinc os inter est, & nasum, inde inter os & maxillam inferiorem. Utrumque labium plica elevata internæ cutis in speciem ligamenti ad gingivas firmat [g]. Inferius minus est [h]. Infra labium inferius ad maxillæ finem medium mentum est; genæ dicuntur, quæ & ante os mali, & sub eo secundum labiorum latera tument.

Cutis exterior in genis & ipsa tenuis, & præter solitum plena est vasorum, quæ per epidermidem plurima pellucunt. Eadem nitet aut retento sanguine, aut vehementius impulso, ab ira, a pudore, a gaudio, a desiderio.

Interna cutis cum tenera epidermide [i], multo tenuior [k], simplicior cute externa, membranæque similior est. Ei cuti, uti alias repetitur, numerosissimæ glandulæ ovales incumbunt, quam late labia, genæque & mentum patent.

Inter has buccas & dentes maxillasque cavum est, exterius quasi oris atrium, quod sponte connivet, ut buccæ dentium sint vicinissimæ; sed varie aut recepto aere, aut musculis agentibus, buccæ possint, vel ab ossibus diduci, vel vicissim apprimi.

A vero ore hoc cavum dentium septo separatur; eo aperto, diducta maxilla inferiori, buccarum cavea cum ore vero conjungitur. Potest ex oris posteriori cavea [k] lingua exire, adque omne punctum internum buccæ adplicari.

§. XXII.

[g] MORGAGNUS *Advers.* I. p. 1.

[h] Duplex in superiori labio RUYSCHE *Thef.* II. aff. 2. n. 5.

[i] MONRO *Ess. of a Societ. at Edimb.* T. III. p. 118. CASSERONI in *posthumis*.

[k] Tunica exsanguis oris interni, linguæ, faucium, laryngis, gulæ ORIBAEUS p. 46

[k*] L. IX. p. 430.

§. XXII. *Buccarum musculi. Labii superioris levatores.*

Eorum primus fuerit, quem descripsimus *nasalis labii superioris* [1], qui id labium totum sursum vertit, etiam extrorsum, & narium meatui adplicat, ut eum meatum claudat. Lacrimas exprimere alii addunt [m].

Sequitur is communis *labii superioris & alarum narium levator* [n], qui ab orbitæ margine inferiori, & interiori [o], a quo osse maxillæ superioris processu nasali [p], supra ligamentum musculi orbicularis palpebrarum & infra idem, duplici principio natus, paulum extrorsum descendit, emissa nasali portione, fibrisque extrorsum declinantibus, & dispersis extrorsum, in cutem labii superioris inseritur, inque orbicularem labiorum. Ea labium superius [q] elevat, os aperit.

Alter *Levator labii superioris proprius* [r] a margine inferiori, interiori, orbitæ secundum priorem natus, simplex aut duplex [s] descendit introrsum, inque decussim prioris musculi, cum quo tamen etiam confunditur, per labium superius se dispergit, latus & brevis. Id labium elevat, & simul os extrorsum ducit.

Non est valde rarum, secundum ejusmodi muscolum propiorem [t] ossibus, ad interiora Levatoris communis, quem continuo dicemus, ab osse maxillæ peculiariter dicto, sub foramine infraorbitali nasci, inque orbicularem labiorum se inmittere.

Fasciculum

[1] L. XIV. p. 128. 129. COURCELLES tab. I. lit. I. II. lit. I. t. 3. l. 1.

[m] BERGEN pent. obs. n. 1.

[n] ALBIN. p. 151. T. I. w. x. y. T. XI. f. 10. SANTORIN. Tab. I. S. n. 4.
Cl. LIEUTAUD p. 164. EUSTACH. tab. 41. f. 1. Quintus VESALIUS, FALLOR. p. 67.

[o] COURCELLES.

[p] ALBIN. Tab. XI. a. b. Grande portion de l'incisif WINSLOW n. 563.
n. 3. LIEUTAUD p. 164.

[q] ALBINI p. 152. Tab. XI. f. SANTORIN. s. 8.

[r] ALBIN. p. 153. T. I. XI. f. 10. c. f. COWPER tab. 21. 22. n. 24.
SANTORIN. tab. 1. R. COURCELLES R. exterius EUSTACH. ibid. Autre portion de l'incisif WINSLOW n. 563. N. 2. Cl. LIEUTAUD.

[s] ALBIN.

[t] An musculus parvus rotundus ex cavitate ossis maxillæ HABICOT D. V. Lect. 10.

Fasciculum alias diximus [a], qui ab orbiculari palpebrarum musculo, ad pinguedinem, etiam duplex & triplex se dispergit.

§. XXIII. *Zygomatici.*

Zygomaticus major, ab omnibus receptus, oritur a facie anteriori ossis malæ [x], pene ad radicem jugi, simplex [y], fissus etiam & duplex [z], atque triplex [a]; descendit oblique, inque angulum oris venit, in quo labia committuntur, atque in labii superioris orbicularem labiorum [b], inque triangularem labii inferioris finitur, ut cum suis fibris descendat [c], nonnunquam & in quadratum [d], & in buccinatorum [e]; aliqui etiam fasciculi per adipem ad oram triangularis evanescent, aut arcu facto in risorium reflectuntur [f]. Oris angulum diducit, fursum & ad latera, os aperit, genam in tumorem congerit, ad risum confert.

Zygomaticus minor [g] oritur ab ossis malæ facie anteriori, magis ad interiora, sive propius naso, supra priorem [b]: descendit similis, & inmittit se [i] in labium superius, ejusque orbicularem, conjunctus cum ejus labii levatore [k].

Officium prioris fere idem repetit, tantum, ut labium superius solum regat.

§. XXIV.

[a] ALBIN. *tab. I. t. XI. g.* SANTORIN. o. LIEUTAUD p. 164. Add. CHESEDEN *anat.* p. 76. CANT. T. 3. f. 1. PARSONS l. c. n.

[x] ALBIN. *tab. XI. f. 10.*

[y] Simplex EUSTACH. T. 41. f. 1. COWPER *tab. 32. n. 20.* COURCELLES *tab. I. G.* SANTORIN. ALBIN. p. 157. *tab. XI. f. 10. II. 12. 13.*

[z] Compositus WINSLOW n. 559. duobus fasciculis insertus BOEHMER *fascie. obs.* p. VIII.

[a] MORGAGN. *Adv. II. p. 29.*

[b] SANTORIN. ALBIN. l. c. f. 13.

[c] CANT. T. I. ALBIN. p. 157. EUSTACH. SANTORIN. ALBIN. f. 10. m.

[d] SANTORIN. m. ALBIN. f. 10. n.

[e] ALBIN. p. 157. f. 13. WINSLOW n. 559.

[f] COURCELLES *tab. I. G. y. L.* SANTORIN. x.

[g] WINSLOW n. 560. ALBIN. p. 155. T. XI. f. 10. i. h. SANTORIN. t. I. Q. PARSONS l. c. g. WALTHER p. 5. EUSTACH. t. 41. f. 1. an non fasciculus ad levatorem MORGAGNO dictus l. c.

[h] EUSTACH. ALBIN.

[i] Duos facit COURCELLES *tab. I. E E.*

[k] ALBIN. EUSTACH. WINSLOW.

S. XXIV. *Musculi labiorum communes aliqui.*

Levator labiorum communis [*l*] satis late oritur sub foramine [*m*] nervi infraorbitalis, ex foveolis ossis maxillaris super alveolos dentis canini, primique incisoris, & inde introrsum, etiam diviso, ut sæpe vidi [*n*], vel triplici [*o*], nam & ita reperi, principio: descendit inde pene rectus; angustior fit, & partim in orbicularem labiorum continuatur [*p*], partim in triangularem [*q*]. Zygomaticus etiam cum eo cohæret [*r*], eo tectus, tegensque buccinatorem [*s*]. Labium superius mentumque elevat, os quod apertum fuerat, claudit, genamque, quam moeror depressit, in lætitia elevat.

Risorius [*t*] musculus est, non ab offe ortus, sed a fibris latissimi colli aberrantibus, aut a celluloso firmoque involucro masseteris ad mediam fere auriculæ altitudinem, alias e lobuli regione [*u*]. Introrsum tendit, arcu [*x*] facto, deorsum primum, deinde sursum, accipit non raro accessorium a Zygomatico fasciculum, inque angulum oris superius, & anterius quam triangularis inseritur.

Oris angulum diducit, genam in breviorum latitudinem contrahit, inque colliculum.

Triangularis [*y*], *Depressor anguli oris* [*z*] latiori principio prodit a membranis maxillæ inferioris marginem obducentibus, & a colli latissimo, adscendit, una interioribus fibris curvatus [*a*], externis rectus, & extrorsum convexus redit ad angulum oris, cum risorio & platysmate

E 2

unitur.

[*l*] Quartus FAELOPII. Habet EUSTACHIUS t. 41. f. 1. 3. Levator anguli oris ALBIN. p. 155. *Les canins* WINSLOW n. 561. Simplex COURCELLES t. 2. H. SANTORIN. t. 1.

[*m*] SANTORIN. T. 1. o.

[*n*] ALBIN. tab. XI. f. 12. 13.

[*o*] COURCELLES tab. 1. h. h. h.

[*p*] ALBIN. p. 156. & *ic. cit.*

[*q*] IDEM *ibid.* & *ic. cit.* WINSLOW *ibid.*

[*r*] COURCELLES.

[*s*] SANTORIN.

[*t*] IDEM t. 1. n. COURCELLES t. 1. L. WEITBRECHT *Comm. Acad. Petrop. Tom. 9.* PARSONS *of physiogn.* T. 1. r. GAUTIER Tab. 1. Habet, sed non pro musculo, ALBINUS p. 194.

[*u*] SANTORINUS. COURCELLES.

[*x*] IDEM.

[*y*] WINSLOW n. 566.

[*z*] ALBIN. p. 158. Parvum SANTORIN. Majorem COURCELLES tab. 1. m.

[*a*] SANTORIN. EUSTACH.

unitur, & in Zygomatium [b], & Levatorem [c] modo dictum, inque orbicularem inprimis superiorem [d] continuatur.

Externæ fibræ introrsum tendunt, internæ extrorsum. Deprimit labia, os aperit, affectus tristic facit hieroglyphum.

§. XXV. *Musculi labii inferioris.*

Transversus menti SANTORINI [e] plerumque mihi adfuit carneus, rubro ponte tegens platysmatis fibras intimas, ut transversis fibris angulum menti subtenderet, a dextro triangulari in sinistrum continuatus.

Possset pro triangularis parte haberi. Nonnunquam dexter sinistro supra mentum potius lunato ductu cohæret [f].

Quadratus [g], *Depressor labii inferioris proprius* partim inter triangulares nudus eminet, partim tegitur.

Oritur, uti diximus [h], ex latissimi colli continuatis fibris, & a margine maxillæ [i], tum intra eundem, tum eo tectus, ex periosteo. Fibræ inde introrsum adscendunt, & inferiores quidem transversim a dextro musculo in sinistrum continuantur. Superioribus se decussantibus [k] in orbicularem [k*], & in labium inferius idem se inmittit, & adeo vehementer adhæret cellulosæ telæ subjectæ, ut nitide separari nequeat.

Levator menti [l]: *elevator proprius labii inferioris* [m] unus utrinque, carneus firmiorque est musculus, quam priorum multi. Nascitur ex maxillæ inferioris fovea sub alveolis dentis incisivi [n] exterioris, & fibras etiam habet ab orbiculari; descendit, non quidem decussatus

[b] SANTORIN. ALBIN. T. XI. f. 10. EUSTACH. t. 41. f. 2.

[c] ALBIN. p. 159. T. XI. f. 12. Add. COWPER tab. 32. n. 22.

[d] COURCELLES. WINSLOW. ALBIN. f. 11. 13. p. 159.

[e] p. 27.

[f] Ita ALBINUS p. 159. EUSTACHIUS tab. 35.

[g] WINSLOW n. 567.

[h] ALBIN. p. 160. COURCELLES t. 2. E.

[i] ALBIN. tab. XI. f. 9. 10.

[k] SANTORIN. y. COURCELLES Tab. I. II. O. EUSTACHIUS tab. 35. t. 41. f. 2.

[k*] COURCELLES t. 1. 2. WINSLOW n. 567.

[l] ALBIN. p. 168.

[m] COWPER Myolog. ed. 1724. t. 31. n. 26. DOUGLAS. SANTORIN. q. r. ut tamen valde superior sit. *Incisif inferieur* WINSLOW n. 568. Syllab. part. corp. hum. Petrop. edit. t. 10. f. 9. *Houpe du menton* LIEUTAUD p. 166. 167. t. 6. ut tamen jungat cum Quadrato. Recte separat PETIT ad PALFYN II. p. 327. cujus est *houpe du menton*.

[n] ALBIN. tab. 3. B. B. tab. XI. f. 15.

tus [o], sed sibi ut accedat utrinque [p], inque cutem menti [q] se inmittit, qua ea ad colliculi modum eminet, inque quadrati partem interiorē, transversam. Eam elevat, labium inferius, postquam deorsum tractum fuit, suum in locum restituit, & idem ultra labium superius seorsum tendit, in contemptu, & indignatione.

Depressorem labii esse alii [r] monent, ut tamen mentum eleve.

§. XXVI. *Buccinator.*

Buccinator non quod inflat buccas, sed quod inflatas deprimat, aeremque per lituum expellat, magnus musculus est, eorumque qui genas & labia adeunt vastissimus.

Ejus triplex origo est, a maxilla quidem superiori [s], supra ultimum dentem molarem, qua sinum HIGHMORI continet, tum a tabulæ pterygoideæ facie extima [t]; aque corniculo pterygoideo [u].

Sequentes fibræ ab ipso pharynge [x], a regione pterygopharyngei prodeunt.

Imæ a maxilla inferiori [y], ejusque sede sub coronoide processu, quæ nervum admittit, pone dentes molares supremos, e sede cavi ibi positi fulci.

Ita latus fit musculus, fibris in universum transversis, parallelis [z], ut tamen supremæ aliquantum descendant, adscendant [a] vicissim infimæ, totusque musculus angustior fiat. Buccam præter tegumenta interna & externa idem constituit, & versus labia antrorsum it, subjectus levatoribus, & depressoribus, quos dixi [b], ut & superior pars mu-

E 3

sculi

[o] Ut apud SANTORINUM.

[p] COURCELLES t. 3. m. M. tab. 4. C. C.

[q] LIEUTAUD p. 167.

[r] WEITBRECHT. *Comm. Acad. Petrop.* T. IX. p. 252. LIEUTAUD.

[s] MORGAGNI *Epist.* XI. n. 42. CASSEBOHM. DOUGLAS p. 23. ALBIN. p. 162. WINSLOW n. 723. COURCELLES tab. 3. O. tab. 4. f. 1. I. I.

[t] MORGAGNI. p. 360. ALBIN. p. 162.

[u] ALBIN. p. 162. DUVERNEY *myotom.* p. 45. MORGAGNI. p. 360. SANTORIN. t. I. & n. 35. DOUGLAS p. 23.

[x] VALSALVA apud MORGAGNI. *Epist.* XI. p. 353. n. 41. DOUGLAS p. 23. ALBIN. p. 162. tab. 10. f. 3. 3. 8. 10. COURCELLES tab. 3. O. t. 42. DUVERNEY l. c. GARENGEOT *myotomie* p. 118. LIEUTAUD p. 175.

[y] ALBIN. p. 162. tab. XI. f. 14. MORGAGNI. l. c. p. 360. COURCELLES tab. 3. O. tab. 3. 4.

[z] SANTORIN. Tab. I. N. N. EUSTACH. tab. 41. f. 1. 3.

[a] COURCELLES tab. 4. Fibræ adscendentes mediæ ALBIN. *ibid.* T. II. f. 14. d.

[b] ALBIN. f. 13.

sculi ad utrumque labium det, & inferior (c), atque fibris suis partim in superioris labii orbicularem (d), partim in inferiorem orbicularem se inmittat (e).

Buccas evacuat, dum ore clauso, arcus a cibo aereve distentos efficiunt, quos vi sua contractili in rectitudinem porrigit, ut pars media ad dentes accedat. Os ad latus ducit, & buccas in rugas contrahit (f), uti fit in risu effuso, & in cachinno (g). Pharyngem arctat ore clauso, etiam ob conjunctionem cum orbicularis labiorum musculi parte ossi inmissa.

§. XXVII. Orbicularis labiorum.

Orbicularis labiorum musculus (h), compositæ fabricæ est & difficilis.

In universum equidem fibræ sunt in superiori labio in arcum modice convexum flexæ (i), & in inferiori, quæ in utroque oris angulo partim circumductæ sibi continuantur (k), partim intertexuntur decussatæ (l).

In eas fibras zygomaticorum, levatorum, depressorum muscutorum, quos huc usque diximus, pene omnium fibræ degenerant (m), & finiuntur. Profundius stratum buccinatores fere foli efficiunt.

Sunt autem ejus orbicularis musculi aliqua strata interiora etiam ossi adnexa. Et in superiori quidem labio (n), a dentium incisivorum alveolis extrorsum feruntur, adduntque se orbiculari, & buccinatori.

In

(c) ALBIN. p. 162. Decussari, ut imæ in labium superius eant, supremæ in inferius COURCELLES t. 4. p. 1. 2. 2.

(d) Superiorem ALBIN. f. 14.

(e) Ad inferiorem ibid.

(f) IDEM p. 163.

(g) PARSONS of *physiognomy* p. 30.

(h) Superiorem ab inferiori separat WINSLOW IV. n. 553. 554. 556. Add. FALLON PIUM p. 67. b. LIEUTAUD.

(i) ALBIN. Tab. XI. f. 10. 11. 12. 13. 14. & tab. 3.

(k) IDEM p. 163. 164.

(l) WINSLOW n. 553. COURCELLES tab. 3.

(m) ALBIN. p. 164. & ic. cit. COURCELLES t. 1. k. k.

(n) Secundus ordo SANTORIN. t. 1. h. *Sur demi-orbitaires* WINSLOW n. 555. *Origine buccinatoris ab alveolis dentium* VERDIER.

In inferiori pariter, a maxilla inferiori (o) infra alveolum dentis canini, aut incisoris proximi, fibræ proveniunt, quæ transversæ, sed in arcum sursum versum extrorsum ductæ se orbiculari addunt, & eædem in buccinatorem (p) continuantur.

Claudit hic musculus os, fibris ultra omnes Mathematicorum calculos ad tertiam, quartamve partem suæ longitudinis contractis, & angulis ad se mutuo adcedentibus, ut transversum os in orbiculum perbreve fiat.

§. XXVIII. *Manducatio.*

His nunc viribus cibus & recipitur, & promovetur, & manducatur. Nam adsumitur vi aliqua musculari, labiis aut deductis, & revolutis, & maxilla inferiori modice depressa, infusoque potu; aut vicissim, labiis ad vas, ex quo bibitur, adplicatis, lingua primum ad dentes admota, tunc vero retracta (q).

Retinetur idem, cibus aut potus, buccis ad ossa maxillæ superioris, inferiorisve adpressis, & ore simul per suas vires clauso. In sene; cum buccarum muscoli paralytici essent, cibus potusve elabebatur de ore (r).

Promovetur retrorsum potissimum labio superiori, inferiori, aut gena ad eum cibum, quem volumus promoveri, adplicatis: deinde linguæ ope, quæ mira volubilitate ad omnes oris utriusve angulos pervenit, cibumque aut potum in dorsum suum onerat, lateribus sursum ductis (s), in vasculi speciem facta; defertque eosdem, & circumgestat: aut apice etiam crassiori de angulo, quem tenuerit per styloglossos depellit, & secum curvato mucrone, quo lubet, urget. Modo dentibus admota, deinde reducta, ex cavea buccali humorem, cibumve manducatum fugit, & in posterius cavum oris defert.

Vicissim

(o) ALBINUS p. 164. Tab. XI. F. 14. *Accessor buccinatoris* COURCELLES t. 3. 4. *Productor labii inferioris* SANTORIN. tab. I. 5. WEITBRECHT l. c. p. 253. *Accessoires du demiorbiculaire inferieur* WINSLOW n. 569. *Origo buccinatoris ab alveolis dentium inferiorum* VERDIER ibid.

(p) ALBIN. p. 165.

(q) De suctione L. VIII. p. 296. Ejus species est potus.

(r) HEYMANN Comm. T. I. p. 483.

(s) L. IX. p. 419. &c.

Vicissim dentes vel recta adducti mordent, dividuntque: vel motu laterali acti inferiores molares duriora quæque contra superiores immotos adprimunt, & prætereundo simul, atque adscendendo molunt, ea magna vi, quam diximus (t).

Estque ea commolitio maximi ad subigendos cibos momenti. Neque enim aut in ventriculo, aut in volumine intestinorum ulla porro vis ad cibos adplicatur, quæ cum dentium momento ullo modo conferri mereatur. Ostendetur enim, ne membranas quidem uvarum in reliqua tota via cibaria frangi, cum dentes etiam persicorum pomorum lapillos diffringant.

Quare magna cum jactura in digestionem manducatio intermittitur, fenesque carnes, nisi minutatim consciderint ad aliquam manducationis similitudinem, male omnino coquunt (u). Ejus vitii sæpe se reos faciunt homines literati nimium diligentes. VOSSII uxor marito cibos in os suppeditabat (x). Senex edentulus cibos, quos non manducabat, altero die ruminatione aliqua reddere cogeatur (y).

Et contra sola manducatione diuturnæ cardialgiæ superatæ fuerunt (z). Nuper nutricis manducationem infanti optimam esse, parvus recepti moris admirator fassus est (z*), facileque crederem, ex multo pariori cibi copia posse satis virium alentium extrahi, dum ii diligentius manducarentur. Quare cum ea actione natura miram voluptatem conjunxit. Siccissimum panem expertus sum grate dulcem reddi, quando accurate & diu dentibus subigitur.

S E C T I O I I.

S A L I V A.

§. I. *Humor oris.*

NON tamen folius commolitionis hæc laus est. Magna enim pars ad humorem pertinet, cum quo cibus subigitur. Is saliva est, cum exhalante

(t) p. 14. 15. 16.

(u) SCHOOK *de fermentat.* p. 332.(x) KUNDMANN *Zustand* p. 112.

(y) Vide in Ventriculi historia.

(z) TISSOT *de l'onanisme* p. 144.(z*) BUFFON *Histoire naturelle* T. II. p. 464. 465.

exhalante humore, & aliquo mucō mixta. Salivam enim peculiariter dicimus, quæ ex ductibus propriarum glandularum conglomeratarum, in os defluit. Mucus ex glandulis minoribus per breviora ostia effunditur; humor exhalabilis de arteriarum productis finibus.

§. II. *Salivæ fontes. Parotis.*

Præcipua hæc secundum aures glandula (a) conglomerati generis, ex acinis fit, in racemos coalescentibus, quos cellulosa tela revincit: & demum universa glandula cellulosis pariter filis, sed textum firmiorem mentientibus, in parte anteriori & media, obducitur, tamquam aliqua membrana, pene tendinea.

Hæc glandula partim cavam sedem inter angulum maxillæ inferioris processum (b) mastoideum & auriculam occupat; partim nuda masseteri (c), & ejus maxillæ nudo ramo subcutanea imponitur. Hinc jugo (d) terminatur, inde biventre musculo.

Figura in univèrsū est, quæ antè duo cornua introrsum protrudat, *superius* (e) quidem sub jugo, e tragi regione, longius, aut connexum cum reliqua glandula Parotide, aut nonnunquam ita separatum, ut peculiarem glandulam (f), sodalem Parotidis referat. Vidi defuisse, vidi duplex fuisse. *Inferius* breviusque cornu paulum sub maxillæ inferiori margine trans musculum sternomastoideum, biventrem, jugularem venam & carotidem arteriam, ad glandulam maxillarem continuatur, solaque vena faciali separatur. Reliqua *posterior glandulæ pars*, retrorsum ad aurem convexa, qua cranium respicit, nullam certam figuram habet, & ad vicinas partes se undique accommodat. Superne angustior lunata facie meatui auditorio adplicatur, eique adhæret: alia plana pariter facie in depressam sedem supra processum styliformem recipitur, & fulco

(a) Vide COURCELLES, & *tab. art. labialis in Fascic. III. ic. anat.*

(b) IDEM *Tab. I.*

(c) *Tab. art. lab. Tab. tot. corp. ant.* Pars ante masseterem alias latior est, alias minus lata.

(d) COURCELLES *t. I. tab. nostr. art. lab. & tab. anter. tot. corp.* Jugo fortiter adhæret LIEUTAUD. p. 170.

(e) Lacinia &c. MORGAGN. *Advers. VI. p. 129.* Paulum distinctam pingit SAN-
TORIN. *tab. I. i.*

(f) *Tab. art. lab.*

fulco effoditur pro arteria temporali, eademque sub meatu auditorio inter aurem & condylum maxillæ, cui incumbit, angulum circa processum styliformem, inter aurem & maxillam totum replet, tum superius spatium inane inter articulationem maxillæ & meatum auditorium. Posterior glandula processu styliformi finitur. Inferior finis in plures conicos processus discedit, alias tamen pone aurem aliquantum adscendit.

Magna est glandula, & salivalium maxima. In homine drachmas quatuor (g) cum dimidia pendere visa est, pondere specifico, quam reliquæ glandulæ minori, ut se ad renes habeat ut 1034. ad 1050. (h).

Aliquas a se ipsa diversas glandulas generis conglobati impositas habet, tres, quatuor ultra (i), tum circa jugum, tum secundum vasa magna.

Multa, neque grandia, vasa habet ab arteria temporali, quam transmittit, & velat (k), & a transversa faciei. Venas ad congeneres truncos remittit.

Nervos transeuntes habet a duro (l) pare, aque quinti ramo tertio (m) numerosos, ut tamen non satis certus sim, in glandula manere aliquos.

In omnibus puto quadrupedibus reperitur: cane, fele, equo (n), bove, sue, ove, erinaceo (o), simio (p).

§. III. Ductus Stenonianus.

Etsi hujus canalis finis, qua buccinatorem musculum perforat, dudum in CASSERIANIS tabulis depictus exstat (q): etsi G. NEEDHAM (q*) anno 1658. a se visum esse, non humilis auctor adfirmat: etsi

(g) WHARTON p. 119.

(h) SAUVAGES *Diff. sur les médic.* p. 28.

(i) *Comm. Boerhaav. T. I. p. 166.* Habet aliquas COURCELLES *tab. 2.* SANTORIN. T. I. & VALSALVA t. I. f. I. k. etsi conglomeratas pingit.

(k) Eadem latior *Tab. art. lab.* p. 17.

(l) L. X. p. 260.

(m) L. X. p. 229. 230. 231.

(n) MURALT *Vademec.* p. 57. 221.

(o) IDEM *ibid.* p. 218. PEYER *obs.* p. 68.

(p) PYGMÆO TYSON p. 53.

(q) Habet CASSERIUS *Pentasthes. org. aud. t. 4. f. I. X.* C. BARTHOLINUS pro ligamento recenset *Instit.* p. 302. & C. BAUHINUS. Negat RIOLANUS in C. B. p. 723.

(q*) *Præf. & c.* 4.

etsi denique etiam *Gerardus BLASIUS*, LEON. f. (r), juvenis STENONII hospes, non expers alicujus ex anatome animalium partæ laudis, eundem ductum sibi vindicare est admissus (s), neque est absque testibus (t), habuitque non neminem consentientem; vere tamen hæc tota laus detecti ductus salivalis debetur *Nicolao STENONIS* f. juniori (u), & medicorum honorum candidato, qui anno 1660. die 7. aprilis in ore suum ductum detexit, & paulo post in dissertatione anatomica descripsit (x), tot aliis inventis celebris, ut etiam hunc ductum invenisse facile credas (y); deinde meliori descriptione de nobis meritis, ut inventorem agnoscamus.

Albus canalis est, numerosis pictus vasculis, teres, compressus, cavea exigua, firmula (z) ex cellulosa tela compactus. Eum innumerabiles ramuli generant, qui ex singulis glandulæ secundum aures acinis prodeunt, & in majores ramos, & in ductum, ab ima glandula, per ejus anteriorem oram, posterius secundum glandulæ longitudinem decurrentem conveniunt, qui porro pene de summa glandula, sed infra verticem, cum cornu superiori exit, fociisque nonnullis de duro pare nervis (a), sub jugo per masseterem pene summum introsumit (b), & posterior, & inferior accessoria, quam diximus, glandula. Ab ea ductum novum (c) insertum accipit, qui ad STENONIANUM fere se habet, ut ad maxillarem ductum BARTHOLINIANUS, minor, ad acutum angulum introrsum eundo insertus, ad anteriorem masseteris musculi marginem. An iste ductus is fuerit, quem ex medio STENONIANO exire, & seorsim in os inferi *Justus VESTI* (d) scribit.

F. 2

Eo

(r) JOHANNEM nescio quare vocat STENONIUS.

(s) Apud BARTHOLIN. *Epist. Cent. III. n. 43.*

(t) Testimonia tamen existant trium discipulorum BLASII, qui ajunt, præsentem STENONIO ante ejus descriptionem a BLASIO ductum ostensum fuisse HOBOKEN *duct. saliv. Blas.*

(u) n. 13. *Diff. inaug.*

(x) De glandulis oris & nuper observatis inde prodeuntibus vasis Præside J. v. HORNE defensa Leid. d. 6. Jul. 1661.

(y) Vindicat se de *musc. & gland. p. 30. 31.*

(z) STENONIUS n. 17. HORNE de *duct. saliv. I. 13.*

(a) Filamentis nerveis irretiri STENONIUS n. 14.

(b) Nimis inferiori loco de glandula educit SANTORIN. T. I. Z. & COURCELLES *tab. I. Conf. tab. art. lab. & PARSONS of physiognomy tab. 7.*

(c) Ann. 1728. inventum & descriptum in *Comm. Boerb. T. I. p. 165.*

(d) *Obs. I.*

Eo ductu recepto, & deserto, quo sustentabatur, massetere, canalis STENONII ductum mutat (*e*), & qui transversim antrosum ferebatur, nunc flexu facto circa tendineam masseteris oram subito ad buccinatoris pharyngeam partem (*f*) accedit; & retrorsum, & paulum deorsum (*g*) introrsum per multum adipem tendit, perque ejus muscoli discedentes fibras penetrat, & aliquo itinere ante oris membranam transit, quam & ipsam perforat. Ob eam curvitatem laxus est, & extenditur discissus (*h*).

Denique resectus quasi, osculo minime eminente, neque in papilla (*i*), obliquo tractu aperitur patulus, tamen angustior paulo, quam prius, in buccarum caveam, super dentem molarem superiorem medium.

§. IV. *Glandula maxillaris, eademque sublingualis.*

Multo minor altera fedet in angulo inter maxillam inferiorem, pterygoideo interno tectam (*k*), inter ejus maxillæ angulum, & musculum biventrem, inque angulo biventris primi cum secundo, partim sub mylohyoideo (*l*), partim exterior (*m*), etiam sub ceratoglosso (*n*), cuti propior, præcipua certe parte; Subrotunda est, in lobulos divisa, involucro celluloso pariter connexis acinis, inque superficie, quasi tela aliqua obnupta.

Pondus inventum est drachmarum duarum cum dimidia (*o*). Comper-
tum est etiam ficcatione a 10000. partibus ad 2668. (*p*), & a 64. ad 10. (*q*) reduci, & pondus habere ad aquam ut 1043. ad 1000 (*r*).
Mollior omnino est, quam parotis, lobulosque in majores dividitur, &
non

(*e*) Curvitatem expriment CHESLDEN t. II. COURCELLIS t. I. *Mém. de Chir.* T. III. p. 458.

(*f*) COURCELLIS tab. II. 5.

(*g*) *Mém. de Chirurg.* T. III. p. 455.

(*h*) BORDEU p. II.

(*i*) Papillam STENONIUS *diff.* n. 14. Carunculam esse excavatam KAAUW n. 286. Id nunquam inveni.

(*k*) *Tab. art. pharyng. & tab. duct. saliv.* BIDLOO tab. 15. f. 1.

(*l*) *Tab. tot. corp. Tab. duct. saliv.* 3.

(*m*) *Ibid. tab. art. phar. tab. duct. saliv.*

(*n*) *Tab. duct. saliv.*

(*o*) WHARTON p. 119. 133. in bove unciarum novem.

(*p*) HAMBERGER *physiol.* p. 185.

(*q*) IDEM *ibid.* p. 183.

(*r*) SAUVAGES.

non raro profundo fulco in partem anteriorem & posteriorem (s) separatur.

Eadem non dudum detectam *appendicem* emittit in aliud stratum de fine suo anteriori, supra mylohyoideum musculum, ad latus geniohyoidei continuatam, & sibi continuam, & sublinguali glandulæ, quæ ipsa glandula certe in homine maxillaris glandulæ vera est, & continua particula (t). Est ubi hæc appendix nulla fuit, sed id rarum est.

In quadrupedibus pariter ut Parotis regnat, bove, ut vidi, ove, rupicapra (u), cane, equo, erinaceo (x), etiam simio (y), leone (y*).

Et ipsa circumpositas habet sibi & margini, & versus parotidem & biventrem maxillæ glandulas conglobati generis (z). Non vere dictum est, ab ejusmodi glandulis natos ductus in salivalem WHARTONI confluere (a).

Sublingualis (b) demum glandula (c) super mylohyoideum musculum, inter effossam ad eum finem levi fulco maxillam, & linguam, extra genioglossum (d), interior styloglossa, & parte sua super ceratoglossum (e), longe antrorsum & introrsum (f), sub oris finiente velamento procurrat, acinis fere minoribus, & antrorsum extenuata (f*) definit, qua lingua ipsa de oris membrana liberum apicem effert. Ejus pondus specificum fuit ad aquam uti 1007. 1000. ut minima fere solidarum partium (g) in ea portio sit. Arterias pars maxillaris a labiali habet, qua per glandulæ sulcum transit (h). Pars sublingualis a submentali (i), & a sublinguali (k) accipit.

F 3

Venas

- (s) Conf. *tab. saliv. duct.* COURCELLES *tab.* 3.
- (t) COSCHWIZ f. 1. 2. KULMUS p. 49. LIEUTAUD p. 174. WEITERICHTE I. c. p. 255. & olim WHARTON p. 129. HORNE *microscop.* p. 23.
- (u) DUVERNEY *anc. mém.* T. III. p. 210.
- (x) PRYER *obs.* p. 80.
- (y) TYSON p. 53.
- (y*) BARTHOLIN. de suo ductu.
- (z) HALE *phil. transact.* n. 364. WHARTON p. 119.
- (a) STENONIS *diff.* n. 16.
- (b) Habet MASA p. 68. RIOLAN. p. 290. &c.
- (c) *Tab. duct. nostr.* f. 3.
- (d) COURCELLES t. 5. g. g. COSCHWITZ f. 2.
- (e) *Tab. nostr.* f. 3.
- (f) COURCELLES *ibid.*
- (f*) COWPER *append.* f. 19.
- (g) SAUVAGES *sur les médic.*
- (h) *Tab. art. phar. & expl. tab. art. lab.* p. 6. not. 10. COWPER *ibid.*
- (i) *Tab. art. lab.* p. 7.
- (k) p. 6.

Venas (*l*) has glandulæ ad truncos sodales mittunt, lingualem, labialem. Pro vena in Maxillari sulcus peculiaris effoditur.

Nervi, si omnino in glandulis manent, sunt in parte maxillari a Quinti ramo linguali (*m*) in sublinguali ab eodem ultra nunc progresso (*n*). Pro nervo nono interius etiam sulco effoditur.

§. V. *Ductus excretorius glandulæ maxillaris.*

Ipsam ostium ab omni tempore notum fuit, ejusque memoria existat apud GALENUM (*o*), & ex GALENO apud ORIBASIIUM (*p*), Arabes universos (*q*), GUIDONEM (*r*), Jacobum BERENGARIUM (*s*), ACHILLINUM (*t*), alios (*u*) ejus ævi, & CASSERIUM (*x*). Orificia ingentia viderunt, quæ ad carnem glandulosam ducerent, sub radice linguæ positam (*y*), & ea ostia salivam profunderere (*z*) non ignorarunt, aut posse stylum in oscula introduci (*a*).

Tamen, cum intermortua esset rei memoria, debemus plurimum Thomæ WHARTON (*b*), cujus industria ductus eosdem ex brutis equidem animalibus restitutos habemus: ex homine (*c*) historia nuper factis emendata existat.

Prodit nempe ex glandulæ Maxillaris lobo posteriori, una cum appendice, ductus, plurimis natus radiculis, quorum major est ex ea appendice, tenuis, mollis, & ejusdem cum STENONIANO luminis, etsi universa diametro minori est.

Is

(*l*) TREW tab. I. Ep. ad HALLERUM m.o. Tab. nostr. duct. saliv. 2. 3. P. COUCELLERES t. 2. u.

(*m*) Et ex ejus ganglio MEKEL Quint. par. 75. 75.

(*n*) IDEM ibid. 77.

(*o*) De semine L. II. de usu part. L. XI. c. 10.

(*p*) p. 54.

(*q*) RHazes ad MANZOR. L. I. c. XI. AVICENNA L. III. fen. 6. c. 1. AVERROES L. II. c. 14.

(*r*) De Cauliaco p. 4.

(*s*) Isagog. p. 45. b.

(*t*) p. XI. fontes salivæ dicit.

(*u*) MELANCHTHON de anima. Glandulas raninas salivam elaborare C. STEPHANUS p. 232. 128.

(*x*) Venarum nomine describit CASSER de laryng. t. 3. c. 1.

(*y*) COLLIGET L. I. c. 29.

(*z*) GALENUS. RHazes.

(*a*) GALENUS.

(*b*) Adenolog. p. 139. seqq.

(*c*) Primus ex homine v. HORNE descripsit in diff. de ductu salivæ.

Is porro ductus trans ceratoglossum, eum inter & glandulam sublingualem, hanc adit, & ejus comes superior (*d*), exterior genioglossus, super mylohyoideum & biventrem, in lingua extensa satis rectus ad apicem linguæ tendit.

Offendit ibi papillam longam (*e*), quando feta extrorsum urgetur, inque caudam de membrana linguæ productam, retractilem tamen, ut retrorsum in oris membranam recepta evanescat.

In eam papillam receptus ductus, quem dicimus, osculo satis angusto ex fine corniculi aperitur, ad latus freni (*f*) linguæ.

Vidi in medio fere ductu suo dilatatum, tripla fuisse diametro.

Hujusmodi sub lingua ductus & in quadrupedibus (*g*), etiam frigidis (*h*), & in avibus reperiuntur (*i*).

§. VI. *Ductus excretorii glandulæ sublingualis.*

Serius aliquanto hi innotuerunt: neque nisi nuper satis vere. Primus Caspar BARTHOLINUS (*k*) nepos, aut ex propria industria, aut ex Josephi Guiscardi DUVERNEY (*l*) ostensionibus, inventum anni 1682. d. 13. mart. (*m*) in vitulo ductum salivalem describit, qui in leone, inque aliis animalibus, similis & parallelus sit WHARTONIANO (*n*), ut tamen ad glandulam maxillarem non pertineat, cæterum secundum ejus ostium paulo exterior (*o*) aperiatur, deque tota longa glandula sublinguali liquorem salivalem in os revehat (*p*).

Rectius Augustus Quirinus RIVINUS, sed in obscuriori libello (*q*), dixerat paulo ante ductus sublinguales, alium principem esse ductum,
WHAR-

(*d*) COWPER. TREW tab. 1.

(*e*) COWPER l. c. Papilla protegi WHARTON.

(*f*) HORNE diff. 1. n. 4. &c.

(*g*) In ove, urso, leone, lepore BARTHOLIN. In tursione TYSON p. 37.

(*h*) Crocodilo, JESUIT. Siam. p. 27.

(*i*) STENON. musc. gland. p. 32. 33. Aquila BORRICH hermet. Egypt. sapient. p. 161.

(*k*) De ductu salivali hactenus non descripto Hafniæ 1684. 4.

(*l*) Ex testimonio Job. MURALTII Vademec. p. 74.

(*m*) p. 4.

(*n*) In icone f. 1.

(*o*) F. 2.

(*p*) Ita habet KEIL p. 206. In plerisque animalibus esse ejusmodi Cl. BARTHOLINUS.

(*q*) De dyspepsia ann. 1679. coroll. 1. 2.

WHARTONIANO conjunctum, alios minores (r), qualia & B. ALBINUS habet (s), & ILL. MORGAGNUS (t), quam quidem descriptionem RIVINI in cathedra Lipsiensi successor Augustinus Eridericus WALTHER (u) in homine perfecit.

Mihi, cum numerosis in exemplis inquirerem, res fuit ejusmodi, in homine quidem.

Quoties glandula maxillaris cum sublinguali non cohæret, tunc quidem solet (x) ductus adesse, qualem dixit BARTHOLINUS (y), longus, similis WHARTONIANI, secundum eum apertus. Vidi non minorem fuisse WHARTONINO. Vidi etiam ejusmodi canalem, cum tamen cum WHARTONI glandula sublingualis continuaretur.

Frequentius tamen est, eum ductum paulo prius quam in papilla WHARTONIANUS ille se aperiat (z), in hunc ipsum se immittere, uti in hepaticum cysticus solet, ad angulum antrorsum acutissimum.

Deinde plerumque non unicus ejusmodi ductus ex sublinguali glandula prodit, sed unus, duo, tres (a), qui ex ordine in WHARTONIANUM ductum se aperiunt.

Denique alii sunt ductus sublingualis glandulæ, minime in WHARTONIANUM aperti, sed in linea, quæ a frenulo linguæ retrorsum tendit, secundum latera linguæ, exiguis osculis in papillis suis aperiuntur, quales WALTHERUS dixit. Numerum varium, & ad vigena (b) usque ostiola reperi, secundum totum glandulæ sub lingua ductum posita. Obscuriores sunt omnino ductus, quando grandes in WHARTONIANUM aperiuntur.

Neque

(r) Paulus BARBETTE foraminula etiam dixit, per quæ glandulæ raninæ se exonerant.

(s) De saliv. Mercur. n. 2.

(t) Neque enim negari potest, ex sublinguali glandula ductus esse, vel ex viri Cl. Verbis, vel ex SANTORINI testimonio Act. Erud. 1727. p. 327.

(u) De lingua Lips. 1724.

(x) Rarum esse LIEUTAUD p. 174.

(y) Similia habet J. M. HOFMANN de gustu p. 34. A. Mar. Balth. 1700. p. 119.

(z) Ita NUCKIUS fialogr. tab. 1. f. 4. COWPER ad f. cit. RAVIUS apud ERNDL. Wein. p. 110. pro perpetuo: WEITBRECHT &c. Plerumque conjungi SCHELHAMMER progr. n. 7. Sæpe ROEDERER n. 19. In cane ita se habet DUVERNOI diff. p. 15.

(a) LIEUTAUD, Multi CHESELDEN p. 144. in vitulo.

(b) Tres RUYSCH Thes. 1. aff. 2. n. 3. etiam unicus ibid. Quatuor WALTHER tab. 1. f. 2. tab. 2. p. 14. 19. 26. 27. Plures TREW tab. 4. p. 12. WINSLOW n. 582. MORGAGN. l. c. BARBAUT splanchn. p. 361. Tria, quatuor oscula FABRICIUS anat. pract. p. 119. BONHOMME p. 188. Habet VERDIER II. p. 45. &c. In aquila ita se habet BOZ-RICH l. c. p. 32. 33. In testudine CALDESI p. 74.

Neque hic finis est. Cum enim glandulæ sublinguali, qualem descripsimus, alii minores acini adfideant, ita ambigui, ut vel a sublinguali separare possis (c), vel cum ea conjungere, etiam isti acini in alia linea suis ostiolis aperiuntur, qua primum de lingua membrana oris secedit. Inveni quinque fuisse; & alia quatuor ostiola utrinque ad latera frenuli. Breviores sunt, & parum ramosi, absque papillis, expressa lingua conspici. Hos forte STENONIUS (d), & HEISTERUS (e) dixit.

§. VII. *Glandulæ salivales minores. Buccales. Labiales.*

Quas ultimo dixi glandulas, eæ ad simplices accedunt; tum *genales*, ad quas transeo. Duræ eæ ovatæ, solidæ, ductu excretorio brevi involucrum oris perforant, & ostio suo aperiuntur, in genis (f), labiisque (f*).

Earum aliquæ majores, compositæ magis, circumstant ostium STENONIANI ductus (g), & earum aliquæ, buccinatorem inter & masseterem positæ, & membranam oris, aliquando ita excelluerunt mole sua, ut peculiare nomen, *molarium* (h) meruisse visæ sunt.

Et eæ ductibus communibus in os suum humorem effundunt. Mihi semel grandiusculæ visæ sunt, nunquam peculiari nomine dignæ.

Sic

(c) Monuit ad glandulas a sublingualibus diversas pertinere WEITBRECHT l. c. p. 255. Singulares porulos vocat BARTHOLIN *spec.* p. 44.

(d) *De gland. oris* n. 19.

(e) Valde posterius habet WALTHER p. 13.

(f) STENONIUS l. c. n. 18.

(f*) COWPER *append.* f. 8. HEISTER f. 36. SCHWIG p. 63.

(g) Fr. HOFMANN *de saliv. inspect.* an. 1698. Novem glandulæ buccales novæ J. W. PAULI ad J. v. HORNE *microcosm.* p. 35. *Gl. buccales* longioribus ductibus LIEUTAUD p. 175. An idem corpus glandosum notabile in buccinatore TRICHMEYER *anthropol.* p. 26.

(h) HEISTER *not.* 57. * f. 36. VERDIER p. 11. BARBAUT p. 362. Habet inprimis BORDEU glandulas molares duplo HEISTERIANA icone majores p. 51. quæ profundius circa condylos maxillæ ponantur; quasi parotidum propagines ad condylos p. 50. quamlibet cum duobus ductibus p. 50. ad penultimum molarem apertis p. 51. An etiam glandula palati non longo a ductu STENONIANO aperta ALBINI *de poris* p. 27. nisi de palatinis fermo est.

Sic porro in palato innumerabiles pori (*i*) sunt, valde etiam in vivo homine manifesti, inque parte posteriori ossea, quæ jam membranaceæ vicina est, ad latus futuræ mediæ uberiores (*k*), sæpe ex communi centro radiati, numerosis & incurvis radiis (*l*), secundum quos pori disponuntur. Alii, pene ad eandem sedem, finis communis mucosi reperiuntur, unus utrinque (*m*).

Ex his omnibus fontibus liquor paratur viscidulus, equidem involucro oris madefaciendo destinatus, qui tamen cum saliva (*n*) varie miscetur. Labiales glandulas maximas, limpidum liquorem per duos menses integros, ad duas pintas quotidie (*o*) fundentes vidit in melancholico homine J. D. SCHLICHTING.

§. VIII. An etiam alii dentur ductus salivales.

Summa quidem hujus humoris est dignitas, qui in omni animalium classe, etiam in serpentibus (*p*), piscibus, cochleis (*q*), in papilionibus (*r*), vermibus (*s*), testaceis (*t*) animalibus difformibus (*u*) eo copiosior paratur, uti sicciori & difficiliore cibo animalia utuntur (*x*). Valde magnæ in castore, ductu in os patente (*y*).

Non

(*i*) STENON. n. 21. f. 4. v. HORNE *microcosf.* p. 18. BARTHOLIN. *spec. anat.* p. 44. RUYSCH *Thef.* II. *aff.* 4. n. 13. HEISTER f. 36. FANTON, LORENZINI *cramp. fish.* p. 28. In bove foramina & glandulæ arenulæ mole LEEUWENHOECK *Phil. transf.* n. 320. In elephante STUKELEY t. 6. inque piscibus COLLINS t. 40. f. 3. in avibus IDEM. p. 219. PARISINI in tarda.

(*k*) Conf. ALBIN. t. 3. f. 1. h.

(*l*) Conf. diversam quidem iconem COLLINS *tab.* 2. f. f.

(*m*) MORGAGN. *Epist.* IX. n. 5. ALBIN. *Adnot.* L. 3. p. 30. t. 3. f. 1. k.

(*n*) Totum palatum glandulam salivalem dixit COLLINS p. 222. 223. Sic CAMERARIUS *de tonsillis* p. 5. unicam per palatum glandulam numerat. Sic Cl. LIEUTAUD p. 174. VERHEYEN L. II. p. 274. & ipse STENONIUS *diff.* n. 21. Conglomeratæ in palato catopardi glandulæ DUVERNOI l. c. & in numidica ardea una cum duobus ductibus PARISINI.

(*o*) *Mnemosyn. crit.* p. 238.

(*p*) His in cavos dentes venenata saliva effunditur, quam minimæ glandulæ suppeditant RANBY *Phil. transf.* n. 401. Alia innocua ex glandula nata saliva RANBY *ibid.* In crocodilo JESUIT. *Siam.* p. 27.

(*q*) Duos ductus salivales dixit, SWAMMERDAM p. 124. 163. 167. 184.

(*r*) IDEM *bibl.* p. 595. In eruca vasa dissolventia eo pertinent LYONNET p. 511.

(*s*) In verme asili duo vasa salivalia cæca in os aperta SWAMMERDAM *bibl.* p. 661.

(*t*) IDEM *ibid.* p. 167.

(*u*) In lingua sepix IDEM p. 883. in lepore marino BOHADSCH p. 13.

(*x*) Ut in castore, in eruca salicis, similem ob causam LYONNET p. 513. ad lignum nempe dissolvendum.

(*y*) *Act. Erud.* 1684. p. 364. *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 61.

Non tamen plures salivæ fontes hætenus vera fide innotuerunt. De COSCHWIZIANIS (z) diximus, qui sint venæ: tum de VATERIANIS (a), qui sint agmina glandularum mucosarum: deque incisivo ductu (a*). Præter eas vias, salivæ non destinatas, BELLINGERUS (b) a thymo ad glandulam maxillarem ductum in fetu duxit: Antonius vero NUCKIUS (c) in orbita detexit ductum majorem ex glandula inter os jugale & muscolum abductorem oculi posita natum, qui prope dentem molarem superiorem secundum in os aperiatur, non sine aliis Cl. viris testibus, in variis animalibus cane (d), lupo (e), catopardo (f), simio (g) volante, quorum scriptorum aliqui etiam ante Cl. virum eundem ductum se vidisse auctores sunt (h).

Alios etiam ex posterioribus laboribus addidit IDEM ductus minores, ex alia glandula natos, perinde in orbita posita, priori parallelos; perinde in os apertos (h*).

Verum in homine hic neque glandula reperta est, neque ductus (i), adeoque nota est orbita, ut nulla spes superfit, eo loco glandulam posse latere.

§. IX. Liquor exhalans.

Subtilior glanduloso humore alter est vasculosus, qui ex universo ore vaporis ad modum exhalat, ex lingua, buccis (k), gingivis (l), labiis, palato; & idem in aquulam cogitur. Eum humorem injecta manu incisoris aqua imitatur, quæ de arteriis oris undique exsudat.

G

&

(z) L. XIII. p. 111.

(a) Ibid. p. 107.

(a*) p. 4.

(b) *Of the nutrition of the fetus.*

(c) *De ductu salivali novo* f. 1. 2. 3. 4. p. 11. seqq.

(d) J. M. HOFMANN *de gustu* p. 35.

(e) HARDER *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. I. obs. 196. apier. p. 194.*

(f) DUVERNOI *Comm. Acad. Petrop. 1726. p. 345.*

(g) IDEM *in iisdem Comm. T. V. p. 231.*

(h) ALBINUS *in diff. de poris ann. 1684.*

(h*) *Sialograph. ed. alt. p. 156. t. 6. f. 2.*

(i) Conf. SCHELHAMMER *progr. valed. n. 8.*

(k) *Ex villis oris Physiol. in Belg. edit. p. 51. Ex vasculis cavi oris & lingue KAAUW n. 107. 108.*

(l) *Sanguis inde sudans VALISNERI oper. T. III. p. 305.*

& cera sua VIR. ILL. ALBINUS imitatus est (*m*); idemque videtur in febribus deficere, quando os cum ingratissimo sensu squallet, neque enim etiam eo in casu salivales glandulæ in officio cessare videntur.

Sed etiam mucus linguæ, ex folliculis simplicibus abunde natus (*n*), cum saliva se miscet, motu linguæ, & buccarum intertritus, ut in saliva mucī natura non obscura adpareat.

§. X. Saliva.

Ex his diversis humoribus, sed potissimum ex glanduloso humore, quem diximus (*n*^{*}), tum ex vapore exhalante, componitur ea *Saliva*, quæ ab ore sani hominis nunquam abest, & quam in linguæ superficie superiori potissimum collectam, cogimur aut deglutire, aut expuere.

Is humor aquosus, in igne totus exhalat (*o*), ita fluidus, ut non-nihil subsit viscoris (*p*), sapore nullo, si quisque propriæ linguæ sensum secutus fuerit, nullo odore, vel colore: difficilior in frigore coagulabilis (*q*). Pondus est ad aquam uti 1960. ad 1875. (*r*), ut aliquantum superet. Vis cohæsionis ad eandem in aqua vim est ut 30. ad 10 (*s*). Globulos aliquos continet minutos (*t*).

Eadem saliva in animalibus carnivoris acrior, & manifesto falsa (*u*) in serpentibus nonnullis, ut in vipera vehementissime venenata (*x*) est, etsi dulcis videtur, & insipida (*y*). In homine similiter perinde ut fit ab usu

(*m*) *Comm. Boerhaav. T. I. p. 177.*

(*n*) *L. XIII. p. 107. 108.*

(*n*^{*}) *n. 2. ad 7.*

(*o*) *BOERHAAVE Prælect. T. I. p. 177. VERHEYEN II. p. 112.*

(*p*) *FORDYCE de catarrh. p. 17. Inde, quam dicemus, diuturna spuma. Ideo forte salivam gelatinosam fecit GEUDER ferment. p. 114. A sputo tamen differt BOERHAAVE l. c. SCHNEIDER T. III. p. 521. WHARTON p. 142. 143.*

(*q*) *F. HOFMANN de saliv. inspect. Ita neque mucus.*

(*r*) *A. F. HOFMANN nov. hypoth. physiol. p. 5. 6. Uti 85. ad 74. la MURE de secret. ad fin. Ut 194 $\frac{1}{2}$. ad 388. HAMBERGER p. 190.*

(*s*) *La MURE ibid. Ut 8. ad 1. SAUVAG. ad bemaist. p. 43.*

(*t*) *Phil. transf. n. 116. ASCHE de globul. &c. p. 62. 68.*

(*u*) *In cane subsalsa Colleg. priv. Amstel. obs. p. 9.*

(*x*) *PLIN. L. XI. p. 621. SEVERIN. viper. pyth. p. 239. 240. 256. COITER p. 126. MEAD of pois. p. 57. 58. RANBY l. c. KALM. Svenska Acad. Handling 1752. n. 4. 1753. n. 1.*

(*y*) *CHARAS Sect. 8. REDUS &c.*

usu argenti vivi, ita per solum jejunium acris (z.) fit, ut totum os doleat, animaue fætoze (a) peculiari corrumpatur, quod sæpe vidi. Per morbos etiam, & acris (b), & denique dulcis (c) fit, quod vitium in scorbuticis (d), in phthificis (e), in hypochondriacis (f), & hysteris (g), aliquando non sine acredine (h), alias absque malo est. Putredinosi quid credas subesse, quoties acidorum usu emendatur (i).

Sibi permiffa, fano in homine, neque vino multum utente, absque conspicuo acore est, neque succum heliotropii rubro colore (k) tingit, certe non mea. Qui acidam se vidisse (l) sibi visi sunt, iis vini usus, aut ventriculi vapor admistus, aut morbus (m) imposuisse potuit, centies enim experimentum repetii. Et, si fermenti loco potest esse, idem aqua potest (n), aut ovi albumen (o). Occultum, parcumque acorem inesse, ut

G 3

in

(z) TSCHIRNHAUSEN *medic. corp.* p. 23. experimento in se ipso facto.

(a) BIRCH T. I. p. 318. *Bresl. Saml.* 1723. M. Mart. DALECHAMP. ad PLIN. L. XI. c. 53. De ordinibus religiosis severioribus LIND. *of scurvy* p. 328.

(b) In scorbuto HOFMANN *diff.* cit. p. 26. ut lintea eroderet ERTMULLER *med. hipp. obyn. Hist. Morb. Uratistav.* 1700. p. 206. Sapor falsus casei putrescentis Nov. *Eph. Nat. Cur.* Vol. I. obs. 31.

(c) SANCTOR. *meth. vit. err.* p. 383. BENNET *Theatr. tabid.* p. 67. HOFMANN. *Med. Consult.* T. II. Dec. IV. c. 1. *Comm. Nor.* 1741. *bebd.* 52. BOSCHETTI *de saliva.* Post tertianam febrem *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. ann. 3. obs. 172. In altero latere VIRIDET du bon chyle p. 293.

(d) *Act. Hafn.* T. IV. n. 72. BOERHAAVE *de natur. dulced.* p. 82.

(e) HENNINGER *de saliv. diff.* II. p. 25.

(f) HOFMANN p. 26.

(g) VIRIDET du bon chyle p. 288. *Add. Eph. Nat. Cur.* Vol. V. obs. 71.

(h) HOFMANN l. c.

(i) SANCTOR. l. c. oleo vitrioli.

(k) Non est acida EDITOR *lib.* DEMOCRIT. *Krankh. und Arzen. des animal. Lebens.* p. 124. Negat in junioribus DUVERNEY l. c. Negat in universum LANG. *physiol.* p. 81. J. W. PAULI in J. v. HORNE *de microcosm.* p. 45. ASTRUC *de digest.* p. 267 seqq.

(l) *Zod. Med. Gall.* T. I. p. 160. SYLVIVS *disp.* 8. n. 50. *Prax. Traet.* 5. app. p. 713. qui dentes vult stupefacere. VIRIDET du bon chyle p. 284. GRANITI p. 4. WILLIS *morb. hypoch.* p. 60. La METTRIE obs. p. 102. *Aur. Caten. boner.* Lac coagere SCHAPER *corpusc.* p. 25. NUCK *sialogr.* p. 48. Succum heliotropii rubore tingere VIRIDET *prim. coct.* l. c. 3. p. 70. ANDRY *alim. du Careme* p. 51. & in senibus DUVERNEY apud du HAMEL *Hist. de l'Acad.* p. 249. Malva tincturam eodem colore vitare VIEUSSENS l. c. p. 161. Mercurium figere DEMOCRIT. CHRISTIAN. *vit. anim. morb.* 63 *med.* p. 53. Ferrum rodere cum fervore la METTRIE. Cum cinnabari incalescere SCHULZE *on koppor.* p. 34.

(m) VIEUSSENS *Trait. des liqueurs* p. 160.

(n) IDEM *ibid.* p. 164. la CHARRIERE p. 18. Pastam saliva fermentat VIEHEYEN II. p. 113. Sed etiam putrida cum pane fervet PRINGLE p. 401.

(o) HENSHAW *aerobal.* p. 23.

in sanguine, non repugno (o^*), tantum ut neque dominetur, neque ex eo salivæ utilitas pendeat (o^*). Sed neque lixiviosam credam esse in sano homine (p), neque ejusmodi phænomena vidi, etsi non recuso, ab usu argenti vivi putrescere, & signa edere naturæ alcalinæ (q). Cito certo putrescit (r), & tamen addita carnis putrefactionem retardat (s), iterum forte ex mucosa sua indole.

In calido aere siccatur, ut exiguum quid falsumque supersit (t). Majori tamen copia inspissata, & salem tessellatum diaphanum, & gelatinosum viscidum quid reliquit (t^*).

Cum aqua ob mucosam naturam admistam non recte miscetur (u); sed neque cum oleo (x).

Balsamum peruvianum tamen solvit (y). Cuprum etiam magis quam aqua nuda erodit (y^*).

Ab acidis aut alcalinis salibus adjectis non fervet (z).

Sed, ob mucosam denuo naturam, a mercurio sublimato corrosivo, & a vini stillatitio liquore, & a nitro ipso (a) cogitur (b), aut certe lentescit (c). A spiritibus acidis, aliis in flocculos addensatur (d), & cogitur (e), ab aliis minime (f). Sub antlia pneumatica (g), aut ab igne admoto (h), aut admisto alcohole (h^*), plurimam spumam agit.

(o^*) Inesse p. 31. 32. sed leviter admistum TEXTOR *stalograph.* p. 37.

(p) De jejunæ salivæ DEIDIER *hum.* p. 44. quod non recuso.

(q) BARON *Comm.* ad *Chem.* LEMERY p. 190. OWEN *de mercur.* p. 10. Putrescit FORDYCE p. 17. Canis ex ejusmodi saliva, quam lambere, perit GOODALL. *coll. vint.* p. 125.

(r) *Comm.* Acad. Petrop. T. XIV. p. 210. Vorticose motum concipere TEXTOR p. 18: quo sal fixus destruitur, ut nullus ab evaporatione supersit.

(s) PRINGLE *diseas. of the army* p. 399.

(t) Duodecimam partem FORDYCE p. 18.

(t^*) TEXTOR p. 18.

(u) FORDYCE p. 17.

(x) NARCISSUS *de chylo.* n. 3.

(y) BIRR *specim. anat. botan.* II. n. 58.

(y^*) TEXTOR p. 41. 42. cæruleo colore p. 44.

(z) BIRCH T. IV. p. 430. VERHEYEN L. II. p. 113. NUCK p. 50. FORDYCE p. 17.

(a) LEWIS *mater. med.* p. 399.

(b) FORDYCE p. 17.

(c) Ibid.

(d) Adfirmat tamen de spiritu vitrioli RAULIN *Obs.* *de acid.* p. 183.

(e) BLANCAARD *acad.* p. 82.

(f) FORDYCE p. 18.

(g) MUSSCHENBROECK *diff. inaug. de aere* p. 6. 7.

(h) NUCK p. 52. BOERHAAVE *Prælect.* T. I. p. 182.

(h^*) TEXTOR p. 28.

agit, & aerem difficulter dimittit. Etiam sponte fervata spumam concipit (*i*), & sedimentum ponit.

Ignе subjecto, & ex artis legibus sensim aucto, maxima pars abit in aquam inspidam (*l*), ad $\frac{4}{5}$. totius.

Exiguum momentum sequitur spiritus, lixiviosæ indolis (*m*), qualis ex sanguine habetur: tum olei empyreumatici (*n*). Alio modo oleum ex soluto in vini spiritu sedimento salivæ se prodit, grato pomi odore (*n**), quale oleum etiam in saliva cum alcali fixo digesta nascitur (*n*†): & denique abacto, quem continet, humore sedimentum ad $\frac{1}{128}$. (*o*) falsum relinquitur. In eo sal fixus (*p*) aliquis (*q*) superest, vix ad $\frac{1}{128}$. totius salivæ (*r*). Is partim de lixiviosa natura est (*s*), partim tessellatus (*s**), marinæ puto, qualis etiam naturæ obtinetur absque igne digestionе.

Terræ (*t*) tantumdem fere, quantum falis, in cinere salivæ est: in nuperis exemplis duplicem, calcariam aliam, alteram lamellatam, legimus fuisse, splendentem, pene trapeziis lamellis foliatam, qualis selenitica dicitur (*t**). A terreo eo in saliva elemento tartarea crusta nascitur, quæ dentes obducit

(*i*) NUCK *anat. saliv.* p. 48.

(*l*) IDEM ib. p. 54. Ad $\frac{1}{20}$. BOERHAAVE ad n. 66. Ad $\frac{2}{50}$. G. V. SWIETEN T. I. p. 679. Ad $\frac{478}{480}$. BARCHUSEN *acroam Exp.* VIII. Absque mensura BAGLIV. VERHEYEN II. p. 112. GAUBIUS. HEUERMANN T. III. p. 340. 341.

(*m*) VERHEYEN. BIRCH. Cum oleo vitrioli fervet l. c. GAUBIUS apud HAYMANN T. III. p. 52. HEUERMANNUS cum spiritu sanguinem comparat.

(*n*) VERHEYEN p. 112. ad $\frac{3}{128}$. Ad $\frac{1}{720}$. BARCHUSEN. Parum ejus inesse HAYMANN.

(*n**) TEXTOR p. 19. 94. Add. p. 23. 30. Non tamen in omnibus hominibus p. 27. Multum inesse oleum p. 45.

(*n*†) IDEM p. 36. Oportet tamen in his omnibus memorem esse, etiam ex simplicissima aqua in ELLERI experimentis, oleum & salem abunde gigni, quando putredinem subiit.

(*o*) NUCK p. 55. Ad $\frac{1}{720}$. de HEYDE *obs. med.* 88. Causticum esse BLANCAARD, valde falsum FORDYCE p. 18.

(*p*) Ad $\frac{1}{80}$. DRELLINCOURT *liensf.* p. 806.

(*q*) Nullum HAYMANN.

(*r*) VERHEYEN p. 113. Ad $\frac{1}{720}$. BARCHUSEN. Tantum $\frac{1}{720}$ falis BAIER apud HOFMANN l. c. Duplicato ad finem salem esse SCHAPER *corpusc.* p. 26. nitrosum BAGLIV. p. 427. acidum acrem BLANCAARD p. 84.

(*s*) VERHEYEN. BIRCH. Etiam in spiritu vini solvi TEXTOR p. 19. 22.

(*s**) TEXTOR p. 18. 19. 26. 30.

(*t*) Tantumdem BARCHUSEN.

(*t**) TEXTOR p. 20. ex flocculis in spiritu vini depositis.

obducit (u), & in ductu WHARTONIANO adeo frequenter (x) in calculi naturam coit, ut vix alium lapillum in homine frequentior rem reperias. Ranulam (y) inde natam vidi, & exciso lapillo sanatam (z), alii anginam (a). Sed etiam olim HIPPOCRATES sub lingua calculos parvos nasci scripserat (b). Quare in WHARTONI potissimum ductu lapillus nascatur, non satis notum est: celeriter (c) id fieri historiarum docent. In STENONIANO rarius gignitur, sunt tamen exempla (d).

§. XI. *Motus salivæ.*

Causa motus in eo humore in universum quidem eadem est, quæ in omnibus corporis humani humoribus, quos vis perpetua succedentis de corde in minima vasa sanguinis ad destinatos fines urget. Est tamen etiam peculiaris potestas, quæ tunc potissimum salivæ fluentum accelerat, quando eo ad subigendos cibos, & ad manducandum utimur.

Parotis adeo a musculo massetere (d*) succutitur, & a colli latissimo (e), a maxilla demum ipsa, quæ non potest vel seorsum, vel deorsum, vel ad latera moveri, quin parotis prematur.

Deinde

(u) FAUCHARD *dentiste* ed. nov. I. p. 179.

(x) SEVERIN. *nov obs.* c. 28. GRULICH *cholelog.* p. 78. PLOT *natur. hist. of Oxfordshire* p. 215. MEIBOM *jurisjur. Hipp.* p. 152. LOSS. *obs.* L. I. p. 90. TIMEI *casus* I. n. 35. HAGEDORN *Cent.* I. *obs.* 71. *Journal des Savans* 1678. n. 23. *Galer. di Minerv.* VI. p. 236. *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 3. *obs.* 1. 43. ann. 9. 10. *obs.* 144. Vol. VIII. n. 20. CONTULI p. 46. ELLER *Mém. de Berlin* T. XI. p. 26. *Breslauer Saml.* 1726. m. Aug. BLAS *obs.* L. VI. *obs.* 14. KRAMER *Comm. Lit.* 1732. *bebd.* 49. SLEVOGT *ibid.* 1733. *bebd.* XI. 1738. p. 163. t. 4. f. 10. 1745. *bebd.* II. *Phil. transf.* n. 491. WALTHER *thesaur.* 92. G. V. SWIETEN p. 854. 855. VOLPINI p. 180. TURNER. WALLERIUS *Act. Soc. Ups.* 1736. p. 178. 179. BACIOCCHI *lettera.* SCHERER *de calculo in duct. saliv.* n. 41. *Recueil périod.* 1756. m. Jul. ACRELL *Chirurg. Händelser* p. 92. *Nordl. Beyträge* p. 168. &c.

(y) TURNER. VALISNER. T. III. p. 138. J. IV. STAHL *de ranula.*

(z) PLOT. VIRSUNG apud SEVERINUM l. c. WALTHER VALISNERI *Eph. Nat. Cur.* Vol. VIII. l. c. Dec. I. ann. 3. *obs.* 1. BACIOCCHI *lettera.* FOGLIAT. *ibid.* MEIBOM. SCHERER. ACRELL. HAGEDORN l. c. ZACUT. LUSIT.

(a) *Journ. des sav.* 1721. BIRCH II. p. 359.

(b) *Epidem.* II.

(c) VOLPINI l. c.

(d) MEIBOM *Comm. in jurisjur. Hipp.* p. 152. & BLANCAARD *Jaarreg. C. V.* n. 47. ut videtur.

(d*) p. 41. 12. seqq.

(e) p. 37.

Deinde maxillares glandulæ, dum os aperitur, fonticulum (*f*) salivæ per WHARTONI ductum projiciunt, vi non minima (*g*). Id fit a potestate biventris primo, deinde mylohyoidei musculi, & a lingua depressa.

Sublingualem glandulam mylohyoideus totam urget, & depressa lingua, interque eas potentias tamquam in prelo media urgetur.

Sunt, ex STAHLIANA (*b*) potissimum secta, Viri, qui malunt ab irritatione, pene ad modum testis (*i*), glandulas salivales humorem suum uberius adfundere: negantque aut mechanica pressione excitari posse, aut absque cupidine, neque admittunt salivam adfluere, si quis lignum (*k*) manserit: neque spongiam (*l*), aqua ebriam, quæ Parotidis locum teneat, aperta maxilla inaniri, neque ipsam glandulam per ductum suum repletam, dum maxilla agitur (*m*), excuti. Sublinguales vero glandulas pressionem etiam fugere (*n*).

Est in hac adfirmatione omnino pars veri. Ad odorem, ad conspectum, denique ad vividam ideam grati ferculi, maxime quidem jejuno homini, & famelico, certum est, de WHARTONIANIS osculis duos insignes salivæ fonticulos projici, ut modo diximus, qui in homine saturo, pariter aperto ore, non perinde conspicui exsiliant. Neque credam unice a plenitudine vasorum fieri, quæ in jejunante homine sint sua saliva plenissima. Exemplum feminis manifesto docet, a cupidine, ab imaginatione, ab ostentata voluptate, semen majori copia ad vesiculas feminales confluere, ut multo majori pondere in proxima venere ejiciatur, quam ab alio homine projiceretur, qui frigidior, absque præmissis veneris incitamentis, ei litaret. Hæc ergo causa ad occultam illam glandularum omnium irritabilitatem pertinet, quam in experimentis non possumus imitari.

Sunt

(*f*) Guttulas inde stillantes SCHNEIDER *de catarrh.* L. III. p. 557.

(*g*) Ad tres quatuorve pedes in jejuno, quotidie BLANCAARD *Jaarreg. Cent.* V. n. 14. Longissime projiciebat ILL. TEICHMEYER MENZ *de Saliv. non temer. exspuend.* p. 3.

(*b*) STORCH *Kinderkrankheit* T. II. p. 391.

(*i*) BORDEU *recherches* p. 277.

(*k*) STAHL *theor.* p. 466.

(*l*) De BORDEU p. 28.

(*m*) p. 35. *De chylicis.* p. 19.

(*n*) BORDEU p. 73.

Sunt tamen nimii in secta sua viri Cl. Nam experimento facto omnino constat (o), agitata maxilla, ad siccissimum lignum, salivam exprimi, in que os confluere: parotidem (p) actione maxillæ ex inani; etiam de ea glandula exulcerata, dum edebat æger, multum salivæ profluxisse (q): a scintillis electricis salivæ adfluxum accelerari (r), & cum convulsione maxillæ inferioris perpetuam salivationem conjunctam fuisse (s). In vulnere ductus STENONIANI, quando claudebatur vulnus, intumescebat parotis, idemque tumor solvebatur manducando (t). In alio casu inter pastum vulnus ad 5. & 6. uncias salivæ suppeditare visum est (u).

§. XII. Copia salivæ.

Accuratam mensuram dari non credo, cum ab infinitis causis ea copia aut augeatur, aut minuatur. Augetur a percussis aliis secretionibus: ut a pedum refrigerio (x): ab urina repulsa (y): ab argento vivo (z) nuncunque intra corpus humanum recepto, dummodo confertim, & absque intervallo subiverit: ab hypochondriaco malo (a): in variolarum in ore tumentium certa periodo (b): in febribus nonnullis intermittentibus (c): in hectica febre (d); in scorbuto (e).

Augetur

- (o) Excitari concussis musculis dat BORDEU p. 278. 279.
 (p) Fatente BORDEU *recherches* p. 39.
 (q) *Mém. de Chir.* T. III. p. 445. *Eff. of a Societ. at Edinb.* T. II n. 13. Adde exemplum BARTHOLINI, *Cent. III. hist.* 77. & *Diff. sur la malad. des os* II. p. 93.
 (r) ZETZEL *consect. electr.* in motum actis, procul dubio, musculis maxillæ regentibus.
 (s) DANIEL *Beiträge* II. p. 65.
 (t) *Mém. de Chir.* T. III. p. 431.
 (u) DE FIEU *physiol.* p. 446.
 (x) BINNINGER.
 (y) Potis aquis Egranis *Henr. v. HEER.* Cum mictu copioso alterna salivatio CAMER: *mict. period.*
 (z) Etiam in cane WEPFER *cicut.* p. 299.
 (a) HOFMANN *diff. cit.* SCHLICHTING. p. 238. ZACCHIAS p. 33.
 (b) Die undecimo SYDENHAM. BOERHAAVE *Aphor. pract.* n. 1398. 1400. Post variolas BETTUS p. 272. In potechiis *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 5. 6.* p. 257. *app.* p. 132.
 (c) *Comm. Nor.* 1740. *hebd.* 23. HOFMANN l. c. SCHNEIDER l. c. III. p. 527. *Bresl. Saml.* 1723. m. Decembr. Cortici Peruviano salivam motam tribuit HELBIG *quin. Europ.* p. 26. Mihi videtur certum convalescentis signum esse.
 (d) BASSI *lettre critique &c.* p. 282.
 (e) VIRIDET *du bon chyle* p. 279. Maximum exemplum, continuo quasi ebullientis de ore salivæ RONSSEUS habet p. 255.

Augetur vehementer ab acri quocunque corpore in os recepto & manducato, potissimum ab acidis salibus (*f*); a *dracone*, qui de *Abinthii* genere est; ab hyssopo; pyrethro; a *staphisagriæ*, & *fabadillæ* seminibus; a tabaci fumo; a medicamentis emeticis mitioribus (*g*), nauseam tamen moventibus; a cibo ipso adsumto.

Minuitur ab aucta quacunque alia secretionem (*h*); a febribus in universum, quæ os exsiccant (*h**).

His in mediocritatem compositis, experimento aliquo in homine suscepto adjutus, NUCKIUS copiam salivæ intra viginti & quatuor horas effusæ, ad duodecim (*i*) uncias æstimat, alii ad sesquilibram (*k*). Sed alias in vulneribus drachmas septemdecim intra quartam horæ partem, & 22. in octodecim minutis, & in 23. minutis drachmas 26. cum sem. & in 28. minutis drachmas 33. exstillasse certi sunt testes (*l*): & demum 15. uncias intra triginta minuta (*m*): & quinque vel sex uncias intra cœnæ tempus (*n*). Ex ipsis tantillis buccarum glandulis magnum, duarum pintarum in diem, ptyalismum excitatum fuisse diximus (*o*). Ductu STENONIANO, ut facile ob itineris injuriis obnoxii rationem sit, discisso (*p*), aut a glandula ulcerata (*q*) tantum salivæ profluvium sequitur, ut difficillime (*r*) cauterio aut caustico, vel compressione diu-

H 2

turna

(*f*) A spiritu salis GLAUBERI injecto plurima profluxit du HAMEL corp. areine. L. II. c. 2.

(*g*) Vitriolum album ad granum unum salivationem ciēt.

(*h*) A diarrhœa TULP l. c. L. III. c. 22. A nimio lotio CAMERAR. *miſt. periodic.*

(*h**) p. 52.

(*i*) L. c. p. 32. 33. Dimidiæ libræ in apoplectico DOLÆUS *Encyclopæd.*

(*k*) NICOLAI *mat. med.* p. 177. 179. Triginta uncie quotidie in hæmoptico NUCK. Semipintam effluxisse, dum unica tabaci fistula consumitur CHESELD.

(*l*) *Mém. de Chir.* T. III. p. 434.

(*m*) HAMBERGER *physiol.* p. 234. 235.

(*n*) De FIEU p. 446.

(*o*) SCHLICHTING *mnemosyn.* p. 238. Magna a vulnere labii salivatio BIDLOO *Exerc. II.* CHESELDEN p. 146.

(*p*) GOOCH *cases* p. 20. 21. LAMBRECHS *obsf.* p. 47. HELVETIUS *Mém. de l'Acad.* 1719. de FIEU, BELLOSTE *obsf.* 4. *Fabric.* ab AQUAPEND. *de oculo* p. 23. FAUCHART l. p. 411. la FOSSE *obsf.* p. 114. in equo Ex eodemerofo JOURDAIN p. 113. BRACKET *obsf. Chir.* IX. Glandula in tumuit, cum ductus coaluisset IDEM.

(*q*) *Mémoire de Chirurg.* l. c.

(*r*) *Rapports de Chirurg.* p. 92. Fistula inde nata *Hist. Morb. Uratist.* p. 700. p. 230. BELLOSTE *obsf.* 4. SAVIARD *obsf.* 121. *Diff. sur les malad. des o* II. p. 93. COL. de VILLARS *dict.* T. III. p. 215. *Ess. of a Societ. at Edimb* II. n. 13. SNAPE p. 147. KUCHLER *de dent. fistul.* p. 11. NUCK c. 3. DIEMERBROECK p. 434. SCHILHAMMER *encol.og.* p. 73. ut puto.

turna (s) compescatur: a coalitu etiam ejusdem ductus novam viam in buccis saliva sibi aperuit (t). Etiam ex male secto frenulo, de WHARTONI adeo ductu, vis salivæ præter voluntatem effunditur (t†).

Abunde autem in morbis salivam fluere per experimenta constat. In mercuriali sputatione (t*) per decem, aut duodecim primos dies duarum (u), trium (x), quatuor (y), quinque (z) in diem librarum, etiam multo major, & trium (a), & quinque pintarum (b), & octo (c), ad sedecim librarum pondus fuit salivæ (d), & in universa curatione ad 50. (e), & 120. (f) libras.

Etiam in homine, ex scirrhuso pancreate hæctico, libræ salivæ decem, & ultra in diem fluxerunt (g).

Hæc si cum alvo, aut urina, aut sudore, & transpiratione sani hominis comparaveris, insignia certe sunt humorum fluentia.

§. XIII. Salivæ utilitas.

Duplex ea est. Pars deglutitur, noctu quidem omnis, etsi eo tempore saliva parcius paratur; interdiu, extra tempus sumendi cibi, in sano & bene morato (h) homine pars maxima. Ea in ventriculum venit,

(s) Conf SAVIARD obs. 121. COL. de VILLARS BELLOSTE obs. 4. GOOCH fact. Mém. de Chir. T. III. p. 445. Ab artificiali fistula sanatio SHARPE oper. p. 112. MARTI de loc. præter nat. ductus Saliv. Stenon. CHESelden anat. p. 143. Act. Edimb. T. II. n. 17.

(t) SPINGSFELD coalit. Visc. n. 21.

(t†) GALEN. de util. part. L. XI. c. 10. RIOLAN. L. IV. c. 16.

(t*) Unius libræ in sex horis OWEN de saliva p. 12. ex uno grano mercurii sublimati. Tanta vis inde salivæ, ut quasi mingeretur BRUNNER pancr. p. 138.

(u) GRAINGER med. ptyal. excit.

(x) PUIATI obs. p. 235. DESAULT p. 53.

(y) IDEM ibid. Nouv. method. des malad. vener. p. 317. Lettera de Gemino Eulabeo: filo p. 25. per multos dies.

(z) Eulabeo filo ad $5\frac{1}{2}$. & 6 in diem.

(a) TURNER syphilis p. 190.

(b) IDEM ibid.

(c) A galon. CHESelden l. c.

(d) SCHLICHTING l. c. p. 539.

(e) IDEM p. 540.

(f) TURNER Praef. ad syphilid.

(g) BESSÉ l. c. p. 282.

(h) Spuere signum est detestationis PLINIUS L. XXVIII. c. 7.

venit, & alio loco melius tradetur. De ore vero effluit, quando buccarum muscoli resoluti salivam male continent, ut in apoplecticis (i).

In ipso ore saliva ventriculo cibum jam pene dissolutum tradit: potus vehementiores debilitat: cum cibo morso & manducato subigitur, eum mollit, in pastam ad deglutitionem, ad digestionem, aptam figurat: diuturno maxillarum & linguae motu diligenter intertrita sales solvit, & diluit: olea subacta ad aquae miscelam contemperat, cujus rei summa est necessitas (k); sapores in massam sui undique similem confundit; aerem, spuma sua tenaciter inviscatum, in minima alentium elementorum intervallo introducit. Saporem etiam ciborum sensui nostro accommodat, dum sales solvit, gratiamque patienter subacto cibo addit (l), eoque modo hominem ad necessarium & utile opus, manducationem, invitat. Lictu solo canes pene omnia sua vulnera sanant, & dudum saliva laudata est ad lichenes (m), lippitudinem (n), ulcera sordida (o), strumas, melicerides (p).

In ea J. F. HELVETIUS (q), adeptus eremita, lapidem philosophorum quæsit.

Quare non absque detrimento universæ coctionis ciborum exspuitur, quod est tabacini fumi vitium. Inde ex solo abusu spuendi (r), aut ex salivæ per vulnus jactura (s), aut ex quocunque nimio ejus humoris fluxu macies (t), verusque marasmus, secutus est. Et etiam vulgo notum est, ipsis etiam indis, a tabaci fumo (u), aut a pastillis (x) Nicotianæ cum ustis conchyliis subactæ, famem interire, eaque causa fuit

H 3

primaria,

(i) SCHWENKE *de saliva* n. 7.

(k) BOERHAAVE l. c. p. 185.

(l) Conf. EUMB. J. R. M.

(m) MARCION Smyrnaeus apud PLINIUM L. XXVIII. c. 7.

(n) RÖPER *saliv. crit.* c. 1.

(o) NUCK p. 52. Ed. II.

(p) Conf. SCHURIG. *Sialogr.* p. 21. 28.

(q) RZASZYNSKI *Hist. Nat. Pol.* T. II. p. 503.

(r) BAGLIVI p. 427. HARDER *apiar.* NEUMANN *oper.* p. 947. de nicoriana. Siccat & debilitat perfas CHARDIN *Voy.* T. IV. p. 36. Similia habet G. v. SWIETEN *Comm.* I. p. 639.

(s) RUYSCH *Advers.* II. n. 5. *Morb. Uratist. hist.* 1700. p. 210. ex evulso dente. Etiam equi ea ex causa languent, quando salivalis ductus dissectus perit La Fosse *obss.* p. 114.

(t) HANNEMANN RAYGER *Eph. Nat. Cur.*

(u) LERY *hist. de l'Amér.* p. 213. COLEATCH *doctr. of acids asserted* p. 435.

(x) MONARDUS *de aromat.* p. 309. Add. BOERHAAVE l. c.

(y) *Prælect.* T. I. ad 66.

primaria, cur fætida hæc planta primum in America tantam indigenarum gratiam sit consecuta. In se ipso expertus est PRÆCEPTOR, famem sublatam fuisse, cum salivam omnem expuisset (y).

Neque debet his opponi, quod salivæ uberior profluxus venericum morbum, febres intermittentes, scirrhus solvat; quod in variolis sputatio salutis sit, & cum periculo supprimatur.

Quod enim ab argenti vivi violentia per os expellitur, id omnino tota est pene humorum (z) massa, adeps omnis, mucusve morbosus, medullæve forte infectæ non exigua portio, quæ omnia in humorum massam reducta, & expulsa, sanum corpus relinquunt, ut novi ex cibo & potu salubri, mitesque humores regenerari possint. Quare & per alvum sudoremve eodem effectû venenum Venereum expurgatur, aut denum, ut nunc maxime fieri solet, solo usu hydrargyri, lente, & absque conspicua excretionis expellitur.

In scirrhis glandularum perinde materies impacta utiliter dissoluta, atque nunc fluida egeritur, eademque forte causa fuerit salutaris in febribus intermittentibus (a) sputationis. Nam etiam tunc in hepate sæpe materies compacta residet, quam pro sputo excernere utile sit. Fætibat ejusmodi in casu saliva (b). Potest etiam signum esse restitutæ in minimis vasculis libertatis.

In variolis, angina funesta, orisque occlusio eo salivæ effluxu cavetur, neque aut perpetua est, aut necessaria, ut absque ea æger servari nequeat (c).

§. XIV. Resorbtio, quæ in ore fit.

Uti arteriolæ in lingua, in buccis, & in palato, exhalant, ita venulæ præsto sunt, quæ humorem tenuem resorbent. Nam aqua quidem, aut gluten piscium colore aliquo tinctum, inque venas capitis impulsam, sudat de facie superiori linguæ, de buccis, de labiis, deque ore universo; etiam COSCHWITZII (d), in lingua, experimento.

Deinde

(z) BOERHAAVE *Præl.* I. p. 190. Omnes humores in salivatione mercuriali putrescunt & fatent GRAINGER *ptyalism.*

(a) Bresl. Saml. 1723. m. Decembr. *Comm.* Nor. 1740. n. 23. SCHNEIDER *de catarrh.* III. p. 527. HOFMANN l. c. Adde CHEYNE *sanit. tuend.* p. 161. seqq.

(b) SCHNEIDER.

(c) FREUND *Comm.* ad *Epid.* VII. *hist.* II. FREWIN. *Epist.*

(d) *De duct. saliv.* p. 10. Aer impulsus erumpit ex minimis ramis ductus salivæ, (qui vena est).

Deinde notissimum auxilium est a pane cum vino manducato, cujus vis refocillans (e) etiam equos (f) restaurat, etiam dum in ore vinum est, & prius omnino quam per ventriculum, intestina, & lactea vasa vis medicamenti potuerit longum iter absolvere. Sophos sola manducatione nutriri PARACELsus scripserat (g). Sed etiam vinum vappescere atque inebriare certum est, dum ore continetur (h).

Ita oleum nicotianæ in os felis instillatum, animalculum necat, totumque corpus, etiam cor, odorem veneni retinet, argumento, in venas fuisse resumtum (i).

S E C T I O III.

D E G L U T I T I O.

§. I. *Pharynx.*

Difficillima particula physiologiæ, plurimum quidem lucis accepit ab ILL. ALBINI laboribus. Ut tamen eam lectori facilem tradam, necesse erit in minutas particulas historiam nostram dividere. Pharyngem adeo primum describemus, iterque ciborum ab ore in pharyngem imum; deinde Oesophagum, & progressum cibi per gulam in ventriculum.

§. II. *Velum palatinum. Uvula.*

Ex cute palatum osseum obducente (a), tum a SCHNEIDERIANA narium postremarum membrana, similis lamina retrorsum educitur, ut inter duas membranas plurimæ glandulæ (b) simplices, ovales, foraminibus
exiguis

(e) KAAUW *perspir.* n. 442.

(f) ENT *oper* p. 446. BATHURST *prælect.* p. 207.

(g) Paramir. L. III. tr. 4. *De originib. morbor. arcan. tartar.*

(h) G. V. SWIETEN *Comm.* T. III. p. 213.

(i) BIRCH l. c. T. II. p. 42. 43.

(a) BIDLOO t. 14. f. 3. HEISTER *Eph. Nat. Cur. Cent. IV. t. II. f. 1. LITTE Mém. de l'Acad.* 1718. f. 2. L. JENTY *tab.* 2. f. 3. 5.

(b) BONHOMME t. 23. WALTHER *ling.* p. 36. COWPER *append.* f. 8. COLLINS t. 2. WINSLOW IV. n. 487.

exiguïs patentes, fibræque musculosæ mediæ contineantur, quâs dicemus. Latera firmantur ad eadem ossa & ad processus alares (*c*).

Hoc productum velum in universum quadrangulare, posteriorem lineam habet in duos semicirculos divisam (*d*), ultra quos media pendet (*e*) particula, ovata simul & conica (*f*), crassior aliquantum reliquo velo, magisque rotunda, fabrica simili, tota glandulosa (*g*). Ea *uvula* a similitudine dicitur, & a velo palatino debet (*h*) distingui. Distinxit FALLOPIUS (*i*), GLISSONIUS (*k*), PRÆCEPTOR (*l*), & LITTRIUS (*m*), & nunc error emendatus est.

Situs hujus (*n*) veli curvilineus (*o*) est, ut pars anterior rectior sit, posterior in veli speciem flexa, denique recta descendat, & uvula quidem potissimum. Ad linguam ita adaptari potest, ut ea convexa radice sui dorsi velum palatinum concavum repleat & contingat, etsi, depressa utique lingua, spatium medium nascitur.

Super velum palatinum aditus a naribus in pharyngem est, quem dicemus.

Infra idem aditus in os (*p*) aut apertus, aut clausus, ut lingua levata aut depressa fuerit, velumque ipsum depresso aut levato.

Uvula longe ante (*q*) epiglottidem valliculæ inminet, quæ est inter eam particulam, & linguam, ut in morbo justo longior, possit denique non sine incommodo linguam attingere. In sano homine utique distat (*r*).

Uvulam

(*c*) LITTRE p. 301.

(*d*) ALBIN. t. 10. f. 12. LITTRE l. c. t. 15. f. 1. JENTY.

(*e*) LITTRE l. c. ALBIN. ibid. & f. 17. COWPER tab. 28. f. 4. DUVERNEY. BIDL. 200. JENTY tab. 2. f. 3. 5. DRYANDER ad Mund. p. 43.

(*f*) COWPER.

(*g*) SLEVOGT gurgul. n. 14. RUYSCH Thes. X. n. 37. Loss. de gland. n. 30.

(*h*) AURELIAN. acut. L. III. c. 1. CELS. L. VII. c. 12. n. 2. Quod uvæ simile pendet PLIN. L. XI. p. 624. Uva pro morbo PLIN. L. XXII. c. 13. L. XXX. c. XI. Ita *καρυυλη* sumitur apud POLLUC. p. 470. ARISTOTELIS hist. anim. L. I. c. XI. ΑΡΕΤΑΕUM L. I. c. 8. Est etiam *κίον* POLEUCI p. 204. ΑΡΕΤΑΕO acut. L. I. c. 7. 8. *κίον* RUFO L. II. p. 57. ΑΡΕΤΑΕO cur. acut. L. I. c. 8. diutur. L. I. c. 7. POLLUCI p. 204. Γαργαρεω Oribas. p. 66. &c.

(*i*) p. 211.

(*k*) De ventric. & intest. II. c. 16. COWPER Phil. trans. n. 220..

(*l*) Prælect. I. p. 200.

(*m*) L. c. p. 300.

(*n*) Excusat VAESALVAM, qui receptum morem secutus sit, Ep. IX. n. 9.

(*o*) Sectio apud BONHOMME t. 16. f. 1.

(*p*) LITTRE f. 1.

(*q*) Conf. LITTRE f. 2. ALBIN. f. 17. DUVERNEY posth. t. 18. f. 1. BONHOMME l. c.

(*r*) BIDL. t. 13. & in iconibus ALBINI, DUVERNEYI.

Uvulam solus homo (*s*) habet, tum simia (*t*) : reliqua quadrupeda ea particula destituuntur. Non adeo rarum est, bifidam (*u*) fuisse, cujus vitii causa videtur esse in azygis musculis justo magis distinctis. Dicitur etiam (*x*) defuisse.

§. III. *Arcus Faucium.*

A lateribus veli palatini utrinque descendunt, & pharyngem ea sede perficiunt duo arcus (*a*), intus musculosis fibris farti, quas membrana obducit. Eorum arcuum anterior, idem tenuis, & a sodali suo magno intervallo remotus (*b*), ad linguam abit: posterior arcus crassior est, & sodali suo proximus descendit in pharyngem. Inter posteriores arcus uvula propendet.

Inter eosdem arcus (*c*), sub velo, & ad latera faucium, utrinque ad perpendiculum sedet, ut tamen inferiora divergant, glandula peculiaris ingenii, in universum ovalis, anterieus plana, posterius convexa (*d*) sursum crassior (*e*), amygdalæ integræ similis, præter proprium strictum involucrum (*f*) membrana laxa pharyngis protecta (*g*) : perforata

(*s*) PLIN. l. c. MORGAGN. *Epist.* II. n. 6. Non habet equus BOURGELAT *hippiatr.* II. 2. p. 311. neque canis PARIS. *anc. mem.* II. p. 338 aut Lupus FABER ad HERNANDEZ p. 819. Ait equidem in cervo uvulam esse SCHELHAMMER *oncolog.* p. 74. Sed puto de palatino velo loqui.

(*t*) BLAS *misc.* p. 258. PARISINI. DEELINCOURT apud BLAS *anat. animal.* p. 105. COLLINS p. 222.

(*u*) CRANZ *obs. cum tr. de instrum. edit.* Eph. Nat. Cur. Dec I ann. 2. obs. 249 ann. 3. p. 512. ann. 6. 7. obs. 229. Vol. VIII. n. 106. PLATER *Martiff.* obs. 40 BUCHNER *miscell.* 1728. p. 1450. STORCH *Kinderkrank.* p. 157. 158. MORG. *Epist.* X. n. 21. Inter morbos habet ARETÆUS.

(*x*) WEDEL *morb. inf.* HAGEDORN *obs.* 68. STORCH *ibid.*

(*a*) Ligamenta lateralia gargareonis, inter quæ tonsillæ RIOLAN. *Encbirid.* p. 311. Piliers WINSL. n. 490. Habet etiam DUVERNEY l. c. LITTE l. c. f. I. p. 301. BONHOMME *tab.* 15. & BIDLOO *tab.* 13.

(*b*) DUVERNEY.

(*c*) DUVERNEY. LITTE p. 301. WINSLOW n. 586.

(*d*) WIDMAN *de tonsillis* p. 13.

(*e*) *Ibid.*

(*f*) WIDMAN p. 10.

(*g*) MORGAGN. *Epist.* IX. n. 119. WIDMAN p. 11. 12. Crassulas membranas vocat SCHNEIDER l. c. III. p. 419.

rata multis, ad quindecim usque sinibus & aliis quidem grandibus, uno (g^*), duobus, tribus. In ejusmodi sinum multa foramina minora patent (b). Alia ostia sunt exigua, sinuum minorum, qui inter se conveniunt, ad usque duodecim (i). In ejusmodi sinum quemlibet etiam glandulæ (k) simplices se aperiunt, quæ mucum parant, inque eos sinus effundunt, perque eos in fauces amandant (l). Ipsa fabrica particulæ cellulosa est (m). *Tonsillas* (n) veteres dixerunt, nuperi *amygdalos*.

Inferius eas late styloglossus præterit & succutit: latera urgent musculi, qui arcubus faucium continentur.

In animalibus quadrupedibus reperitur glandula satis humanæ similis, cum sinibus, ut in (o) cane (p), bove (q), porco (q^*), phoca (q^{**}).

Haud longe a tonsilla, tubam versus, aliud utrinque & simile corpus (r) cum quatuor foraminibus visum est, ut quatuor tonsillæ numerari possent (s). In animalibus etiam passim a tonsilla ad tonsillam stratum glandulosum venit, & conjungit utramque (t).

§. IV. *Pharynx*.

Pharynx (a) inconstantius apud veteres sumitur: nobis perpetuo tubus

(g^*) DIEMERBROECK p. 323. WHARTON WIDMAN p. 14. 15. 16. COLLINS. WINSLOW n. 587. Non perpetuum esse puto: conf. MORGAGN. *Epist.* IX. n. 18. SIG. WIDMAN p. 15.

(b) Unum sinum habet, in quem majores duo. & plures minores aperiuntur WHARTON c. 22. & SCHNEIDER *de catarrb.* L. III. p. 520. Decem, duodecim WIDMAN n. XI. WINSLOW n. 587. HEISTER f. 1. F.

(i) HEISTER *ibid.* DUVERNEY *ibid.* MORGAGN. *Epist.* IX. n. 18. DIEMERBROECK WHARTON c. 22. RUYSCH *Thes.* II. *aff.* 6. n. 14. VERHEYEN p. 275. RIOL. p. 294. WIDMAN p. 14. 15. COWPER *myotom.* t. 28. f. 4.

(k) COLLINS p. 126. KAAUW n. 342. WIDMAN p. 10.

(l) HEISTER f. 1. F.

(m) WIDMAN p. 9. qui cum glandulis mesenterii comparat.

(n) AURELIANUS *acut.* L. III. c. 1. CELS. L. 7. c. 12. n. 2. *Αντιades & παροδυσσεα* POLLUX p. 204. 252. *Παροδυσσεα* ARETÆUS *cur. acut.* L. I. c. 7.

(o) MORGAGN. l. c. p. 245.

(p) MORGAGN. *ibid.*

(q) IDEM *ibid.* Negat habere equum BOURGELAT l. c. p. 353.

(q^*) MORGAGNI l. c. n. 16 p. 245.

(q^{**}) VALENTINII *Amphitheatr. Zootom.* p. 89.

(r) VALSALV apud MORGAGN. l. c. n. 12. add. n. 17. p. 246. ad proprium MORGAGNI experimentum.

(s) *ibid.* n. 16. 245. RUFUS p. 28. 57.

(t) WHARTON c. 21. WIDMAN p. 12.

(a) *Pharynx* modo pro larynge dicitur, ut apud TIMÆUM, HIPPOCR. in *vet. med.* GALENUM *de usu part.* L. 8. modo pro *Pharynge* GALEN. *ad tert. prognost.* ORIBAS, p. 208. POLLUCEM p. 254. ubi pro broncho laryngem habet. *Φαρυγγετρον* dixit ARETÆUS *cur. acut.* L. I. c. 7. Et *ἡ φαρυγξ* dicitur & *ὁ φαρυγξ* NORMAN *Instit. med.* p. 189.

bus est superne latus, dorsum angustus (*b*). Amplior est superne, versus os hyoides contrahitur, iterum qua laryngem continet latior (*b**).

Membrana intus oblinitur, cuti continua, suaque tecta epidermide, quam & per nares & per os accipit. Extus velatur cellulosa tela, in tenuem membranam, qualis est in omnibus musculis, collecta: interque eas duas membranas, quarum posterior vix id nomen meretur, fibris carneis varii ductus fit. Eas inter fibras & membranam internam, glandulae ovales sedent, foramine proprio in cavam pharyngis patulae.

Facies posterior (*c*) longissima, continuatur narium cavae, atque ad cuneiformem processum multiformis ossis, tunc ad ossis occipitis cognominem apophysin firmatur. Inde secundum vertebrae colli descendit, & ad septimam vertebrae, sub imo larynge, in gulam sive in oesophagum arctatur. Ad ea ossa multa tela cellulosa (*c**) cum mobilitate firmatur maxima (*d*), & firmitus ad processum cuneiformem ossis occipitis.

Latera (*e*) huius facci musculosa accedunt utrinque a maxilla inferiori (*f*); a gena (*g*); a velo palatino (*h*); a pterygoideo processu (*i*); a styloiformi apophysi; a lingua (*k*); ab osse hyoide (*l*); a laryngis cartilaginibus, scutiformi, & anulari. Eorum laterum dextrum simile sinistro in ejus occursum venit, ut in linea quadam alba (*o*), adipe signata, utrumque latus conveniat.

I 2

Ante-

(*b*) WINSLOW n. 469.

(*b**) CASSER L. IV. t. 4. f. 5. ALBIN. t. 12. f. 24.

(*c*) Conf. ALBIN. T. 10. f. 8. 9. 10 t. 12. f. 24. COWPER t. 28. f. 3. CEPHALOT. t. 22. COURCELLES tab. 6. CANT. tab. 3.

(*c**) MORGAGN. Ep. XI. n. 31. p. 348.

(*d*) Mediastinum vocat. retro pharyngem collum bipartiens, GUNZ *Mém. des Savans étrang.* T. 1. p. 288.

(*e*) ALBIN. t. 10. f. 1. 2. 3. 4. 5. 6. t. 12. f. 23.

(*f*) COURCELLES n. 3. CANT. ALBIN. t. 10. f. 8. q. t. 12. f. 23.

(*g*) ALBIN. f. 8. r. t. 12. f. 23.

(*h*) p. 74. ALBIN. f. 12. 13. 14. 15.

(*i*) *Cephalatom.* M. COURCELLE. n. 4. CANT. ALBIN. t. 10. f. 8. y. y. t. 12. f. 23.

(*k*) CANT.

(*l*) *Cephalat.* O. COURCELLES m. CANT. ALBIN. f. 8. n. n. o. &c. f. 1. 2. 3.

(*m*) *Cephalat.* P. COURCELLES l. L. CANT. ALBIN. f. 8. COWPER

(*n*) COURCELLES q. & f. 2. CANT. ALBIN. f. 1. 2. 3. COWPER.

(*o*) C. BAUHIN. *Theatr. Anat.* CANT. tab. 3. EUSTACH. COURCELLES t. 6. L. L. Subinde deest MORGAGN. *advers.* II. p. 36. *Epist.* XI. n. 28. Nempe negat Vix ill. tendinam lineam; adiposam, ut puto, non rejicit.

Anterius positum habet idem pharynx primo iter ad nares, tum palatum mobile (*p*), denique sub utroque iter in os: porro membranam oris, & linguæ radicem, ex que ea subrectam epiglottidem, & ad latera os hyoides, totum demum laryngem, qui in cavum pharyngem promi-
nens, eo continetur (*q*): eaque sede Glottis, sive iter in asperam ar-
teriam ex pharynge patet. Inde glandulam thyreoideam anterius incum-
bentem accipit.

Paulo retro narium ossium tubæ tumidæ intra pharyngem ape-
riuntur (*r*).

§. V. *Musculi pharyngis constrictores superiores* ALBINI (*a*)
Pharygopharyngæi (*b*).

Hi ad constrictorem pharyngis supremum pertinent, suntque ex præci-
puis faucium musculis.

Oritur unus utrinque a toto corniculo (*c*) pterygoideo, interius, a-
que lamina (*d*) interna pterygoidea, nonnunquam a margine ossis
palati huic continuo: alias & ab ipso tendine circumflexi palati (*e*).
Vidi accessisse a salpingopalatino (*f*) fibrarum fasciculum.

Translevatorem palati mollis, quem tegit (*g*), migrat, & circumdat
in universum transversus arcu facto (*h*) pharyngem, retrorsum ductus,
facitque ejus sacci latus, ejusque lateris partem supremam (*i*) carneam,
dexterque in sinistri occursum venit, cumque eo conjungitur.

Pharynx

(*p*) EUSTACH. t. 42. f. 6. Tendo brevis est, & vix infra terminos supremi constrictoris
descendit. Conf. etiam GUNZ *Mém. des Savans étranz.* p. 287.

(*q*) CASSER. L. IV. t. 2. f. 5.

(*r*) ALBIN.

(*a*) ALBIN. p. 232.

(*b*) COWPER. *diff.* MOLINETT L. III. c. XI. DOUGLAS p. 42. SANTORIN. WALTHER
BONHOMME t. 22. M. *Pterigoidiens* (ex typographi errore) WINSL. Omisit VALSALVA,
monente jam COWPERO *Phil. Trans* n. 299. etsi non ignoravit, MORGAGNO teste. *Epist* XI.
n. 35. p. 352.

(*c*) MORGAGN. *Epist* XI. l. c. ALBIN. p. 232. t. 13. f. 23. l.

(*d*) WINSLOW n. 476. SANTORIN. p. 121. MORGAGN. *Ep.* VIII. n. 6. p. 227.
Ep. XI. n. 38. p. 356. ALBIN. t. 10. f. 3. r. & p. 232. COWPER nimis anguste t. 28.
f. 3. L.

(*e*) ALBIN. l. c. r. & t. 12. f. 23. k. COWPER in expl. tab.

(*f*) VALSALVA fibras ejus musculi in hamulum, pterygoideum vidit inseri.

(*g*) Compara utrumque latus COURCELLES tab. 6.

(*h*) Ita etiam MORGAGNUS *Ep.* XI. p. 356. BONHOMME ALBIN. p. 232. 233.

(*i*) Conf. COURCELLES tab. 6. n. 4. & icones BONHOMME l. c. ALBINI, COWPER,

Pharyngis posteriora dum ad anteriora adducit, utique gulam constringit.

In os occipitis inferi (*k*) ita interpretor, ut de celluloso fibrarum ad id os nexu firmo sit, qui possit nonnunquam similior videri tendinis.

Fasciculum ab osse petroso accessorium frequenter vidit ALBINUS, ego raro & semel aut bis. Esset *Petropharyngæus* Cl. Virorum (*l*). Sæpe abesse D U V E R N E Y U S junior (*l**).

Deinde veteres *sphenopharyngeum* (*m*) suum ab acuto processu ossis cuneiformis, prope styliformem processum deduxerunt, & inter nuperos aliqui Cl. Viri similem ab apice processus spinosi ossis multiformis musculum viderunt, mihi nunquam repertum, diversum a nostro musculo (*n*). Longe enim & processus styliformis, & apex processus spinosi ossis cuneiformis distat ab ala pterygoidea, a qua noster provenit.

§. VI. *Mylopharyngæi* . *Fibræ a buccinatore in pharyngem.*

Huic sodales se addunt, proximæ pterygopharyngeo, aliæ fibræ, quæ a buccinatore (*a*) inter ejus musculi originem a superiori maxilla, alteramque a maxilla inferiori, natæ, transversæ retrorsum tendunt.

Proximus est, qui a maxilla inferiori ejusque aspera linea super dentes molares postremos eminente natus, alias a tubere sub dentibus molaribus postremis, non minimus retrorsum tendit, sub priori, & pariter pharyngem complexus, pene transversus, in se ipsum redit, Plurimumque tenuis, tamen adest (*b*).

Et iste supremam gulam perinde constringit, & tonsillam exprimit.

I 3

§. VII.

(*k*) SANTORIN. p. 122. MORGAGN. p. 157.

(*l*) WINSLOW *expos.* T. IV. n. 476. COURCELLES t. 6. n. 3. BONHOMME.

(*l**) *Myotom.* p. 126. 129. 130.

(*m*) RIOLAN. p. 314.

(*n*) WEITBRECHT *Comm. Acad. Petrop.* T. IX. p. 264.

(*a*) ALBIN. p. 232. *tab.* 12. f. 23. m. f. 24. 10. *tab.* 10. f. 3. s. f. 8. e. f. g. 1. f. 10. c. COURCELLES *tab.* 6. n. 5. *tab.* 3. O. *tab.* 4. f. 1. 3. Huc referam fibras a superiori maxilla prope ultimum dentem molarem ortas MORGAGNI *Epist.* VIII. n. 6. *Epist.* XI. n. 38.

(*b*) *Mylopharyngæus* DOUGLAS p. 42. pro novo: SANTORINI p. 123. WEITBRECHT l. c. p. 267. CANT. p. 12. *tab.* 3. 28. 35. qui magnum omnino fecit. COURCELLES ad n. 3. Habet MORGAGNUS *Epist.* XI. n. 45. p. 364. Est pars Cephalopharyngæi COWPERI *tab.* 28. f. 3. *tab.* 29. f. 1. *Myloglossi* pars major. I. *Wilb.* PAULI *Præf. ad microsc.* *Myloglossus* VERNHEYEN *Pars constrictoris pharyngis superioris* ALBIN. p. 232. *tab.* 12. f. 23. n. f. 24. 3. *tab.* 10. f. 2. z. f. 3. t. f. 8. q. s. f. 9. f. f. 10. d.

(*c*) Negat se reperire HEUERMAN T. III. p. 873. WINSLOW n. 480.

(*d*) SANTORIN. MORG. *Ep.* XI. n. 45. ALBIN.

§. VII. *Glossopharyngæi* (e).

Potius obscuriores istæ sunt fibræ, quæ a fibris linguæ postremis (f); & a genioglossæ (g) musculo natæ, per oris membranam sparsæ, retrorsum eunt, sub prioribus, ductu consimili, & pariter pharyngem contra linguam adstringunt.

§. VIII. *Hyopharyngæi* (h). *Constrictor pharyngis medius* (i).

Oritur distinctis fasciculis carneis, evidentibus, omnino tribus, summo a baseos ejus ossis (k) parte exigua, neque perpetuo: altero a dimidio cornu (l) etiam duplex (l*) tectus ceratoglossæ musculo: denique major a corniculo hyoideo (m), ejusque margine inferiori, sursum latefcens (n); etiam a ligamento inter os hyoidei & cartilaginem scuti-formem medio, quæ fibræ descendunt (o). Universi musculi pars superior, ad angulum valde acutum (p) adscendit, & partim tegit priores musculos (q), mediæ fibræ transversæ sunt (r), descendunt infimæ (s) & teguntur a sequentibus (t).

Supre-

(e) VALSALV. SANTORIN. cap. 7. n. 6. p. 124. CANT. DOUGLAS.

(f) COURCELLES t. 6. n. 2. tab. 8. l. i. ALBIN. p. 232. t. 12. f. 23. p. t. 10. f. 2. 3. COWPER t. 28. An hic musculus gulæ a mento veniens C. BARTHOLINI inst. 3 p. 278. Habet MORGAGNUS Ep. XI. n. 1. p. 317. & n. 45.

(g) COURCELLES t. 8. *Geniopharyngæus* WINSLOW IV. n. 480. WEITBRECHT p. 269. SANTORIN. p. 126. 127. ALBIN. t. 12. f. 23. o. t. 10. f. 2. 3.

(h) VALSALV. SANTORIN. n. 8. *Septimus musculus Pharyngis* MOLINETTI p. 134.

(i) ALBIN.

(k) *Basipharyngiens* WINSLOW n. 479.

(l) Habet COWPER T. 28. O. COURCELLES t. 6. m. tab. 8. K. *Ceratopharyngiens* WINSLOW ibid. Exstat. apud ALBIN. p. 230. tab. 12. f. 23. g. t. 10. f. 1. 2. 3. CANT. A. toto cornu EUSTACH. t. 41. f. XI.

(l*) MORG. p. 335.

(m) VALSALV. MORG. Ep. XI. n. 14. 17. SANTORIN. ALBIN. p. 230. t. 12. f. 23. h. f. tab. 10. f. 1. 2. 3. COURCELLES tab. 8. K. interius. *Chondropharyngæus* DOUGL. *Petits ceratopharyngiens* WINSLOW ibid.

(n) MORG. p. 336.

(o) *Synpharyngæus* DOUGL. WINSLOW n. 481. CANT. p. 13. tab. 3. 27. 47. Habet COURCELLES tab. 8. MORGAGNUS n. 16. p. 334.

(p) Id. ALBIN.

(q) ALBIN. t. 10. f. 8. 9. t. 12. f. 23. seqq.

(r) Idem ibid. EUSTACH. &c.

(s) COURCELLES t. 6. M. m. tab. 8. WEITBRECHT l. c. p. 261. BONHOMME t. 222. EUSTACH. l. c. ALBIN. p. 230. t. 12. f. 23. 24. 25. tab. 10. f. 8. 9.

(t) MORGAGN. p. 334. EUSTACH. ALBIN. in ic. cit COURCELLES t. 6.

Supremas fibras ossi occipitis se infigere (u) lego, & de celluloso pariter nexu interpretor.

Pharyngem detrahit & arctat.

§. I X. *Thyreopharyngæi* (a), *Cricopharyngæi* (b). *Constrictores pharyngis infimi* (c).

Hi muscoli reliquis ampliores sunt, hinc vulgo noti, & dudum, etiam veteribus dicti (d). *Thyreopharyngæus* quidem multiplici origine nascitur, & a cornu superiori (e) cartilaginis scutiformis; & ab ora laterali superiori ejus cartilaginis (f): atque a latere ejusdem iterum cartilaginis, longe (g), ut mediæ fibræ breviores sint: demum a processu ejusdem inferiori (h), exque inferiori margine (i).

Fibræ ejus sibi parallelæ sursum eunt (k), & in linea media pharyngis inter se intrlicantur (l), teguntque hyopharyngeos (m).

Accedunt fasciculi a sternothyreoideo (n) cricothyreoideo (o) & hyothyreoideo (p).

Cricopharyngæus musculo modo dicto continuus (q) oritur a parte laterali posteriori cartilaginis cognominis, e regione musculi cricothyreoidei, supra marginem inferiorem (r), crassius valensque: accedunt aliquæ a cricothyreoideo fibræ.

Fibræ

- (u) ALBIN. f. 8. MORG. *Epist.* VIII. n. 5.
 (a) VALSALV. CANT. WINSLOW. DOUGLAS. SANTORIN. & C.
 (b) IDEM *ibid.*
 (c) ALBIN. p. 226.
 (d) Musculi a posterioribus cartilaginis scutiformis ad gulam ORIBAS. p. 202. add. GALLEN. *us. part.* L. 7. c. 11. 12. & *de vocis instrum.* c. 5.
 (e) MORG. *Epist.* XI. n. 25. p. 342.
 (f) Conf. ALBIN.
 (g) WINSLOW n. 482. EUSTACH. t. 41. f. 8. Tab. 42. f. 4. CANT. tab. 3. ALBIN. t. 12. f. 23. b. b. t. 10. f. 1. 2. 3. BONHOMME tab. 21.
 (h) ALBIN. p. 227. COURCELLES t. 8.
 (i) ALBIN. T. 12. f. 23.
 (k) ALBIN. ubique COWPER t. 28. f. 3. BONHOMME COURCELLES t. 6. L.
 (l) MORGAGN. *ibid.*
 (m) ALBIN. *ibid.* f. 24.
 (n) Habet & MORGAGNUS p. 342. & GUNZ.
 (o) Habet etiam GUNZ.
 (p) SANTORIN. p. 129. ALBIN. t. 12. f. 24.
 (q) WINSLOW n. 483. MARCNETTI p. 91. cui est *sphincter*; & GENGA *anat. chir.* p. 225. cui *Oesophagæus*. Diversos esse GUNZ. *Mém. des Savans. étrang.* p. 287.
 (r) ALBIN. p. 227. t. 12. f. 23. c. c. t. 10. f. 1. 2. 3. COURCELLES t. 8. CANT.

Fibræ superiores sursum oblique tendunt, & se addunt sodales thyreopharyngæo, pariterque in media linea alba se decussant.

Fibræ inferiores transversæ fere, in anuli speciem, pharyngem ambiunt, nomenque gesserunt (s) *oesophagæi* (t), ut tamen aliquæ descendant (u). Hæ fibræ subinde a superioribus distinctæ sunt, aque iis teguntur.

Priores lacerti pharyngem & detrahant & arctant: imæ arctant unice.

In glandulam thyreoideam fibras dedisse (x) & in asperæ arteriæ proximum annulum (y), Clari auctores exstant.

§. X. *Stylopharyngæi.*

Constrictores diximus; qui nunc sequuntur musculi pharyngem elevant. Hic princeps, plerumque ab appendice cartilaginea processus styloformis (a), aliquando & ab ossea parte (b) aliis ibi nati musculis inferior, & ab initio ligamenti stylohyoidei provenit.

Descendit antrorsum (c), teres, solus inter pharyngis musculos: adplicatur pharyngi, & fibris suis disiectis, sæpe in duos & tres fasciculos distinctos separatis (d), inseritur per Pharyngis stratum interius, sive membranæ villosæ propius, fibris radiatim discedentibus (e) ut earum summæ adscendant, mediæ transversæ sint, descendant imæ. Sed aliæ exteriores aliquæ, non obscuræ, longe in marginem cartilaginis scutiformis (f)

se

(s) ALBIN. p. 228. BONHOMME, WINSLOW n. 484.

(t) WINSLOW n. 484. SANTORIN.

(u) COURCELLES t. 8. paulum ALBIN. t. 12. f. 24. n. 10. f. 8. COWPER.

(x) WINSLOW.

(y) MORGAGN. *Epist.* XI. n. 34.

(a) Conf. ALBIN. t. 12. f. 27. COURCELLES tab. 6. & 5. CANT. tab. 3. EUSTACH. t. 41 f. 5. 8. 11.

(b) MORGAGN. *Epist.* XI. n. 8.

(c) ALBIN. t. 10 f. 8. 9. 10. 11. COURCELLES t. 5. 6.

(d) ALBIN. *ibid.* f. 9. 10. 11.

(e) ALBIN. p. 215. & *ic. cit.* f. 9. 10. 11. & tab. 12. f. 27. EUSTACH. tab. 42. f. 4. 6. SANTORIN. c. 7. n. 7.

(f) ALBIN. f. 9. 10. 11. tab. 12. f. 27. 28. 29. 30. LIEUTAUD. EUSTACH. tab. 41. f. XI. t. 42. f. 6. COURCELLES t. 6. ⑥. FALLOP. l. c. WINSLOW n. 477. HABICOR. *Journ.* 6. *lect.* XI. MORG. *Advers.* l. p. 4. II. p. 34. In oram supremam cartilaginis Thyreoideæ *Idem Epist.* VIII. n. 5. p. 226. 227. *Epist.* XI. n. 7. p. 324. & n. 10. Negat eas fibras, forte quod tenues sint, CANTIVS p. 12.

se inmittunt: & interiores aliæ in membranam laryngis (*g*), pone ligamentum hyothyreoideum fibris suis disperguntur, circa epiglottidem. In linguæ (*h*) radicem etiam, sed raro, partem hujus musculi immixtam alii viderunt: Alii Cl. viri & in os hyoideum (*i*) & in epiglottidem (*k*) deducunt, in quas quidem fibras non incidi.

Pharyngem elevat, contra cibum recipiendum adducit, etiam ad latera distrahit. Una laryngem sursum ducit, ut se inclinet, & epiglottidem glottidi obducatur.

Secundum stylopharyngæum (*l*), etiam a tuba oſſeanatum (*m*), oſſeve vicino Cl. Viri viderunt.

Alias pars styloglossi musculi non minima pharyngem adit (*n*).

§. XI. *Alii pharyngis levatores.*

Ob connatum cum larynge pharyngem huc etiam pertinent laryngis & linguæ levatores; stylohyoideus (*a*). Biventris venter primus (*b*); geniohyoideus (*c*): hyothyreoideus (*d*); styloglossus (*e*); genioglossus (*f*), hætenus etiam palatopharyngæus.

Numerantur etiam inter levatores pharyngis *cephalopharyngæus* & *salpingopharyngæus*; ille quidem fibrarum pharyngis adſcendentium supremus vertex, tum constrictoris medii (*g*), tum inferioris (*h*), quæ fibræ denique

(*g*) ALBIN. t. 12. f. 29.

(*h*) FALLOP. *observ.* p. 75. b. cui est *Quartum par lingue*, & *Instit.* p. 33. Minus certas facit MORG. *Advers.* II. p. 34. Negat SANTORINUS p. 126.

(*i*) MORG. *Adv.* I. f. 4. II. p. 34. *Epist.* XI. n. 7. VIII. n. 5. FALLOP. l. c. Negat SANTORINUS.

(*k*) WALTHER *de deglut.* n. 6.

(*l*) ALBIN. *adnot.* IV. c. 5. MORGAGN. *Ep.* XI. n. 9. SANTORIN.

(*m*) MORGAGNUS.

(*n*) BOEHMER *præf. ad fasc. obſſ.* 117. Styloglossus alter, de quo dubitabat, num ad linguam pertineat, num ad Pharyngem CHESELDEN *anat. of human. body* Ed VI. p. 79.

(*a*) L. X. p. 415.

(*b*) p. 418.

(*c*) p. 420.

(*d*) p. 382.

(*e*) p. 424.

(*f*) p. 422.

(*g*) L. XVIII. p. 70.

(*h*) p. 71. conf. icones CANTII tab. 3. BONHOMME tab. 22.

quæ fibræ denique ante magnum foramen in medium processum cuneiformant tænia (*i*) cellulosa firmantur, aut unica, aut nonnunquam (*k*) duplici. Nos certe præter cellulosam telam nihil reperimus, quæ posterius, quam origo recti antici musculi minoris proveniat, & in medium pharyngem desinat. Si ea tamen totela firma satis fuerit, ut resistat magis, quam pharynx cum larynge, poterit fieri, ut inverso officio illi constrictores omnes pharyngem levent. Neque tamen id mihi probabile videtur, cum in deprimendo pharynge manifestam actionem musculosam percipiamus, cujus nullum foret instrumentum, si musculi pharyngem deprimentes in levatores converterentur (*l*).

Salpingopharyngeus (*m*), summis viris dictus, ab extrema ossea parte tubæ EUSTACHIANÆ, & ab initio cartilagineæ portionis prodire dicitur, carneusque descendere, firma tendinea membrana tectus, & introrsum, antrosum tendere, & inferi pharyngi, cum (*n*) palatopharyngeo, eumque elevare. Sæpius cum inquirerem, fasciculum eo loco reperi, qui tamen magis glandulis (*o*), quam fibris intus esset fartus.

§. XII. *Pharyngopalatini vel palatopharyngæi* (*a*).

Multorum nominum grandis est, & compositæ fabricæ musculus, qui inter principes deglutitionis auctores merito locum præcipuum tenet.

Muscu-

(*i*) *Azygos* SANTORINI c. 7. n. 2. p. 121.

(*k*) PARIS. III. FALLOPII pars a basi capitis nata, qua jungitur cerviei *observ.* p. 77. Similia docet HABICOT D. VI l. XI. sed addit processum transversum atlantis ib. *Cephalopharyngeus* DOUGLAS p. 41. CANT. p. 12. tab. 3. WINSLOW n. 475. GARENGROT.

(*l*) Non reperit VALSALVA, neque MORGAGNUS *Epist.* XI. n. 42. p. 361. neque HEURMAN *physiolog.* tom. 3. p. 373. Tenuibus fieri fibris DUVERNEY *myotomolog.* p. 129. 130.

(*m*) SANTORINI c. 7. n. 4. p. 122. ALBIN. tab. 12. f. 27. 28. p. 235. tab. 10. f. 13. WALTHER de *deglut.* p. 10. *anat. musc. repetit.* p. m. 617. COURCELLES tab. 6. (P. BONHOMME. *Sphenosalpingopharyngiens* WINSLOW IV. n. 476. Exiguum musculus EUSTACHII t. 42. f. 6. huc revocat ILL. ALBINUS, qui se comitem addit palatopharyngæo.

(*n*) ALBIN. l. c. EUSTACH. l. c. COURCELLES l. c. Vidi inter processum styloformam & eminentem ultimam alam pterygoideam.

(*o*) Similia reperit MORGAGNUS *Epist.* XI. n. 44. p. 363. Membranæ albæ meminit WALTHERUS. Negat reperiri WREITERBECHT *Comm. Petr.* t. IX. p. 264. VINK van de *Spieren.* p. 196. Pergracilem fecit ALBINUS.

(*a*) Musculi gulæ 2. 3. a palato orti C. BARTHOL. *Instit.* p. 238. *Pharyngostaphylinus* VALSALV. c. 2. n. 19. 20. *Pharyngostaphylinus* WINSLOW L. IV. n. 496. & *thyrostaphylinus* EJUSD. n. 457. *Pharyngostaphylinus* SANTORINI c. 7. n. 12. p. 131. & *thyropalatinus* EJUSD. n. 12. p. 132. & *hyperopharyngeus* EJ. p. 132. 133. *Thyrostaphylinus* DOUGLAS p. 45. Recte conjungit in unum diversa nomina MORGAGNUS *Epist.* XI. n. 18. p. 300. & ALBINUS p. 238. Neque valde dissentit WINSLOW n. 497.

Musculus in universum, connumerata dextra & sinistra columna, bicruris est (*b*), cruribus per arcum modice convexum conjunctis. Is arcus, retrorsum cavus, late palato mobili insternitur (*c*).

Crura inde secundum pharyngis latera conflectuntur (*d*), suntque in facie posteriori pharyngis, propius membranam intimam, ut omnibus fibris trium constrictorum tegantur (*e*).

Origo superior est & a margine levi, posteriori, ossis utriusque palati, Cl. Viris auctoribus (*f*), neque enim eo unquam deduxi; & a membrana firma (*g*), quæ ex periosteio palati ossei in palatum mobile retrorsum producitur, estque ei pro fundamento; aque instrato tendine circumflexi (*h*) musculi, & nonnunquam nonnullis fibris a musculo azygo (*i*): reliquæ fibræ a dextro musculo in sinistrum transversæ continuantur (*k*). Arcus iste carnosus, jacet inter tendinem circumflexi musculi & inter uvulam, suamque concavitatem ostendit uvulæ (*l*).

Fibræ palatopharyngei, ut ego quidem reperio, in duobus sunt stratis, aliæ super levatorem palati mollis positæ, ut in vulgationi harum partium situ a levatore tegantur (*m*): aliæ infra levatorem, quem ideo contingunt (*n*), hæ pauciores.

Inde utraque columna, dextra, & sinistra, ab extremo palato molli deorsum (*o*) conflexa, tecta levatore, constituit arcum faucium interiorum, qui interius, quam tonsilla, & posterius, in pharyngem descendit,

K 2

interque

(*b*) SANTORIN. p. 137. 232.

(*c*) WINSLOW n. 491. COWPER *tab.* 28. f. 2. *tab.* 29. f. 1. ALBIN. t. 12. f. 27. 28. 29. t. 10. f. 13. 14.

(*d*) *Postérieur* ALEXII LITRE *Mém. de l'Acad.* 1718. p. 301. f. 2. S. DUVERNEY *tab.* 18. f. 2. g. g.

(*e*) COURCELLES *tab.* 6. Conf. ALBINUS t. 12. f. 27. 28. 29. & t. 12. f. 10. 11. 12. 13. &c.

(*f*) MORGAGN. *Epist.* VIII. n. 4. *Epist.* XI. n. 17. p. 298. 299. VALSALV. *Ep.* XI. n. 16. ALBIN. p. 236 SANTORINUS p. 133. de suo hyperoopharyngeo: LIEUTAUD p. 171.

(*g*) ALBIN. p. 237. t. 10. f. 15. t. 12. f. 28. 29.

(*h*) VALSALV. apud MORGAGN. *Ep.* XI. n. 16. p. 298. ALBIN. p. 237. COURCELLES *tab.* 7.

(*i*) MORGAGN. *Ep.* VIII. n. 4.

(*k*) MORGAGN. *Epist.* XI. n. 17. p. 299. ALBIN. p. 236. t. 10. f. 14. t. 12. f. 27. 28. 29. WINSLOW n. 496.

(*l*) COURCELLES *tab.* 6. ALBIN. t. 10. f. 14. 15. 17. t. 12. f. 27. 28. 29.

(*m*) ALBIN. t. 10. f. 14. COWPER t. 28. f. 2. N.

(*n*) COURCELLES in ic. 7. D. 2. ALBIN. t. 10. f. 13.

(*o*) ALBIN. p. 237. t. 10. f. 4. 14. 15. t. 12. f. 27. COWPER t. 28. f. 2. t. 29. f. 1. WINSLOW n. 496.

interque stylopharyngæum musculum utrumque se conjicit (*p*), lateque per membranam albam pharyngis ad imum usque laryngem se radiatim spargit (*q*).

Earum fibrarum aliquæ superiores, in cornu superius cartilaginis scutiformis & ad latus ejus externum (*r*), & in marginem lateralem (*s*) veniunt, & ei adhærent, sub stylopharyngæo (*t*).

Facile apparet, cum hic musculus utrumque finem habeat in parte mobili; cum superiorem præterea finem conjunctio cum membrana dura palati mollis confirmet, inferiorem adhæsiō ad cartilaginem scutiformem stabiliat, esse pene utrumque finem æque mobilem, tantum ut mobilissimus sit arcus, quo in palato molli dexter musculus cum sinistro convenit.

Quando ergo hic musculus ex sua propria natura agit, detrahit quidem palatum molle, aque naribus removet, adque linguam idem propius adducit, cibum ergo ea parte positum a naribus interposito velo arcet, deorsum urget in pharyngem, & ne in os redeat, cavet, deducto ad linguam velo palatino. Una pharyngem elevat, dilatat, contra detrusum cibum adducit, ad inversionem epiglottidis confert.

Si vero alter finium ejusdem musculi firmior fuerit, & larynx suas pervires detractus sit, tunc unice poterit velum palatinum deducere, & adplicare linguæ.

Si contra per levatorem palati mollis velum palati fursum ductum fuerit, latusque pharynx, & larynx, poterit tunc pharyngem, & una laryngem elevare, tamquam ad palatum osseum (*u*).

Tonsillam quam prætervehitur, concutit & evacuat. Hinc a tumida tonsilla dolor in deglutiendo & incommodum, potissimum ab hoc musculo compresso.

§. XIII.

(*p*) EUSTACH. ALBIN. p. 237. tab. 12. f. 27. 28. 29. 30.

(*q*) ALBIN. t. 10. f. 10. 11. t. 2. f. 27. EUSTACHIUS.

(*r*) EUSTACHIUS t. 42. f. 6. MORGAGN. *adv. anat.* I. n. 8. *Epist.* VIII. n. 4. *Epist.* XI. n. 14. VALSALVA *ibid.* COWPER edit. 1724. ALBIN. p. 237. t. 10. f. 10. 11. tab. 12. f. 27. 30. LIEUTAUD p. 171. SANTORIN. p. 131. 132. WINSLOW n. 497. DOUGLAS. p. 45.

(*s*) ALBIN.

(*t*) COURCELLES EUSTACHIUS.

(*u*) Similia habet ALBINUS. COURCELLES.

(*x*) Glossostaphylinus VALS. WINSL. SLEVOGT.

§. XIII. *Glossopalatini. Constrictor isthmi faucium (a).*

In velo palatino arcum similem, ut is, quem nuper diximus, hic musculus efficit, quem perinde possis pro uno & azygo numerare, & pariter duos arcus ad latera veli mollis descendentes facit, sed interiores, minores, & minus descendentes. Sæpe obscurior est, (b), ut tamen carneum esse adgnoscas.

Finis ergo hujus musculi alter, & superior, est arcus in mobilis veli palatini parte posteriori (c) qua palatopharyngæo incumbit (d), multo angustior (e). Aliqua parte cum membrana firma veli cohæret. Subcutaneus est, sive musculorum ejus regionis infimus, & qui primus remoto velamento, glandulisque detractis, conspicitur. Fibræ posteriores in uvulam usque dorsum sparsæ desinunt (f). A latere utroque veli ferè recta antrorsum & paulum deorsum fertur, & ad linguam accedit (g), in que ejus basim supra styloglossi musculi insertionem se inmittit. Cum palatopharyngæo (h) nonnihil confunditur, & cum levatore veli palatini. Vires habet similes, magni momenti ut in tantilla carne. In deglutitione veli palatini faciem inferiorem ad linguam deducit, unit utramque, aditum ad os perfecte intercipit, cibumque in pharyngem præcipitat (i).

Tonsillam, dum tumet, cum musculo proxime dicto comprimit, ut inter utrumque musculum emulgeatur.

§. XIV. *Levatores palati mollis (a). Salpingostaphylini (b).*

Tertius in palato molli arcus (c) magna parte inter duas quasi laminas
K 3 thyreo-

(a) ALBIN. p. 241. COURCELL. *L'antérieur* LIEUTAUD p. 170.

(b) SANTORIN. c. 7. n. 14.

(c) COURCELLES, VALSALVA: ALBIN. tab. 10. f. 17, tab. 12. f. 11.

(d) ALBIN. l. c. COWPER p. 29. f. 1.

(e) COURCELLES tab. 7. B. β. ALBIN. l. c.

(f) ALBIN. l. c.

(g) LITRE l. c. f. 1. D. D. DUVERNEY tab. 18. f. 1. d. d. ALBIN. l. c.

(h) LIEUTAUD, ALBIN.

(i) ALBIN.

(a) ALBIN. p. 242.

(b) VALSALV. SANTORIN. c. 7. n. 15. p. 134. *Le droit.* LIEUT. p. 170.

(c) SANTORIN. l. c. MORGAGN. *Epist.* VIII. n. 3. X. n. 2. EUSACH. tab. 42. COWPER t. 28. f. 2. ALBIN. p. 243. tab. 10. f. 12, 14. Tendinem interjectum habet. MORGAGNUS *Epist.* X. n. 7. LIEUTAUD.

thyreopalatini interceptus est (*d*) idem antè nudus (*d**), retrorsum convexus (*e*), carneus & robustus ; tenetque veli palatini partem inter musculi circumflexi tendinem & oram liberam (*f*). Fibras ad uvulam, & palatum osseum mittit, & cum pharyngopalatinis passim se commiscet (*g*), & cum tendine circumflexi.

Inde antrorsum adscendit, (*h*) & extrorsum, ut tegatur pterygopharyngæo, & inferitur alio fine in ossis petrosi (*i*) partem, quæ tubam emittit, ad radicem processus acuti ejus ossis, pone tubæ partem mollem, alio fine in foveolam glabram ossis petrosi, inter iter carotidis, & processum acutum extremæ alæ pterygoideæ : alio denique in tubæ cartilaginem (*k*).

Nares quidem in cadavere sponte clausas vidi, potest tamen utique hic musculus, quoties palatum mobile ab eo diductum fuit, sursum ducto (*m*) velo, & retrorsum, nares claudere (*n*). Probabile est, agere in iis hominibus, qui odores (*o*) infestos solo nixu edito norunt excludere, & vidit Cl. LITRE, cum per alteram narem liquorem infudisset, rediisse per utramque, manifesto a velo palatino prohibitum, ne in fauces descenderet (*p*). Denique sunt qui continuo & absque intervallo flare norint, aere per nares admissio, in os descendente, & per idem efflato, dum nares clauduntur, ne per eas is aer exeat (*q*). In respirando agere etiam ALBINUS (*r*) auctor est.

§. XV.

(*d*) Pars tecta palatopharyngæo ALBIN. *tab.* 10. f. 13. Pars quæ cum musculo tegit f. 14.

(*d**) Pars nuda anterior COURCELLES t. 7.

(*e*) ALBIN. *ic.* *tab.* 12.

(*f*) COURCELLES.

(*g*) ALBIN.

(*h*) ALBIN, t. 12. f. 9.

(*h**) ALBIN COWPER t. 28. f. 4.

(*i*) Similia fere habet LIEUTAUD n. 170. Paulo aliter ALBINUS conf. t. 12. f. 9. t. 10. f. 13. 14. Ex osse petroso COURCELLES t. 6.

(*k*) RAU *myolog.* p. 52. LIEUTAUD WINSLOW n. 501.

(*m*) MORGAGNI. *Epist.* X. n. 7. VIII. n. 3. ALBIN. p. 243. LIEUTAUD.

(*n*) SANTORIUM. p. 135. ALBIN. p. 243. 244. COWPER *Phil. trans.* n. 220. A velo palatino in sugendo nares claudi GLISSON *ventric. & intest.* p. 296.

(*o*) La HIRE *Hist. de l'Acad.* 1712. p. 38.

(*p*) *Mém. de l'Acad.* 1718. p. 304.

(*q*) *Mém. de l'Acad.* 1717. p. 70. 71. 72.

(*r*) L. c.

§. XV. *Circumflexi palati.*

Multo grandior musculus est, quam continuo credas, & tunc demum totus apparet, quando sollicite alam externam pterygoideam demolitus fueris: arcum autem facit eorum, qui sunt in velo mobili, quartum, maxime anteriorem, & vicinissimum fini palati.

Oritur ab extremo osse petroso (*b*) qua cum extrema ala pterygoidea committitur; & continua eminentia acuta (*c*) ejus alæ, quæ est ossis cuneiformis, posterius quam foramen rami tertii nervi Quinti paris; & ab eodem osse antrorsum, in alarum usque intervallum, interius quam arteria meningea (*d*), & late ab alarum intervallo (*e*); alaque interna; & a tubæ parte cartilaginea (*f*), late, alias paucis fibris, alias uberioribus (*g*).

Descendit antrorsum cum levatore (*h*), sed exterior quam tuba, ut ille interior est, per cavum alis internis & externis interpositum, proxime alam internam, latus ad unciam, & tendine mistus & carne.

In tendinem conversus transit per suum sulcū (*k*) ad hamuli pterygoidei basin, & reflectitur introrsum, paulum sursum, abitque in latum expansumque tendinem (*l*), per membranam veli mollis sparsum, superiori loco quam glandularum agmen, radiatum (*m*), ut fibræ anteriores antrorsum, mediæ recta introrsum, posteriores retrorsum eant (*n*). Anteriorum fibrarum non paucæ
in

(*a*) ALBIN. p. 245. *Musculus novus tubæ* VALSALV. Primum par FALLOP. p. 76. *b. Contourne* LIEUTAUD p. 171. Habet etiam Pygmæus TYSON.

(*b*) SANTORIN. ALBIN. p. 246. t. 12. f. 9. COURCELLES p. 76.

(*c*) De ea FALLOPIUS p. 76 b.

(*d*) ALBIN. t. 12. f. 10. MORGAGNUS p. 214. COURCELLES, WALTHER, WEITBRECHT.

(*e*) Ab ala interna WALTHER, SANTORIN. a radice alæ ALBIN. COURCELLES; ab alis MOLINETT. *Rau myolog.* p. 52.

(*f*) ALBIN. p. 246. *conf. tab.* 10. f. 15. 16. VALSALV. MORGAGN. Ep. VII. n. 26. p. 212. 213. n. 28. p. 214. COURCELLES, LIEUTAUD, WEITBRECHT *Comm. Petrop.* T. IX. p. 257. add. COWPER t. 28. f. 2. Negat SANTORINUS c. 2. n. 11. p. 46.

(*g*) MORGAGNUS.

(*h*) VALSALVA, COURCELLES, t. 7. ALBIN. t. 12. f. 9. 10. t. 10. f. 15. 16. COWPER l. c. f. 4.

(*i*) VALSALVA, COURCELLES, CANT. *tab.* 3. f. 2. EUSTACH. t. 41. f. 13. t. 42. f. 4. 6. ALBIN. t. 12. f. 9. 10. t. 10. f. 15. 16.

(*k*) VALSALVA.

(*l*) Nimis angustum VALSALVA & EUSTACHIUS: melius COURCELLES.

(*m*) IDEM.

(*n*) IDEM.

in lunatam posteriorem aciem ossis (*o*) palati innascuntur, in ipsam usque mediam spinam. Interiores & posteriores fibræ cum comparibus in arcum coeunt (*p*), & passim cum palatopharyngæi (*q*) arcu miscentur. Fasciculus etiam per pterygopharyngæum, ejusque internam laminam, versus linguam abit (*r*).

Viderunt aliqui clari Viri, partem, ab osse petroso & ab ala majori natam, in hamuli radicem defuisse (*s*); ab ea radice vero aut alium musculum porro in velum palatinum se defuisse (*t*), aut partem ejusdem musculi circumflexi alteram (*u*). Alii summi viri eam fabricam non viderunt (*x*), neque ego in eam incidi.

Officium idem habet, quod haberet, si ab hamulo pterygoideo nasceretur. Nempe velum palatinum deprimit, a naribus abducit, has claudas aperit. Simul idem velum ad latera expandit.

Tubam paulum dilatat (*y*) trahendo, nam tumendo potius arcuat (*z*).

§. XVI. *Azygos. Palatostaphylinus.*

Satis similis in eo geniohyoidei, fibras habet rectas, ita sibi accumbentes & parallelas, ut vel unicum musculum (*a*) sine pari facere possis,

(*o*) SANTORIN. p. 47. ALBIN. p. 247. f. 9. 10. t. 10. f. 16. MORGAGN. *Epist.* VII. n. 23. p. 208. *advers. anat.* II. p. 35. WALTHER p. 8. DOUGLAS.

(*p*) COURCELLES. ALBIN. t. 12. f. 9. 10. t. 10. f. 16.

(*q*) ALBIN. p. 247.

(*r*) An de ea, sed carnem vocat WALTHER de *musc.* ed. nostr. p. 594. de *deglut.* p. 19.

(*s*) ALBIN. WINSLOW n. 458.

(*t*) ALBIN. WEITBRECHT p. 258. *Ceratostaphylinus* HEISTER *Compend. anat.* n. 72. f. 38. WEITBRECHT. *Ceratostaphylin* VERDIER. GARENGEOT p. 131. *Pterygopalatinus* CROONII apud GIBSON *anat.* p. 476.

(*u*) WINSLOW.

(*x*) Negat se vidisse MORGAGN. *Epist.* X. n. 19.

(*y*) MORGAGN. p. 212. Experimento facto.

(*z*) Arctare ALBINUS.

(*a*) *Azygos* MORGAGNI *Epist.* VIII. n. 2. *Ado.* I. n. 8. p. 4. *Advers.* II. p. 35. *Comm. Acad. Bonon.* T. I. p. 311. VALSALV. apud MORGAGN. *Epist.* X. n. 19. SANTORIN, c. 7. n. 16. p. 133. HEISTER f. 38. K. *Musculus sine pari* CANT. p. 15. *Azygos uvula* ALBIN. p. 248. COURCELLES. *Musculus uvula* LITRE p. 302. In gervo media in uvula musculorum quid invenit SCHELEHAMMER *Oncolog.* p. 74.

sis, aut duos (*b*): non habet tamen satis evidentem cellulofam telam, ut duos musculos vere distinctos videas (*c*).

Origo anterior est aut a palati ossei spina media (*d*) ut Cl. Viri scribunt, neque enim eo deduxi (*e*) aut a tendine circumflexorum muscutorum, nam ita omnino vidi (*f*) & a membrana firma, ex periosteo producta (*g*).

Ponitur in strato fibrarum supremo (*h*) sive proximo cælo narium. Tendit retrorsum, rectus primo (*i*) & eundo arctior fit (*k*), deinde cum velo palatino flexus, & denique descendens (*l*) in uvulam continuatur, cui fundamentum præstat, & quam, multis cum glandulis efficit (*n*). Cum palatopharyngæo nonnihil miscetur (*o*) & cum levatore, plerumque pallidus.

Uvulam antrorsum curvat, versus linguam, elevatque (*p*) quando descendit.

Videtur, si quid ferii est in populari modo confirmandæ ejus particulæ

(*b*) Duos olim & suspensorios dixit I. v. HORNE p. 20. Duos fecit DIONIS *course d'Anat.* p. 592. Palatostaphylinos vocat. DOUGLAS. p. 44. Epistaphylinos WINSLOW p. 502. Duos esse SANTORINUS p. 136.

(*c*) Conjungit VALSALVA, & ex maturioribus cogitationibus MORGAGNUS p. 303. 304. & WALTHER *de deglutit.* p. 17. ut rarissime duo sint MORG. p. 306. 314. cum in animalibus potius duos reperiatur p. 312. Non vult musculum dici LIEUTAUD p. 172.

(*d*) ALBIN. *tab.* 10. f. 13. VALSALVA apud MORGAGN. l. c. p. 301. DOUGLAS. WINSLOW. LITTRE t. 15. f. 2. CANT. *Syllab. part corp. hum.* in Russ. edit. 88.

(*e*) VALSALVA *ibid.*

(*f*) Non omnino ab osse MORGAGN. p. 308.

(*g*) ALBIN. & levatoribus *ibid.*

(*h*) COURCELLES in *tab.* 7.

(*i*) Fibras longitudinales vocat RUYSCH *Thes.* II. *aff.* 5. n. 6.

(*k*) COURCELLES.

(*l*) In Fig. LITTRII.

(*m*) ALBIN. p. 248. MORGAGN. *Epist.* X. n. 24. p. 307. COURCELLES t. 7. DOUGLAS. WINSLOW. CANT. t. 3. f. 2. Alias ad initium, in finem alias MORGAGN. *ibid.*

(*n*) LITTRE, SCHERHAMMER.

(*o*) MORGAGN. p. 306. 309.

(*p*) MORG *Epist.* X. n. 27. LITTRE. Errorem, qui ILL. DOUGLASSIO excidit, tum PRÆCEPTORI. correxi in *Præl.* BOERH. T. I. p. 213. 214. tum ALBINUS *de deglut.* p. 72.

culæ quando per morbum longior, abiit in *uvam*, in hoc isto musculo admotis acribus aromatibus, irritabilem naturam a medicis augeri.

Uvula motu voluntario regitur (*q*).

§. XVII. *Glandula pharyngis.*

Humorem pharyngi natura, & per exhalationem arteriosam suppeditat, & mucii copiam, quem folliculi simplices linguæ (*a*), palati (*b*), veli palatini (*c*), dorsi epiglottidis (*d*) tubæ EUSTACHIANÆ (*e*) denique pharyngis, & convexi laryngis undique fundunt. Totus nempe pharynx obducitur in fede convexa membranæ albæ, quæ ex cute continuatur, glandulis duriusculis, ovariis (*g*), per exiguum ductum porumque mucum fundentibus; tunc potissimum, quando deglutimus, tunc enim muscoli pharyngis agunt, eumque faccum dum constringunt varie, mucum de glandulis exprimunt.

Nusquam eæ defunt, adsunt tamen uberiores, qua pharynx ex naribus continuatus (*b*) os occipitis subtendit. Ea in sede vidi in lineas rectas radiatas (*i*) disponi. Ductum (*k*) communem aliquando ibi repertum fuisse lego. Lacunas & circa tubam EUSTACHIANAM longas vidi, & magnam aliam medio inter tubas loco. Ante tonsillas etiam linguam versus, agmen ejusmodi glandularum est, rectum, quod antè & superius, quam tonsilla, incipit, & in pharyngem definit (*l*). Aliæ denique

(*q*) RIEDLIN. *car. med. obs.* 46.

(*a*) L. XIII. p. 107.

(*b*) L. XVIII. p. 50.

(*c*) p. 63.

(*d*) L. IX. p. 392.

(*e*) L. XV. p. 223. 224.

(*g*) MORGAGN. *Epist.* IX. n. 21. p. 250. de plerisque, tum COVEZZES t. 6. Habet etiam VALSALVA t. 5. f. 2. & COWPER tab. 29. f. 2. Glandulas ad fauces etiam GALENUS dixit, *de util. part.* L. XIV. c. 11.

(*b*) Vide descriptionem ejus partis suæ membranæ SCHNEIDER de catarrh. L. III. c. 3. p. 503 504.

(*i*) Habet fere similia MORGAGNUS *Epist.* IX. n. 13. p. 242. 243. & SANTORINIUS p. 137.

(*k*) HISTER not. 58. f. 38. f. Non perpetuum esse MORGAGN. p. 242.

(*l*) An tonsilla anterior p. 66.

que glandulæ in teretem fasciculum membranæ ope colliguntur, quem salpingopharyngæum (*m*) musculus vocant.

Superius in universum majores, deorsum sensim rariores sunt.

§. XVIII. *Arteria pharyngis, palatique.*

Arterias numerosas natura his partibus dedit; neque exiguas velo palatino.

Pharynx arteriam propriam (*a*) habet, etiam duplicem (*b*). Quando unica, tunc est ex carotide fere externa (*c*), & posteriori loco nascitur, quo ex eo trunco arteria occipitalis exit. Adscendit, tecta vasis & musculis ejus sedis omnibus, & ramos ubique musculis colli (*d*) anterioribus impertit.

Sed tamen alios furculos præcipuis musculis a styloide processu descendentibus (*e*) & levatoribus, & tubæ (*f*) largitur: truncoque suo, quo carotidis foramen videbatur subire, reflexa (*g*) posteriorem partem adit pharyngis, in eum saccum late impensa. Dat tamen, uti diximus, etiam pharyngis lacunari supremo, & narium parti postremæ & superiori (*h*).

Arteria palati mobilis plerumque est ex labiali, alias tamen a pharyngea (*i*). Adscendit cum musculis a styloformi processu natis, tum cum levatore; & quidem trunco profundo adit velum palatinum, & in eo loco supremo posita, sodalis azygi musculi in ultimam usque uvulam (*k*) venit. Alter ramus superficialis cum circumflexo palati musculo venit in velum mobile, ejusque glandulas & musculos. Hæc palatina satis grandis est, ut resecta uvula subinde plurimum sanguinem (*l*) funderet, etiam crosa (*m*), & funestus nonnunquam eventus fuerit ejus jacturæ (*n*).

L 2

Tonsil.

(*m*) p. 74.

(*a*) Fascic. II. T. L. X. p. 110. Fascic. III. p. 4. Comm. ad Boerhaav. prælect. T. I. p. 202.

(*b*) p. 4. Fascic. VIII. p. 10. Fascic. II. not. c c.

(*c*) Fascic. III. tab. art. phar.

(*d*) Ibid. i. p. 4. His dicari PETIT ad PALFYN p. 346.

(*e*) Tab. 3. s ad x.

(*f*) p. 4.

(*g*) p. 4. Add MEKEL. tab. nervi Quinti.

(*h*) L. X. p. 110.

(*i*) Fasc. III. p. 7. Fasc. II. M.]

(*k*) Fascic. II. ad cc.

(*l*) Fascic. II. N.

(*m*) Alex. BENEDICT. L. IX. c. 44.

(*n*) IDEM ibid. & VALBSCUS de TARANTA. cum gurgulio resicaretur.

Tonsillaris arteria ex labiali prodit, dum ea per fulcum glandulæ sub maxillaris transit; ascendit secundum sedem pharyngis lateralem, in tonsillæ partem convexam. Altera etiam solet ad tonsillas accedere, palatinæ propago (o).

Palati durioris arteriæ sunt a palatina quam diximus, & a ramis palatinis (p) descendentes arteriæ maxillaris internæ, qui antrorsum secundum dentium radices procurrunt, & arcum faciunt in sede futuræ incisivæ, ex quo ipso furculus per incisivum ductum in nares ascendit (q), inque ossa spongiosa.

Buccarum arteriæ sunt ex labiali, ejusque ramis labiali (r) inferiori, coronaria inferiori (s), & superiori (t), & labiali superiori (u); tum ex transversa faciei (x),

Accedunt rami buccinatorii (y) a maxillari interna adrepentes, cum prioribus conjuncti: & rami infraorbitalis trunci (z), perinde irretiti cum labialibus; & rami de foramine mentali (z*) prodeuntes: & alii rami temporalis arteriæ profundioris (z†). Longa hæc omnia, neque hujus sunt sermonis.

§. XIX. Venæ earum partium.

Pharyngis venæ sunt, minores aliquæ a ramo aliquo venæ jugularis internæ circa os hyoides nato, infra divisionem, aut superius in parotide, aut a vena thyreoidea superiori, aut a labiali. Ejus trunculi furculi sunt, qui in facie posteriori pharyngis descendentes arcum faciunt cum fodalibus: plexumque (a).

Major

(o) Fasc. III. p. 7. Fasc. VIII. p. 12.

(p) Fasc. VIII. p. 18. Fasc. III. p. 10. Fasc. II. p. & not. y. MEKEL de nervo quint. 46.

(q) L. XIV. p. 149.

(r) Fascic. III. tab. art. labial. O. Y. Fasc. VIII. t. y. MEKEL Mémoir. de Berlín. T. VII. JENNY tab. 1. f. 2.

(s) Fasc. III. Y Y. Fasc. VIII. P. MEKEL.

(t) K. K. Fasc. VIII. §. MEKEL.

(u) Fasc. VIII. x x.

(x) d. d. Fasc. VIII. ad L.

(y) Fasc. VIII. α.

(z) Fasc. VIII. γ.

(z*) Fasc. II. R.

(z†) Fasc. III. p. 19. 20.

(a) WEITBECHT Syndesm. ic. n. 32.

Major vena pharyngis a trunco imprimis magno (*b*) interno , jugularis venæ est , ad glandulam maxillarem nato , qui lingualem venam profundam , inferiorem , ramum dorsalem linguæ , ramum maxillarem internum , ramum nasalem , ramum maxillarem inferiorem , ramum tonsillarem , ramum palatinum , & pharyngæum edit.

Ad tonsillas , dorsum linguæ , velum palatinum , pharyngem , maxillam inferiorem , laryngem , alius sæpe truncus venit , aut a vena thyreoidea superna , aut a linguali , aut a vena labiali.

Alias ex trunco venæ jugularis , cum venis pharyngeis , primo loco dictis , nascitur truncus , qui ad posteriora linguæ , velum palatinum , tonsillam , supremum pharyngem accedit.

Venæ buccales sunt a labiali (*d*) propagine jugularis internæ , simplicioribus quam arteriæ truncis , anulo per supremas nares maximo unitæ , tum cum vena ophthalmica de orbita emergente (*e*) inosculatæ.

Profundæ aliquæ a temporali accedunt , ut profundæ arteriæ (*f*).

§. XX. *Nervi earum partium.*

Nervi pharyngis præcipui prodeunt ex trunco glossopharyngæo , qui ab Octavo est (*g*) : tum ab alio nervo pharyngis pariter ad Octavum par pertinente , inferius nato (*h*) , & a nervo laryngæo & ipso Octavi furculo (*i*). Adeunt porro eundem saccum nervi aliqui molles , & a ganglio producti intercostali (*k*) , & ab eodem laryngeo nervo.

Nervi palati mollis & uvulæ sunt a palatinis descenduntibus (*l*) ex Quinto pare natis , ramoque ejus secundo.

Tonsillæ (*m*) , & proximus pharynx , a linguali tertii rami Quinti furculo propagines habent.

L 3

Bucca-

(*b*) L. X. p. 262.

(*c*) T R E W *Epist.* ad H A L L E R t. 2.

(*d*) Conf. *ic. arter. in fasc.* III. & L. X. p. 262. J E N T Y *tab.* I. f. 1.

(*e*) L. XVI. p. 440.

(*f*) Dicta L. X. p. 233.

(*g*) p. 232. add. Cl. R O R D E R E R *Thes.* n. 17.

(*h*) p. 233.

(*i*) p. 233.

(*k*) p. 256, 257.

(*l*) p. 212.

(*m*) p. 213.

Buccarum innumerabiles nervi, a duro (*n*) trunco; & ab infra orbitali secundi quinti (*o*) ramo; aque mentali (*p*); & a buccinatorio (*q*), & a masseterico (*r*) ramis tertii trunci quinti paris nascuntur. Eos in MEKELII incomparabili (*s*) tabula videas.

Acris pharyngis, & veli palatini sensus est, cum a levi harum partium irritatione ventriculus subvertatur, & sequatur vomitus. Igneus salivæ sensus erat, dum deglutiebat hydrophobus (*t*).

§. XXI. Deglutitionis historia. Iter cibi per os.

Prima hæc pars narratu difficilis est. Nempe cibum ponimus in linguam receptum esse (*a*), explicatam per suos musculos; deinde ora utraque sursum per styloglossos ducta (*b*), ut media quasi cymba tutius receptam buccam contineat (*c*). Una buccarum muscoli & labiorum (*d*) os undique claudunt, ne quidquam elabatur.

His ita præparatis, lingua per styloglossos elevata ad palatum adprimitur (*e*), apice primum, deinde ex ordine etiam posteriori sua parte. Ita cibus, cui non alia via patet, ad posteriora migrat, sedemque faucium, pergit. Potest etiam linguæ apicem suum retrorsum curvare, & cibi iter juvare, & retrorsum sensim duci (*f*).

Accedit, certe sæpe, vis suctionis, inprimis dum bibimus. Nempe linguam ex ordine retrorsum ducimus, ut spatium retrocedendo paremus, in quod anteriora quæque succedant (*g*), denique ipsa inspiratione adhibita

(*n*) p. 227. seqq.

(*o*) p. 211.

(*p*) p. 217.

(*q*) p. 221.

(*r*) p. 220.

(*s*) *Mém. de Berlin*. T. VII.

(*t*) DESAULT *de la rage*.

(*a*) L. IX. p. 429.

(*b*) p. 425.

(*c*) *Prælect. Boerb.* T. I. p. 212. ALBINUS *de deglut.* p. 10. II. REVERHORSÆ *de usu ling.* p. 55. PETIT. *Mém. de 1716.* p. 15.

(*d*) S. I. n. 22.

(*e*) ALBIN. p. 21. PETIT *Mém. de 1716.* p. 15. 16. & *Mém. de 1715.* p. 145. SENAC *Ess. de phys.* p. 494. HAMBERGER p. 356. n. 9. & p. 358.

(*f*) HEUCHER *oper. omn.* p. 551. HAMBERGER p. 359.

(*g*) PETIT. 1715. p. 143. HAMBERGER p. 358. 361. not. 12. add ALBIN. p. 11. In hirudine lingua sola totum hoc officium absolvit MORAND. *Mém. de l'Acad.* 1739. p. 263.

bita (*b*), ut aer externus per os torrentis in modum subeuns cibum, potumve detrudat. Creditum est, non alio modo, neque absque inspiratione, deglutiri posse (*i*) & ob hanc potissimam causam negant Cl. Viri, fetum per os ali, ut qui respiratione careat. Sed quisque facile percipiet, quiescente pectore, neque inspirante, & clauso ore naribusque adstrictis, bene nos deglutire & rarissime una inspirare.

§. XXII. *Ut claudatur larynx.*

Sed exstat ad posteriora & inferiora linguæ (*a*) erecta epiglottis (*b*), & pone eam ad laryngem nunquam non apertus aditus.

Adest pariter supra linguam, & supra epiglottidem aditus in nares, inter cuneiformem processum, & inter velum palatinum (*c*).

Eorum itinerum primum continuo funestum vitæ finem imponit (*d*), si eo cibus descenderit.

Alterum incommodum est, & dolens, ut quisque expertus fuerit, si casu per nares cibus redierit, & præterea naturæ fini repugnat, quæ cibum in gulam vult deduci.

Magna primum sapientia naturæ factum est, ut vires pharyngem levantes & dilatantes, una laryngem elevent (*e*), atque viam ad asperam arteriam claudant.

Æ vires sunt (*f*) styloglossi (*g*), stylohyoidei uterque (*h*), stylopharyngæi (*i*), biventrium (*k*) primus venter, hyothyreoidei (*l*).

Sed elevato larynge fit, ex ejus fabrica, ut invertatur & antrorsum inclinetur (*m*), utque una & vera glottis constringatur (*n*), & totus larynx

(*b*) PETIT 1715. p. 144. 1716. p. 20. 21. GLISSON *ventr. & intest.* p. 296. HAMBERGER *Elem.* p. 356.

(*i*) Nullum animal absque suffocatione sub aqua deglutit BIRCH T. I. p. 117.

(*a*) COWPER ad t. 13. BIDL. f. 1.

(*b*) L. IX. p. 373.

(*c*) p. 64.

(*d*) L. VIII. p. 267.

(*e*) CASSERIUS p. 193. MORGAGN. *Epist.* XI. n. 33.

(*f*) L. IX. p. 240.

(*g*) Ibid. p. 424. COWPER *Phil. transf.* n. 220.

(*h*) L. IX. p. 415. 416. 417.

(*i*) L. XVIII. p. 72.

(*k*) L. IX. p. 418.

(*l*) Ibid. p. 383.

(*m*) ORIBAS. p. 64. RUFUS p. 27. C. STEPHANUS l. c. p. 25. ALBIN. *deglut.* p. 25.

(*n*) L. IX. p. 447.

ryn timer sub epiglottidem se recipiat, a qua ampliter tegitur (o) & abunde. Ergo in animalibus sub aqua respirantibus merito maxima est, ut in phoca (p) & in lutra (q).

Id ut fiat perfectius, & larynx (r) firmiter elevetur, una os plerumque clauditur & maxillae adducuntur (s), plerumque nempe, & in commodiori deglutitione : nam possumus (t) & humores imprimis, aperto ore etiam deglutire, sed magis incommode, & cum periculo : & etiam tunc necesse est firmari maxillam, ut punctam inmotum levatoribus laryngis præbeat. Hinc a luxatione maxillae deglutitio aboletur, & fitis incurabilis supervenit (u). Et in senibus, quibus articulatio maxillae minus firma est, deglutitio patitur (x).

Firmatis vero maxillis biventres, geniohyoidei (y) & genioglossi (z), laryngem sursum ducunt & invertunt (z*). De biventre video negari (a) : sed duritatem ejus in deglutiendo nascentem Cl. Viri experti sunt (b).

Confert ad invertendam epiglottidem lingua (c), quam diximus eo tempore elevari. Sed potest etiam immota lingua, inque cadavere ostendi, ut laryngis aditus, dum idem sursum ducitur, arctetur, seque inclinet; neque aliter ob vires geniohyoideorum, genioglossorum fieri potest. Et credam linguam potius resistere, non adeo retrorsum ductam epiglottidem impellere. Penitus enim firmata lingua, & contra palatum stabili, bene deglutitio. Bolum (d) aliqui epiglottidem inclinare scripserunt.

(o) L. IX. p. 474. ARIST. *hist. anim.* L. I. c. 16.

(p) PARISINI.

(q) *Mém. des savans étrang.* T. II. p. 205.

(r) Elevari in deglutiendo ALBIN. p. 21. & C. ORIBAS. p. 94. CARR. *Isagog.* p. 50 b. CASSER. p. 181. MONRO *Eff.* & C. T. I. p. 145. WALTHER *de deglut.* p. 10. GLISSON *ventr. intr.* p. 299. MORGAGN. *Epist.* XI. n. 33. & C.

(s) MONRO *Eff.* T. I. p. 137. 145. COWPER t. 15. f. 1.

(t) FERREIN *Mém. de* 1744. p. 552.

(u) LA MOTTE T. IV. p. 337.

(x) FISCHER *morb. senil.* p. 181.

(y) L. IX. p. 420.

(z) p. 422. seq.

(z*) In vivo cane SCHEHAMMER *de voce* p. 10.

(a) FERREIN *Mém. de* 1744. p. 552.

(b) MONRO *Eff. of a Societ. at Edimb.* T. III. ed. 4. p. 424. 229. T. I. ed. 4. p. 113. 114.

(c) B. S. ALBIN. *hist. musc.* COWPER *Phil. transf.* n. 220. PERRAULT *Eff.* III. p. 194.

(d) GALENUS *util. part.* L. VII. c. 16. ORIBAS. p. 64. CASSER. p. 187. HILDAN. *Gent.* V. obs. 94.

runt. Sed exiguus humor, epiglottidi invertendæ ineptus, tamen deglutitur.

Ostendi tamen necessario fieri, dum levatur pharynx, ut una glottis claudatur (e), ne guttulæ forte aliquæ, sulcum(f), qui est ad utrumque latus aditus laryngis, perlabentes in fistulam spiritalem destillent, faciantque tussim(g). Et intelligitur, cur adeo facile tussis superveniat iis, qui dum deglutiunt, rident, aut alioquin animo aliis curis occupato, celerius bibunt. Nam in risu erigunt epiglottidem ut essent, & laryngem detrahunt, quando eum maxime oportebat levare, quo epiglottis invertetur. Et adparet impossibile esse, una nos inspirare & deglutire. Nam inspiranti larynx apertus ponitur.

Hinc ab epiglottide erosa(h), aut rigida(i), aut resoluta(k) ut inverti nequiret, ex illapso in laryngem potu, funesti eventus sequuntur.

Majores guttulæ tussim cient, minimæ non adeo nocent. Peranti-qua de potu in asperam arteriam illabente lis fuit, & auctor I. HIPPOCRATICI(l) aliquid tamen de humore epoto in laryngem(m) subrepere, experimento cum odorato liquore capto confirmavit; PLATO(n) eam sententiam repetiit, refutavit ERASISTRATUS(o), & ante eum alius HIPPOCRATICUS auctor I. περί νοστων(p), tum ARISTOTELES(q).

Inde GALENUS(r) exiguum tamen aliquid in spiritalem fistulam adve-

(e) L. IX. p. 447.

(f) PETIT. *Mém. de* 1716. p. 13.

(g) Ibid. p. 14. LITTE *Mém. de l'Acad.* 1718. p. 304.

(h) Ex lue venerea, erosa epiglottide, suffocatio, MERELIN ad PANDOLPHIN, *de ven-rosit. spin.* p. 273.

(i) BONNET *sepulchr.* II. p. 31.

(k) HELMONT *catarrh. delirant* n. 54.

(l) De corde, & alius auctor I. περί τῶν ἐν τῷ πύλῳ.

(m) Ea enim est sententia, licet pharyngem nominet.

(n) In TIMEO.

(o) GALEN. *hisp.* & *Plat. decret.* L. VIII. c. 9.

(p) L. IV. fin.

(q) *Part. anim.* L. 3. c. 3.

(r) De usu part. L. VII. c. 17. *Metb. Med.* L. IV. Ita ORIBASIVS p. 64.

advenire secundum parietes, etiam per experimentum putavit ostendi, ulcerum ejus fistulæ a siccantibus lente deglutitis sanatorum (s).

Multi ex ea schola, ut ubique, Cl. Viri in eam iverunt sententiam (t).

Contra VINCENTIUS BARONIUS (u), vir eximius, negavit in vivo animale coloratos liquores in eam arteriam, inque bronchia, descendisse, ut nuper Cl. ALBINUS (x). Inde CÆSO GRAM peculiari libello ostendere conatus est, vera docuisse PLATONEM, & H. FABRICIUS experimentum HIPPOCRATICI auctoris repetiit (y). In nostris denique & Cl. EVERSI experimentis (z) adparuit, & vulgarem, & tingam aliquo colore aquam, omnino in pulmone fuisse, cum viva animalia in ejusmodi aqua suffocassemus (z*).

Ut omnino lis tota videatur ab aquæ ubertate pendere, quæ tussim moveat, si major fuerit; nihil noceat eadem, quando perexigua est.

§. XXIII. *Cibus in pharyngem recipitur.*

Eadem causæ, quæ laryngem elevat, eadem non possunt non una pharyngem (a) sursum ducere; sursum vero ductus dilatatur: eo magis, quod abductus a vertebra larynx, & antrosum prolatus (b), spatium auget, cujus mensura est distantia vertebrarum colli a fine anteriori pharyngis. Sed etiam lingua una radice sua paulum antrosum ducta pharyngis caveam auget (c).

In hunc dilatatum pharyngem cibus premitur a lingua, cujus pars major palato osseo adpressa est; pars denique postrema elevata (d) cibum ab anterioribus sibi transmissum, in proximum spatium impellit, quod ei recipiendo patet.

Has

(s) *Method. Med.* L. V.

(t) NARDI *noct. genial.* L. X. p. 700. TANCREDUS LATINIUS *de fame & siti* p. 103. HEUCHER *oper.* p. 563. GURDOT *prolegom.* p. 22. Humoris thoracici partem inde deducit JASOLINUS *de aqua pericard.* c. 4.

(u) *Pleuropneumon.* p. 131.

(x) *L. c.* p. 68.

(y) *De gula* p. 27.

(z) *Exp. de respiratione Sect.* 4.

(z*) *Hist. de l'Acad.* 1719. p. 29. EVERSI *disp.* p. 6. 7. BRAUNIER *additam* p. 190.

(a) p. 73. & C. ALBIN. *de deglut.* p. 23.

(b) ORIBAS. p. 94. FABRICIUS *de gula* p. 33.

(c) ALBIN.

(d) CICERO *de natura deor.* L. II. p. 602. PETIT *Mém.* de 1715. p. 145. 1716. p. 8. p. 494. ALBIN. p. 13.

Has ob causas adparet, magnas esse in deglutiendo partes linguæ (e), ut omnino gravius vulnerata (f) difficilem reddat deglutitionem. Femina, cui de lingua nihil supererat, nisi tuberculum (g), sicca quæque non deglutiebat, nisi digitis intrusa.

Potus facilius & ab incumbente palato molli, & ab uvula (g*) & a linguæ sulca, qui est ante epiglottidem (g**), ducitur secundum utrumque ejus linguæ latus, per sulcos, utrinque aditum spiritalis fistulæ amplexos. Necessè autem est, parce bibere & lente, ne in laryngem copiosior humor aberet.

§. XXIV. *Cibus in gulam pellitur.*

Sed cum ea linguæ elevatione, ita concurrit ad depulsionem cibi veli palatini descensus, ut utraque actio linguam palato molli adpri-
mat (a): sic omnem in os reditum intercipiat, & una potenter a na-
ribus cibum removeat potumque, & in pharyngem demum urgeat.

Ea actio est thyreopalatini (b) qui, dum pharynx adsurgit, una velum mobile deorsum ducit, & glossopharyngæi (c). Ideo quando amygdalæ tumefactæ sunt, laborat hæc actio; neque enim velum palatinum satis nunc ad linguam accedit (d).

Et una, quamprimum cibus in pharyngem (e) est receptus, irritatus pharynx & ipse contrahitur, omneque linguam inter & vertebrae spa-
tium abolet. Videtur hæc actio ad irritationem pertinere; neque enim in arbitrio nostro est, non deglutire, quæ pone linguam in summas fauces illapsa sunt (f).

Primi ergo pterygopharyngæi (g), & cum iis conjuncti buccinato-
res, & (h) mylopharyngæi (i), & glossopharyngæi (k), pharyngem ad re-
fisten-

M 2

(e) GREW *Cosmolog. sacr.* p. 26.

(f) A plumbea glande BAUSCH *prooem. hamatol.* p. 52.

(g) JUSSIEU *Mém. de l'Acad.* 1718. p. 8. Conf. ALBIN. *de deglutit.* p. 12.

(g*) PETIT *Mém. de* 1716. p. 13. LITTRE *Mém. de* 1718. p. 302.

(g**) PETIT p. 13.

(a) ALBIN. *de deglut.* p. 15. Conf. COLLINS p. 222. COWPER *append.* p. 23. PETIT *Mém. de* 1714. p. 145. *Mém. de* 1716. p. 21. Sed iste de unico casu.

(b) ALBIN. p. 13. 14. 23. *hist. musc.* p. 238.

(c) Ibid. p. 241.

(d) SENAC *Eff. de phys.* p. 591.

(e) ALBIN. *de deglut.* p. 15. 16. *Hist. musc.* p. 238. 239.

(f) HARVEI p. 197.

(g) p. 68.

(h) p. 63.

(i) Ibid.

(k) p. 70.

fistentem linguam adprimunt (*l*), quo tempore saccus ad laryngem amplior cibos recipiendos expectat.

Deinde ex ordine (*m*), ut irritatæ fuerunt, carnes pharyngis inferiores, hyopharyngæorum (*n*), thyreopharyngæorum (*o*), cricopharyngæorum (*p*), porro eundem deorsum promovent, ut denique in gulam recipiatur. Arytænoidei, dum secundum glottidis veræ appendicem cibus atque potus descendit, eam rimam claudunt (*q*).

Una larynx laxatus descendit, & retrorsum per suas vires reducitur, & pharyngem etiam ipse arctat. Id fit ab agentibus sternohyoideis (*r*), sternothyreoideis (*s*), coracohyoideis (*t*).

Absoluta ea actione suo se elatere epiglottis nunc erigit, & uvula a levatore palati mollis & azygo suo restituitur.

Eadem veli palatini, linguæ, & pharyngis contractio intercipit iter ad nares (*u*), neque eo cibi redeant, cavet.

Merito igitur quoties vel ex connato vitio columella deest (*x*), aut palati fornix (*y*), palatumve (*z*), aut velum fissum est, aut nimis parvum (*a*), aut ab ulcere erosum palatum (*b*), aut consumptum velum palatinum; toties male utique deglutitur (*c*), & cibus in nares turpi spectaculo redit (*d*).

Si

(*l*) ALBIN. p. 27. *Hist. musc.* p. 238.

(*m*) CICERO l. c.

(*n*) p. 70.

(*o*) p. 71.

(*p*) Ibid.

(*q*) L. IX. p. 472.

(*r*) Ibid p. 413.

(*s*) p. 381.

(*t*) p. 414.

(*u*) C. ALBIN. *de deglut.* p. 15. & p. nostr. 78.

(*x*) BAUHIN. *Theatr.* p. 507. RIOLAN. p. 254. WEDEL *morb. inf.* p. 12. STORCH *Kinderkr.* p. 157. 158. SALMUTH L. III. n. 6. CRANZ *obs. cum tr. de infirm.* ed.

(*y*) ZIMMERMANN *Eph. nat. cur.* Dec. I. ann. ad p. 512.

(*z*) Fränk. *Anmerk.* IV. p. 241. PETIT *Mém. de 1735.* p. 52.

(*a*) La METTRIE *obs.* 110. etiam p. 316.

(*b*) TURNER *Siphylis* p. 263. HAYMAN *Comm. ad Boerb.* III. p. 249.

(*b**) MORGAGN. *sed. & caus. morb.* II. p. 9.

(*c*) ZIMMERMANN *var. natur. luf.* p. 14. WEDEL. Fränk. *Anmerk.* *Eph. Nat. Cur.* l. c. RIOLAN. CRANZ. STORCH. In altero latere ALBIN. *de deglut.* p. 16. Inde mors per famem ARÆTÆUS *cur. acut.* L. I. c. 9.

(*d*) SALMUTH. WEDEL *de lacte.* La METTRIE. TURNER. C. BAUHIN. HAYMAN, PETIT. RIOLAN. &c.

Si vero reperiuntur aliqui, quibus uvula aut resecta (*f*) aut a morbo deleta (*g*), aut a primo ortu deficiente (*h*), etiam eroso palato (*i*), tamen deglutitio integra superfuit (*k*), iis probabile fit, aut solam laxiorem columellam decurtatam fuisse, ut ejus satis ad necessarios usus relinqueretur; aut certe palati, quantum natura desiderabat, superfuisse integrum; aut naturam peculiari aliqua fabrica malos effectus vitiosæ fabricæ reparavisse, ut margine processus palatini ossis maxillæ superioris eminente (*l*) scimus factum esse. De sola certe uvula possis excusare, si quis negaverit ad claudendas nares facere (*m*). Quibus animalibus nulla uvula, iis majus est velum (*n*).

Magis mireris, etiam in asperam arteriam vitio veli palatini cibos potusque illapso fuisse (*o*), natamque phthisin (*p*), & suffocationem denique (*q*) supervenisse. Etsi enim antiquares est, cavere id velum, ne quid in fistulam spiritalem illabatur (*r*), certum est tamen, & multo, quam glottis anteriorem uvulam esse (*s*), & ad eam rimam claudendam minime idoneam. Videtur liquor ex veli vitio minus bene in pharyngem depelli, hinc hæere circa glottidem, & paulo post illabi (*t*).

In angina pars mali solet in velo palatino esse (*u*).

§. XXV. *Finis hujus actionis.*

Adparet multa & composita vi (*a*) musculorum cibum potumve descendere; neque simplici ponderis potentia ad ventriculum duci, cum alio-

M 3

quin

(*f*) HAGEDORN *obs.* 69. RAV. apud BÖTTICHER *de loquela*. EYSEL *de præcip. uvula morb.* n. 3. RUFUS II. p. 57.

(*g*) *Phil. transf.* n. 464. ASTRUC. L. IV. c. II. p. 523.

(*h*) HAGEDORN n. 69. *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3.* p. 490.

(*i*) FORREST. *obs.* L. 32. c. 22. add. HILD. *obs. chir. Cent. II. obs.* 22.

(*k*) HAGEDORN. qui non est ad manus; EYSEL. *Phil. transf.* l. c. RUFUS. ASTRUC. HILDAN. FORREST.

(*l*) *Eph. Nat. Cur. Nov. vol. I. obs.* 103.

(*m*) SLEVOGT *de gurgul.* p. 189. 190. nob.

(*n*) *Canis compar. anat.* p. 50.

(*o*) PETIT *Mém. de 1716.* p. 14.

(*p*) PARE. *admin. anat.* p. 47. MORGAGN. *Epist.* p. 239. C. BAUHIN. p. 502.

(*q*) MORGAGN. ex velo palatino consumto l. c. WALTHER *hist. suffoc. ex velo palatino male formato*

(*r*) ORIBAS. p. 66. conf. SENAC. p. 497.

(*s*) p. 64. & LITRE *Mém. de 1718. tab. 15. f. 2.*

(*t*) Conf. ALBIN. p. 16.

(*u*) STÖRK *ann. med. II.* p. 144.

(*a*) BOERN. *Prælect.* T. I. p. 242.

quin & pleraque quadrupeda contra ejus ponderis vim in deglutiendo cibum urgeant, & homo inverso (*b*) corpore, & pedibus supra caput eminentibus, bibere queat. Quare intelligitur, cur a morte (*c*) aqua in ventriculum animalium submersorum non facile descendat, etsi a vivis utique sub aquam datis bestiis deglutitur (*d*), plerumque certe (*e*) in experimentis nostris (*f*): ob quam ipsam irritationem in ventriculo natam eadem vomere conantur (*g*).

Quare etiam in mente conscia doloris, quem inter deglutiendum pateretur, aquæ timor nascitur, quoties organa deglutitionis inflammata sunt, etiam quando nullus canis morsus accessit (*h*). Adparet etiam, cur in summa debilitate (*i*) & in apoplexia (*k*) nonnunquam, inque paralyti gulæ (*l*), & in stupore a frigore nato (*m*), nulla deglutitio supersit, quæ funesta est in morbis malignis anginæ species (*n*). Frequens satis est malum, in quo sola solida descendunt, fluidi nihil degluti potest (*o*). Vidi & sanavi paralytin dilatati pharyngis, ut in sacco cibi aliquamdiu (*p*) circa thyreoideam cartilaginem retinerentur, & demum crudi rejicerentur.

Et vicissim ex spasmo hysterico constricto pharynge deglutitio abolita fuit. Ejusmodi mala sunt, quæ opio levantur (*q*).

Multum

(*b*) Add. SENAC p. 493. KRUGER *physiolog.* p. 84.

(*c*) EVERS *experiment. in submersis* p. 6. 7.

(*d*) J. HORNE 2. *bref om drifvande and. sunkande long.* p. 13. *Art. de faire les rapports* p. 516.

(*e*) *Exp. nostr.* 135. 136. 138. 139. & in experimentis EVERS p. 613. & nonnullis *Hist. de l'Acad.* 1719. p. 26. & de se ipso BRUHIER *addit.* p. 190.

(*f*) Nullam reperit LOUIS *signes de la mort.* p. 267. nec in aliis experimentis *Hist. de l'Acad.* 1719. p. 29. Nulla erat *Exp.* 137.

(*g*) EVERS p. 18 sub ipsam mortem.

(*h*) LIRUTAUD *precis* p. 475. DARLUE *Journ. de med.* vol III. n. 3.

(*i*) In senē HAYMANN *Comm. T. III.* ex BOERHAAVIORE. Add. MORGAGN. *sed & caus.* II. p. 10. de ultimo bolo. Ab evacuationibus nimis le DRAN. *oper.* p. 278. A diabete HEYDE *obs* 28.

(*k*) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 6. 7. obs.* 40.

(*l*) TULP. L. I. c. 42. *Hist. Morb. Uratist.* 1702. p. 96. 97. STARRPARE *Cent.* II. *obs.* 27. FABRIC. *de gula* p. 16. In altero latere ALBIN. p. 16.

(*m*) SCHURIG *chylolog.* p. 270.

(*n*) FELICE *diss.* p. 161. HYSERL K. *Svensk. Soc. Handl.* 1746. p. 193. In febre carceraria PRINGLE p. 307. in ardente ZACUT *hist. med. mirab. obs.* 100. [in isto casu vinum datum saluti fuit.]

(*o*) G. V. SWIETEN *Comm. T. II.* p. 702.

(*p*) Sacci œsophagi non infrequentes DUYERNEY *postb.* II. p. 173.]

(*q*) COLLINS p. 263.

Multum autem hic juvat mucī, ex fontibus jam excitatis copia: neque enim sine eo gula quidquam absque summo dolore dimitteret; neque aspera, & arida, aut acria absque irritatione sentientis membranæ pharyngis transeunt.

Multum etiam facit epidermidis tutela. Ea enim per inflammationem (s) & excoriationem amissa, deglutitio fit difficillima. Etiam hic blandi liquores & mucī analogi salutare fuerunt.

In solidorum deglutitione superstite, quando fluida non descendunt, credas obstaculum aliquod in gula esse, quod cedat buccæ solidæ, fluido non cedat.

S E C T I O I V.

O E S O P H A G U S [a].

§. I.

Oesophagus vel gula similis undique sui, carnosus, cylindricus, tubus, antèrius tamen & posterius compressus est, qui sub cartilagine cricoide [a*] ex pharynge continuatur, inque ventriculum ducit. Nullo animali negatus est [b], brevior tamen [c], & amplior [d] in piscibus

(r) De HAEN de deglut. vit. p. 59.

(s) BIUMI canalet. p. 90. Hist. de l'Acad. 1712. n. 5. A lixivio poto SEVERIN. nov. Abscess. c. XI. a spiritu nitri Journ. de medec. 1757. Ne aquam quidem ferebat miser.

(t) La METTRIE obs. de med. prat. p. 10. Journ. de Medec. 1757. m. April.

[a] Στενωχος POLLUX p. 252. PLIN. L. XI. p. 625.

[a*] COWPER myotom. 1724. tab. 23. f. 3.

[b] Habet apud SWAMMERDAM bibl. p. 454. hemerobium p. 248. crucea p. 477. de GER p. 8. LYONNET. Cochlea GAUTIER obs. p. 199. LISTER cochl. t. I. f. I. Purpura Phil. trans. T. L. p. 2. p. 587. Ostreum, cancer, locusta, CHARLETON enquiries on nutrition p. 23. Mentula marina VANDELEI diff. Animalculum valde simplex microscopicum HILL Essays p. 261.

[c] Multis piscibus ARISTOTELIS hist. anim. L. II. c. 17. PLIN. l. c. SEVERIN. antiperipatias p. 105. RONDELET de piscib. p. 96. puto quod brevis sit.

[d] Doro COLLINS tab. 26. Acipenser GRONOV. mus. ichthyol. II. p. 43. Rhomboturbot COLLINS tab. 37. Siluro HELWIG ex MONAVIO Plicæ COLLINS ibid. f. 4. Lucioperce SCHONVELD p. 114. Lamæ RONDELET p. 392.

piscibus, in quadrupedibus frigidis [e], & in nonnullis avibus [f]. Latum multivoris esse, & iis quæ ossibus vivunt [g] dudum dictum est. Divisus, inque insulam rediens, raro fuit spectaculo [h].

Ejus iter in universum est secundum corporum vertebrarum anteriorem sinistramque faciem, ad sinistram fistulæ spiritalis latus, ut cartilaginea dextra pars ejus fistulæ, ultra oesophagum, nuda emineat, molle vero deliquium, & anulorum ejus fistulæ cartilaginæorum pars sinistra, gulæ [i] incumbat.

Per collum multa cellulosa tela ad eam, quam modo dixi, fistulam, adque membranas vertebrarum corpora velantes revinctus, descendit oesophagus. Neque aliam tunicam externam [k] habet, ea enim, quam a mediastino addunt [l] & parvæ longitudinis est, & unice anterior gulæ incumbit.

In pectore medius inter pleuræ dextrum sinistramque saccum intercipitur, in spatio mediastini posteriori [m] dexter adjacens arteriæ aortæ, cui cedit, & dextrorsum deflectit [n], fere a quinta [o] vertebra dorsi ad nonam. Ita descendit pone cor, secundum medium sinum pulmonalem: sensim tamen deflectit iterum paulum sinistrorsum [p] & antrorsum, ut vertebra deferat anterior, & in ostium septi transversi, sibi destinatum [q], inter musculosas carnes lumbales medias interceptum, recipiatur,

[e] Amplius in vipera BLAS *anat. anim.* p. 332. serpente p. 353. rana JACOBUS C. 3. p. 50. Salamandra p. 117 testudine WELSCH *becatoft. obs.* 47.

[f] Corvo marino PARIS. Ciconiæ Eph. *Nat. Cur.* Dec II. ann. 2. *obs.* 97. Plateæ ALBIN. *de avib.* Tom. II. n. 66. Aquilæ F. II. n. 5. Ardeæ SCHRADER *diss. anim. carniv.* p. 29. Butauro ALDROVAND. L. XX. p. 406. Liro COITER p. 133. Anati SEVERIN *Zootom. demer.* p. 337. Gregi COITER p. 122. Corvo SCHRADER p. 24.

[g] GREW *anat. of the guts* p. 20.

[h] BLAS p. IV. *obs.* 7.

[i] WINSLOW *Mém. de 1715. Expos. anat.* T. IV. Plerumque FANTON. p. 75. MORGAGN. *Epist.* XI. n. 43. Accurate pone asperam arteriam poni BENRENS *Bresl. Saml.* 1723. m. Jan. & situ ludere HEISTERUS *Compend. not.* 48. Neque aliter tamen vidi quam dixi.

[k] WILLEIS *Pharm. rat.* L. I. tab. 4. A. A. VERNERYEN p. 201. tab. 23. f. 4. HEISTER p. 127. WALTHER *de deglut.* n. 29. FANTON. *diss. anat.* p. 75.

[l] FANTON.

[m] L. IV. p. 265.

[n] EUSTACH. *tab.* 10. f. 1. 3. VESAL. L. 5. c. 3. p. 594. COLUMB. p. 226.

[o] COLUMB. PRITSCH *diss. sape laud.* n. 97.

[p] Conf. EUSTACH. l. c. COLUMB.

[q] L. VIII. p. 79. 82.

piatur, oblique inmissus. Infra gulam carnei diaphragmatis fasciculi a dextris in sinistra decussantur [r]. Denique in abdomine oesophagus dilatatus [s] in ventriculi faciem superiorem, posteriorem, ad originem sacci cæci sinistri se immittit.

§. II. Oesophagi fabrica.

Carnea hujus tubi fabrica est, ut robore & ventriculum & intestina in homine inmensum superet, in herbivoris [a] etiam robustior [b], quibus lento opere cibum de terra sursum in ventriculum promoveat, in ruminando in os reddat.

Fibrarum duosunt plana. Exteriores [b*] sub cricopharyngæo musculo primum natæ; a cartilaginis anularis [c] facie posteriori, ex ejus dorso, eæque obliquæ [d] primo, inde rectæ, secundum omnem gulæ ambitum in ventriculum descendunt.

Interiores [e] ab eadem cricoide cartilagine [f] nascuntur, sub musculo cricopharyngæo, obliquæ primo [g], deinde transversæ [h], & in circulum gulam ambiunt.

In nonnullis animalibus, ut in cane [i], & fele [k], tigride [l], phoca [m], bove [n], ove [o], ove guanaco [p], hæ fibræ in spiræ speciem

[r] Ibid. p. 79.

[s] RUYSCHE thes. II. tab. 5. f. 1. COWPER l. c. tab. 29. f. 4. EUSTACH. ibid.

[a] Ruminantibus GREW l. c. equo p. 12.

[b] Musculus perforatus FALLOP. p. 158. b. Adde in cane SCHRADER p. 18.

[b*] FALLOP. p. 159. COWPER tab. 28. f. 3 tab. 29. f. 3. 4. MORGAGN. Epist. XI. n. 51. p. 375. & n. 52. p. 376. RUYSCHE Thes. II. tab. 5. WEPFER de cicut. p. 120.

[c] FALLOP. p. 158. b. SANTORIN. c. 7. n. 20. p. 140.

[d] Helices vocat WALTHER l. c. p. 30. 33. & MORGENESSER de vomit. p. 6. Habet etiam COWPER ic. cit.

[e] FALLOP. p. 159. MORGAGN. p. 376. WEPFER. WALTHER. deglut. p. 29. COWPER l. c. f. 3.

[f] WALTHER. SANTORIN.

[g] MORGAGN. Epist. XI. p. 376. WALTHER p. 29. SANTORIN. p. 139. n. 19. WINSLOW n. 159.

[h] in lupo BESLER.

[i] Observ. colleg. priv. Amstelod. p. 31. MORGAGN. Adv. L. p. 19.

[k] GREW. p. 22.

[l] PARISINI De omnibus animalibus LORENZINI. p. 27.

[m] SANTORIN. p. 138.

[n] MORGAGN. PEYER Merycol. p. 152. GREW anat. of the guts tab. 26.

[o] GREW p. 17.

[p] FRUILLER Journal T. 2.

speciem oesophagum ambeunt, contrario utrinque ductu : & se decussant [q] : non perinde in homine [r].

Mire dilatabiles factæ sunt, & fibræ istæ, & reliquæ tunicæ oesophagi. Neque enim solæ viperæ [s] magna animalia deglutiunt, qualia vidi in eorum gula hæere in SEBÆ & VINCENTII thesauris, quæ nunquam credidisses eo potuisse urgeri [t]. Sed etiam in lupo [u] similis est facilitas, inque aliis bestiis. Lamia hominem obesum, gula excepit [x]. Etiam in homine per morbos mire distenditur [y] : & transmisit nonnunquam nummum duarum fere unciarum diametro [z].

Etiam plicæ in nonnullis bestiis extensionem adjuvant, ut in hufone [a] ave Peruviana [b] tarda [c].

§. III. *Cellulosa tela* [a]. *Tunica nervea.*

Laxior [b], quam usquam in systemate cibario, hæc tela est, adeo longa, & rara, ut olim dictum sit, duos tubos esse in oesophago, carneum exteriorem, ac huic inclusum membranaceum, quos facile separe [c].

Succedit continuata tunica nervea [d] gulæ, firma [e] alba, laxa, distensibilis, exque cellulosis laminis, stipata ipsa nempe & oris [f] & faucium.

[q] STENON. *de musc. & gland.* p. 13. WINSLOW n. 159.

[r] MORGAGN. p. 375. 376. *Adv.* II. p. 35. VERHEYEN p. 201. 202. WINSLOW n. 159. Vidit tamen in homine SANTORINI c. 7. n. 18. p. 138.

[s] CHARAS p. 44. SEVERIN. p. 231. BARTHOLIN. *Cent.* IV. *Hist.* 15. Tres aviculæ in anguis ventriculo SEVERIN. *Zootom.* p. 364.

[t] Serpens hinculium 40. l. deglutivit SAAR *Ostind. Reis.* p. 70.

[u] BESLER. *Gazophylac.*

[x] RONDELET p. 192. Fuisse Jonæ balænam jam est suspicatus.

[y] BLAS P. IV. *obs.* 9. Ventriculo æqualis G. V. SWIETEN T. II. p. 647. add. BARRERE *obs. anat. obs. ed. nov.* p. 147. de HAEN *de deglut. cas.* I.

[z] *Hist. de l'Acad.* 1752. n. 1. Florenum WREDEN *Nachricht von im Magen gefundenen Holzern* p. 16.

[a] MARSIGLI *Danub. Paton. Mys.* T. VI. tab. 4.

[b] FEUILLE *Journal.*

[c] HARDER *apiar. obs.* 19.

[d] WINSLOW n. 160. WALTHER l. c. n. 14. Conf. VEREILLON *Gland. Oesoph.* p. 41.

[e] WALTHER l. c. p. 31.

[f] FALLOP. p. 158. b. HABICOT *Journ.* VI. *leg.* II. VERHEYEN p. 202. WINSLOW IV. n. 161. Laxe pendet a fibris musculosis PEYER *mercol.* p. 165.

[d] Nervosa GREW p. 16. WALTHER n. 14. WINSLOW IV. *Poitr.* n. 160. &c. Duas fecit sphære WOLFIANO J. W. PAULI *progr.* 1721.

[e] WEPFER *cicut.* p. 121. GREW p. 16.

[f] CHARLETON *Enquiries on nutrit.* p. 28.

faucium alba cutis [g]. Aere impulso, ut in ventriculo, in spumam & in bombycinas abit cellulas.

Sensum, ut vera cutis, retinet. Ustionis sensus mansit, cum membrana interna vomitu rejecta fuisset (h). Perit convulsus, cui vitrum in oesophago hæserat [i].

Interior facies oesophagi in plicas [k] amat collabi, quæ longitudinem sequuntur, porosque habet, de quibus continuo dicetur.

Obducitur denique vera & insensili epidermide [l] quæ & nervæ membranæ sensum minuit, & eadem post ambustiones [m] absque magno malo, & decessit & recrevit. Vidi feminam, quæ plumbo fuso deglutite supervixit. In exuviis insectorum & ipsa deponitur [n]. Tenera cum sit, non sufficit retinendæ & in vesiculam colligendæ materiæ variolosæ. Hinc ultra fauces nunquam pustulas variolosas vidi [o].

Villi [p] in animalium variorum cavo oesophago dependent, etiam prælongi; in homine, etsi Cl. Viris dicti sunt, mihi tamen nondum innouerunt [q]. In testudine [r] manifestissima dura corpuscula in cavum gulæ producuntur. Sed ea pertinent forte ad auxilia retinendæ prædæ [s].

N 2

S. IV.

[g] WILKES l. c. §. II. n. 2.

[h] *Hist. de l'Acad.* 1712. p. 39.

[i] BARTHOL. *Cent. V. hist.* 66.

[k] WEPFER p. 120. COWPER *tab.* 29. f. 2. FANTOM. p. 55. WINSLOW.

[l] Cuticularis NICHOLLS.

[m] Add. BOERHAAVE. *pralect.* T. I. p. 239. Canes ab infuso plumbo non perierunt *Phil. transf.* 1749. P. 2. n. 54. In morbo ejecta est *hist. de l'Acad.* 1752. n. 5. Therias illasa potabat femina apud SALMUTH c. 2. *obs.* 5. Voratum vitrum BARTH. l. c. SALMUTH L. III. *obs.* 3.

[n] SWAMMERDAM p. 670 686.

[o] Ita neque in gula, ventriculo, intestinis, larynge, aspera arteria vir Cl. P. C. FABRICIUS *Progr.* ann. 1760. edit.

[p] Papillas vocat RUYSCH *Advers.* II. n. 9. Habet etiam in *Thes.* VII. n. 40. villosæ nomine. Valde parvas esse WINSLOW n. 161. Veram villosam dixit VERMEYEN p. 202. *tab.* 23. f. 5.

[q] Neque Cl. HAASE de *renovat. tunic. villos.* n. 13. tum PAULI l. c.

[r] COLLINS p. 286. RUYSCH *cur. renov.* n. 85. *Thes.* VIII. *tab.* 2. f. 4. BEL-LIN. *discors.* IV. p. 83. Dentium speciem vocat STUBBS *Phil. transf.* n. 27. Habet etiam CALDESI p. 23. & JACOBÆUS p. 104. Habet jam PLINIUS L. XI. p. 625. Stomachum callo denticulatum. In acipensere etiam reperiuntur RICHTER *Ichthyol. Theol.* p. 203. In xiphia SCHULHAMMER p. 12.

[s] Vocat aculeos CALDESI p. 27. Add. VALISNER T. III. p. 448. SCHULHAMMER. JACOB.

§. IV. *Liquor oesophagi.*

Arteriolæ omnino, ut in reliquo tubo cibario, ita in gula humorem tenuem exhalant, quem ars imitatur, quæ aquam per arterias injectam in cavum idipsum perpluere [a] cogit.

Earum glandularum aliæ externæ [b] sunt, quæ secundum gulam universam, & in pectore etiam superiores sequuntur. Ex non raro ulcerosæ, inque canibus verminosæ [c], habitæ sunt pro fonte liquoris, pleni vivis animalculis, quæ in gulam & ventriculum effusa sint præcipuum coctionis ciborum instrumentum [d], & vitalem characterem massæ chylosæ impertiant. Verissimæ tamen conglobati, & lymphatici generis glandulæ sunt [e].

Quare etiam, uti mesenterii & inguinum glandulæ frequentissime humore viscido & concreto replentur, intumescunt [f]. ita & istæ glandulæ simili malo gulam comprimunt, cogunt super compressam sedem dilatari, & iter ad ventriculum ita arctant, ut malignus ciborum

in

[a] K A A U W *perspir.* n. 178. 179. etiam de cera.

[b] Conf. L. II. p. 189. 190. Habet duas ejusmodi glandulas testudo CALDESI p. 28.

[c] MORGAGN. *Epist.* IX. n. 44. *Bresl. Sam ung.* 17. 6. M. nov. FANTON *anat.* p. 55. CORNEL. *Consent. progymn.* p. 241. KÖNIG *regn. anim.* p. 88. PEYER *obs.* 13. *Phil. transf.* n. 315.

[d] Toto libello a Jacobo VERCCELLONI, imprimis *Secl.* II. n. 18. p. 129. seqq.

[e] L. II. p. 190.

[f] BARTHOLIN. *inst. anat.* p. 237. RUYSCH *Advers.* I. Dec. I. n. 20. p. 24. *Ess. of a Societ. at Edimb.* II. n. 24. 25. RONCALL. *PAROL. hist.* p. 171. BONNET *Sepulchr.* III. p. 263. II. p. 31. 33. 34. 35. *Eph. Nat. Cur.* vol. VI. *obs.* 149. VERHEVEN p. 201. SCHURIG *Chylog.* p. 249. WBSZPREM. *obs.* HILDAN. *de angina* p. 403. EYSSON *de fund. microc. diff.* 5. *Gal. di miner.* T. VI. p. 66. T. VII. p. 12. *Ad. Budissin.* p. 171. SCHEUCHZER ad DREIDIER p. 538. 539. in *Tr. de la peste.* TOLP. L. I. c. 44. G. V. SWERTEN *Comm.* T. I. p. 647. BORDEU *sur les glandes* p. 193. BLANCAARD *chirurg.* p. 470. COECHI *bagni di Pisa* p. 238. *Journ. de medec.* 1759. nov. VALISN. *Oper.* III. p. 208. 209. de HARN *Histor. morb. deglutit. propr.* MANGET *Theatr.* p. 298. KRAMER *med. milit.* F II p. 172. MORGAGN. *Secl. & caus. morb.* p. 9. ob glandulam maxillarem durum, aliosque tumores canerosos.

Ventriculi ostium superius connatum tumore inaequali scirrhus, ostium angustante, ut sola liquida descenderent PONTICELLI *conf.* 14. Ex nivis abusu oesophagus cartilagineus & osseus, ostio pene clauso, inde ciborum omnium vomitus tabesque funesta TRILLER *de callosa oris ventriculi angustia.* Ex membranaceo corpore & mucro compositum in oesophago impedimentum BEVERWYCK *Schat. der ongezondb.* p. 201. Ex tuberculo, ut videtur, prope septum transversum FERDINANDUS EPIPHANIUS. Ex scirrhus ad orificium ventriculi COITER p. 121. SCHEUCHZER l. c. Oesophagus scirrhus circumlatus MAUCHART *struma oesoph.* p. 13. Caro excrescens de gula & aditum in ventriculum claudens IDEM. Ex acino mucoso oesophagi scirrhus idem malum SCHMIEDER *Eph. Nat.*

in eum ventriculum commeatus, & denique nullus sit, lentaque tabe æger [g] intereat, nisi efficax manus Medici accesserit [h]. Valde frequens malum est, ut præter infinitas per Medicos fastos sparsas historias, mihi pene invito & per alia officia distracto medico, & subinde consilia, inter differentissima civilis munia danti, tres eodem tempore casus ejusdem mali curandi occurrerint. Curavi autem eos ægros, ut breviter aliquid de arte medica adspargam, argento vivo cum camphora [i] & aloe composito, ut per alvum pituita sanguine tincta decederet; alium etiam nuper oleo tartari per deliquium in multa aqua dato.

Aliæ glandulæ [k] pharyngis veriores, exiguæ, subrotundæ & ovatæ, depressæ, in cellulosa tela sedent, inque convexitate membranae nerveæ [l] eademque per ductus exiguos [m], & poros [n], humorem viscidum [o]

N 3

in

Cur Vol VI. obs. 73. Add RHOD C. II obs. 48. HAYMAN Camm. T. III. p. 166. VERHEIJL de alim. chylopoj. p. 21. A spongiola oesophago adnata HORNUNG cista p. 255. A tumore fungoso nata angustia, lente aucta UYLHOORN in HEISTER p. 824 1815. Ab atramenti potu ad orificium oesophagi duo tumores adfidentes BECK palp. cord. tuberculis duobus id ambeuntibus FERNEL pathol. L. VI c. 1. Ex steatomate pectoris JAMIESON Edimb III. n. 28. A steatomate superiori orificio adnato RHOD II. 3. Ex scirrho amplexo ostium ventriculi Hamb. Magaz. T. XIV. Est ubi absque glandulæ aliquo discrimine gula tota in scirrhum versa fuit RHOD Cent. II. obs. 47. G. V. SWIETEN T. I p. 37. II p. 648. de HAEN de deglut. cas. 3. ant. demum cartilaginea WARNER cas. 9. COLLINS p. 262. VALISNER. l. c. Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. p. 173. TRILLER diss. propr. BECK tal. p. 11 & etiam ossæ MORG. sel. morb. Gula pene coaluit ex abusu spiritus vini WILLIS Pharm. l. I. p. 22. Comm. Nor. 1741. hebd. 25.

[g] TRILLER. DIEMERBROEK p. 326. UYLHOORN ad HEISTER p. 824. 825. VERHEYEN. HILDANUS. HAYMAN. EYSSON. SCHNEIDER. COCCHI. Act. Budiss. TULP. JAMIESON. Hamb. Magaz. Anton. de HARN. SWIETEN. BLANCAARD. WARNER. VALISNER. BECK. Act. Edimb. l. c. EPIPHANIUS hist. 63. SCHEUCHZER ad DEIDIER p. 538. COCCHI apud TARGIONI pref. hist. p. LIII. FERNEL l. c.

[h] RUYSCH. WESZPREMI. BLANCAARD Jaarregist. C. V. n. 31. SCARELLA in gal. di Minerva.

[i] Conf. L. II p. 189.

[k] STEEN. gland. musc. p. 34. DUVERNEY arud du HAMEL Phil. vet. 63 nov. Phys. c. 3. p. 316. Journ. des Sav. 1678. Ann. Mém. de l'Acad. T. X. p. 610. I. G. PAULI. V. HORNE microsc. p. 37. MORGAGNI Advers. III. p. 6 Epist. IX. n. 24. p. 252. BOERHAAVE Epist. de fabr. gland. ad p. 22. HEISTER n. 386. KAAUW perspir. n. 251.

[l] MORGAGNI. Epist. IX. l. c.

[m] FANTON, CALDESI.

[n] WEPFER, HEISTER, KAAUW n. 177. 178. BOERHAAVE l. c. p. 10.

[o] In cane FANTON. p. 55 57. WEPFER cicut. p. 149. 252. Colleg. priv. Amstel. obs. p. 32. In lupo WEPFER cicut. p. 163. In animale Zibethi FANTON. In tigride PARIS. In vitulo MORGAGNI Adv. III. p. 5. In castore Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs. 251.

in oesophagum deponunt, qui acriter sentientem tubum, & a frictione, acrimonia, aut calore cibi deglutiti dolentem, confoletur.

Pene omnia animalia ejusmodi glandulas in oesophago habent, quadrupeda [p], pisces [q] aves etiam manifestissimas.

§. V. Arteria oesophagi.

Multæ, sunt exque diversis natæ trunculis, arteriæ oesophagi, quarum quæque non longam sedem ejus tubi suis ramis percurrit. Primæ sunt a thyreoidea inferiori [a] ejusque ramo laryngeo.

Quæ sequuntur, jam in pectore, ex eodem trunco sed ex ejus ramo thoracico [b] nascuntur. Sub iis sunt parvi trunculi cum glandulis lymphaticis, etiam pericardium, vasa magna cordis [c] adeuntes. Eorum *dexter* ex arteria subclavia dextra [d], aut ex mammaria [e], aut ex trunco subclavio ante ortum carotidis [f], aut ab intercostali superiori [g*] aut a thyreoidea inferiori [g] venit. Duo etiam trunci fuerant, ex aorta alter, & alter ex intercostali superiori [h]. *Sinister* [i] venit a subclavia ejus lateris [k], aut a mammaria sinistra [l], aut a trunco aortæ [m], aut ab intercostali superiori [n].

Sequuntur

[p] Inter pisces squatina COLLINS p. 256. Etiam testudo MORGAGN. CALDESI p. 28. FANTON. *diff.* p. 81.

[q] COLLINS p. 255. GREW. p. 9. 31. 40. Peculiariter aquila HARDER *apiar.* p. 61. MARSIGLI *danub.* T. VI. p. 9. tab. 6. Noctua Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 4. obs. 34. scops demoiselle PARIS. Platea ALBIN. T. II. n. 66. Casuarius GREW l. c. Galina MORGAGN. *Adv.* III. p. 5. Anser Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs. 85. Hirundo GREW. p. 8. 9.

[a] Fascic. II. tab. art. thyr. inf. not. g. k. & in icone. SYLVA de la Saignée p. 95.

[b] Fascic. II. l. c. not. l. & Fascic. VIII.

[c] Fascic. II. ic. art. thyr. inf. l. not. m. Comment. ad BOERH. T. III. n. 308. not. a. Fascic. III. tab. art. thorac. II. h. i. & not. 6.

[d] Fascic. III. l. c. Conf. SYLVA p. 95. WALTHER *vas vertebr.* ad verba rami tertio GUNZ ni fallor l. c.

[e] Fascic. III. l. c. & tab. thor. I.

[f] Ibid.

[g] Ibid.

[g*] Ibid. & RUYSEN *Epist.* VI. tab. 7. f. 3. Conf. SYLVA.

[h] Ibid.

[i] Fascic. VIII. p. 21.

[k] Ibid.

[l] Ibid.

[m] Ibid.

[n] Ibid. WALTHER ni fallor.

Sequuntur rami cum bronchiis communes, lateris dextri, duobus sæpe trunculis, ramis numerosis ex bronchiali dextra [o].

Sic a sinistra bronchiali, sæpe duplici [p] trunculo ad gulam arteriæ veniunt.

Infra eas, aut etiam commistæ, ex aorta ipsa arteriæ duæ [q] tres [r], quatuor, quinque [s], sex, septem [t] oesophageæ veniunt; superiores minores, inferiores majores [u], & ad pleuram, pericardium, pulmonem etiam extensæ, denique in ventriculum cum oesophago propagatæ, ut cum coronariis & phrenicis inferioribus ramis communibus uniantur.

Inter eas una alterave est ab intercostali aortica [v].

In brevi spatio gulæ, quod est sub transverso septo, a phrenica [x] æque coronaria dextra [y], hi principes rami, ad gulam veniunt, quorum ista in thoracem etiam redit, inosculata pectoralibus.

Ita natæ hæ arteriæ, numerosæ, exiguos quidem ramulos dant carneo gulæ involucro, rete vero faciunt ramorum majorum in parte convexa nerveæ tunicæ, quod nomini membranæ *vasculosæ* [z] occasionem dedit, quæ eadem etiam a glandulis glandulosa dicta est [a].

Surculi per nerveam convexam plurimi sparguntur, eaque perforata minuti ramuli denique in convexitate epidermidis finiuntur, minimis, quas jam diximus, fistulis exhalantibus emissis.

§. VI. *Venæ oesophageæ.*

Exigua earum, ut fere undique venarum, memoria est. Numerosis etiam ex trunculis nascuntur.

Supremæ

[o] *Fascic. III. tab. post thor. k. G. & not. 10. Fasc. VIII. p. 21.* Unicam habet RUYSCH *obs. anat. post. tr. de valv. Lymph. & WALTHER de nerv. intercost. diff. 2.* Habet WINSLOW III. n. 109. LIEUTAUD p. 221. SYLVA & C.

[p] *Fascic. III. not. 9. Fasc. VIII. p. 21. 22.*

[q] *Fascic. VIII. p. 22. HEISTER n. 67. LIEUTAUD p. 439.* Tres oesophageas habet P. C. FABRICIUS in *progr.*

[r] *Ibid. HEISTER. LIEUT.*

[s] *Fascic. VIII. l. c. Quinque vel sex GUNZ Mém. des savans étrangers I. p. 291.*

[t] *Fascic. III. not. 10. 11. ic. cit. q. r u. y. z. tum 7. 8. 12. 14. 15. 16.* Aliquot KULMUS numerat *anat. p. 82. & HEBENSTREIT. Unam. I. DRAKE t. sæpe cit. XX. n. 30. WALTHER.*

[u] *Fascic. III. p. 38. y. l. c.*

[v] *Fascic. III.*

[x] *Sinistra tab art. renal. & ibid. p. 54.*

[y] *Fascic. II. tab art. coeliac. not. 8. Fasc. VIII. p. 92.*

[z] *VERHEYEN p. 202. WILLIS in tab. 6.*

[a] *VERHEYEN l. c. WILLISII glandulæ videntur in concava parte nerveæ poni l. c.*

Supremæ oesophagearum sunt a thyreoideis [a] inferioribus, adeuntibus laryngem,

Proximæ in dextro latere ex trunco venæ cavæ [b] veniunt, qua dividitur, vel ex mammaria dextra, & ex azygo [c]; in sinistro ex subclavia sinistra [d] aut ex bronchiali sinistra, aut ex vertebrali ejus lateris. Ex venulæ vasa cordis magna, fistulam spiritalem, glandulas ei adfidentes, & oesophagum adeunt. Etiam bronchialis dextra ramos eodam [e].

Proximæ sunt ex vena sine pari [f] in dextro latere, & ex hemiazyga in sinistro: adeunt ex mediastinum, pericardium, pulmonis superficiem, oesophagum, valde numerosæ. Imæ earum, & majores eadem, ad diaphragma descendunt, cumque coronariis ad pectus redeuntibus, cumque phrenicis communicant.

In abdomine ex phrenica [g] & ex coronaria natæ gulam adeunt.

Rete faciunt ut arteriæ, etiam magis manifestum sed exterius, cetera similes.

Lymphaticæ venæ oesophagum numerosæ perambulant, qui totus conglobatis glandulis tegatur. Num tamen ex gula quidquam fugant, num potius ad telam cellulosam pertineant, quæ pleuræ exterior circumponitur, nunc quidem non possum definire.

§ VII. Nervi.

Numerosi ii multique, quantum novi, omnes sunt ex pare octavo: superiores quidem ex recurrente [a] trunco, grandes ii, & multo, quam ad intestina, potiores. Inferiores sunt ex ipso nervo octavi paris [b], cujus uterque truncus, dexter & sinister, per oesophagum multis magnisque ramis ad ventriculum descendit.

§ VIII.

[a] Fascic. III. p. 29. T. I. II. & p. 38. Venæ ad jugularem WELSCH tab. 31.

[b] Fasc. III. p. 35.

[c] p. 38. Habet WELSCH l. c.

[d] p. 35.

[e] Ω. T. II. Fasc. III.

[f] Fasc. III. p. 38. tab. II. t. 2. 3. 4.

[g] Fascic. III. p. 56.

[a] L. IX. p. 407.

[b] L. X. p. 235. 236.

§. VIII. *Actio oesophagi.*

Eadem, quæ pharyngis est, sed simplicior. Cibus ex pharynge in oesophagum demissus eum dilatat, fibras extendit, irritat. Eadem per leges naturæ irritabilis paulo post contractæ, se liberant stimulo, cibum in partem proximam laxam, non irritatam, neque contractam, promovent: quæ & ipsa, ab ea ipsa causa irritata, paulo post deorsum cibum urget, donec in ventriculum depulsus gulam sinat quiescere.

Motus naturalis oesophagi in animalibus [a] est evidentissimus, etiam in ranis [b], potissimum tamen in ruminantibus & vomentibus [d]. Idem ab irritatione adeo arcte contrahitur [e], dum cibum promovet [f], ut nullus tubus supersit [g], isque motus etiam a morte [h] major [i] est. A morte oesophagus convulsus [k]. Robore constrictionis suæ, ut fibrarum vi, ventriculum utique superat [l].

A nervis octavi paris irritatis idem motus nascitur [m].

In homine etiam adparuit [n], non bene negatus oesophagi motus [o]. A convulsionibus hystericis arcte constrictus fuit, ut unica in diem hora misera posset deglutire [p].

Quare & paralyxis [q], ex debilitate nata, omnem deglutitionis usum abstulit, ut tamen cum viribus, etiam gulæ naturalis usus rediret [r].

Etiam

[a] Motum peristalticum gulæ habet FABRICIUS *de gula* p. 22. & in equi bibentis oesophago GREW p. 229. In aculeo pediculi motus peristalticus SWAMMERDAM *biol.* p. 78. 79. In proboscide GEFROEI *insect.* II. p. 6.

[b] CALDAN *Letter.* in *collect.* Bonon. p. 329.

[d] Conf. p. 154.

[e] CALDAN- p. 319. *Experim. nostr. de irritab.* 340. 341. 342. SPRÖGEL *de venen.* p. 51.

[f] *Exp.* 340. 341. SPRÖGEL. PRYER *mycolog.* p. 164. WEPFER *cicut.* p. 353.

[g] *Exper. nostr.* n. 334. SPRÖGEL p. 44.

[h] De HEYDE *obs.* 91.

[i] CALDAN. *ibid.* p. 335.

[k] De HEYDE *obs.* 92.

[l] *Exper.* 342.

[m] CALDAN. *Lett.* II. p. 420.

[n] De HEYDE.

[o] LANGGUTH in *diff. de motu perist.*

[p] BESSE *analys.* I. p. 470.

[q] COLLINS p. 263.

[r] *Eph. Nat. Cur.* Vol. 8. *obs.* 21.

Etiam manifesto a cerebri vitio feroque in ventriculis effuso destructa [s] deglutitio.

In obstructo oesophago cibus & peristaltico naturali motu deorsum actus est, & antiperistaltico [t] fursum rediit.

Fibræ, quæ longitudinem sequuntur, in ruminantibus visæ sunt gulam elevare, cibumque quasi adtrahere [u].

§. IX. *Motus gulæ a diaphragmate.*

Diximus [a] oesophagum inter musculos inferiores & intimos diaphragmatis ad abdomen descendere. Ab iis nunc omnino constringitur, dum homo inspirat [b], ut per experimenta manifesta apparet [c]. Etsi enim in animale inciso molliter [d] gula comprimitur, facile tamen intelligitur, vivo in homine, quando omnia plena sunt, multo arctius omnia adstringi. Ut eo minus sit mirum, succum heliotropii, adeo impatientem acoris, tamen in oesophago vivi animalis colorem cyaneum fervere, quem etiam vapor acidus vitiaffet, si potuisset de ventriculo effugere [e]: cum ipse etiam vapor fermentationis lac cogat [f]: Ita in alio exemplo, oesophagus plenus fuit, inanis vero ventriculus [g], ut viam a gula clausam fuisse certum esset. Quare etiam in sano homine, de ventriculo non nimis onerato, neque aer, neque aqua, neque odor adscendit, eaque omnia, quoties adscendunt, id vitio fit.

In ruminantibus [h] animalibus majori cum robore oesophagum stringi adparet.

Aliis

[s] COLLINS p. 260.

[t] MAUCHART *de struma*. Talem in vomitu adgnovit FABRICIUS l. c.

[u] PEYER l. c. Habebat ORIBASIIUS p. 94.

[a] p. 96.

[b] L. VIII. p. 87. Ventriculum plenum ab eo claudi THEOPHILUS L. II. c. 3. Nobiscum VIEUSSENS *traité des Liqueurs* p. 263. SCHWARTZ *diff. de vomitu &c.* Inspiranti animali stringitur SPRÖGEL p. 26. 28.

[c] *Exp. nostr.* 335. 336. 337. 338. 339

[d] L. VIII. p. 87.

[e] VIRIDET *de ferment.* p. 223. conf. L. VIII. l. c.

[f] SCHUYL. *Vet. med.* p. 183.

[g] SENAC p. 127.

[h] PEYER p. 178.

Aliis in animalibus valvulam [i], aut sphincterem [k], in oesophagi aditu esse legas. Sed & illam nuperiora [l] experimenta infirmant, & de isto alias dicemus, quid verum sit. In cadavere certe humano oesophagi in ventriculum patentis ostium amplius est ductu reliquo [m] accurate tamen constringi posse non recuso [n].

Sed vel ob membranas, quibus cum septo transverso gula cohæret, vel ob carneos [o] a Cl. viris dictos fasciculos, vel ob nervorum forte communem naturam, qui ex ganglio semilunari & diaphragma adeunt & ventriculum, consensus certe aliquis est in utroque organo, ut in vulnere diaphragmatis deglutitio sit impedita [p] & contractis carnibus diaphragmatis vomitus secutus sit [q]. Singultus etiam utriusque consensum manifestum reddit.

[i] In equo LAMORIER *Mém. de Montpel.* 1733. p. 511. asino & mulo p. 514. porco BUFFON T. V. t. 18. f. 2, porcello guineensi BUFFON T. VIII. p. 9. lepore T. VI. t. 40. f. 2.

[k] In vulpe PEYER *obs.* 20. in cane IDEM *obs.* 29. in equo BERTIN. l. c. in raja STEN. *musc. & gland.* p. 45. in homine LAURENTIUS p. 304.

[l] *Mém. des Savans étrang.* T. III. p. 416. BERTIN. *Mém. de* 1746. p. 44. seqq.

[m] RUFUS p. 60. VESAL. L. V. c. 3.

[n] Angustissimum in equo est BERTIN. *Mém. de* 1746. p. 48. BUFFON T. IV. T. 5.

[o] L. VIII. p. 82.

[p] ZITTMAN *Méd. leg. Cent. II. Cas.* 31.

[q] SCHULZE *de Emesi exp.* 3.

L I B E R X I X.

V E N T R I C U L U S.

S E C T. I.

F A B R I C A.

§. I. Numerus.

Ventriculus, & etiam *stomachus* latinis, pars est cibarii organi amplior, quæ gulæ succedit, & ante angustiora intestina sequitur.

Animalia quidem omnia canalem cibarium habent, estque is ipse primarius character (a), quo a vegetabilibus distinguuntur: cibum enim per aliquod sensibus obvium ostium recipere, & in proprio canali interno conficere, omnibus est commune (b).

Dilatatio vero ejus canalıs, quæ post gulam succedit, & ad intestinum pertinet, est quidem in plerisque animalibus, non tamen in omnibus. Quadrupeda calida, avesque omnes manifestam habent, piscesque calidi.

Quadrupeda frigida (c), longum ventriculum habent, ut tamen is plerumque oesophago amplior sit & intestino, ut in rana (d) testudine (e), serpente (f), lacerta (g), & perinde in piscibus (h) ut in xiphia

(a) TISON *Phil. transf.* n. 269.

(b) Reperitur cibarius canalis in animalculo valde simplici HILL *Essays* p. 261. & in alio JOBLLOT *tab.* 6. f. 10. p. 54. 55. In Hydra, cui nullum cor neque cerebrum BOHADSCH *anim. mar.* p. 92. Et in pectine HASSELQVIST p. 447.

(c) Sanguine carentibus nullus ventriculus, & intestinum ab ore incipit PLINIUS L. XI. p. 629.

(d) JACOBÆUS *de varis* p. 104.

(e) IDEM *ibid.*

(f) Vipera COITER p. 126. COLLINS *tab.* 41 f. 1. Serpenti colubri f. 2. SEBA *Thes.* T. 1. *tab.* 109. f. 1. BLAS. p. 233. Illi vix a gula differt, nisi quod minus carnosus sit, BLAS *anim.* p. 372.

(g) Etiam Americanæ GAUTHIER *obs. period.* 1756. Nov. In Salamandra JACOBÆUS p. 109. nullum facit discrimen.

(h) RONDELET p. 70.

phia (*i*), trigla (*k*), asello (*l*), lucio (*m*), esoce (*n*), lucio perca (*o*), acipensere (*p*), galeo (*p*^{*}), salmone (*p*^{**}), tinca (*p*^{***}), barbione (*p*^{****}), acu marina (*p*[†]), cyprino lato (*p*^{††}), mullo rubro (*p*^{†††}), phoca (*p*^{††††}), qui quidem potius est quadrupes; & inter vermes in lumbrico terrestri (*q*), hirudine (*r*), teredine (*s*). Inter insecta in cruce (*t*), ape (*u*), musca (*w*), scarabæo (*x*), hemerobio (*y*), hydrocantharo (*z*), monoculo (*a*), pediculo (*b*). Denique in testaceis, ut in buccino (*c*), cochlea (*d*) purpura (*e*); & in zoophytis, ut in lepore marino (*f*) mentula marina (*g*). Lumbrico tamen intestinali, nulla a gula aut ab intestino est diversitas, tum humano (*h*)

O 3

tum

- (*i*) SCHËLHAMMER disp. de eo pisce.
 (*k*) GRONOV. Act. Soc. Lit. Upsal. 1742.
 (*l*) SCHOONEVELD ichthyolog. p. 20.
 (*m*) BLAS anat. anim. p. 481.
 (*n*) Non distinctus GRONOV. p. 10.
 (*o*) SCHOONEVELD p. 44.
 (*p*) GRONOV II. p. 43.
 (*p*^{*}) PARIS. Distinguit tamen in cane DAMPIER T. III. p. 87.
 (*p*^{**}) GREW p. 42. Gronov. Upsal. 1741.
 (*p*^{***}) GREW. COLLINS t. 40. f. 1.
 (*p*^{****}) IDEM ibid. etiam JAC. BRIME.
 (*p*[†]) Phil. Transf. n. 144.
 (*p*^{††}) COLLINS t. 36. GREW.
 (*p*^{†††}) COLLINS t. 36 f. 2.
 (*p*^{††††}) HARTMANN Anat. phoc. p. 8.
 (*q*) WILLIS anim. brut. p. 24. 25. VANDELLI p. 125.
 (*r*) TYSON Phil. transf. n. 144. COLLINS tab. 40.
 (*s*) ADANSON p. 266.
 (*t*) DE GEER p. 20. SWAMMERDAM bibl. p. 477.
 (*u*) SWAMMERDAM p. 454.
 (*w*) Asili vermi SWAMMERDAM p. 678.
 (*x*) MALPIG. posth. p. 59. SWAMMERDAM p. 313. Cossi vermi SWAMMERDAM t. 27. f. 11. 12.
 (*y*) Journ. des Sav. 1696. p. 477. 478. VALISNER. intorno alle brume.
 (*z*) SWAMMERDAM p. 248. t. 15. f. 5.
 (*a*) SCHËFFER p. 37. huic latior.
 (*b*) SWAMMERDAM t. 2. f. 3.
 (*c*) LISTER Exerc. Anat. II. p. 55.
 (*d*) LISTER ibid. p. 9. 26. de cochl. p. 73. (SWAMMERDAM p. 124. 166.
 (*e*) Phil. transf. vol. L. P. 2. p. 587.
 (*f*) SCHOONEVELD p. 42. BOHADSCH p. 7.
 (*g*) VANDELLI dissert. p. 93.
 (*h*) TYSON Phil. transf. n. 147. REDI tab. 10.

tum lupino (*i*) neque inter zoophyta hydrae (*k*), neque animalculis quibusdam microscopicis, quibus certum tamen intestinum est (*l*).

Contra possis ventriculum polypo tribuere, absque intestino, si quidem ex ventriculo toti corpori æquali, per os, fæces suas reddit (*m*), neque aliud inferius ostium nactus est, per quod cibum deponat. Plus enim hic inventori credo, etsi alii Cl. Viri (*n*), cum id animal plerumque cibum vomitu reddere fateantur, tamen ano non carere defendant. Sed etiam hirudini (*n**), & formicaleoni (*n***), negant idonei viri anum esse.

§. II. Simplex. Multiplex.

Multi ventriculi esse dicuntur iis animalibus, quibus receptaculum ciborum amplius, in partes fabrica sua diversas distinguitur; neque enim multiplicem dixerim, si absque ea fabricæ diversitate aliqua in sede, pluribusve locis strictior fuerit, quod in homine (*a*) frequens etiam ipse (*b*) sæpe reperi: cum in variis bestiis castore (*c*), sue (*d*), aliis.

Avibus plerisque pene tres (*e*) sunt ventriculi.

Et primum oesophagus supra pectus (*f*), sub ipsa cute, intumescit in ovalem & insigniter dilatabilem saccum (*g*), membranaceum, valde glandulosum,

(*i*) KLEIN *berpetol.* tab. 2.

(*k*) Apud BOHADSCH l. c.

(*l*) HILL. l. c.

(*m*) TREMBLEY p. 117. *Phil. transf.* n. 469.

(*n*) BAKER *du polype* p. p. 42.

(*n**) *Phil. transf.* n. 469. *Mém. de 1739.* p. 264.

(*n***) REAUMUR *Mém. pour servir à l'hist. des insect.* T. IV.

(*a*) SCHRADER *Dec. I. obs.* 8. WEPFER *cicut.* p. 117. RIOLAN. p. 117. DIONIS. p. 284. C. BAUH. *theatr.* p. 161. SPERLING *anthrop.* p. 732. *Eph. Nat. Cur.* Vol. 10. *obs.* 16. BLAS *obs.* 9. p. 4. PETSCH *Disp.* sæpe cit. n. 84. HAEN *rat. med.* VI. p. 16. 17. FANTON. *anat.* p. 162. ut etiam valvula subesset. LUDWIG *de viis bilis cystica* FABRIC. *progr.* ann 1759. MORG. *Ep.* 30. V. II. Tribuitur trabeculæ la planchette Nov. *Eph. Nat. Cur.* Vol. 1. *obs.* 76. spiritui vini DAUBENTON *hist. naturell.* T. III. p. 163. 264.

(*b*) *Id. Oment.* II.

(*c*) BUFFON. T. VIII. t. 39. f. 1. *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 32. *Act. Erud.* 1684. p. 361.

(*d*) GREW p. 14. *Armadillo des NOUES* p. 250. urso PARIS. hystrici PARIS. equo non valde pasto SEVERIN. p. 290.

(*e*) FABRIC. *de ventric.* p. 48. *de variet. ventr.* p. 110. PEYER *merocol.* c. 4. GREW *Cosmolog. Sacr.* REAUMUR *Mém. de l'Acad.* de 1752. p. 304.

(*f*) Onocrotali capiti saccus adnascitur; qui & dilatari se patitur, & vi musculosa stringitur J. B. CORTES apud ALDROV p. 51.

(*g*) Conf. HARV. *de gener. anim.* Exerc. 8.

duosum, succique plenum. In eo sacco aliquamdiu, & eo diutius (*b*) quo difficilior cibus est, congeritur idem, & maceratur, adque tritum præparatur, quem in ventriculo musculofo expectat. Fibras etiam ingluviæ habet, quibus se inaniat.

Eam ingluviem habent aves (*i*): primo perfecte granivoræ & fructivo-
ræ, columba (*k*), turtur (*l*), perdix (*m*), urogallus (*n*), lagopus (*o*),
galli sylvestres (*o**), psittacus (*p*), graculus bohemicus (*q*), cotur-
nix (*r*), fringilla (*t*), rubicella (*u*), chloris (*w*), passer (*x*),
emberiza (*z*).

Deinde, quæ præter grana quidem insecta etiam vorant, ut tamen præcipuum alimentum sit ex granis, ut gallus (*a*) meleagris (*b*),
picus (*c*), anas (*d*), colymbus (*e*), si de his credi potest ALBINO.

Porro aves aliquæ, quæ etiam multum animalis cibi absumunt, ardea (*f*)
phœnicopterus (*g*), ardea (*h*), casuarius (*i*).

Denique aves aliquæ rapaces non sunt penitus absque ingluviæ (*k*),
etsi

(*b*) GREW p. 40. major tunc, ut magis ad latera emineat.

(*i*) Pene omnes habere PERRAULT *Ess. de physique* T. III. p. 179. DUVERNEY
posth. II. p. 446.

(*k*) GREW *anat. of the guts* p. 35. tab. 28. ARIST. *hist. anim.* L. II. c. 17.

(*l*) ALBIN. II. n. 47.

(*m*) WILLOUGHBY *ornith.* p. 119. 120.

(*n*) IDEM p. 122.

(*o*) IDEM p. 127.

(*o**) DERHAM *Physicotheol.* p. 4. c. 13.

(*p*) COLLINS *tab. 23. Phil. transf.* n. 211. ALDROV. I. p. 146. II. 33.

(*q*) ALDROV. T. I. L. 12. p. 799.

(*r*) ALBIN. I. n. 70.

(*t*) GREW p. 37.

(*u*) IDEM p. 38.

(*w*) WILLOUGHBY p. 179.

(*x*) p. 185.

(*z*) p. 196.

(*a*) ARIST. I. c. SUIDAS III. p. 83. GREW p. 37. 38. FANTON. *diff. anat.* p. 118.

(*b*) PARIS. T. III. P. 2. p. 85.

(*c*) WILLOUGHBY p. 93.

(*d*) SEVERIN. II. p. 337.

(*e*) ALBIN. T. I. n. 82.

(*f*) BEAS p. 146.

(*g*) PARIS. T. III. p. 3. t. 10. p. 42.

(*h*) WILLOUGHBY p. 204.

(*i*) PARIS. T. III. p. 2. t. 67. F. Non bene adeo negat GREW p. 31.

(*k*) MONRO *compar. anat.* p. 119. COLLINS p. 255. DUVERNEY *posthum.* T. II.
p. 447.

etsi ea minus manifesta est, nam etiam in vulture (*l*) nudi colli, qui griseo gallis (*m*), & in pica (*n*), lego ingluviem esse.

Multæ tamen adeo aves eo præsidio destituuntur, aliquæ granivoræ, ut otis (*o*), struthio (*o*^{*}), passeris nonnulli (*p*): tum pleræque carnivoræ, aquila (*q*), ossifraga (*r*), ulula (*s*), corvus (*t*), cornix (*u*), monedula (*x*), turdus (*y*), hirundo (*z*), cuculus (*a*), torquilla (*a*^{*}), platea (*b*), pelicanus (*c*), ardea stellaris (*d*), ciconia (*e*), ibis (*f*), avis regia (*g*), anser, anas sylvestris (*i*), mergus (*k*), colymbus maximus (*k*^{*}), aves aquaticæ in universum (*l*), eas puto, quæ piscibus vivunt aut insectis.

Alter *bulbus* (*n*) est *oesophagi*, pars ventriculo musculofo aut proxima, aut continua, & ipsa carnea, etsi minus valens eo ventriculo, & in ovi speciem dilatata, inque omnibus, ni fallor, avibus (*o*) plurimis glandulis ornata, quæ succum videntur suppeditare, cum quo cibus durior in vero ventriculo teratur; cujus callosæ tunicæ, & vehementes motus, non poterant glandulosum systema admittere.

Repri-

- (*l*) IDEM p. 345.
- (*m*) PARIS. P. III.
- (*n*) ALBIN. T. I. n. 15.
- (*o*) Comm. Lit. Nor. 1731. Spec. 14. PARIS.
- (*p*) GREW p. 39.
- (*q*) Not. x. p. 113.
- (*r*) COITER apud ALDROVAND I. p. 126.
- (*s*) Not. d. p. 114.
- (*t*) ARIST. hist. II. c. 17.
- (*u*) ARIST.
- (*x*) ARIST. T. I. n. 14.
- (*y*) WILLOUGHBY p. 137.
- (*z*) GREW p. 39.
- (*a*) GREW p. 33.
- (*a*^{*}) GREW p. 38.
- (*b*) PARIS.
- (*c*) GREW.
- (*d*) ALDROVAND L. 20. p. 406.
- (*e*) PARIS.
- (*f*) PARIS.
- (*g*) PARIS.
- (*i*) GREW p. 33.
- (*k*) COITER obs. p. 132.
- (*k*^{*}) ALBIN. I. n. 82.
- (*l*) REDI anim. viv. p. 88.
- (*n*) FABRIC. I. c. PLYER. Mergool. p. 22. 23. REAUMURIO secundus ventriculus.
- (*o*) Omnibus GREW p. 32. 40.

Reperitur primum in granivoris, ut in genere pavonum, in gallinis (*p*), ut in gallo indico (*q*), ægyptio (*r*), meleagride (*s*), otide (*t*), psittaco (*u*), graculo (*w*); in columba (*x*), turture (*y*), fringillis (*z*) coturnice (*a*), torquilla (*b*): in aquaticis carnivoris, ut in ardea (*c*), scope numidica (*d*), ciconia (*e*), platea (*f*), pelicano (*g*), phœnico-
ptero (*h*), ave regia (*i*), corvo marino (*k*), anfore (*l*), cygno (*m*), mergo (*n*), arquata (*o*), colymbo majori (*p*), sterna (*q*); denique in omnivoris in casuario (*r*), struthione (*s*), sturno (*t*), pico (*u*), corvo (*w*). In veris porro carnivoris, ut in aquila (*x*), haliæto (*y*),
vulture

- (*p*) GREW p. 33. PEYER *de ventric. gallin.* p. 62.
 (*q*) PARIS. T. III. P. 1. p. 126.
 (*r*) PARIS T. III. P. 3. p. 56.
 (*s*) PARIS. T. III. P. 2. p. 85.
 (*t*) PARIS. T. III. P. 2. p. 106. Add. ALDROVAND I. p. 146. *Comm. lit. Noric.*
 1731. p. 107. GREW p. 37. 38.
 (*u*) *Phil. transf.* n. 211. COLLINS *tab.* 23.
 (*w*) ALDROW I. c.
 (*x*) GREW t. 28. p. 35.
 (*y*) WILL. p. 334.
 (*z*) GREW.
 (*a*) WILLOUGHBY p. 121. SEVERIN. p. 339.
 (*b*) GREW p. 38.
 (*c*) SCHRADER *digest. anim. carniv.* p. 29. 30.
 (*d*) PARIS. T. III. P. II. p. 9
 (*e*) PEYER I. c. p. p. 26. WEPFER *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs.* 251. PARIS.
 T. III. P. 2. p. 68.
 (*f*) PARIS. III. P. 3. t. 6. ALBIN. III. n. 66.
 (*g*) PARIS. III. P. 3. p. 197. HUC ALDROV. & ATKINS *voy to Guinea* p. 256.
 (*h*) PARIS II. P. 3. I.
 (*i*) PARIS. III. P. 3. p. 205. M.
 (*k*) PARIS III. P. 1. p. 216. 217.
 (*l*) COLLINS *tab.* 19. PEYER *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs.* 85.
 (*m*) BARTHOL. *Cent.* II. n. 79.
 (*n*) L. c. not. k. p. 112.
 (*o*) WILLOUGHBY p. 217. ALBIN. I. n. 179.
 (*p*) Id. WILLOUGH. p. 259.
 (*q*) p. 269.
 (*r*) PARIS. III. P. 2. ic. G. I. p. 57. GREW. p. 31.
 (*s*) PARIS. III. P. 2. p. 127. HUC *descriptions Phil. transf.* n. 386. 394. VALISN. T. I. p. 271.
 (*t*) GREW p. 37.
 (*u*) *Phil. transf.* n. 350.
 (*w*) SCHRADER *digest. carniv.* p. 25.
 (*x*) PARIS. III. P. 2. p. 91. Pro ingluvie HARDER *opiar.* n. 61. ALDROV. I. p. 116.
 (*y*) Huc refero infundibulum BORRICHII *hermet. sapient.* p. 253.

vulture (z), vulture nudicollis five grifone (a), ossifraga (b), pygar-go (c), ulula (d), cuculo (e).

Tertius *ventriculus* (f) in omnibus quidem avibus reperitur, diversa tamen cum fabrica, ita ut ubique tendines & musculos, eosdem habeat, quas aves granivoræ, sed omnia debiliora (g).

Nempe bene multæ aves ex genere carnivoro (h) & insectivoro, tenuem habent & membranaceum ventriculum, qualis est in quadrupedibus carnivoris, inque piscibus. Ejusmodi ventriculus est in aquila (i), accipitre (k), vulture (l), ossifraga (m), onocrotalo (n), pica (o), cuculo (p), pico (q), nycticorace (r), merope (s), pica marina (t), scolopace (u), sturno (w), vanello (x), alcyone (y), ardea (z), butauro (a), mergo albello (b), merganser (c), colymbo minori (d), & majori (e).

Robustio-

- (z) SCHEUCHZER *Bresl. Saml.* 1726. I. p. 87.
 (a) PARIS. III. P. 3.
 (b) BLAS *anat.* p. 261. CORTESIUS apud ALDROVAND I. p. 226.
 (c) Ingluviem vocat WILLOUGHBY p. 31.
 (d) GREW p. 32.
 (e) GREW p. 33. HERISSANT *Mém. de* 1752. p. 421.
 (f) FABRIC. I. C. REAUMUR I. C.
 (g) DUVERNEY *posth.* T. II. p. 447.
 (h) GREW p. 40. COLLINS p. 255. MARSIGLI *Danub.* T. VI. *misc. obs.* p. 11. SWEKIN. p. 338.
 (i) PERR. *Ess.* T. III. p. 204. PARIS. III. P. 2. p. 94.
 (k) SEVERIN. *Zoot. democr.* p. 338.
 (l) PARIS. *anc. mem.* T. I. p. 430. DUVERNEY II. p. 545.
 (m) CORTES. apud ALDROV. T. I. p. 226.
 (n) ALDROVAND III. p. 50. PARIS. III. P. 3. p. 197. WHEELER *voyage de Grèce &c.* T. II. p. 29.
 (o) ALBIN. I.
 (p) *Mém. de* 1752. p. 306. Huic est inter debilissimos.
 (q) ALBIN.
 (r) ALBIN. T. I. n. 40. his quatuor glandivoris una & insectivoris.
 (s) ALBIN. T. II. n. 44. WILLOUGHBY p. 102.
 (t) ALBIN. T. I. n. 70. SEVERIN. p. 337. WILL. p. 210.
 (u) ALBIN.
 (w) ALBIN.
 (x) ALBIN. T. I. n. 74.
 (y) ALBIN. T. I. n. 54. WILLOUGHBY p. 101.
 (z) WILLOUGHBY p. 204.
 (a) ALDROV. L. 20. p. 406.
 (b) ALBIN. T. I. n. 89.
 (c) WILLOUGHBY p. 253.
 (d) IDEM p. 258.
 (e) ALBIN. I. n. 82. Potest hic error tot sub titulis itrepisse, quem cum nihil valde sit nociturus, lectorem ut excuset rogo.

Robustiores, non tamen ut attingat robur avium granivorarum, habent aves aliquæ omnivoræ, ut casuarius (*f*), struthio (*g*), monedula cornubica (*h*), graculus (*i*), turdus (*k*), merula torquata (*l*): aut insectivoræ ut merula (*m*), sturnus (*n*), hirundo apus (*o*), curruca (*p*), oenanthe (*q*), gallinago (*r*), pluvialis major (*s*), tringa minor (*t*), armeria (*u*); vanellus (*u*^{*}), & in universum aves longicrures ripariæ (*u*^{**}): porro aquaticæ (*w*), ut grex (*x*), albellus mergus (*x*^{*}), larus (*y*), corvus marinus (*z*); denique carnivoræ aliquæ, ut grifo (*a*), falco (*b*), ulula (*c*).

Denique carnosus miri roboris ventriculus est in genere gallinaceo (*f*); meleagride (*g*), gallo calecutico, indico (*h*), tarda (*i*), columba (*k*),
P 2 turture

- (*f*) GREW p. 32. PARIS. III. P. 2. t. 1.
(*g*) WARREN *Phil. transf.* n. 394. Robustissimum tamen vocat VALISNERI p. 241.
(*h*) ALBIN. T. II. n. 24.
(*i*) ALBIN. T. I. n. 16.
(*k*) IDEM T. I. n. 34. 36.
(*l*) IDEM T. I. n. 39.
(*m*) WILLOUGHBY p. 140.
(*n*) IDEM p. 145. GREW p. 37. ALBIN. I. n. 40.
(*o*) WILLOUGHBY p. 156.
(*p*) p. 158.
(*q*) p. 168.
(*r*) p. 214.
(*s*) IDEM p. 221.
(*t*) p. 223. ALBIN. T. I. not. 50.
(*u*) p. 235.
(*u*^{*}) p. 228. ALBINUS. T. II. n. 74. carnosum esse negat.
(*u*^{**}) MARSIGLI p. 13.
(*w*) WILLOUGHBY p. 254. Add. ALBIN. T. II. n. 89. COITER p. 132.
(*x*) COITER p. 132.
(*x*^{*}) ALBIN. I. n. 89.
(*y*) WILLOUGHBY p. 263. VALENTIN. *amphib. zootom.* T. II p. 231.
(*z*) PARIS. III. T. I. p. 217. & in ic. WILLOUGHBY p. 28. Membraneum vocat ALBIN. T. II. n. 281.
(*a*) PARIS. III. P. III. p. 214. 215.
(*b*) MURALT *vadem. anat.* p. 337.
(*c*) GREW p. 32. WILL. p. 66. ALBIN. T. I. n. 9.
(*f*) GREW p. 34. PEYER l. c. p. 59. 60. 61. PERRAULT T. III. t. 13.
(*g*) PARIS. III. P. I. p. 85.
(*h*) IBID. p. 227.
(*i*) PARIS. III. P. 2. p. 107. *Comm. Lit.* Nov. 1731. l. c. Minus tamen robustus.
(*k*) GREW p. 35.

turture (*l*), graculo (*m*), corvo (*n*), coturnice (*o*), chloride (*p*),
tum inter aquaticas in anserem, anate, laro (*t*), cygno (*u*), ciconia (*w*),
ardea numidica (*x*), platea (*y*), phoenicoptero (*z*), ave regia (*a*);
avibus etiam nonnullis una & insectivoris, & granivoris, ut in alauda (*b*),
passere (*c*), caryocatacta (*d*), arquata (*e*).

Duros etiam ventriculos habent buccina (*f*), murices (*g*).

Inter quadrupeda, carnivora omnia habent ventriculum simplicem (*h*),
humano similem, unice paulo robustiorem: habent etiam herbivora ali-
qua, ut equus, elephas (*i*), manati (*k*), balæna, lepus, & omnivora,
ut mus, porcus, simia.

Excipiuntur uniceruminantia (*l*) animalia, quibus iisdem cornua ple-
rumque de fronte surgunt, & quæ eadem plerumque pedis ungula sunt
bipartita, aut tripartita: his enim ventriculi quidem aliter, ac in avi-
bus quidem, continuus est, cæterum per strictos aliquos quasi isthmos
dividitur, in partes, quæ tota sua fabrica dissentiant. Duo, tres, qua-
tuor sunt ejusmodi ventriculi. Quatuor in camelo (*m*), bove (*n*),
etiam

- (*l*) ALBIN. T. II. n. 47.
(*m*) ALDROW. T. I. p. 799.
(*n*) SCHRADER p. 25.
(*o*) ALBIN. T. I. n. 30.
(*p*) GREW p. 37.
(*t*) ALBIN. T. II. tab. 87. (a Gull.)
(*u*) BARTH anat. cygn. p. 35.
(*w*) PARIS. III. P. 3. p. 67. *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 2. obs. 97*
(*x*) PARISS. III. P. 2. p. 9.
(*y*) IDEM p. 27. cum iconc.
(*z*) PARIS. III. P. 3. p. 10.
(*a*) IBIDEM p. 205.
(*b*) ALBIN. T. I. n. 42.
(*c*) Ibid. n. 62.
(*d*) ID. T. II. n. 28.
(*e*) Limaces edente ALBIN. T. I. n. 79.
(*f*) *Exerc. anat. II. p. 55. 61.*
(*g*) *Phil. transf. Vol. 50. P. II. p. 582.*
(*h*) ARIST. part. anim. L. III. c. 14.
(*i*) STUKLEY. MOULINS.
(*k*) *Nov. comm. Acad. petrop. T. II. p. 310.*
(*l*) FABRIC. var. ventric. p. 48. ARIST. part. anim. L. III. c. 14. conf. *hist. L. II. c. 17.* PERRAULT *Essays. de phys. T. III. tab. 13.*
(*m*) ARIST. l. c. PERRAULT *Ess. T. III. tab. 10.* PARIS. III. P. I. p. 75. *Comm. pe- trop. T. X. p. 243.*
(*n*) BLAS anat. vituli p. 207. BUFFON T. IV. p. 460. seq. VIEUSSENS *tr. des liqueurs* p. 273. seq. PEYER *mercol. GREW. p. 19.*

etiam afro (o), ove (p), capra (q), cervo (r), caprea (s), rupicapra (t), alce (u), animale moschifero (u*), & caprea stepnoi farai (u**).

Tres dicuntur in animale esse ovibus adfini peruviano huanaco (w): tres animali de suis genere Tayacu (x).

Duo dicuntur in gazella esse (y). Leporum unicus (z), est ventriculus, et si levi plica distinctus (a).

In quadrupedibus marinis tursioni tres dantur ventriculi, neque dissimiles (b) fabricæ ruminantium. Est tamen ex carnivoris, ut admireris hanc quasi ex lege exceptionem.

Sic in lumpo pisce duos ventriculos esse legimus (c). Ingluviem & ventriculum ostrea, & cochleæ habent (d), & murices (e).

Inter insecta gryllotalpa quatuor ventriculos (f) habet: quinque sunt in echino marino (g), sed totum id animal in quinque partes dividitur.

§. II. Situs.

Homini unicus est ventriculus & situm tenet perpetuum: neque enim morbosas aliquas varietates hic numerasse fas est, in quibus utique ad perpendicularicu-

P 3

- (o) PARIS. P. III. p. 2. p. 27.
 (p) GREW p. 16. seq. ALDROW paralip. p. 125. & in Quadruped. bisulc. p. 398. BUFFON p. 40.
 (q) BUFFON T. V. p. 81. PEYER Exerc. p. 82. merycol. ic. I. seqq. VIEUSSENS des liq. p. 274. tres facit iste.
 (r) BUFFON T. VI. t. 15. f. 3.
 (s) HARDER apiar. p. 51.
 (t) WELSCH agagropil. p. 10. PEYER App. Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. PARIS. III. P. I. p. 206.
 (u) PARIS. III. P. I. p. 184.
 (u*) Nov. Comm. Acad. Petrop. IV. p. 402.
 (u**) Ibid. p. 391.
 (w) FEUILLEE Journ. d'un voyage au pèrou T. 2.
 (x) COWPER Phil. transf. n. 153. add. BARTH. Cent. II. Hist. 96.
 (y) PARIS. III. p. 101. seq. MURALT p. 107.
 (z) BUFFON T. VI.
 (a) Valvulam vocat PEYER p. 83. de cuniculo, & merycolog. ic. n. XI.
 (b) TYSON p. 21. tab. 1. f. 6. BARTHOL. Cent. II. Hist. 25. Duos vocat LE MAYRE voyag. p. 117.
 (c) SCHERHAMMER de xiphia.
 (d) LISTER de cochl. T. I. f. 1. 2.
 (e) Phil. transf. T. L. p. 587.
 (f) PEYER merycolog. c. 7.
 (g) CESTONI apud VALISNERI Oper. T. I. p. 467. KLEIN dispos. natur. echinoderm. Ged. an. 1734. t. 30.

pendiculum (a.) positus, denique ad umbilici sedem (b.), aut ad ossa ilium & pubis (c.), detractus fuit: aut arcu suo majori sinistrorsum (d), minori dextrorsum respexit.

Sed neque eos casus oportet numerasse, in quibus totus per aliquod diaphragmatis foramen in pectoris cavum migravit (e): aut in quibus transpositis visceribus dextra tenuerunt ea viscera, quibus NATURA sinistram abdominis & pectoris sedem destinaverat (f).

Hypochondrium ergo sinistrum ita occupat, ut anterius partem hepatis sinistri sibi impositam patiatur (g), cum id viscus inter ventriculum sit & inter diaphragma (h): plerumque nudus sit tum inferius, tum sinisterius, qua parte etiam diaphragma ipsum sinistra amplitudine contingit (i). Alias hepar totum ventriculum protegit.

Ad latus sinistrum & posterius cum mobilitate adnexum patitur lienem (k), quem omentum ad ventriculum adligat. Pone se & pancreatis (l) partem habet; & capsularum renalium, & hepatis (m). Oesophagus vertebris mediis incumbit (n).

Sterni

(a) Ita etiam BOERNER de *tabe sicca lethal.* de HAEN *hist. morb. Sing.* MANGET *biblioth.* p. 77. ETTMULLER ad *Disp. G. FRIDERICI Comm. Petrop.* T. VII. p. 233. RICHERTI *obsf. quadr. n. 1. Comm. Acad. Petrop.* T. VII. p. 233. De fetu *Mém. de l'Acad.* 1749. p. 385. 386.

(b) *Obsf. of a Societ. at Lond.* T. II. p. III. RIOL. p. 118. Infra umbilicum LAMBRECHT *obsf. t. 14. p. 28.* Ad pelvim usque VELSE *ingress. intest. obsf. 6.* LUDWIG *fit viscer. abdom. p. 11. P. V.* In hypogastrio ACRELL *chirurg. bändels.* p. 157. Ex hernia ad vesicam usque PARE *administr. p. 14. b.*

(c) G. V. SWIETEN T. III. p. 107.

(d) Etiam LUDWIG p. VII.

(e) SENNERT *Prax. L. III. part. 2. c. 15.* PLATER *manif. obsf. 13.* BARTH. *Cent. VI. hist. 55.* PARE *operum L. IX. c. 31. p. 313.* HOLT. *Phil. transf. n. 275.* Bresl. *Saml.* 1723. Maj. CHAUVET *Hist. de l'Acad.* 1729. n. 2. inque fetu STAEHELIN *tent. anat. bot.* 1724. Porro BAUSCH *Proem. ad tr. de hematit. p. 9.* BEKER *mort. submers. sine aqua obsf. 1.* CLAUDER. *obsf. mirab. Journal. de medec.* 1758. m. Dec. In cane LITTRE *Hist. de l'Acad.* 1706. *obsf. 13. in ove* PEYER *Eph. Nat. Cur. Dec. 2. ann. 4. p. 195.* Coli pars cum omento & pancreate per viam nervi intercostalis in thoracem pulsa *Phil. transf. n. 351.*

(f) L. IV. p. 303. In ventriculo HEUERMANN *physiol. T. III. p. 455. 590.*

(g) CELSUS L. IV. c. 1. WAINWRIGHT de *hepate* BIDLOO *tab. 41.* EUSTACH. *tab. 9. Ic. nostr. Omenti. I.* SPIGEE p. 244. JENTY T. I. f. 3. CHESLDEN *tab. 21.* VESAL. L. V. f. 2. 12. Sed ventriculus valde nudus est in iconibus: add. p. 596. In fetu *Mém. de* 1749. p. 385. 386.

(h) CHESLDEN. JENTY & VESAL. p. 595.

(i) WINSLOW n. 48. CHESLDEN. JENTY t. I. f. 3.

(k) JENTY T. 3. f. 4.

(l) EUSTACH. T. X. f. 3. VESAL. f. 15.

(m) Conf. JENTY t. 3. f. 4.

(n) WINSLOW n. 45. & *ic. nostr. diapbr.*

Sterni appendicula (o) alias respondet fere medio ventriculo plerumque adhuc hepate tecto: alias dexteriori parti, & pene pyloricæ (o*), ut tamen hepar medium se interponat. Fissura umbilicalis hepatis principio (p) pylori opponitur. Arteria aorta inter duo orificia pone ventriculum descendit (q), cui quasi, sinum imprimit (r).

Inter eadem orificia hepatis lobulus se inmittit (s). Arcus uterque utrimque fere æque altus est in ventriculo inflato: sibi relictus, ad dextra humilior est.

Utrumque orificium posteriori loco est. quam reliquus ventriculus, magis tamen oesophagus. Subjectam habet intestini coli transversam partem (t) & a mesocolo transverso sustinetur, quando plenus (u) est. Costis ita continetur, ut & partem nudam inter costas dextras & sinistras occupet (w), & infra marginem costarum aut omnino non, aut aliquantum descendat (x) magis quando plenus, inanis minus.

Omentum majus ex pene tota linea ventriculi maxima prodit, ut tamen dextro fine cis pylorum finiatur (y); sinistro in ligamentum abeat, quod a liene ad ventriculum tendit. Minus omentum ex curvatura minori in hepar exit.

Oesophagus aliquanto posteriori loco est & superiori, & oblique per hepatis sinum in ventriculum (z) cis ejus cæcum saccum se inmittit. Pylorus anterior (a) & insigniter inferior (b) de fine graciliori ventriculi adscendit. Non valde se invicem remota sunt (b*) hæc duo ostia.

Partium demum ventriculi situs totus mutabilis est, ut ventriculus magis fuerit potu ciboque plenus, aut vicissim inanis.

Verius

(o) A depressa ea appendice cardialgia. GENG A *anat. Chir.* p. 116. Recte ergo negat pylorum subesse SANCTORIUS *meth. vitend. error.* p. 174.

(o*) POLLUX p. 254.

(p) Ita fere EUSTACH. l. c. CHESelden. Sinisterius VESAL. f. 26.

(q) L. XVII. p. 600.

(r) VESALIUS.

(s) *Tab Oment.* f. 2.

(t) EUSTACH. *tab.* 9.

(u) DUVERNEY *postb.* T. II. p. 178.

(w) JENTY t. I. f. 3. Compara etiam EUSTACH. *tab.* 9. cum 45.

(x) In cholera BARTHOL. *Cent.* II. *Hist.* 81.

(y) EUSTACH. l. c. VESAL. l. c. &c.

(z) WINSLOW n. 53.

(a) IDEM n. 49.

(b) IDEM *ibid.* *Mém. de l'Acad.* 1715. p. 233. Modice FABRIC. *de ventric.* p. 53. Multo SANTORINUS p. 164. uterque puto vere. Aequè altus SMETIUS *miscell.* L. X. Id vero nimium est.

(b*) LUDWIG l. c. n. XI.

Verius in cadavere ita ponitur ad perpendicularum, ut & oesophagus in eum descendat (c), & vicissim ab eo adscendat pylorus (d), ita arcus maximus inferior sit (e), curvatura minor superior (f) & intercepta his arcibus planities ventriculi anterior (g) peritonæum contingat: ut demum cum ventriculo & lien se ad perpendicularum componat, & finem alium superiorem habeat, inferiorem alterum.

In vivo homine hæc omnia paulum aliter se habent (h), & intestinorum resistantia ventriculum ita repellit, ut planum anterius una paulum superius, posterius una paulum inferius, arcus major paulum anterior, arcus minor posterior sit, oesophagus retrorsum inclinetur (i).

Omnia ea majora sunt, quando ventriculus aut impulso flatu bene turgit (k), aut aere sponte recepto, nam & ita vidi habuisse: tunc enim surgit antrorsum pars inferior, quoad arcus (l) major peritonæum contingat, arcus minor sua cornua retrorsum ostendat (m); planum interceptum quod posterius fuit (n), nunc sit inferius; superius vero sit, quod erat anterius (o).

Inflatus magis sursum versus diaphragma mihi visus est turgere, quam deorsum.

Una oesophagus ad horizontem parallelus ex ventriculo retrorsum inclinatur (p). Sic etiam pylorus, qui adscendebat, nunc retrorsum migrat transversus (q), atque adeo in homine supino descendit. Etiam alioquin potest ita repleri, ut potius deorsum vergat (r). Inflatus, vel alioquin

(c) EUSTACH. tab. 10. f. 1. 3. VESAL. L. V. fig. 2. 6. n. 14. 15.

(d) EUSTACH. tab. 10. f. 1. 3. VESAL. f. 14.

(e) EUSTACH. VESAL. f. 14. & 15. JENTY tab. 1.

(f) EUSTACH. VESAL. f. 14. 15.

(g) EUSTACH. f. 1. VESAL. f. 14. JENTY tab. 1.

(h) CONF. LUDWIG l. c. p. VI. WINSLOW n. 48. seqq. 50. 51. DUVERN. postb. T. II. p. 178.

(i) WINSLOW IV. n. 53. VESAL. f. 12.

(k) CANT. p. 18. Ita describit RUFUS p. 61. Non penitus satis ventriculum antrorsum vertit EUSTACHIUS t. 10. f. 2. Laudat quidem MARTINE p. 53. Add. JENTY t. 3. f. 4. JACOBUS B. WINSLOW *Mém. de 1715* p. 233. qui hunc ventriculi situm proposuit.

(l) RUFUS, WINSLOW. *ibid.* *lc. nostr.* *Oment. I.* LIEUTAUD p. 266. CLAUSSEN *de duodeno* t. 1.

(m) RUFUS, WINSLOW add. CANT. l. c. LIEUTAUD p. 266. JENTY. GARENGROT *splanchnol.* T. 1. p. 212. tab. 7.

(n) WINSLOW n. 51.

(o) IDEM *ibid.*

(p) CANT. p. 18.

(q) EUSTACH. t. 10. f. 2. ut certe videas, parum adsurgere: add. *lc. Oment. I.*

(r) CANT. p. 18. t. 5. f. 1. JENTY t. 3. f. 4. CLAUSSEN. GARENGROT.

quin amplius, vesiculam fellis a dextra parte arcus majoris (s) pyloro suo contingit: vidi etiam eam vesiculam cis pylorum in curvatura minori fuisse (t).

Arteria gastroepiploica (u) cum ventriculo, arcum magnum antrorsum vertente, ad peritonæum nunc pervenit, & in macilentis tangitur.

Una lien (w) situm mutat, & ita transversus fit, ut fines habeat, anteriorem (x) & posteriorem. Pancreas, utique a ventriculo nunc potius minus comprimitur (y); hepar (z) magis. Vicissim a pancreate tumido comprimitur (z†) ventriculus.

§. III. *Ventriculi figura.*

Figura non facilis est dictu, in universum tamen conica, cujus omnes sectiones sint circuli: basis cono adaptatum hæmisphærium (a) in sinistro fine clausum. Circulus maximus ad insertionem oesophagi ponitur (b), inde ventriculi lumina uniformiter decrescunt (c), donec in duodenum se immittat, sine angustissimo.

Is conus cæterum in fetu brevis est (d), ut totus ventriculus pene rotundus sit. In adulto homine longior (e) est stomachus, & magis dextrorsum protenditur; diversa tamen amplitudine, modo amplius, modo angustus,

(s) EUSTACH t. 10. f. 2. *tab. nostr. oment. 2.* vesicula in situm reposita. DUVERNEY T. II. p. 83.

(t) Ita se habent in f. 2. VESALII, ubi ventriculus præmagnus pingitur.

(u) WINSLOW l. c. PECHLINI *obs. 6. Cent. II.* Add. DUVERNEY *postb.* T. II. p. 178.

(w) *Comment. Boerb.* T. III. p. 39. LA SONE *Mém. de l'Acad.* 1754. p. 139. FORBUIU *recherch.* p. 432. add. FIZES de *Liene* p. 131. PETIT ad PALF. II. p. 125.

(x) *Tab. nostr. Oment 2.*

(y) DUVERNEY *postb.* T. II. p. 183.

(z) CHRESDEN p. 164. RUFUS p. 31. KOEHLER de *cardialg.*

(z†) MORG. *Sed. & caus.* II. Ep. 30.

(a) Conf. EUSTACH. t. 10. f. 1. 2. 3. VESAL. f. 13. 14. CANT. t. 5. f. 1. HELVET. *Mém. de 1719. tab. 22. f. 1.* RUYSCH *Tbes.* II. *tab. 5. f. 5.*

(b) EUSTACH. l. c. HELVETIUS, RUYSCH.

(c) EUSTACH. *ibid.* VESAL. p. 596. f. 13. 14. CANT. RUYSCH. *Sensim in ventriculo longo* HELVETIUS.

(d) Et parvus. In maturo fetu ad hominem adultum se habet ut 1. ad 43. Est autem in eodem reliquum corpus ad corpus adulti ut 1. ad 20. cum ventriculi sint ut 1. ad 28. SAUVAGES *Embryolog.* p. 11.

(e) Conf. icones VESALII f. 2. 6. HELVETII.

angustus, & intestini similior; non raro aliqua strictura quasi divisus (*f*), maxime posterius (*g*), tum paulo cis pylorum (*h*), unde tunc antri (*i*) aliqua imago (*k*) nascitur, quam aliqui Clar. Viri nimii fecerunt.

Deinde conus iste non rectus est, & ventriculi inanis finis dexter contra sinistrum sursum peracuto angulo redit (*l*), ut ostia superne vel posterius sibi valde vicina, anterius aut inferius remotissima sint (*m*). Porro cæcus sacculus superior est, indeque ventriculus dum contrahitur, una descendit (*n*).

Cæterum cardiacam (*o*) veteres dixerunt, qua subit oesophagus, & scrobiculus cordis etiam nunc vocatur, qua ventriculo appendicula ensiformis imminet. Pylorus est ostium dextrum, arcus minor est (*p*), qui posterius duo ostia conjungit, major qui anterius (*q*).

Credas in universum amplitudinem multum pendere a copia distendentis cibi. Hinc longior ventriculus, cum callosus pylorus male pateret (*r*), hinc in helluonibus peramplus (*s*). Hinc perangustus in cosso, quando nunc in nympham abit (*t*), & magna ratione arctior in musca asili, quam in edace verme fuit (*u*). Angustus, neque tenui intestino crassior (*u**) a scirrho oesophagi. Agno herbis pasto, quarum id animal magnam molem devorat, amplius, angustus idem cum pane aleretur (*x*).

Amplitu-

(*f*) p. 110.

(*g*) VESAL. p. 596.

(*h*) Tab. Oment. II.

(*i*) WILLIS I. C. p. 21. WEPFER *cicut.* p. 121. 122. In cane PEYER *obs.* 31. in crocodilo Jesuit. Siam p. 20. A morbo MORG. *Sed. caus. morb.* II. *Epist.* 30.

(*k*) WINSLOW n. 49. Nulla, quæ nunc succurrat memoriæ meæ, hujus antri icon existat, ne WILLISII quidem. Non habet EUSTACHIUS.

(*l*) Oment. t. 2. WINSLOW n. 49. VESAL. p. 597. L. V. f. 12. 13. 14. Add. ic. CANT. HELVET.

(*m*) CANT. HELVET.

(*n*) EUSTACH. t. 10. f. 1. 2. 3. &c.

(*o*) RUFUS p. 31. conf. KOEHLER p. 4. seqq.

(*p*) Petite arcade WINSLOW *Expos.* IV. n. 45. 50.

(*q*) Grande arcade *Idem* ibid.

(*r*) PLANC. *Acad. conjectur.* p. CI. Amplissimus a glanduloso coneremento in principio duodeni Bonon. *Comm.* T. II. P. I. p. 457.

(*s*) p. seqq.

(*t*) SWAMMERDAM *tab.* 28. f. 5.

(*u*) *Idem* p. 678.

(*u**) G. V. SWIETEN *Comm.* T. I. p. 37.

(*x*) BUFFON T. IV. p. 464.

Cæterum amplitudo perinde incerta est : angustus (*y*) est ea in robustissimis hominibus, & subito enectis (*z*) ventriculus, & in aliis longo morbo (*a*) maceratis, aut ab inedia extenuatis (*b*), aut vini spiritu (*c*) abutentibus. Vidi in vetula intestino non latiore (*d*), vidi duodeno angustiores (*e*).

Peramplius autem est (*f*) in edacibus (*g*): in iis quibus pylorus obstructus cibum maligne dimisit (*h*). Mensuras aliquas addo, & ex fanis, quas ex variis auctoribus repeto (*i*); & ex morbosis cadaveribus alias (*k*). Etiam a venenis, distentus (*l*) reperitur, & a rephritide (*l**).

§. IV. Fabrica ventriculi. Tunica extima.

Eadem in universum ventriculi, quæ gulæ, quæ intestinorum, & quæ
Q 2 vesicæ

(*y*) BARTHOLIN. *Cent. I. Hist.* 50. Anserino non major G. V. SWIETEN *Comm. T. III.* p. 151. Minimus GALEN. *art. med.* Minimus WINTER *mot. musc.* FANTON. p. 162. Libræ capax STÖRK. *ann. II.* p. 250. Coli similis IDEM p. 115.

(*z*) SANTORIN. c. 9. n. 6. ETTMULLER *progr. ad Disp. Cl. FRIDERICI.* ubi sex tantum uncias recepit: Ab emetico HILDAN. *Cent. IV. obs.* 51. Ad ovi volumen contractus ibid. *obs.* 79. A colica PAW *obs.* 4. VATER *de chordaps.* a veneno MANGER *bibl. T. I.* p. 80. HILLET p. 13.

(*a*) Duorum digitorum capax SCHURIG *chylolog.* p. 377. Minimus WOLF *obs.* p. 119. HEUERMANN *physiol. T. IV.* p. 35. SCHMIEDEL *de peric. &c.* p. 27. 28. Spissus & contractus a longa ægitudine CHIFFLET *obs.* 27.

(*b*) RUYSCH *obs.* 68. LITTE *Mém. de 1716.* p. 187.

(*c*) LOESECKE *obs.* p. 36. *Hist. de l'Acad.* 1706. n. 5. LAMBRICHTS *obs.* p. 28. In PECQUETO, celebri anatomico, avellana nuce non major BOERHAAV. *Prax. T. I.* p. 54. Add. BEHRENS *dietet.* p. 394.

(*d*) In polyphago BOEHMERI p. 7.

(*e*) HEUERMANN T. III.

(*f*) Duos pedes longus WALRAVEN *tympan.* p. 42. & in universum in tympanicis LITTE *Mém. de l'Acad.* 1713. Magnum facit ubique VESALIUS. Add. *Phil. transf.* n. 207. BEHRENS *Bresl. Saml.* 1723. M. Mart. Ab emetico ALBERTI M. *Leg. T. I. P. 2.* p. 441.

(*g*) DILTHEY *obs.* 10. SCHURIG. STENZEL. ALBIN. *fam cania* n. XI. *Frank. Anmerk. T. VI.* p. 397. LOTICH L. IV. c. 2. *obs.* 2. ad 5. Sex mensurarum capax HABN *Rat. med. L. VI.* p. 23. una tenuissimus.

(*h*) HASENOHRL p. 60. LIEUTAUD *Mém. de 1752.* LANGGUTH *progr. de tabeifica. Comm. Bonon. T. II. P. I.* p. 157. SCHLICHTING in *Verbrügge* p. 47. 48.

(*i*) Decem librarum MAJOR *Anat. Prior.* p. 17. Sex libras parissinas & uncias 2. solidi cibi distentus capit RIOLAN. p. 117.

(*k*) Quatuor stopharum LOESSE *ren.* p. 60. Sedecim librarum STÖRK p. 123. Trium pintarum aquæ & septem librarum carnis DIONIS. p. 181. Novem pintarum PLEMP. *fund. med.* p. 129. Novem quartarum ROSEN p. 308. Novem cantharorum SCHURIG p. 361. 175. Tredecim librarum RHOD *mantiss.* n. 18. Quatuordecim librarum SPIGEL p. 225. Sedecim COLLINS p. 323. Duodecim mensurarum STENZEL *stomat. aort.* Viginti mensurarum HASENOHRE p. 60. Librarum nonaginta SMETIUS *miscell. L. X.* p. 320.

(*l*) A veneno MORG. *sed. caus.* II. p. 14. HILFFELD p. 4. 21. 43. 44. A tartaro emetico *Lettr. al S. CURZIO* p. 23. 24. Post omnis cibi vomitum MORG. *sed. caus.* II. p. 425. A febre maligna *Journ. med.* 1762. M. Avril.

(*l**) *Phil. Transf.* n. 207.

vesicæ urinariæ fabrica est: membranæ veræ quatuor, extima; musculosa: nervea: villosa: cellulosa: telæ tres, - quæ earum tunicarum intervalla replent, extima, media, intima. In eo hæc receptacula differunt. quod ob variam eorum figuram simplicior in intestinis, in ventriculo magis composita fibrarum carnearum natura sit.

Ergo primum peritonæum (*a*), ad utrumque oesophagi latus, se super omentum eo modo conjiciens, quo alias opportunius dicetur, generat membranam ventriculi primam, & extimam. Ea firma, simplex, extus glabra, minutis undique vasculis abunde picta, membrana est (*b*), quæ maximam partem ventriculi contegit, fibrasque musculares firmat; eæ fibræ hac membrana violata neque aerem nunc continent, neque figuram ullo modo suam valent sustinere. Fibrarum in prima tunica nullus est certus ductus (*c*).

Duæ sunt ventriculi sedes (*d*), a quibus hæc membrana abest, ad originem utriusque omenti. Id enim huic ipsi tunicæ continuatur, cumque duplex sit; duasque paginas habeat, hætenus remotas, ut & glandulæ intercedant, & vasa non minima, spatium id totum inter duas omenti paginas absque membrana extima est. Latius est in arcu minori, qua sede plurima sunt vasa, nervique. pluresque glandulæ. Minus, sed longum, est per totum arcum majorem.

§. V. Cellulosa prima.

Qua nuda sedes est ventriculi (*a*), ea laxis satis, neque absque adipe cellulofus (*b*) & laminosus textus est, in arcu minori etiam evidentior, qualem etiam ubique convexum peritonæi dorsum circumpositum gerit: dorsum enim est, quod tunicæ carneæ ventriculi, & omnibus equidem visceribus obvertitur.

In ea cellulosa tela, arcus semper minoris, nervorum octavi paris (*c*) præcipui rami sunt, & arteriæ coronariæ majoris, venæque.

Sed

(*a*) WINSLOW n. 55.

(*b*) *Première tunique* WINSLOW n. 55. Extima WILLIS p. 16. GLISSON *ventr.* & *int.* p. 135. Ob cellulofam naturam in plures laminas resolvere potuit PRYERUS *Meryco-log.* p. 116.

(*c*) Facit fibras longitudinem ventriculi sequentes, WILLIS *tab.* 2.

(*d*) BARTHOL. *analect.* p. 183. 184. *Method. demonstr.* p. 183. 184. *Specim. anat.* p. 140.

(*a*) Paulo prius.

(*b*) DUVERNEY *posthum.* T. II. p. 179.

(*c*) L. X. p. 236.

Sed etiam perpetuæ ea sede glandulæ (*d*) reperiuntur, conglobati generis, nihil ab iis diversæ, quæ sunt in mesenterio, numerosæ, ovales, compressæ, pene agminatæ, minime ignoratæ antiquis, neque a nuperis (*d*^{*}) detectæ. Lymphaticæ sunt indolis, & vasa lymphatica (*e*) maxima ea sede reperiuntur, alibi repetenda. In aliis animalibus oportet conglomerati esse generis, cum ostia (*f*) in ventriculum aperta habeant.

Secundum arcum majorem cum pariter tela cellulosa sit, recipit ea arteriam venamque gastroepiploicam dextram (*g*) & sinistram, & nervulos nonnullos minime grandes (*h*); denique glandulas etiam conglobatas (*i*), quæ longa serie, non valde confertæ, in principio sedent omenti.

Non rarum est eas glandulas, maxime supernas, viscida (*k*) materia, etiam scirrhusa repleri (*l*), ut etiam ventriculum arctent (*m*), & ad pylorum (*m*^{*}), & ad oesophagum (*m*^{**}).

Verum in reliquo toto ventriculo, inque utraque planitie illa, anteriori & posteriori, cellulosa tela brevis est, fibrosa, reticulata, absque adipe, ita stricta, ut aegre, neque unquam satis perfecte, a fibris carnis membranam extimam separe. Sensim autem ex laxitate illa degenerat, & ut recedit ab utrovis arcu, ita brevior fit, & strictior, Quæ brevissimæ cellulosi textus laminæ sunt, ea sede fibræ exteriores, longæque ventriculi ita manifestæ pellucunt, ut aliquid tendini simile nascatur, aut ligamento. Ita ad utrumque latus pylori descripsit WINS-

Q 3

LOW

(*d*) Superiores ventriculi NUCK *aden.* p. 6. NICHOLLS p. 20. Gastricæ VERCELLONE p. 50 seq. Conf. L. II. p. 190.

(*d*^{*}) Sibi tribuit BIANCHI *prolus.* p. 19. Negat in cardia, nec bene HEISTER T. II. p. 301.

(*e*) PETSCHÉ n. 38. &c.

(*f*) Quindecim in castore BUFFON T. VIII. p. 314. In lutra marina Nov. Comm. Acad. Petrop. T. II. p. 376. in phoca IB. inque manati p. 310.

(*g*) Fasc. II. tab. art. coeliac. II. RUYSCH l. c.

(*h*) Vide n. 22.

(*i*) Et has BIANCHUS sibi tribuit: sunt autem inferiores ventriculi NUCK p. 6. & Omentales ejus p. 7. ante eum Cl. virum jam dictæ PEYERO *merycolog.* p. 105 & J. Wilhelmo PAULI apud RIVINUM, & prius RUDBECKIO.

(*k*) HEUERMANN T. III. p. 417. tumores ovi mole.

(*l*) BESSE *append. Thes.* p. 278. 279.

(*m*) BESSE *ibid.*

(*m*^{*}) RONCALL PAROLIN. *hist. morb.* p. 171. *Comm. Acad. Bonon.* T. II. P. I. p. 157.

(*m*^{**}) BESSE *ibid.* Prope antrum pylori plexus glandularum post vomitus conspicuus MOREAU *sed. caus. morb. Ep.* 30.

LOW (n). Huc etiam Cl. virorum intersectiones tendineas refero, quæ sint in ventriculi fibris carneis (o).

Hic accuratus nexus fecit, ut fibras carneas aliquas in externam tunicam inferi dictum sit (p).

In hac cæterum cellulosa prima rete est truncorum (q) vasorum, arteriosorum, & imprimis venosorum majorum. Earum trunci majores sunt in arcu minori, & majori; rami sensim minores in utrumque planum ventriculi mutuos in occursum tendunt (r).

§. VI. *Fibræ musculosæ ventriculi.*

Difficilis certe harum fibrarum est administratio, hinc parca, & sui dissimilis, in diversis scriptoribus (a) historia. Difficulus a membrana externa expediuntur: difficulter stratum fibrarum primum (b) ita tollitur, ut alterum integrum maneat. Ita vero in robustis corporibus mihi visæ sunt habere.

Fibræ validæ, quæ longitudinem oesophagi sequuntur, primum *stratum exterius* constituunt. Eæ, quando ad ventriculum pervenerunt, fere ad stellæ (c) modum undique in ventriculum se disjiciunt.

Aliquæ sinisteriores, alias valentes, uti nobis visæ & WEPFERO (d), alias tenuiores (e), carneæ primum, inde sensim pallidiores, per arcum minorem (f) versus pylorum tendunt, proprio ibi sed ludicro nomine nuper adpellatæ (g). Inter eas, quæ mediæ sunt, eæ in pylorum

(n) N. 61. & HELVETIUS *Mém. de l'Acad.* 1719. p. 337. t. 22. f. 1. FF. In equo BERTIN. *Mém. de* 1746. p. 30. 31. 32. t. 1. f. 2. qui duo alia addit ligamenta.

(o) DISDIER *Splanchnol.* T. I. p. 136. WINSLOW n. 57. LIEUTAUD p. 267.

(p) PEYER *mercol.* p. 174. BERTIN. l. c. p. 36.

(q) FANTON. *diff. anat.* p. 87. DUVERNOY *Comm. Acad. Petrop.* T. VII.

(r) Conf. DUVERNOY l. c. p. 313. subobscurè: conf. etiam RUYSCH l. c. EUSTACH. *tab.* 10. f. 2.

(a) WILLISIANA descriptio tota a nostris differt; accedit maxime WINSLOWIANA.

(b) Rectas externas ab his nostris diversas habent Cl. viri WILLIS *tab.* 2. WEPFER *cit.* p. 121. FALLOP. p. 162. b.

(c) Recte BERTIN. p. 32. & *tab.* 4. a. b. c. d. breviores tamen: Habet & GALEACIUS *Comm. Bonon.* l. c. & DUVERNEY *posibum.* T. II. p. 180.

(d) L. c.

(e) Tenues HELVET. t. 22. f. 1. ab E ad F. Tenuis MORGENSESSER *comit.* p. 10.

(f) Habet GALEACIUS *Comm. Bonon.* T. II. P. 2. p. 240. WEPFER *cit.* agnot. p. 121. *Plan. externe* WINSLOW n. 25. DUVERNEY T. II. p. 181. Aliquot fibræ FALLOP. p. 162.

(g) *Gravate de Suisse.*

rum excurrunt (*b*), inque ipsum duodenum, & paulatim in eo intestino evanescent. Numerus earum minor est. Hæ imprimis pylorum ad oesophagum adducere aptæ natæ sunt, ut ventriculus replicetur magis, & pylorus adscendat, cibique exitus hætenus fit difficilior.

Pleræque intermedio loco inter oesophagum & pylorum usque descendunt (*i*) de arcu minori, seque inter transversas abscendunt & evanescent, & ipsæ in longas illas degenerant.

Aliæ demum fibræ inter oesophageas sinistrorsum (*k*) incedunt, inque saccum ventriculi cæcum, & longitudinem ventriculi relegunt.

Sequitur stratum transversum ventriculi, fibræ nempe, quæ ambitum ejus sacci ita ambeunt, ut circulos absolvant, quales quidem fibræ carniæ circulos faciunt, plures nempe in lineam anularem conjunctæ, ut tamen subinde divergant, interque sodales suis finibus (*l*) se abscondant.

Harum fibrarum primæ ambeunt saccum cæcum (*m*) ventriculi sinistrum, circulis semper majoribus, ut sunt dexteriores, & porro universum ventriculum (*n*), inque ipsum duodenum continuantur, strictiores in arcu minori, inde versus majorem laxatæ. Anuli etiam plerique obliqui (*o*) sunt, & se leniter intersecant. Subjacent prioribus interiores, & utique ventriculum arctant. Eædem in pyloro ventriculum adstrictæ claudunt; & eædem, ut repetere erit necesse, robustum anulum in sede valvulæ pylori efficiunt (*p*).

Denique intimæ fibræ ventriculi (*q*) sunt ex fibris oesophagi circularibus. Circulum integrum absolvunt, ad sinistra oesophagi, arcu versus lienem

(*b*) Valde breves b. c. BERTIN. T. 4.

(*i*) BERTIN. p. 34. GALEAC. p. 240. 241. Oblique FALLOP. p. 162. WEPFER p. 121. GARRNGEOTI icon est ex HELVETIO, *Splanchnolog.* Tom. I. tab. 8. p. 243.

(*k*) BERTIN. p. 34.

(*l*) L. XI. p. 410. 411.

(*m*) HELVET. f. I. 2. C. C. C. p. 338. WINSLOW n. 59. BERTIN. p. 34. 35. 36. (sed adnumerat primis & tertiis), DUVERNEY *postb.* T. II. p. 181.

(*n*) HELVET. f. I. G. G. p. 338. WEPFER p. 121. BERTIN. p. 36. t. 4. i. t. 5. c. d. GALEAC. p. 241.

(*o*) HELVET. l. c. & p. 338. BERTIN. Spirales facit SANTORINUS n. 166. & olim FALLOPIUS p. 162.

(*p*) GALEACIUS p. 241. Conf. WEPFER p. 122.

(*q*) HELVET. D. f. 2. B. B. *Troisième* BERTIN. p. 37. DUVERNEY T. II. p. 181. Interior series longitudinalium GALEAC. p. 240.

linem converfo (*r*), dextrorsum aliqua pars obsolescit. Possis etiam pro duobus fasciculis habere (*s*).

Inde dextrorsum, sed ad utrumque latus oesophagi, se conjiciunt (*t*) inque planitiem utramque ventriculi, secundum ejus longitudinem, productæ, cis pylorum demum desinunt. Hæ tertium stratum ventriculi constituunt, & videntur & claudere posse oesophagum, maxime quando pylorus per suas vires circulares clausus est, & morari cibos, dum eas sinistrorsum reducunt iis adjuvantibus, quas modo diximus (*u*).

Ligamenta pylori sunt duæ lineæ albæ (*w*) inter utrumque arcum, per media duo plana decurrentes, in quibus fibræ, longitudinem ventriculi sequentes, cum tunica extima coalescunt.

Et ventriculi, & urinariæ vesicæ, & felleæ demum, fibræ sunt ex genere ramoso, reticulato, quæ variis & obliquis sub angulis se secant, & in se mutuo inhærent, atque inosculantur (*x*).

Quare intermediæ inter eos fasciculos areolæ sola a nervea membrana robur suum habent & ab extima; & in saccos cæcos non difficillime deprimuntur, etiam in ventriculo (*y*). Ob eam etiam rem aerem in flatum musculosa tunica non retinet, quando extimæ præsidium ablatum est.

§. VII. *Ventriculi animalium fibræ.*

Quadrupedibus carnivoris fibræ earum sunt analogæ, quas ex homine descripsimus, in equo valde similes (*a*) plerumque robustiores (*b*), in nonnullis animalibus tamen debiles, ut in marte, & in mustela (*c*), in animale boreali *Vielfras*, & in sciuro (*d*).

Ruminan-

(*r*) Carnosæ fibræ FAELOP. p. 162. b. Sphincter Oesophagi LIEUTAUX p. 267. DUVERNEY l. c. p. 184.

(*s*) *Deux plans* WINSLOW n. 60.

(*t*) Unum fasciculum habet HELVETIUS sub D. f. i. add. p. 337. BERTIN. f. c. t. 6. Habet WINSLOW n. 60.

(*u*) p. 127.

(*w*) HELVETIUS p. 337. t. 22. f. i. inter E. & F. BERTIN. p. 31. 32. WINSLOW n. 61.

(*x*) HELVET. p. 338. WINSLOW n. 58. BERTIN. p. 36.

(*y*) Videtur FANTON. *Epist.* II. ad MANGET.

(*a*) BERTIN p. 24. SCHVIG *chyloleg.* p. 29.

(*b*) In cane WEPFER p. 200. in porco IDEM; & des NOUVEAUX p. 110.

(*c*) GREW p. 1.

(*d*) IDEM. p. 24.

Ruminantibus validæ sunt, quæ perpetuum & naturalem vomitum solæ, absque auxilio musculorum abdominis, nimis debiliæ, exercent (*e*).

Avium granivorarum musculos describere visum est, quod earum exemplum in physiologiam humanam sit introductum.

Duo sunt muscoli, etsi possunt videri quatuor esse (*f*) : radiatus uterque & connexus in utroque centro tendineo (*g*) ventriculi, quæ centra utrique musculo communes sunt. Eorum alterum est in superficie anteriori (*h*), in posteriori alterum (*i*).

Uterque musculus durus est & pene absque cellulositate, neque ullus ejus roboris musculus, adeo strictis stratis compactus, in homine invenitur. Superior alter sphincter est (*k*) oesophagi, quem amplectitur (*l*).

Alter musculus *duodenalis* (*m*), hinc sulco a majori distinguitur, inde cum eo confunditur: duodeno propior idem, superne brevior altero, inferne longior.

Uterque ventriculi cavum comprimit, quod exiguum est, ovatum, diametro vix æquante musculi crassitiem.

Interna crusta ventriculi, quæ in homine villosa, hic cartilaginea (*n*) est, & maxima ejus pars plicata (*o*).

Cæterum etiam in minutis animalibus, inque insectis, fibræ ventriculi transver-

(*e*) Conf. PAYER *Merycol.* ic. 2. 3. 5. 7. &c.

(*f*) Pro quatuor muscolis numerant PAYER *de ventric. gallin.* p. 68. DUVERNEY *posthum.* II. p. 446. PERRAULT *Ess.* T. III. p. 201. t. 2 f. 1. Sed muscoli ab eo viro A. & D. dicti continuantur cum B. & C. Sex facit GREW in *Gallo* p. 34. 40. Sed ejus viri muscoli laterales sunt cellulosæ telæ cum vasculis mixtæ.

(*g*) COLLINS *tab.* 19. PERRAULT t. 12. f. 1. GREW p. 34. *Obs. sur le poulet* n. 270.

(*h*) Ibid. *obs.* 267. 268. 269.

(*i*) Ibid.

(*k*) Ibid. n. 269. 270. Est A. D. PAYERI.

(*l*) Etiam PAYER p. 70.

(*m*) *Obs. sur le poulet* n. 269. PERRAULT B. C.

(*n*) PAYER p. 72. REAUMUR *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 296. 297. 298. *Compar. anatom.* p. 95. In grege COITER p. 132. In aquila ALBROVANDUS T. I. L. 12. p. 799. In loligine LISTER *Conchyl. bivalv.* p. XXXV.

(*o*) GREW *tab.* 29. PERRAULT f. 2.

transversæ robore superant: in ephemero (*p*), eruca, (*q*) bombyce (*r*), ape (*s*), scarabæo nasicorni (*t*), cochlea (*u*).

Aliquæ rectæ intercedunt (*w*), quæ in eruca ligamentum referunt (*x*).

Robusti vero, & fere ex avium similitudine, sunt ventriculi cochleæ (*y*), & buccini (*z*), & locustæ (*z*^{*}).

§. VIII. Cellulosa secunda (*a*).

Multo hæc priori laxior, per universum ventriculum facile continuanda, statu per vulnusculum carneæ tunicæ inflictum optime ostenditur, bombycina, albissima, laminis facta & fibris. Ampliores sunt areolæ, & cellulosa tela crassior, quam in intestinis.

Per eam tunicam pleraque vasa (*b*) ventriculi sparguntur. Truncos solos prior cellulosa habet, carnea minutissimos furculos excipit; in ista vero numerosissimi, & inter maximos & minimos medii, rami arteriarum & venarum suum faciunt rete.

In eandem & in intimam exhalat vapor, qui in morbis frequenter cum cellulosis laminis confervet, & viscidam primo, deinde duram in naturam, callosam (*c*) & cartilagineam abit, quæ universum ventriculum crassum

(*p*) SWAMMERDAM. t. 15. f. 5.

(*q*) *ibid.* p. 275.

(*r*) MALPIGH. p. 17. tab. 5. f. 1.

(*s*) REAUMUR *Mém. pour servir à l'hist. des Insect.* T. V. p. 445.

(*t*) SWAMMERDAM *bibl.* p. 313.

(*u*) HARDER *exam. cochl.*

(*w*) In bombyce MALPIGH. l. c.

(*x*) SWAMMERDAM p. 575.

(*y*) LISTER *buccin. Exerc.* II. p. 9.

(*z*) *Ibid.* p. 55.

(*z*^{*}) RÖSEL *von Heusebreken* p. 59.

(*a*) Habet WINSLOW n. 62. DUVERNOI l. c. n. 7. FANTON. p. 84. HESTER not 9^{*} NICHOLLS p. 20. & olim BEASIIUS in porco. Nervea alia, ope siphonis ostensa J. WILB. PAULI *progr.* ann. 1721.

(*b*) FANTON. *diff. anat.* ed. II. p. 87. WILLIS *pharmac. rat. tab.* 4. f. 2. p. 23. DUVERNOI l. c. n. 8. WEPFER *cicut.* p. 124. Rami nerveæ RUYSCH *Thef.* II. n. 3. n. 14. *Thef.* VIII. n. 33.

(*c*) BOSCHUS *facult. anat.* p. 21. CHIFFLET *obs.* 27. ROEDER in *progr.* HASENORHEL p. 60. LANGGUTH *de tabe secca lethali.* SCHMIEDEL in *diff. de pericard.* *Comm. Bonon.* T. II. P. I. p. 157. *Phil. transf.* n. 351. LEMERY *Hist.* 1702. n. 1.

crassum (d), pylorum sæpe perangustum (e) facit. Etiam ossea (f) duritas in ventriculo visa est. In eadem cellulosa ventriculi tela adipis glebularum vidi (g).

§. IX. Nervea tunica (a).

Hæc vera ventriculi, ut intestinorum basis est, cuti faciei, oris, faucium & oesophagi continua, alba pariter, firma, crassior, quam in intestinis. Ejus superficies externa æquabilis, cellulosam, quam modo diximus, sibi adnatam recipit. Interna in exigua juga producitur, quæ sunt nuclei & quasi fundamenta plicarum (b), in quas villosa tunica repetitur.

Vasa propria exigua habet, si recesseris a vasis cellulosæ tunicæ, quam diximus.

Impulso per vulnusculum aere dissolvitur, inque spongiosum, bombycinumque, albissimum textum abit, qualis est in reliquis intestinis. In gelatinam per morbum conversam vidit Cl. RICHERTS (c).

§. X. Cellulosa tertia (a).

Hæc inter nerveam & villosam sequitur ultima cellulosa tela, lata & manifesta, ut non difficulter præpares, adacto per vulnusculum tunicæ villosæ

R 2

flata

(d) Conf. BARTHOLIN. Cent. III. Hist. 6. BEAS obs. 9. P. IV. Journ. de Med. 1759. nov. CHIFFLET obs. p. 27. SCHMIEDL de pericard. p. 27. 28. BARRERE obs. p. 153. seq. p. 213. 214. LOESKE obs. p. 36. & STORCK ann. med. I. p. 250. A spiritu vini vir. III. JANUS PLANCUS Acad. conject. p. CI.

(e) BARRERE nouv. obs. anat. p. 153. 157. FANTON. p. 14. PETIT apud LATHERMANN. Sebacea materie infarctus SCHNEIDERUS p. 321. Callosus BARTHOLIN Cent. IV. Hist. 47. PLANCUS conject. p. 21. Prædurus MOBG. Sed. II. p. 416. Induratus membranis crassioribus confusus, exiguum iter relinquentibus Journ. med. 1757. M. Mart. Impedimentum scirrhum pylorum ambeus HARNRAT. medend. VI. p. 13. 14. 272. Pylorus & media pars pylori cartilaginea fere ossea Phil. trans. n. 153. Durus & angustus pylorus DIONIS. p. 185. mort. subit. p. 125 Scirrhusus PERRAULT de la fièvre p. 227. Penclausus tuberculis scirrhosis WILLIS pharm. ration. II. c. 1. DUVERN. II p. 573. & gypso ZOD. GALE ann. 1. Febr. In febre scirrhus, & glandulosa caro adnata Ess. of a Societ. at Edimb. I. n. 14.

(f) PETIT apud LATHERMANN, etiam a spiritus vini abusu.

(g) Ita DUVERNOI l. c. p. 214. Phil. trans. l. c.

(a) WINSLOW n. 63. PAULI l. c.

(b) WINSLOW n. 66.

(c) Obs. 3.

(a) Tissu fort lache WINSLOW n. 64. Filamenta quæ fibrosam nerveæ connectunt. WEPFER cicut. p. 122.

flatu, a quo artificio in spumæ speciem intumescit: Pinguedinem aliquando recipit (*b*). Eadem magnam partem plicarum efficit, nerveam inter & villosam sumta.

Per eam cellulofam telam ultimum vasculosum rete dividitur, & minutorum ramorum, & una numerosiorum, a quibus porro brevissimi ramuli per villosam penetrant. Idem a rete secundo per nerveam perforatam trunculis suis advenerunt.

Et hæc potissimum cellulosa tertia sedes est præcipua inflammationis, quæ in ventriculo per venena (*c*), etiam per emetica pharmaca (*d*), morbosque inflammatorios (*e*) frequens reperitur. In eo casu fere sanguis in cellulosa spatiosa effusus reperitur, ut in canibus a venenis variis enectis (*f*), inque homine post repetita medicamenta emetica (*g*) pereunte vidi. In cane veros grandes que grumos cruoris ab usu coboldi in cellulosa spatia effusos reperi, tum in fele ab arsenico, in tertia semper cellulosa, & in homine Cl. CURZII (*g**) amicus.

§. XI. Tunica villosa (*a*).

Epidermidi etiam manifesto continua (*b*) & ipsa decessit & (*c*) reparata

(*b*) Conf. OELHAFEN *part. abdom. content.* de corpusculis pinguibus internæ superficiei ventriculi adnatis.

(*c*) HASSENAE *Richter* T. IV. p. 47. 48. VALDARENGHI *ad EBBEN. BITAB.* p. 104. 105. A vomitu in cane *Phil. transf.* n. 335. In cane etiam SPRÖEGEL n. 44. 46. A mercurio præcipitato HILDEFELD p. 43. 44. A semine staphisagriæ p. 21. A scylla p. 15. 17. A nuce vomica p. 45. 46. maculis rubris varius. A cobaldo IDEM p. 63. Ab oleo anisi p. 38. 39. A cocculis indis p. 34. 37. A viridi æris attroruber p. 48. A saccharo saturni p. 52.

(*d*) Ipse vidi, & habet *Hist. de l'Acad.* 1713. p. 130. & Cl. HILDEFELD p. 51. a Gummi gutta p. 28.

(*e*) In cholera HEINRICI *de cholera*, in dysenteria *Phil. transf.* Vol. II. P. I. n. 12. In febre maligna ibid. *Journ. med.* 1762. M. April. HOFMANN *de remed. benign. nov.* Post febrem intermittentem MORGAGN. *sed. & caus.* II. *Epist.* 30. A funesta siti POZZI *Commerc. Epist.* p. 77. In variolis STUBBE *phlebot.* p. 252. KÆMPF *infaret. ventric.* *Phil. transf.* 1755 p. 56. in morbo bubulo SALCHOW: in epilepsia VALENTIN. *Epist.* IX. n. 216.

(*f*) *Opusc. anat.* T. I. de part. sent. & irrit. Exp. 328.

(*g*) *Opusc. pathol. obs.* 14.

(*g**) *Lettera* al S. CURZIO p. 24.

(*a*) Crusta villosa WILLIS p. 12. 13. Veloutee WINSLOW n. 65. Panniculus nervos operiens MASSA p. 25.

(*b*) NICHOLLS p. 20. Cl. C. a BERGEN *pent. obs.* MONRO *Edimb. Ess.* III. p. 118. Epithelium vocat RUYSCHIIUS *Thes.* VII. n. 40.

(*c*) In hectico *Journ. de Médec.* 1761. M. Mars. Ab emetico VIRIDET *du bon chile* p. 87. 88. 89. ALBERTI *med. leg.* T. I. P. 2. p. 441. Ex dysenteria ARET. *diut.* II. p. 61. PICCOLI. *pralect.* p. 105. a vesicatorio devorato BARTHOL. *Cens.* III. *Hist.* 16. ut videtur.

parata est, & in animalibus variis, avibus (*d*), ratto moschato (*e*), cancris (*f*), insectis (*g*); etiam in homine, siquidem post eam ejectam multi convaluerunt (*h*).

Alba est, flava (*h*^{*}), rubra, simplex, mollis, quando sola habetur. Perinde ut cutem vulgaris epidermis, ita hæc villosa nerveam oblinat, ne perpetuo doleat. Hinc ventriculus etiam pulverem adamantum absque malo tulit (*i*). Hinc ab ea detrita dysenterici dolores (*k*), & cardialgici (*l*); & appetitus prostratus (*m*); & diarrhoea (*n*); & ciborum intolerantia (*o*), & vomitus perpetuus (*p*), & cruentus ventriculus (*q*) & sanguinis per inferiora secessus (*r*). Visus est in ventriculum sanguis effundi ab inflammatione ex frigido potu nata (*s*); & a tartaro emetico (*t*): cum ea crusta villosa ab emeticis (*u*) destruat.

In nonnullis animalibus crassa est, dura, pene cartilaginea, ut in avibus granivoris (*w*), ingluvie aquilæ (*x*), etiam in loligine (*y*).

§. XII. *Plicæ valvula.*

Ut minutius hanc membranam prosequamur, primo tenere oportet, eam, & in homine, & in plerisque animalibus, amplam esse, & nota-

R 3

bili

(*d*) Suspicatur REAUMUR *Mém. de 1752. p. 297.* Cuticularem esse MONRO *compar. anat. p. 95.* Tota ingluvies renata in gallina HARDER *apiar. p. 70.*

(*e*) Renovatur *Mém. de 1725. p. 332. 333.*

(*f*) Totum ventriculum novari ROLFINK *de calcul. p. 31. &c.*

(*g*) SWAMMERDAM *p. 686. in nympha asili.*

(*h*) VIRIBET. A RETARUS. BARTHOL. &c.

(*h*^{*}) Ad pylorum DUVERNEY *p. 535. cæterum rubella.*

(*i*) KRUGER *Pathol. p. 202.*

(*k*) ARETÆUS PICOLOHOMIN.

(*l*) BLAS *obs. 6. P. V. BARTHOL. l. c.*

(*m*) VIRIBET *p. 365.*

(*n*) *Journal de Médec. l. c.*

(*o*) VATER *deglut. imped. caus. abdit.*

(*p*) MANGRT *bibl. T. I. p. 8. a veneno.*

(*q*) VATER.

(*r*) HOFMANN *remed. benign. nox.*

(*s*) *Lett. la S. CURZIO p. 23. 24.*

(*t*) ALBERTI *Med. leg. T. I. P. 2. p. 546.*

(*u*) *p. 132.*

(*w*) ALDROV. *ornitholog. p. 116.*

(*x*) LISTER *conchyl. bivalv. anclav. p. XXXV.*



bili ratione ampliorem (a), quam eæ membranæ, quibus extus circumpositis interior coercetur.

Hæc autem amplitudo infumitur in plicas & juga eminentia, quæ in cavum ventriculi eminent, & quorum præcipua pars villosa est membrana, quæ cellulofam tertiam, & nerveæ quasi radicem continet.

Eæ plicæ in variis animalibus varie se habent (b). Et primum in homine plicæ oesophagi, quæ ejus longitudinem sequuntur, in ventriculum aliquousque producuntur, in omnem ambitum, ad stellæ aliquam similitudinem (c). Valvula in ea sede nulla est, neque in homine, neque in equo (d), neque in bove (e), etsi nonnulla animalia plicam ibi habent (f): sed plicæ, ut in ano, tamen id ostium arctant.

Deinde per universum ventriculum amplæ rugæ plicæque secundum fere longitudinem (g), tamen varie inplexæ, a cæco sacco versus pylorum producuntur, ea sede magis conspicuæ.

Denique ventriculi membranæ interiores omnes, carneæ interius & circulare stratum, cellulosa secunda, nervea, & cellulosa tertia, & villosa (h) in duodenum ita producuntur, ut nascatur anuli tumidi, molli-

(a) Longitudinem tunicæ villosæ superiorem unciiis 13. inferiorem unciiis 39. æstimavit WEPFER *cicut.* p. 121. 122. Longitudinem membranæ carneæ superiorem unciarum 12. inferiorem 24. IDEM.

(b) Fere in omnibus animalibus ejusmodi plicæ reperiuntur, ut in Elephanto. PARIS. cuniculo GREW p. 10. mure SCHRAEDER p. 22. Sue GREW p. 9. 14. Apro mexicano COWPER *Phil. transact.* n. 153. In Leone BARTHOLIN. *Cent.* IV. *Hist.* 100. in tigre *Couguar Hist. natur.* Tom IX. in urso *hist. natur.* T. VIII. t. 34. f. 1. PARIS. in cane MONRO *compar anat.* p. 14. In tursione TYSON p. 21. COLL. p. 276. in phoca PARIS. In serpentibus CHARAS *viper.* p. 44. in crocodilo BORR. *herm.* p. 276. in piscibus ut xiphia HARTMANN add. GREW. p. 32. &c. *Rædianim.* p. 116. In rana JACOBÆUS p. 83. in testudine PARIS. etiam in gryllotalpa PEYER *merycol.* p. 8. & locusta ROESSE *von Henschecken* p. 59. In ruminantibus tamen profundissimæ sunt plicæ & folia, ut in tertio ventriculo PERRAULT *hist.* T. III. f. 4. PEYER *meryc. ic.* 8. 9. 10. BUFFON *Tom.* V. *tab.* 18. p. 490. VIEUSSENS *liq.* p. 273. & in camelo Com. *Petr.* cit. inque *huanaco* FEUILLEE. Etiam in quarto ventriculo PEYER. PERRAULT. f. 5. VIEUSSENS *liq.* p. 279.

(c) VESAL. T. V. f. 16. h. WINSLOW n. 67. BERTIN. l. c. *tab.* 7. RUYSCH *Thef.* VIII. n. 62. BOEHMER *de polyphago* p. 9.

(d) BERTIN. l. c. p. 44.

(e) SAUVAGES *Mém. sur le mal des boeufs* p. 20.

(f) Lepo is BUFFON l. c. porci BUFFON T. V. *tab.* 18. f. 2. Angustissimus in equo BERTIN. p. 48.

(g) WILLIS *tab.* 4. f. 1. RUYSCH *Thef.* II. *tab.* 5. f. 2. BOEHMER p. 9. de *Fieup* p. 15.

(h) WINSLOW n. 66.

lis, lubrici, crassique & plicati effigies (*i*), quam laxius intestinum duodenum circumpositum amplectitur.

Is annulus (*k*) utique etiam in vivo homine ostium primi intestini arctius reddit, & aliquantum resistit iis, quæ inprimis duriora & crassiora ex intestino in ventriculum repellerentur, nisi is obex impediret. Hinc calculi vesiculæ felleæ vomitu non frequenter rejiciuntur, nisi minimi, per secessum vero etiam vegrandes.

In sicco ventriculo hic annulus in speciem valvulæ, aut diaphragmatis abit, qualia sunt in tubis telescopicis (*m*). Dimidiatus visus est (*m*^{*}).

In plerisque certe animalibus pylorus angustus est, angustissimus in ruminantibus (*n*), & in tursione (*o*), in porco (*p*), in urso (*q*), ut neque aerem transmittat, etiam in rana piscatrice (*r*), in hydrocantharo (*s*).

Neque rarum est, proprium quasi sphincterem pylorum ambire in porco (*t*), vitulo (*u*), cuniculo brasiliiano (*w*), fele (*x*), demum in homine (*y*).

Si

(*i*) Conf. AMSTELODAMENSES in porco add. WINSLOW n. 70.

(*k*) Comm. Bonon. VESAL. WINSLOW n. 71.

(*l*) Vulgo *valvula pylori*. Habet jam VESALIUS *rad. chin.* p. 192. 193. & in *Exam. Fallop.* p. 116. & in *ic. cit k. & fabr. corp. bum* p. 607. PAREUS II. c. 14. VID. t. 63. f. 3. ROUSSET *hysterot.* p. 238. COITER p. 132. RIOLAN. *Enchirid.* p. 118. SMETIUS *miscell. L. X.* WEPFER *cicut.* p. 122. FANTON. *Diff. anat.* p. 85. 86. WINSL. n. 69. 70. 71. DUVERNEY II. p. 182. RUYSCH *mus. rar.* p. 152. Comm. Bonon. T. II. f. 2. p. 241. Existat etiam in vitulo apud *Amstelod.* p. 13. in rupicapra HARDER *apiar.* p. 51. PEYER *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. append.* In porco apud BLAS *anat. porc.* p. 65. & paulo aliter apud amicos *Amstelod.* p. 13. In sciuro FANTON. p. 162. In talpa lineam separatoriam habet RICHARD *Constit. Epid.* n. III. p. 96. In lepore valvula est *hist. natur.* T. VI. t. 40. f. 2. PEYER *obs.* 18. in hystrice SEVERIN. *Zootom.* p. 320. in cuniculo brasiliiano MURALT p. 64. in urso *hist. natur.* T. VIII. tab. 34. f. 1. TREW. *Comm.* 1734. n. 38. in fele PEYER *obs.* p. 57. in cane BLAS *anat. can.* c. 18. Sed negat SCHRADERUS *digest. anim. carniv.* p. 16. eam plicam in cane valvulæ nomen mereri.

(*m*) HEISTER *fig.* 6. & fere BOURDON t. 2. f. 2.

(*m*^{*}) MORGAGN. *sed. & caus. morb.* p. 208.

(*n*) VIEUSSENS *tr. des Liq.* p. 274. PEYER *meryc.* p. 145.

(*o*) TYSON in ejus animalis anatome p. 21.

(*p*) BLAS l. c.

(*q*) SCHRADER *de anim. carniv.* p. 16.

(*r*) CHARLETON *mantiss.* p. 19.

(*s*) *Journ. des Sav.* 1696. p. 478.

(*t*) AMSTELOD. *colleg. priv. observ.* p. 13. 27.

(*u*) p. 17.

(*w*) MURALT p. 122.

(*x*) PEYER *obs.* p. 57.

(*y*) MORGAGN. *Adv.* III. p. 6.

Si nunc requiras, num ideo pylorus in naturali fabrica conniveat, sitque clausus, non facillimum est respondere. De convulsiva occlusionē non quæro, cujus certi sint exempla (z). In homine vero sano citum iter lactis in nutricibus, tum aquarum mineralium; phænomena velociter de vulnere intestini exeuntis (a) cibi, aut argenti vivi (b), bilis regurgitatio (c), ipsa naturalis extra irritationem remissio sphincterum, quos voluntas non regit, faciunt ut credam, sola dura, integra, & solida, ab angustiis pylori repudiari, uti vidi in fele massam lacteam coactam a pyloro refutatam fuisse; fluidis vero id iter semper patere. Video equidem contra nos produci posse, aliquando, etiam aliquot a pastu horis, lac in ventriculo solo fuisse, quod ipse vidi: & in submersis animalibus aquam in intestina non transiisse (d). Verum in istis quidem brevissima, post submersionem, vita fuit (e); in illis lac crudum in ventriculo erat, cum per intestina cum materia reliqua commistum (f) esset.

Rugæ omnes cæterum inflando (g) evanescent, dum membrana musculosa & extima ab impulso aere in eandem amplitudinem distenduntur, quæ est villosæ nunc explicatæ. Etiam in vivo homine per morbos delentur eadem, quando ventriculus super modum distenditur (h).

§. XIII. *Rugæ minores, villi, papillæ.*

In his rugis, multo minores aliæ vermiculares rugæ (a), reticulatæ quasi, utcunque subrotunde tetragonæ, accurate conspiciendo adparent (b); leves eadem & facile evanescentes, & obscuriores quam in ductibus biliaris.

(z) Sect. IV. Huc repeto HÆN *rat. med.* VI. p. 272.

(a) Ibid.

(b) Sect. III.

(c) Sect. IV.

(d) EVERTSE *Disp. de submers.*

(e) L. VIII. p. 267. 268. &c.

(f) Vide suo loco.

(g) GLISSON p. 137.

(h) *Lett. al CURZIO* l. c. BONNET *sepulchr.* L. 3. Sect. 6 obs. 8.

(a) A maceratione villosam rugosam fieri, ut in lotricibus digitorum cutis C. A. v. BERSEN l. c.

(b) Rete minimum in cane & bove MALPIGHIUS dixit, in ove RUYSCH *Thef. anat.* II. p. 15. *Adv.* III. t. 2. f. 7. B. in urso PARIS in Elephanto DUVERNEY. Habet in homine RUYSCH *Thef.* II. *Aff.* III. n. 14. t. 5. f. 3. 4. *Thef.* X. n. 142. 143. Habet DUVERNEY *Comm. Acad. Petrop.* T. IV. p. 215.

ris. Minimum & subtile rudimentum esse videtur reticulatæ fabricæ, quæ pulcherrima est in ruminantium (c) secundo ventriculo.

Denique & in homine, & potius evidentius in aliis animalibus, fila, sive villi (d) adparent, in ventriculi caveam producti, breviores tamen quam in intestinis (e). In avibus totus bulbus, ipsaque glandularum convexa superficies, conspicuis villis obsitæ sunt.

Eadem ubique villorum natura videtur, ut nempe per eos & arteriæ & venæ in caveam ventriculi patulis ostioliis aperiantur.

Nam aqua (f), gluten piscium, argentum vivum (g), denique sebum (h), aut ceracea materies, in arterias impulsa, hos villos, rubore suo implet, & in caveam ventriculi exsudat (i), ut in concava villosæ tunicæ sede cylindri ceracæ in cavum ventriculi prominentes distinguantur (k). Similia fiunt, si per venas eos humores impuleris (l), utrumque enim experimentum sæpe feci. Et vicissim aqua in vivis animalibus in vasa omenti ventriculi adtenfa (m) venit.

Papillæ subrotundæ, nerveæ (n) nondum certa fide innotuerunt; in ruminantibus utique reperiuntur (o) ejusmodi tubercula, sed grandia & compo-

(c) PEYER *ic.* 6. p. 125. BUFFON T. IV. t. 17. VIEUSSENS *liqueurs* p. 272. In gallo pisce rhombos sensim minores sustinentes villos descripsit DUVERNEY l. p. 515.

(d) Fibras, ut in lingua, dixit FALLOPIUS *obs.* p. 161. & WEPFER *cicut.* p. 124. In sue vidit SWAMMERDAM apud RECHLIN *purg.* t. 2. f. 3. In sue, asino, & cane MALPIGH. *glan. l. conglob.* p. 9. In asino DUVERN. *postb.* p. 536. add. n. 525. Id. in porcello, castore zibetho T. II. p. 489. In cervo VIRIDET *bon chyle* p. 459. In bulbo avium, inque ipsis glandulis villi sunt evidentissimi. Evidentes in Lagopode ROBERG. in *diff. de ea ave.* KLEIN *de avib.* p. 116. cum *ic.* Videntur de genere composito esse. In avibus etiam Cl. REAUMUR descripsit *Mém.* 1752. p. 307. tum in echino ruminantium PEYER l. c. BUFFON l. c.

(e) Pars in equo absque villis BERTIN. p. 40.

(f) KAAUW *perspir.* n. 185. 562. HALLS *hamastat.* p. 218. PAULI *præfat.* ad V. HORNE.

(g) VIEUSSENS *obs. d'and.* & *de med. prat.* p. 12. 13.

(h) KAAUW p. 185. 562. HALLS. VIEUSSENS *conf.* p. 257. 258.

(i) RUYSCH *Thes.* VI. n. 33. KAAUW.

(k) KAAUW n. 185. 187.

(l) IDEM n. 466. 617.

(m) KLAUNIG *nosodoch obs.* 15. KAAUW n. 489. de venis potissimum VIEUSSENS *Var. syst.* p. 31.

(n) Papillas dixit RUYSCH *Thes.* VII. n. 40. *Advers.* II. p. 26. *Advers.* III. n. 10. p. 33. seqq. &c. tum HAASE *renov. tunic. vill.* & totam tunicam papillosam IDEM RUYSCHIVS *Thes.* VIII. n. 71. Fatetur obscuriorem esse in homine, quam in ove, fabricum *Adv.* III. p. 34.

composita, ut nullo modo cum humana fabrica compares. Quas Ruy-
schius vidit, eas credunt Cl. Viri villos venosos inanes fuisse (o),

§. XIV. Glandula ventriculi.

Avium (a) quidem ventriculi, & bulbus inprimis, quem diximus, evidentissimas habent glandulas ovatas, ductu suo patentes, in cavum bulbum, septemplici in gallina (b) ordine. Reperiuntur in gallo indico (c), columba (d), turture (e), otide (f), psittaco (g), struthione (h), casuario (i), cygno (k), mergo (l), fulica (m), corvo (n), scope (o), ave regia (p), ciconia (q), ibide (r), ardea (s), onocrotalo (t), corvo aquatico (u), falcone (w), vulture (x), aquila (y), ossifra-

(o) DUVERNEY T. II. p. 436. VIEUSSENS *liq.* p. 273. In vacca barbarica PARIS. III. P. II. p. 227. in tertio vitulorum ventriculo. GREW p. 27. RUYSCH *Adv.* III. t. 2. f. 7. *cur. post.* n. 37. 171. In ventriculo primo VIEUSSENS p. 272. GREW p. 17. In tertii lamini. VIEUSSENS n. 273. BUFFON T. IV. t. 13. p. 490. GREW p. 18. PERRAULT *Ess.* t. 14. f. 2. 3. FEUILLEE. PEYER *ic.* 8. p. 118.

(a) WEPFER *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. obs.* 251. DUVERNEY *posthum.* T. II. p. 446. Addit succum mucosum album fundere. Porro MALPIGH. l. c. p. 10. FANTON. *diff.* p. 39. CORNEL. CONSENTIN. p. 215. PEYER p. 68. WILLOUGHBY p. 7. GREW p. 40. REAUMUR *Mém. de 1752.* p. 304.

(b) FANTON. *diff. anat.* p. 108.

(c) PARISINI.

(d) *Amst. coll. priv. obs.* p. 38. COLLINS p. 256. GREW p. 35. ELAS p. 285.

(e) ALBIN. *de avib.* ed. Gall. T. II. n. 47.

(f) ALDROV. II. p. 92. PARIS. *Mém. &c.* HAEDER *apiar.* p. 78. *exerc.* p. 254.

(g) *Phil. Transf.* n. 211.

(h) VALISNER. I. p. 240.

(i) GREW p. 12.

(k) BORRICH *hermet. sap.* p. 261.

(l) COITER p. 132.

(m) PEYER *obs.* 46.

(n) PEYER *obs.* 50.

(o) PARIS.

(p) IDEM. T. III. P. 3. p. 29.

(q) HARDER *obs.* I. WEPFER l. c.

(r) PARIS.

(s) ELAS p. 146.

(t) MARSIGLI in *oper. Danub.* T. VI. p. 10. & PARIS.

(u) PARIS. ALDROV. L. XIX. p. 265. ALBIN. T. II. n. 81.

(w) MURALT *vadem.* p. 337.

(x) SCHEUCHZER. *Bresl. Saml.* 1726. p. 87.

(y) BORRICH l. c. p. 260. PARIS. MALPIGH. *gland. congl.* p. 10. ALDROV I. p. 116. MARSIGLI. T. VI. p. 9.

offifraga (x), noctua (a), hirundine (b), aliis aviculis (c). Sic manifestissimæ glandulæ sunt in castore (d), elephanto (e), rupicapra (f), cuniculo (g), hystrice (h), erinaceo (i), talpa (k), marsupiali (l), lutra (m), sue (n), civetta (o), cane (p), lupo (q), panthera (r), tigride (s), catopardo (t).

Etiam in serpentibus (u) reperiuntur, & in piscibus, aurata (x), xiphia (y), asello (z), lucio (a), torpedine (b): & in insectis, ut in sphondylia (c), locusta (d).

Homini (e) non perinde (f) sunt evidentes: poros (g), equidem

S 2

plerum-

- (2) LEIGH. *natur. hister of Lancast.* p. 159.
- (a) MALPIGH. l. c.
- (b) GREW. n. 39
- (c) IDEM ib.
- (d) BERGER *natur. human.* p. 135. WEPFER l. c. *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 52.
- (e) BILFINGER *var.* T. II. p. 194. PARIS.
- (f) HARDER p. 51.
- (g) GREW.
- (h) PARIS.
- (i) MURALT p. 265. FANTON! p. 57. In siamensi echino TACHARD *voyag.* T. II. p. 252.
- (k) MURALT p. 538.
- (l) COWPER p. 28.
- (m) *Mém. présent.* T. II. p. 200.
- (n) BRUNNER *auden* p. 70. VERCHELLON. PEYER. *obs.* 34. MALPIGH. *Colleg. Amst.* p. 26. GREW p. 14. ASTRUC *digest.* p. 161. 162.
- (o) DE HAMEL p. 228.
- (p) GREW p. 59. BRUNNER p. 49.
- (q) PAULIN. *hycol.* p. 4. DOLAEI *Fig.* IV.
- (r) PARIS. BUFFON T. IX. p. 180.
- (s) PARIS.
- (t) DUVERNOI.
- (u) BRUNNER p. 84.
- (x) PEYER *mercul.* p. 17.
- (y) SCHELHAMMER. Negat HARTMANN.
- (z) COLLINS p. 276.
- (a) *Phil. trans.* n. 262.
- (b) STENON. *Act. Hafn.* T. II. p. 224.
- (c) PEYER *mercul.* p. 6.
- (d) ROESSEL *Henfobrek.* p. 6.
- (e) Habet WILLIS p. 13. t. 4. f. 3. & villosam tunicam glandulosam dicit, tum in homine WEPFER p. 122. 123. RIDLEY *obs. pract.* p. 199. HARDER *obs.* XI. p. 204. 251. ASTRUC *de la digest.* p. 161. 262. HEISTER II. p. 29. KAAUW n. 120. HEURMANN T. III. p. 467. JUSTI VESTI *Dec. obs.* I. HELVETIUS l. c. ex WINSLOW. DUVERNEY II. p. 480. 481. MORGAGN. *Sed. & caus. morb.* II. p. 18.
- (f) Etiam MORGAGN. *adv.* III. p. 6. FANTON. p. 59. VERDIER. Parvas esse VIDET l. c. p. 43. Microscopio visas RIDLEY HEURMANN.
- (g) Poros habet VIDUS *tab.* 63. f. 3. RUYSCH *Thes.* II. *tab.* 5. f. 2. *Thes.* VII. n. 19. *Thes.* X. n. 141. FANTON *diss.* p. 89. 90. VIEUSSENS l. c. p. 82. In catopardo DUVERNEY l. Conf. VALISNER. p. 241. in struthione,

plerumque reperi, passim in ventriculo obvios, circa pylorum etiam frequentiores (*b*), per quos mucosi aliquid in ventriculum potest exprimi (*i*). Ductus excretorios, & ostia, & succum expressum alii viderunt (*k*). Semel tantum aut bis glandulas ipsas vidi, de cryptarum genere, simplices (*l*) rotundas, lenticulares, membranaceas, cavas, brevi ductu per villosam productas, sedentes in cellulosa tertia (*m*). Non sunt vasorum penicilli (*n*) neque rugæ (*o*), neque rejici debent (*p*), etsi non semper possunt ostendi (*q*).

Has glandulas in ingentes glandium quernarum quasi calyces, tres lineas latos, hemisphæricos (*r*) duros, grandi foramine in ventriculo cavo patulos, vidi degenerasse (*s*).

§. XV. Ventriculi succus.

In hujus succi historia accurate versandum est, cum in eo ipso causa coctionis ciborum primaria, seculo potissimum præterito, vulgo quaesita fuerit (*a*).

Difficilis res est, cum ventriculus raro purus sit, & etiam tunc spontanea degeneratio hujus succi ejus naturam corrumpere possit.

Et primum acida corruptio ventriculo valde familiaris est, quam lac (*b*), &

(*b*) MORGAGN. SANTORIN. p. 165. WINSLOW n. 61. VERDIER p. 60. HARDER, BEHRENS *Bresl. Saml.* 1723. m. Jun. Paucasibi WEPFERUS, alieno a nostris modo.

(*i*) WEPFER p. 123. VESTI.

(*k*) DUVERNEY T. II. p. 182. Negat quidem BARBIELLINI proprio lib.

(*l*) Compositæ in struthione VALISNERII p. 240. in castore WEPFER, cui etiam aliæ sunt conglomerati generis BUFFON T. VIII. p. 314.

(*m*) WILLIS p. 13. WINSLOW n. 61. WEPFER p. 123. 124. 129.

(*n*) *Thes. II. Ess. 3. n. 14. IThes. IV. n. 92. Thes. VI. n. 33. BOERHAAV. p. 57. VIEUSSENS obs. d'anat. & de prat. p. 80. trades liqueurs p. 261.*

(*o*) *Thes. X. n. 142.*

(*p*) BRUNNER *de duoden.* p. 51. 53. 70. LIEUTAUD p. 68. BARBIELLINI, in *prop. lib.*

(*q*) Vindicat eas BOERHAAV. *Epist.* p. 11.

(*r*) *Opusc. pathol. obs. 22.*

(*s*) Conf. tumefactarum glandularum exempla MANGET *libl.* p. 174. Ab atramento deglutito scirrhusas dixit VERDIER *de pica* p. 26. An huc locus DUVERNEY II. p. 573.

(*a*) HELMONT *Sextupl. digest.* PASCAL. *fermens* p. 285. WILLIS *ferment.* c. 5. HIPPOCR. CHEM. ETMULLER. BAYLE' *corp. anim.* p. 342. VIRIDET *prim. coct.* c. 11. 12. FLOYER *præternat. stat.* p. 167. SYLVIVS de le BOE ubique: etiam NICOLAI von Fiebern n. 102 qui famem ab iis deducit. Eo videtur, certe in avibus, inclinare REAUMUR l. c. p. 307.

(*b*) A cibus esse in cane GRUDER *ferment.* p. 78. A vino Rhenano vomitus acetosus RICHLIN. L. I. *obs. 19.* A pane acor. passerum. HELMONTIANUS SCHOCK *ferment.* p. 297.

& panis, & pleræque plantæ, & demum carnes (c) ante putredinem sponte concipiunt, ut etiam putredinem nonnunquam superet. Inde factum esse potuit, ut homines nonnunquam acidissimos humores vomitu rejiciant (d), aut in ventriculo acidi signa evidentia ostenderint (e), & in animalibus ruminantibus (f), & in omnivoris (g), inque avibus (h), denique etiam in carnivoris (i), & in homine (i*) acida massa, & acidus succus repertus fuerit; & aviculæ acidum vaporem exhalent (k).

Contra carnes, post initia quædam acoris, sponte in putredinem degenerant, cujus cum certo gradu alcalina natura conjungitur (l). Sed etiam nostri humores, & cum iis ventriculi succus, ad eam degenerationem sponte vergunt (m).

Ita fieri potuit, ut contenta ventriculo, fatida, putrida, denique manifeste

S 3

festo

(c) PRINGLE p. 396. 398. 402. 406. Acidum est principium putredinis in hypochondriacis HIGHMOR. *affect. hypochondr.* p. 40. 105.

(d) H de HEERS *obs.* p. 251. ALBIN. *de attherapens.* p. 13. BOYLE *util. Phil. exp.* p. 135. TRALLES *Hist. Chol.* p. 150. ILSEMANN *colic. Saturn.* HELMONT l. c. n. 41. p. 173. CELSUS L. I. c. 3. p. 27. *Obs. of a Soc. at London* T. I. n. 46. Argentum tingentes WOODWARD *cases* p. 17. Ructus acidi VERHEYEN p. 255.

(e) In ventriculo humano gas acidum STORK *Ann.* I. p. 126. BLAS *obs.* 6. L. V. *obs.* 3. L. VI. Odor acidus in homine SAND *rarus ventr. abscess.* Acidissimus odor in ligno devorato Eresl. *Saml.* 1723. m. Sept. & WEEDEN *Nachricht wegen im Magen gesunderer Hölzer* p. 8.

(f) Agno FLOYER. ove REAUMUR, cuniculo FLOYER *prat. nat. state of hum.* p. 66. vitulo du HAMEL p. 249. Capella VIEUSSENS *liq.* p. 280. Adde manati Comm. *Petr.* Nov. II. p. 310. crucam *Phil. trans.* n. 470.

(g) Sue PEYER *obs.* 34. mure VALISNER *gener.* L. II. n. 5 6. (lac coactum) glire BARTHOL. *anat.* [p. 78.

(h) Columba succum heliotropii rubro colore tinxit *Mém. avant.* 1699. T. II. p. 8. du HAMEL *hist.* p. 256. add. FLOYER *pharmacobasan.* p. 53.

(i) In avibus carnivoris acidus FROYER In onocrotalo MARSIGLI *danub.* T. VI. *obs. misc.* p. 10. In aquila p. 9. an cane KNIGHT *vindic.* p. 34. (Nempe primo adscendens in destillando liquor.) In cane subito enecto, lac coactum LITTE *Hist. de l'Acad* 1711. n. 7. In piscibus carnivoris VIRIDET *prim. coct.* c. 10. 11. 12. & du bon chyle p. 64. in torpedine LORENZINI p. 28. in lucio coagulum lac cogens ANDRY *des alim.* p. 362.

(i*) Lac omnino cogitur LEWIS *mater. med.* p. 528.

(k) HELMONT *calor. efficac. diger.* n. 27. [p. 164. *imago ferment* p. 93. n. 23. 24. 25. 26. 27. *Conf. sextupl. digest.* n. 12. p. 168. Add. DUVERNEY *possib.* p. 272.

(l) Fasc. *Sect.* III.

(m) L. V.

fecto alcalina fuerint, in homine (*u.*) in animalibus carnivoris (*o*) & denique herbivoris (*p*) potest.

Est ubi bilis de intestino regurgitans (*q*) amarorem & flavum colorem ei succo impertit (*r*). Amari vomitus a navigatione (*s*). Et a multo usu salis marini ejus generis acrimonia subesse (*t*) potest.

Ut ergo is succus verus & purus habeatur, cavendum est, ne ciborum reliquæ, neve aliqua fermentatio, aut putredo, eum corrumpat. Sumendus est ergo ex puro animalis aliquamdiu, neque tamen nimis diu cibis abstinens, ventriculo: aut recipiendus, qualem homo sanus, jejunos, cum aliquo levi deliquio animi sæpe regurgitantem remittit. Spongiis etiam in animalium ventriculis datis vir I. L. L. eum succum suscepit (*u*).

Repertus est autem his artificiis succus ventriculi pene salivalis (*w*), omnino in igne exhalabilis (*x*), mucosus (*y*) in ipso ventriculo, & minus mucosus quando de ore exstillat, aut insipidus (*z*), aut leviter falsus

(*u*) In ventriculo sani hominis succus malvæ virebit VIREUSSENS *liq.* p. 270. Per distillationem stomachus dat elementa alcalina, phlegma, spiritum alcalinum, substantiam oleosam, saltem fixum PINELLI *de podagr.* p. 313. Etiam caninus ventriculus dedit alcali KNIGHT indicat. p. 34.

(*o*) In cane *vas brev.* TILING p. 362. In crinaceo MUSGRAVE *Phil. transf.* n. 192. In collifraga anima olidissima CORTES apud ALDROV. l. p. 226. In serpente foetidissimus ventriculi liquor GEUDER *ferment.* p. 71. ex R. I. CAMERARIO. In pisce *Phil. transf.* n. 102. DAMPIER III. p. 87.

(*p*) In vitulo malvæ tinctura viridis facta est VIREUSSENS *liq.* p. 276.

(*q*) WALSÆUS p. 763. VALISNERI l. p. 241. PANAROL. *pénec.* l. n. 39. WINKER *alc. ventr. obs.* l. HILDAN. *Cent.* IV. n. 40. (in marasmo). Amarus in cancro molli BROWNE *jamaic.* p. 425. In animalibus nonnullis constanter amarus est ut in struthione VALISNER. In pullo ovo contento nunquam non bilem in ventriculo reperi *Du poulit.* II. p. 128.

(*r*) A fenna sumta flavus liquor in ventriculo MATTHEI *anim.* p. 44. & bilis ipsi p. 53.

(*s*) CELS. l. c. 3. p. 23. A morfu vipere POUTEAU *obs.* p. 135.

(*t*) PINELLI l. c. p. 290.

(*u*) REAUMUR *Mém. de* 1752. p. 482.

(*w*) DEIDIER *physiol.* p. 80. LIEUTAUD *Ess.* p. 270.

(*x*) WEPFER *cicut.* p. 80. PEYER *mercur.* p. 182.

(*y*) WEPFER p. 123. Parum acris in lucio & cyprino VIRIBET *bon chyle* l. c. In pisce BOYLE *util. phil. exp.* p. 117. in xiphia HARTMANN in cane B. LANGRISH *Exp. on brutes* l. BRUNNAR *pancr.* p. 88. 119. ASTRUC. p. 78. In Castore WEPFER l. c. in glire MORBIUS *de usu ventr.* § 3. int.

(*z*) Limpida abunde de ore reddita *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. ann. 4. *obs.* 108. Phlegma FLOYER l. c. p. 59. Pituita vomitu rejecta TULP. P. II. p. 19. TILING p. 220. MARC. DON. *Hist. med.* p. 8. non acida WEDDEL *phys.* p. 119. In porco phlegma plurimum FLOYER

falsus (a), in quadrupedibus herbivoris (b), & carnivoris (c), in avibus (d), & piscibus (e), etiam in homine (f).

Neque aut acidula (g) aut alcalina natura in eo succo puro conspicua fuit.

Deinde cum meo rogatu Cl. Lugdunensis medicus RASTIUS, & in mulo, & in ove, per abstinentiam a pastu, purum succum ventriculi obtinisset, in utroque animale succus gastricus mucosus & viscidus repertus est, in omaso tamen ovis, quam in mulo minus. Cum acido vitriolico & nitroso idem in ove paulum efferbuit, cum odore putrido: syrupum violarum viridi tinxit. Ab acido non coactus est, ab oleo tartari admisto filamenta deposuit. Sapore fuit falso subacri, absque sale muriatico. Adservatus etiam magis glutinosus evasit.

In mulo albuminosus visus est & glutinosus, & spumam egit virgis percussus ut albumen, tamen ut igne subposito totus aufugeret. Ab alcohole vini non mutatus est. Cum spiritu vitrioli paulum efferbuit, flocculos posuit; sic cum aliis acidis liquoribus chemicis: magis tamen cum nitri spiritu conflavit. Cum oleo tartari fluidor factus est, & floccos dejecit. Videtur adeo hic succus ex muco & aqua componi, & ad naturam alcalinam vergere.

Compo-

FLOYER. Insuper succus ventriculi in ossifraga LEIGH. *natur. hist. of Lancash.* p. 159. In struthione VALISNER. p. 240. contra PROCHLINUM qui acidum fecerat purgant p. 74. In buteone REAUMUR *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 305. In glire TILING l. c. p. 371. In gallina GALATHEAU & HARDER *apiar. obs.* 16. In tarda HARDER *apiar.* p. 78. In cervo VIRIDET *bon chyl.* p. 459. Blandus & iners HECQUET. *dispens. du Carême.*

(a) BRUNNER *pancreat.* p. 91. *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. I.* p. 127. In buteone falsus REAUMUR p. 305. BOHN. p. 131 in ossifraga.

(b) In vitulo KERGER *ferment.* p. 201. 202. in ove MATTEI *anim.* p. 15. REAUMUR p. 495. Subfalsus in agne COLLINS p. 308. MORBIUS. TILING p. 362. MUEALT p. 495. In glire acris TILING p. 361. MORBIUS. In cuniculo MATTEI p. 15. & in lepore Id. in cuniculo piperatus BRUNNER *duoden. c. 5.* p. 92. & in homine VIRIDET p. 475. In castore falsus BERGER l. c. & in lepore MATTEI. in fele Idem.

(c) In cane STRAUS. TILING MORBIUS *de usu ventr.* in fele MATTEI.

(d) TILING *vas. breve* p. 361. MORBIUS p. 188. In gallina SCHOCK *de ferment.* p. 304. In ciconia STRAUS apud VALENTIN. II. p. 54 in falcone (dulcis) BORELL. apud MAEPHIG. *postb.* p. 22. Salsus in aliis avibus COLLINS p. 308.

(e) In squatina COLLINS p. 277. in lupo p. 308. in lucio Jack *Phil. transf.* n. 162. ammoniacalis in harengo Oecon. *Abbandl.* IX. p. 17. Dulcis in piscibus BORELL. l. c. In cancro nitrosus TILING.

(f) Vomitu redditus submuriaticus *Eph. Nat. Cur. III. ann. I.* p. 127. gelatinosus ANEL. *lib. propr.* p. 45.

(g) LIEUTAUD p. 271. GALATHEAU. BOYLE *Phil. Exp. util.* p. 117. BOHN. p. 131. & *de ferment. sang.* BERGER. ASTRUC. *trit. ur.* p. 78. in cane. LISTER *de hum.* p. 157. VALISNERI *Vol. III. obs. III.* p. 139. seq. PINELLI p. 345. GEUDER. DUVERNEY *Mém. avant.* 1699. l. 6. CAPOA *dell' incertezza de medic.* p. 52. seqq. &c.

Compositæ autem naturæ est, ex saliva, alibi descripta: ex liquido exhalante ventriculi, quod credas, ex analogia, & ex certis in pullo-
rum avium ventriculo factis experimentis de lymphæ genere esse: ex suc-
co œsophagi: & pancreatis: & ex mucosum demum glanduloso.

§. XVI. *Arteriæ ventriculi. I. Coronaria sinistra.*

Eum nunc succum, ut omnes, arteriæ generant. Earum plurimæ in
ventriculo ex *Coeliaca* arteria nascuntur, quam, etsi etiam alios ramos
edit melius hoc loco conjunctam describemus.

Rarissime (a) ex communi cum mesentericæ superiori trunco, sæpi-
sime ex aorta, dum inter cruram septi transversæ descendit, in duode-
cima vertebra dorsi (b) nascitur, magna, sed minor tamen quam mesen-
terica (c), ex aortæ anteriori, & sinisteriori paulum sede, ut dextror-
sum & antrorsum se efferat, & deorsum (d).

Ex trunco suo, qui semper brevis est, amat edere phrenicam fini-
stram (e), etiam phrenicam dextram (f) & capsulares (g), ali-
quando pancreaticam (h) ad sedem pancreatis reni sinistro proximam, in-
osculatam ramo phrenicæ sinistræ.

Deinde vel ex uno loco in tres ramos finditur, facto quasi tripode (i):
vel primam producit coronariam majorem (k) & paulo post, non re-
moto loco, in duos truncos discedit, hepaticam, splenicamque, nisi
quod aliquando dextra hepatica ad mesentericam pertinet. Est ubi prior
splenica, deinde ex hepatica coronaria nascitur (l).

Est

(a) Semel vidi *Fascic. VIII. p. 35. Habet PARE' L. II. c. 22. VESLING. Epist. posth. 8. RIOLAN. anacephal. p. 153.*

(b) *Tab. art. tot. corp. ant. EUSTACH. t. 26. in cartilagine inter ultimam dorsi & pri-
mam lumborum vertebra WINSLOW n. 176.*

(c) Lumina sunt uti 900. & 289. *Comm. in Præl. Boerh. T. I. p. 39. & alias dia-
metri ut 17. & 19. Ut 14400. & 16900. SENAC du cœur. p. 247. Diametros facit ut 13.
ad 14. HELVETIUS Lettre au sujet de la critiq. &c. p. 181. seq.*

(d) *Tab. coeliac. not. e. tab. corp. ant. HEUBERMANN T. III. tab. 3.*

(e) *Conf. not. f. WINSLOW n. 176. WALTHER coeliac. S.*

(f) *Tab. art. corp. tot. ant. & WINSLOW T. III. n. 172. 176. Fasc. II. 3.*

(g) *Ibid. not. f. & PETSCHÉ n. 49.*

(h) *Fascic. III. p. 32.*

(i) *Tab. corp. anat. C. D. E. EUSTACH. t. 27. f. 4. LOWER de corde p. 214. WINS-
LOW n. 178. LIBOTAUD p. 485. WALTHER ten. port. HEUBERMANN l. c.*

(k) *Tab. coeliac. l. R. & not. nostr. f. WALTHER obs. 3. STULELEY of the spleen, G.
WINSLOW n. 177.*

(l) *Not. f.*

Est etiam uti prior prodit coronaria, & tamen tripus adest coeliacæ in hepaticam dextram, sinistram, & splenicam divisæ (*m*). Vidi coronariam ex aorta prodierit (*n*). Ex splenica etiam, sed rarius nascitur (*o*).

Prima ergo, minor tamen (*p*) coeliacæ propago, coronaria superior (*q*), sinistra, vel major, addit se principio sinistro arcus ventriculi (*r*) minoris, exeuns antrorsum & sinistrorsum.

Dat nonnunquam phrenicam sinistram, aut utramque (*s*), aut pancreaticam peculiarem, quæ cum vena portarum descendit, & cum pancreaticis a mesenterica natis se conjunxit (*t*).

Peculiarem solet ibi edere oesophageam (*u*), quæ in thoracem veniens cum furculis ibi natis inosculatur.

Edit eodem loco coronarium (*w*) ramum, peculiariter eo nomine dignum, qui ad coronæ modum, non tamen ut circulum manifestum efficiat, oesophagi ad ventriculum limitem ambit. Edit is unum alterumve ramum sursum in oesophagum (*x*); & plerisque aliis deorsum in ventriculi cæcum saccum absumitur (*y*), cum splenicis conjunctus.

Sequuntur ad utramque planam faciem ventriculi rami aliquot (*z*).

Præci-

(*m*) Tab. Coel. II. S.

(*n*) Ibid. Fascic. II. not. f.

(*o*) Habet GUNZ obs. n. 10.

(*p*) Habet tamen STUKELLY venam imitatus tum EUSTACH. t. 27. f. 4. ~~VERHEYEN~~ VERHEYEN t. 38. c. KULMUS t. 16. CASSER L. VI. tab. I.

(*q*) Valde parva EUSTACH.

(*r*) COWPER t. 3. n. 39. Gastrica major. C. BAUHINO. Gastrica GLISSON ~~ven.~~ tric. & int. p. 116. Gastrica sinistra KELLIO abrigd. p. 342. Epigastrica LOWERO Stomachique coronaire WINSLOW n. 177.

(*s*) Tab. coeliac. I. WINSLOW n. 179.

(*t*) Tab. coel. I. Y.

(*u*) Fasc. II. not. g.

(*w*) Tab. coeliac. I. Z. & not. g. EUSTACH. tab. 27. f. 2. 4. STUKELLY VESAL. p. 454. & C. WINSLOW n. 179.

(*x*) Fascic. VIII. l. c.

(*y*) Not. g.

(*z*) Tab. coeliac. I.

Præcipuus demum truncus coronariæ (a) in duos ramos dividitur, anteriorem (b), & posteriorem (c), etiam tres sibi similes (d).

Eorum vel uterque, vel posterior, secundum arcum ventriculi minorem dextrorsum excurrit, & cum coronaria parva, hepaticæ propagine (e), insignem anastomosis facit, ut non minimi trunci contrario ductu in unum coalescant.

Sed ab eadem coronaria & in anterius planum ventriculi, & in posterius, maximi rami eunt, & versus arcum majorem protensi (f.), cum sulculis gastroepiploicarum & brevium in rete consentiunt.

Reliquus truncus ejusdem coronariæ circa lobulum spigelii inflexus per sulcum ductus venosi hepar adit, plerumque exiguus (g), aliquando tamen ita insignis, ut alterius sinistræ arteriæ hepatis nomen mereatur. Dat etiam diaphragmati (h).

§. XVII. II. Splenica.

Hic ramus, etsi ab alio viscere nomen habet, tamen magna parte sui ad ventriculum pertinet.

Splenica arteria rarissime ex aorta (a), neque enim unquam vidi, longe plerumque ex coeliaca nascitur, paulo postquam prodiit coronaria (b). Inde incurvo quidem, sed acuto fatis angulo (c), sinistrorsum & potius retrorsum se confert, secundum oram superiorem (d) pancreatis, & posteriorem (e), in universum in arcum flexa, sursum
cavum

(a) *Tab. coel. I. b. not. h.* EUSTACH. l. c. VESAL. l. c. STUKELEY l. c. WINSLOW n. 180. LIEUTAUD p. 433. CASSERUS l. c.

(b) *Fascic. VIII. l. c.*

(c) *Ibid.*

(d) *Ibid. Fascic. II. l. c.*

(e) *Ibid.* EUSTACH. f. 4. LEONCENA in *Phil. trans.* n. 280. WINSLOW ib. Hepaticæ inferi PETIT ad PALFYN. p. 353.

(f) *Conf. tab. x. coel.*

(g) *Tab. coel. I. & not. g. h. add.* WINSLOW n. 181. PETSCHEN n. 50. HEUERMAN T. III. p. 714. GUNZIG & olim RHOD *manif.* n. 43. Hepatica prima WALTHER l. c. b.

(h) *Not. h.* WINSLOW n. 181.

(a) Ita RIOLAN. in LAURENT. p. 641. *Enchirid.* p. 244. DRELLINCOURT de liene t. I. n. 8. LINDEN *physiolog. reform.* p. 817.

(b) *Tab. coel. I. g.*

(c) *Tab. coel. I.* HEUERMAN l. c.

(d) *Tab. coel. II. ic. & not. e.*

(e) WINSLOW n. 190.

carum (*f*), sed serpentinis (*g*) alternis flexibus, eo evidentius, quo magis cera repleta fuerit.

Finem utique facit sui in lienem, secundum cujus finem, ventriculo obversum, in omento gastrocólico conflexa adscendit, quando inanis est ventriculus, aut antrosum emergit, quando plenus (*h*). Inde plures, ad decem (*i*), ramos in id viscus infigit, quasi in foramina (*k*) mersos. Aliqua (*l*) lienalium aliquando ex medio pancreate ad suum viscus accedit.

Verum eadem ventriculi curvaturæ majori plurimos ramos impertit, quorum primus (*m*) aut ex lienalium maxime postica arteria, aut paulo prius natus, ad duas tertias finemve pancreatis (*n*), aliquando etiam ex medio pancreate prodit. Is secundum ventriculi magnum arcum antrosum, dextrorsum, cum arcu migrat, in omento: ad aliquam a ventriculo distantiam (*o*). Est *gastroepiploica sinistra* (*p*) quæ non raro aut splenicæ arteriæ verus truncus est (*q*), aut certe alter ramus princeps, ut splenicæ propagines alterum ramum efficiant.

Ejus rami gastrici ad utrumque planum ventriculi adscendunt, & cum surculis coronariæ (*r*) utriusque in retia coeunt. Abeunt autem ad ventriculum per omentum (*s*).

Rami epiploici in omentum gastrocolicum, ejusque utramque paginam abeunt, pariter reticulati (*t*).

Eorum aliquis, ex primis, per medium omentum productus, apud

T 2

veteres

(*f*) Fascic. VIII. p. 34.

(*g*) ARANT. *obs. anat.* c. 35. CASSER. L. VIII. t. 9. f. 1. RUYSCH *Epist.* VII. tab. 4. DRAKE l. c. 41. BIDLOO t. 36. f. 1. WALTHER *ven. port.* WINSLOW n. 194.

(*h*) p. 120.

(*i*) Tab. *coeliac.* II. not. c. & ic. conf. Fascic. VIII. Ad quinque WINSLOW n. 195.

(*k*) CASSER L. VI. T. 1. L. VIII. t. 9. f. 1.

(*l*) Fasc. VIII. l. c.

(*m*) EUSTACH f. 2. 4. STUKELRY t. 1.

(*n*) Not. g.

(*o*) Icon. *Coel.* II.

(*p*) De MARCHETT & C. Habet VESALIUS p. 491. ic. p. 484. E. *Gastrica sinistra* WINSLOW n. 191. LIEUTAUD p. 491.

(*q*) Tab. *coel.* II.

(*r*) WINSLOW n. 191.

(*s*) Tab. *coel.* II & not. c.

(*t*) WINSLOW n. 191.

veteres *epiploica sinistra* (u) nomen gessit, & anastomofin cum dextris omentalibus fecit.

Ipse truncus vel majori anastomofi (w), vel minori aliqua (x), cum gastroepiploica dextra in continuum arcum abit, postquam tertiam, & ultra, longitudinis ventriculi partem emensus est, semper tamen dimidia minorem.

Sunt etiam ex primis ejus ramis aliqui pancreatici (y), & aliquando lienales aliqui (z), tum rami perpetui ad mesocolon & ad ligamentum lienem sustinens (a).

Porro & ex sinu lienis, aque ramis ipsis lienalibus (b), & ex trunco, inter nascentes ex ordine splenis trunculos (c), numerosæ arteriæ, ad quinque (d), cum omento gastrocolico ad ventriculi tuber veniunt; eæ inosculatæ (e) coronariis a gastroepiploica sinistra, natis, & ad usque ipsum insertum oesophagum, & ad ligamentum in quod omentum definit, ramulis suis excurrunt. Sunt venarum *brevium* comites arteriæ.

Surculi ex ea sede aliqui ad diaphragma per ligamentum oesophagenum veniunt, alii redeunt ad pancreas & ad mesocolon (f).

Sed neque valde rarum est, a splenica, dum secundum pancreas migrat, jam vicina lieni, unam alteramve arteriam (g) in planum posterius ventriculi, sub oesophago, prope arcum minorem (h), venire, non in eodem cum brevibus arteriis ordine, & quam ex posterius.

Rarius

(u) Ibid. Fascic. VIII. C. BAUHIN. D. d. MARCHETT. LIEUTAUD p. 490. VESALIUS p. 484. ad γ. & ι. & c.

(w) EUSTACH. tab. 27. f. 4. tab. nostr. II. & I. & not. e. STUKELLY WINSLOW n. 192.

(x) Hinc inconspicua EUSTACH. f. 2.

(y) WINSLOW n. 192. Not. e.

(z) Not. c. LOWER p. 214.

(a) Not. e. & Fasc. VIII.

(b) Not. e. tab. post. O. O. Fascic. VIII. Unum STUKELLY. Habet VESAL. p. 484. 5. WINSLOW n. 194.

(c) Fasc. VIII.

(d) Unicam veteres RHOD. mantiss. obs. n. 29. Plures esse RHOEN. in Laurent. p. 660. Tres, quatuor, TILING. Vasc. brev. p. 105.

(e) EUSTACH. f. 4.

(f) Not. e.

(g) Tab. coel. II. k. not. f. & Fascic. VIII. EUSTACH. t. 27. f. 2. 4. CASSERL. V. t. I. WALTHER ven. port. p. XI.

(h) Fasc. VIII.

Rarius est, ex splenicæ origine peculiarem *pyloricam* ad partem pylori posteriorem, & ad fasciculum vasorum biliariorum ivisse (i). Ejus locum alias pancreatica peculiaris tenet, suprema sodalium: & dextrorsum trans pancreatis caput, retro pylorum, ad duodenum missa & ad pancreas (k), cum pylorica & pancreaticoduodenali inosculata. A coeliaca, etiam (l) a coronariæ trunco, & ab aorta vidi (m) hanc arteriam prodiisse.

Denique fere ex origine splenicæ ramum ad mesocolon transversum ramum vidi ivisse, omentalibus & colicis ramis inosculatum (n).

Reliqui rami splenicæ, dum pancreas sequitur, id viscus numerosi adeunt (o), cum pancreaticis a mesenterico trunco natis varie inosculati.

Omnino quam hepatica minor est. In junioribus reperi, splenicam o. 000144. & o. 00081. hepaticam o. 000149. & o. 000336. (p). In adultis hominibus hepatica, ut totum hepar, minor est, atque adeo ratio splenicæ crescit.

Vidi secundam arteriam splenicam (q), prius ex coelicæ trunco ortam, quæ per pancreatis apicem lienem adiit, inque ejus visceris sinu inosculata fuit cum lienali vulgari.

§. XVIII. III. Hepatica (a).

Maximus ramorum coeliacæ, & verus ejus plerumque continuus truncus est.

Pergit dextrorsum, antrorsum, sub papilla lobuli spigeli, per proprium ejus lobuli sulcum, tunc secundum arcum minorem ventriculi, ad pylori sedem, & vesiculæ felleæ. Ibi in duos ramos plerumque finditur (b), hepaticum, & gastricoduodenalem, hunc minorem. Iste edit (c) *coro-*

T 3

nariam

(i) Tab. I.

(k) Tab. coel. II. not. e.

(l) p. 144

(m) Tab. II. l. c.

(n) Fascic. VIII. l. c.

(o) Tab. coel. II. i. EUSTACH. l. c. f. 2. 4. WINSLOW n. 190. WALTHER.

(p) Praelect. in Boerb. T. III. p. 45.

(q) Tab. coel. I. f. not. b.

(a) Tab. coel. I. Conf. WINSLOW n. 182.

(b) EUSTACH. tab. 27. f. 2. 4.

(c) Conf. not. m. ad Fasc. II. tab. art. coel. Puto pingi apud EUSTACHIUM t. 27. f. 2.

nariam dextram minorem (d); nisi ea, ut non raro fit, ex trunco hepatico ante divisionem prodit.

Ea per arcum minorem ventriculi, sinistrorsum redit, atque majori coronariæ (*e*) occurrit, & inosculatur, similesque ramos in ventriculum inque gastroepiploicarum dextrarum occursum edit ut dextra: Surculos etiam dat omento hepaticogastrico, & ductibus bilariis, cum cysticis inosculatos (*f*). Minimam vidi fuisse, ut totus arcus minor a coronaria dextra ramos suos haberet.

Truncus *gastricoduodenalis* (*g*) minor plerumque, aliquando tamen trunci nomine dignus (*h*), pone pylorum se recipit (*i*). Edit, primam *pyloricam superiorem vel dextram* (*k*): quales etiam coronaria parva alias dat, aut hepatica (*l*). Ea per anteriora pylori facit circellos, & cum pylorica inferiori, & cum gastroepiploicis dextris ventriculi arteriis, cumque duodenæ ramis connexos (*m*).

Dat porro truncus aliquando hepaticam parvam in fossam umbilicalem (*n*), & minores aliquas pyloricas, & *pyloricam* (*o*) *inferiorem* dextrorsum & sinistrorsum divaricatam, in ventriculum & in duodenum, & ventricularibus, atque duodenæ primæ inosculatam.

Inde truncus emergit sub duodeno, & denuo dividitur. Ramus *pancreatico duodenalis* (*p*), circumlegit arcum cavum duodeni sinistrorsum versum, & ei intestino, & pancreati prospicit; cui ramum aliquem majorem, longe *transversum* (*q*), sinistrorsum euntem impertit, cum aliis pancreaticis a splenica, aq. coronaria (*r*), & a mesenterica, & a gastroepi-

(*d*) *Pylorica GLISSONII COWPERI WALTHER Ven. port. WINSLOW n. 183. Gastrica dextra C. BAUHINI J. de MARCHETTIS p. 37. VERHEYENII Habet CASSER. L.V. tab. I. G.*

(*e*) p. 146 EUSTACH. f. 2. WINSLOW ibid.

(*f*) Not. m. l. c.

(*g*) *Gastrica dextra WINSLOW n. 184.*

(*h*) Fasc. VIII. p. 38.

(*i*) Not. p. ic. I. & ic. II.

(*k*) Conf. Fasc. II. not. n. ic. I. Est *gastrica dextra minor WALTHERII a.*

(*l*) NICOLAI direct. vas. p. 64.

(*m*) Not. cit. n.

(*n*) Fascic. II. not. p.

(*o*) Fasc. II. t. 2 a. a. Fascic. VIII. p. 44.

(*p*) Fascic. II. T. I. T. II. b. *Duodena WINSLOW n. 184. 186. HEISTERI. WALTHERII. Intestinalis C. BAUHINI, DIEMERBROEKII.*

(*q*) Fascic. II. T. I. q. T. II. d.

(*r*) Fascic. VIII. p. 33.

stroepiploica (s) natis inosculatum. Is ramus & omento furculum dat (t), etiam mesocolo transverso, colicis mediis irretitos (u).

Duodenalis vero ramus cum duodena superiori (w) convenit, cumque melentericis, & ex eodem ramo duos manifestos arcus habet (x), estque is ramus, quem dixi cum duodena dextra coire (y), & cum pancreatica ex splenica nata (z), & cum pancreatica transversa (a) communicare. Aliqui ejus furculi in peritonæum renale abeunt. Ex mesenterico ramo hepatico nata visa est (b).

Eo ramo edita reliquus truncus, nunc *Gastroepiploica dextra* (c) dicitur, eaque trunco suo per omentum colicogastricum incedit, ad aliquam a ventriculo distantiam (d), & hinc omentales edit numerosissimas, primas ad colicum omentum (e), alias ad colicogastricum, ejusque anterius folium. Harum aliqua dexterior, & major, olim *epiploica dextra*, dicta est. Ejus rami in laminam posteriorem omenti circumducti denique ultimis furculis ad colon veniunt, inosculatæ colicis. Anteriores demum in omento colicogastrico pulcherrima retia (f) faciunt. Dedit etiam vesiculæ fellis furculos, cum omenti minoris parte membranacea advenientes; aliqui etiam ex primis ramis pancreas adeunt, cum *transversali* inosculatæ.

Inde e regione in ventriculum, ejusque planum anterius & posterius furculos dat (g) ex ordine, cum coronariis superioribus in rete intricatos, & cum pyloricis, & reliquis gastricis.

Denique

(s) Ibid. p. 34.

(t) Fasc. II. l. c.

(u) Fascic. II. t. 2. b. Fasc. VIII. p. 34.

(w) p. 152.

(x) Fascic. II. T. I. s. T. II. b. f. not. d. Fasc. III. p. 44. WALTHER EUSTACH. l. c.

(y) Fascic. VIII. p. 33. 34.

(z) p. 149. Fascic. II. t. II. Fasc. VIII. p. 32.

(a) Fascic. II. t. 2. d.

(b) WINSLOW n. 186.

(c) Fascic. II. tab. 1. 2. not. r. EUSTACH. i. c. CASSER L. V. tab. 1. ad G. C. BAUHIN. GLISSON. Gastrica major. SPIGEL L. IV. tab. 8. f. 1. 2. Gastrica dextra WINSLOW n. 184. Coronaria inferior COWPER 35.

(d) Fasc. II. t. I. II.

(e) Fascic. VIII. p. 34.

(f) DIEMERBROECK. VERHEYEN. KULMUS. LIEUTAUD p. 489. Plures WINSLOW n. 185.

(g) RUYSEN Thes. II. tab. 5. f. 2. CASSER L. VII. tab. 3. L. VIII. tab. 4. f. 2.

Denique vel majori, ut frequentius est (*b*), vel obscuriori aliqua anastomosi, in arcum cum gastroepiploica sinistra coit (*i*).

Reliquus truncus, *hepatica*, continuo dividi solet, plerumque in duos (*l*) ramos, nonnunquam in tres (*m*), & tunc medius coronariam parvam, ramulos biliariorum ductuum, & duodeni, inque anonymum & sinistrum lobulum versus dat arterias, In solita magis fabrica ramus *sinister* (*n*), etiam prius quam duodena natus (*o*), tenet locum in fasciculo vasorum hepaticorum sinistram, & anteriorem, ante venam putarum (*p*).

Edit sæpe coronariam minorem, furculum ad omentum gastrohepaticum, & per fossam venosam peculiarem hepaticam (*q*). Edit inde *duodenam superiorem*, alias a duodenali natam, aut a dextra hepatica, quæ circa convexum arcum duodeni, per posteriora capitis pancreatis circumflexa, decussans ductum choledochum, duodeno, & pancreati, ramos exhibet, cum aliis pancreaticis vasis bilariis insertis (*r*) mistos; & in ima parte descendens duodeni sinistrorsum recurva, demum duplici anastomosi in duodenalem sinistram, modo dictam, & in mesentericam (*s*) se immittit.

Reliqua dicentur, quando de hepate sermo erit.

§. XIX. Arteriarum ventriculi communia.

Multis ex locis & truncis hæ arteriæ adveniunt, ob multiformem puto ventriculi figuram, in quam unicus truncus minus æqualiter se distribuisset, aut nimis, qua adiret, robustus, aut non par transmittendo ad remotos ramulos sanguini, si tenuis foret.

Omnes

(*b*) EUSTACH. l. c. *Fascic. II. t. 1. 2.*

(*i*) LEONCENA.

(*k*) HERBSTREIT.

(*l*) EUSTACH. f. 1. 2. 4. STUKELEY. PLEHLIN. obs. 58. *Cap. I.*

(*m*) *Fascic. VIII. p. 33.*

(*n*) *Tab. Coel. I.*

(*o*) WALTHER *nerv. intercost. c. II.*

(*p*) *Fasc. II. not. o. ic. I.*

(*q*) *Fascic. VIII. p. 33.*

(*r*) *Fascic. II. not. p.*

(*s*) *Fascic. II. not. p. WALTHER l. c. EUSTACH. t. 27. f. 2. 4.*

Omnes autem ii diversi trunci (a) inter se consentiunt, ut compressis omnibus, unicus, qui liber fuerit, provideat universo visceri: in unum etiam injecta materia repletum, turgeant omnes.

Omnes in trunco suo, coeliaca, innumerabilibus nervis (b), obnubuntur, quodcumque demum in ejusmodi plexu naturæ fuerit consilium. Serpenti (c) in modum flectuntur omnes, ut possint obsequi extensioni ventriculi, neque disrumpi, quando a flatu mire turget, aut a nimio cibo.

Omnium ea est distributio, ut truncis suis rete majus faciant in cellulosa prima (d): perforent fere absque ramis musculosam (e); secundum & tenuius rete faciant (f) in cellulosa altera: perforent nerveam: faciantque rete (g), minimorum ramorum, in cellulosa tertia, quos villosa tunica sola tegat, facillime rumpenda, si eo præsidio caruerint. (h).

In exhalantes villos sanguis post mucum non difficulter subit, ut vomitus cruenti absque magno periculo fiant, potissimum a suppressis mensibus (i). Hinc neque vas ruptum eo in casu non invenitur, neque erosio (k).

Sic injectus in arterias hydrargyrus facile in venas transit (l), etiam in cellulosam tunicam (m).

§. XX. *Venæ ventriculi.*

Rectius eæ conjunctæ tradentur, quando cum hepate vena portarum describetur (a). Nunc sufficiat dixisse, venarum truncos in universum arterioso-

(a) P R I T S C H E n. 52. add. V I E U S S E N S obs. d'anat. & de med. prat. p. 67.

(b) L. X. p. 263.

(c) P R I T S C H E n. 37.

(d) p. 124. 125.

(e) p. 128. &c.

(f) p. 130.

(g) p. 132.

(h) Sanguis effluxit, cum in cadavere mucus (villosa tunica) detergeretur G L I S S O N ventr. int. p. 382.

(i) Conf. C. S T A L P A A R T van der W I E L obs. 17. Cent. post. & L. XXVIII. Sect. III.

(k) G. V. S W I E T E N T. III. p. 126. 127. G L I S S O N ventr. & intest. l. c.

(l) V I E U S S E N S traité des Liq. p. 255. 256. obs. d'anat. & de med. prat. p. 64.

(m) I D E M ibid.

(a) L. XXIII.

arteriosorum focios esse: tantum ut ex splenica quidem vena, brevissima (b), & posteriores (c) venæ gastricæ, & gastroepiploica sinistra (d) & coronaria major (e) trunco; vena vero coronaria minor ex trunco venæ portarum (f), aut ex ramo a vena portarum nato; aut ex gastroepiploica proveniant. Porro vena *duodena superior* (g) & *inferior* (h), & vena *dextra gastroepiploica* (i) & *pylorica* (k) ex proprio trunco gastrocolico (l) ad mesentericam venam spectante nascuntur, aut ex eadem seorsim (m) prodeunte, aut a vena portarum (n), aut a splenica.

Deinde venarum rete primum potius arterioso uberius est, veriusque reticulatum, & anastomoses, quas arteriæ, venæ etiam majores habent.

Omnes etiam ventriculi venæ (o), & quidem omnes venæ ex trunco portarum natæ, absque valvulis sunt, ut in universo eo systemate ad portas pertinente valvulæ desiderentur.

Venam aliquam a cava venire ignoro, nisi huc aliquas anastomoses referas, qualem inter venam renalem sinistram & gastricam sinistram ILL. SCHMIEDEL vidit (p); aut venam, qualem ipse vidi, ab azyga in coronariam dextram communicantem; aut vasis brevis cum sinistra phrenica (q) conjunctionem.

Non potest autem præteriri error, apud veteres equidem potentior, nostro seculo obsoletus, quo vena brevis, aut vas breve, (nam multas venas in unam contrahunt) dictum est, in ventriculum aperiri, eo-
que

(b) EUSTACH. l. c. FONTAN. ad VESAL. *Epit.* p. 22. Dixit & plurima, GUNTHER p. 26. Ex trunco splenicæ raro venite. BERTRANDI *hist.* p. 12.

(c) VESAL. L. III. l. c. O. O. ex coronaria. Ex splenica Id. U. L. V. f. 3.

(d) EUSTACH. *ibid.* VESAL. *ibid.* WINSLOW n. 257.

(e) EUSTACH. l. c. f. 24. VESAL. III. c. 5. p. 444. ROLFINK p. 1150. WINSLOW n. 254. Ex trunco venæ Portarum SALZMAN *Ep. ad HORST* p. 448. WINSLOW n. 255. WENKER *vuln. ventr.* p. 15.

(f) EUSTACH. f. 2. VESAL. l. c. WINSLOW n. 238. & similiter vidi se habuisse.

(g) WINSLOW n. 239.

(h) Conf. interim *comment. in Boerb.* T. III. p. 82.

(i) EUSTACH. f. 4. WINSLOW n. 239. 243. 244. 245. LEONCENA E. *conf. Comment.* T. III. p. 83. *Fascic. III.* l. c. *Art. mes.* p. 44. b. Ex trunco venæ portarum WALTHER p. IX.

(k) *Comm.* T. III. p. 87.

(l) WINSLOW n. 244.

(m) EUSTACH. f. 2. VESAL. L. III. l. c. L. V. f. 3. 4.

(n) CASSER *tab.* 1. L. V.

(o) STAHL. SALZMAN *ven. port.* WINTRINGHAM *enquir.* p. 292.

(p) *Variet. vasor.* p. 26. n. 19.

(q) HABICOT. D. 1. *Lect.* II. p. 39.

que acidum succum atramve bilem (*r*) destillare, quæ a liene adveniat, & ad ciborum coctionem utiliter ferviat, & appetitum faciat (*s*), & ventriculum stimulet, & ad excretionem faecum (*t*) sollicitet.

Paulum aliter A R E T A E U S , lienem purgamenta sanguinis recipere (*u*): quæ ita ornat O R I B A S I U S (*w*), ut lien eos humores ex hepate adtractor commutet, inque ventriculum per vas breve effundat.

Eam opinionem J. B A P T I S T A ab H E L M O N T ita auxit, ut acor peculiaris ingenii (*x*), diversus a chemico acore, fermenti nomine dignus, ex liene, per vas breve ventriculo adspiret (*y*), qualia etiam alii sunt imitati (*z*).

Adduxerunt etiam testimonium sanguinis succive atri & sanguinolenti, qui frequentissime vomitu (*a*) redditur, & quem per vas breve in ventriculum venisse persuadebantur (*b*); & quem ipsum ex liene venire sanguinis in eo viscere conditio suaderet, tum ejusdem visceris, quando sanguinem ejusmodi aegri reddebant, tumor immensus (*c*); & experimentum, cum pressa liene ea materiis in ventriculum effunderetur (*d*).

Etiam notas in membrana ventriculi iis vasis respondere addiderunt, tanquam poros (*e*); & venas breves in splenetico homine sanguinem revomente cruore plenas fuisse (*f*).

V 2

In

(*r*) GALEN. *de usu part.* L. IV. c. 3. L. V. c. 5. NEMES 28. ORIBAS. p. 118. LAURENT. p. 325.

(*s*) GALENUS *ibid.* RIOLAN. p. 118. NEMESIUS. AVICENNA L. I. *fen. I. doctr.* 5. *summ.* 5. c. 2. RHAZES ad MANSOR. L. I. c. 2. C. STEPHANUS p. 179. BARTHO- LINUS p. 170. TANCREDUS p. 31. Arabibus tribuit HOFMAN de Liene. Acido salsum facit TILING *vas. breve* p. 106.

(*t*) AVICENNA.

(*u*) *Diut.* L. c. 15. ORIBAS. p. 118.

(*w*) *Ibid.*

(*x*) *Sextuplex digest.* n. 2. 3. 4. 11. 12. 13. 14. &c.

(*y*) *Ibid.* n. 11. p. 168. *Pylor rect.* n. 26. p. 185. WILLIS *de ferment.* c. 5.

(*z*) Halitum in avibus acidum CORNELIUS *Consent.* p. 227.

(*a*) *Journ. de med.* 1758 m. Mart. SCHURIG *chylol.* p. 474. 475. Per vomitum liquor niger *lettera* al S. CURZIO p. 23. 24. etiam felici eventu CARDAN. *ad aphor. bipp.* p. 253. Conf. MORG. *sed. & caus. morb.* II p. 23. 130. SCHENK *de trib. coction.* HOECHSTETTER *Decur.* II. *Cas.* 5. Nihil aliud est morbus siamensis TITSING *genees konst.* p. 131.

(*b*) Ostium in ventriculo apertum fuisse VALVERD L. VI. c. 5. p. 267. WEDDE *phy- siol. reform.* p. 120. calamo aequale BARTHOL. *hist.* 61. Cent. III.

(*c*) In sanguinis vomitu lien triplo major TILING. *digress.* p. 182. A sanguinis vomitu tertia pars lienis consumpta SCHURIG *chylolog.* p. 460.

(*d*) VALVERD L. c. Meatum dicit C. STEPHANUS p. 179.

(*e*) RIOLAN. in LAURENT. p. 660.

(*f*) BARTHOL. *hist.* 80. Cent. I. Vasa coronaria turgida HORST. Venæ breves non raro varicibus obsidentur, etiam apud Cl. BERTRANDUM p. 12.

In cane, cui lien erat excisus, ventriculus cibo putrido plenus (*g*) & cum liene crusta lapidosa obstructo morbus niger (*b*) conjunctus fuit.

Et credam equidem, materiam eam, cujus effusionem renovato nomine morbum nigrum in Gallia vocare solent, utique per vomitum, & per concussiones abdominis vehementissimas, quæ vomitum faciunt, de liene forte & de hepate, contra circulationis leges retroagi, ventriculi vasa tumefacere (*i*), demumque ruptis iis in ventriculum effundi, cum præterea venæ breves valvulis destituantur (*k*). Manifesto lienem durum, callosum, majorem, in ventriculum, cum premeretur, materiem dare vidit Cl. MUZELIUS, qualem æger vomendo reddebat (*l*). Et lien obstructus sæpe expeditur, sanguine per vas breve exeunte, ut ægri morbo liberentur. Denique cum hepatis scirrhus, qui reducis a ventriculo ad portarum venas sanguinis iter impedit, vomitus sanguineus & vasa coronaria turgida (*l**) fuerunt.

Non ideo tamen hæc naturalis sanguinis per venas breves fluentis via (*l***) est: quam utique sanguis a ventriculo ad lienem relegit, non contra; ut etiam vinculis injectis (*m*), tumor ostendit ventriculo propior, dum sedes venæ lieni vicinior inanitur. Neque ea vena unquam in ventriculum pertunditur (*n*), & si fuisset pertusa, nihil esset hic brevibus vasis peculiare. Nam & venæ gastricæ in morbo nigro ruptæ fuerunt (*o*), & cum morbo nigro splen parvus est repertus, bonumque hepar (*p*).

Longe minus in sano homine acidum quid (*q*) in eo sanguine est, sive sanguinem, sive bilem, sive vaporem dixeris. Acor enim in sano sanguine

(*g*) MEAD. apud STUKELBY p. 46.

(*b*) HOFMAN *morb. lien.* n. 6.

(*i*) FUSE id demonstrat STUKELBY p. 31.

(*k*) BARTHOL. *hist.* 60. *Cent.* IV.

(*l*) *Obs.* p. 28.

(*l**) HORST. A scirrhus hepatis vomitus cruentus BOHN. p. 251.

(*l***) Cl. MACOPPE & alii id senserunt apud ROTARI *oper.* p. 142. *seq.*

(*m*) DRELCINCOURT *canicid.* 8. add. MALPIGHI *de liene* p. 115. WALAEUM ad BARTHOL. p. 775. nempe sanguinem a liene ad hepar ferri. Vide *hujus operis* L. II. p. 213.

(*n*) VERSAL. *de rad. chin.* p. 196. *de fabr. corp. hum.* p. 630. Cl. HOFMAN *de liene* c. 19. P. A. MOLINETTI in peculiari folio. Negat pertusam fuisse in morbo nigro CLAUDER *obs. præct.*

(*o*) PALFYN ex Cl. LARBERI editione T. II. p. 118.

(*p*) GUARINONI *cas.* 388.

(*q*) Ex primis acorem ex Liene refutavit SCHNEIDER *de catarrh.* L. III. p. 43.

sanguine obscurus, per multa demum experimenta, separatis principiis, manifestus constitui potest (r).

In liene, etiam cocto, nullum acorem (s) reperiri constat: Neque infusum lac aut succum violarum mutat (t), neque austeritas in liene est, nisi tota massa sanguinea aceat (u); id is ipse discipulus SYLVII confirmat, qui vasis brevis usum fictitium se evertisse gloriatur (w).

§. XXI. *Nervi ventriculi.*

Numerosi sunt, ex pare vago potissimum nati, ventriculo destinati nervi. Adveniunt cum oesophago, duplici, uti descripsimus, plexu (a) anteriori minori, posteriori majori.

Ex utroque fasciculo plexus circa dextra sedem ingredientis oesophagi permagnus nascitur (b), qua sede etiam sensus acris est, & in deliquium animi facile transit, vel ex oscillatione, vel ex vomitus primis conatibus, vel ex veneno maligno miliari ad ventriculum re percusso, vel simpliciter ex titillatione cutis, quæ ei sedi respondet.

Accedunt ad saccum sinistrum nervi ab intercostali plexu coeliacam amplexo (c); tum ad pylorum (d); aliique ab hepaticis (e).

Sensus interni ventriculi (f) acris (g) est, potius vehementior quam intestinorum (b). Aliquoties colicas ventriculares expertus, a flatu natus, levabar, quamprimum causa mali in intestina transierat. Dolor intolerabilis a calculis (i) subnascitur. Multo acrius quam cutis etiam nuda ventriculus sentit,

V 3

(r) L. V. p. 94.

(s) GRUDER *ferment.* p. 182. de la FONT *de tympanite* p. 144. CHARLETON *Exerc. pathol.* p. 131. BOHN *duumvir. hypoch.* n. 28. seq. VIRIDET in nefrende *prim. coct.* p. 66.

(t) BOHN *ibid. circul. anat.* p. 258. Sal marinus in eo infuso fuit IDEM *duumvir.* n. 30.

(u) SCHUYL *de natura & usu lienis* Leid. 1664.

(w) *Diff.* V. n. 15.

(a) L. X. p. 236. 237.

(b) WILLIS *fig.* XI.

(c) L. X. p. 262.

(d) *Ibid.*

(e) p. 261.

(f) Vidit Cl. v. Bos *viv. corp. ham. solid.*

(g) Dolor ab ulcere ventriculi HILDAN. L. III. *obs.* 20. a scirrho BOSCVS *facult.* p. 21. G. v. SWIETEN III. p. 151. BARRERE *nouv. obs.* p. 213. 214. In vomitu *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 230. ab omento elapso POTT. *rupt.* p. 64.

(b) Fatetur WHYTT *physiol. ess.* p. 155. Tactus, ut recedit a lingua, ita debilior fit HARTLEY p. 151.

(i) CARDAN. *contrad.* L. II. tr. 5. p. 175.

tit, aut quam lingua: Aqua laurocerasi instillata oculum non adficit, & tamen pota canem inter horam enecat (*k*). Antimonialia medicamenta vulnera cutis exsiccant, & tamen vomitum movent (*l*). Arsenicum, quod linguæ nihil quidquam sensus imprimit, ventriculum in horridas convulsiones ciet, lateque inflamat (*m*). Vitrum antimonii gustu non acre est, & tamen ad mortem (*n*) usque vomitum movet. Insipida infusio antimonii ventriculum tamen subvertit (*o*). Ricini tertia species semen habet dulce, ut amygdalæ, & tamen vehementer purgans (*o**).

Et si præterea ad vomitum movendum acrius, quam ad alvum ducendum pharmacum requiritur, intelligitur majorem violentiam posci, ut motus ventriculi invertatur, minorem, ut intestinorum contenta naturalem viam sequantur. Mire cæterum vires tollunt, quæ ventriculum adficiunt. Cholera subito robustissimum hominem frangit. Ex dolore ventriculi deliquium funestum animi (*p*), & ex sola fame (*q*), vel (*r*) foda.

Neque alia via ad mortem brevior est, venenis vehementer acribus in ventriculum receptis, ut sublimato hydrargyro (*s*) qui vix deglutitus tenaces alioquin vitæ suæ bestias exstinguit; nuce vomica, quæ nondum fere ventriculum ingressa, convulsiones (*u*) lethiferas sciit; arsenico (*w*), drasticeis medicamentis (*w**) aliis. Solent autem per inflammationem ventriculi fere occidere. Adde post nostra, experimenta Clar. HILDE-
FELDI in scylla (*x*), staphisagriæ semine (*y*), gummi guttæ (*z*), oleo anisi (*a*), nuce vomica (*b*), cocculis (*c*), viridi æris (*d*), tur-
pheto

(*k*) CANGRISH *Exper.*

(*l*) WEPFER *cicut.* p. 83.

(*m*) PECHLIN, *purg.* p. 151.

(*n*) MEIBOM *de ulcerib.*

(*o*) HARVEI *Exerc.* 53. *de gener. anim.*

(*o**) LEWIS, *mater. med.* p. 469.

(*p*) BERNABE *delle morte improvise.*

(*q*) L. XII. p. 70.

(*r*) MISC. BEROL T. VI. p. 81.

(*s*) SPROEGEL p. 29. 44.

(*u*) WEPFER *cicut.* p. 213.

(*w*) SPROEGEL *Exp.* 31.

(*w**) WENKER *vuln. ventric. obs.* 1. HOFMAN *imprud. med. morb. caus.* ALBERTI *med. leg.* T. I. P. 2. p. 546. A tartaro emetico Lett. al S. CURZIO p. 23. Ab Euphorbio H. v. HEERS *obs.* 25.

(*x*) p. 13. 15. 17.

(*y*) p. 21.

(*z*) p. 28.

(*a*) p. 38. 39.

(*b*) p. 5.

(*c*) p. 34. 37. (*d*) p. 48.

petho minerali (*e*), cobaldo (*f*), sublimato mercurio capta (*g*). Etiam mechanica irritatione, ventriculus evertitur per omentum detractus (*b*), aut a pilis equinis (*i*), a spica fecalis (*k*) de glutita; a pluma. Ab erucae pelle occisus canis (*l*), & a fabulo ventriculi gallinacei sumpto (*m*) mors secuta est.

Sed etiam solum frigus in potu nimium, non solum ventriculum inflammat (*n*), sed pene subito etiam integerrimæ valetudinis hominis enecat (*o*). Convulsiones in integra familia ex cucumerum usu vidi supervenisse. Sic a melonibus, mitissimo cibo, unice ventriculum inflante, subitæ mortes (*p*), frequentes sequuntur; aut ab aliis ventriculum irritantibus, ut a lactis usu post vinum potum (*q*), demum a potu post magnam sitim largiori (*r*), qui sola copia ventriculo molestus esset.

Opium & sensum ventriculi tollit, & vim irritabilem minuit (*s*).

Ab acri ventriculi sensu deduco, quod ventriculus polypi neque plantas (*t*), neque propria, quæ sæpe devorat, brachia digerat (*u*),

Est autem etiam ea in re varietas. Sunt enim homines vix sentientes, quos acerrimis pharmacis necesse sit sollicitare, ut ventriculus ad vomitum moveatur. In Curonia jalapæ grana viginti vix alvum emonent (*x*). Nuce vomica Russi vomitum sibi movent (*y*), & eo fine vase ex arsenico confe.

(*e*) p. 61.

(*f*) p. 63.

(*g*) p. 43. 44.

(*b*) VESAL. p. 603.

(*i*) BRUNING. *Singult. Exp.* 3.

(*k*) K. *Smensk. Wetensk. Handl.* 1759. p. 266.

(*l*) PLANQUE *bibl.* T. III. p. 567.

(*l**) BIRCH T. IV. p. 342.

(*m*) LINN *amoen.* V. p. 59.

(*n*) HOFMAN *remed. benign. nox.* BLAS. P. I. obs. 21.

(*o*) CANIS SCALIGER VALISN. II. p. 172. POMPEJUS Card. COLUMNA apud MASINI *de abusu aq. geled.* p. 174. 175. FRANC. DELPHINUS Ibid. p. 154 add. VALISNER. II. p. 518. CARDAN. *subtil. exerc* 33. SCHNEIDER *Catarrh.* L. V. p. 137. BOYLE *util. phil. exp.* p. 311. MARCELL. DONAT. L. IV. c. 6.

(*p*) PATIN. *valetud. tuend.* p. 354. 355. PANAROL *Pentec.* l. c. obs. 39.

(*q*) CHRYNE *valetud. infirm.* p. 43.

(*r*) ZUCHELLI *relat. di Congo.* p. m. 72.


(*s*) SPROEGEL p. 26.

(*t*) Rejicit incoctas TREMBLEY p. 129.

(*u*) TREMBLEY p. 113.

(*x*) LENTILII *miscell.* p. 214.

(*y*) *Relat. des voy. au Nord.* T. VIII. p. 385. Idem mercurio sublimato ad salivationem ciendam utuntur IB. & ex relatione GMELINI olim nostri.



confecto siamenses utuntur (z). Fuit, qui Euphorbi dimidiam drachmam ferret (a).

Animalia pleraque multo homine robustiora sunt: equo (b) a croci metallorum uncia semis alvus modice purgatur, cani a drachma una. Satis memini canes, in nostris, & SPROEGELII, experimentis immensis demum præbiis opii (c) datis etsi varia symptomata excitarentur, nonquam periisse: aliis a dosibus apud alios enectos fuisse non recuso.

Vegetabilia venena ut tithymalum (d), cicutam (e) aquaticam, phytolaccam (f) canes nostri vix senserunt.

Id crassiori villosæ tunicæ tribuas: quam ab acribus crispata & insensibilem redditam accuses, quoties ad arsenicum, aliave venena ferenda longa consuetudo hominem aptum reddidit, quale quid de MITHRIDATE EUPATORE narratur.

§. XXII. Vasa lymphatica ventriculi.

Cum & in superiori arcu ventriculi (a) & in majori (b), glandulæ conglobatæ sint, in ventriculo etiam vasa lymphatica merito expectes. In arcu certe minori vidi quam maxima (c), tendentia in ductum thoracicum, eaque & inflato in cellulosa (d) tela prope venam aliquam aere CASSEBOHMIIUS ostendebat, vir sollertissimus, & per experimentum, quod tamen non describit (e), ILL. KAAUW in omni parte ventriculi pellucida vasa demonstrabat. Per arterias ea replet, & in ductum thoracicum usque ducit, ALEX. MONRO Alex. fil. (f).

In animalibus varii generis paulo uberius dicta sunt (g).

Porro

(z) Hist. de l'Acad. 1703. p. 52.

(a) PECHLIN. Cent. II. obs. 49.

(b) NEUMANN oper. ed. ZIMM. p. 1473.

(c) Drachmæ exp. 15. 21. duæ drachmæ exp. 22. 23. resinæque opii tandumd. exp. 24. tum res denique drachmæ exp. 25.

(d) SPROEGEL exp. 6.

(e) Exp. 9. 11.

(f) Exp. 14.

(a) p. 125. Conf. etiam de his vasis ILL. MEKEL ad me p. 10. 11.

(b) Ibid.

(c) Habet PETSCHER n. 83. versus oesophagum euntem.

(d) BOEHMER Fasc. obs. 1. præf. p. XV.

(e) KAAUW n. 612.

(f) Vaf lymph p. 39.

(g) In ruminantibus habet PEYER merycol. p. 88. 709. in aliis animalibus RUBER fig post. 5. NUCK p. 144.

Porro non lymphatica, sed omnino lactea vasa, in ventriculo (*b*) VESLINGIO aliisque (*i*) vetustioribus anatomicis dicta sunt, per pancreas (*k*) euntia, & ad lienem (*l*), hinc in cisternam (*m*).

Sed imprimis *Paulus Hieronymus Biumi* (*n*), in proprio libello, describit plurima vascula, quæ anno fere 1708. in cane viderit (*o*), ex fundo ventriculi nata, exeuntia in trunculos, per omentum versus hepar tendentia, ut versus jecur anserino calamo non minora sint (*p*): addit eadem eo loco in minora denuo vascula per hepar dividi (*q*); & injecto liquore conspicua, plena esse valvulis, quæ stylum ad hepar admittant, contrario ductu refutent.

Testes etiam sui inventi producit (*r*), in vitulo FELICEM SGALIUM (*s*); in ove MARINONIUM, & alios, inque verre. Etsi autem vasa chyliifera (*t*) fuisse dicit; eaque dissecta chylum dimisisse, & candore suo conspicua fuisse addit, & diversa a lymphaticis; necesse tamen esse fatetur, ut continuo in calido animale res inquiratur, & oportere ligare venas vasque chyliiferum, canemque esse pendulum, & inania vasa sanguinea (*u*).

Ea esse vascula pergit, per quæ brevi via aquæ acidulæ ad sanguinem veniant: & ob eam causam supervivere, quibus ob clausum ventriculi exitum nihil ad intestina, neque ad vulgata vascula lactea venit (*w*). Olim DOLÆUS scripserat, in variis animalibus aquam, quæ ventriculum replevisset, in vasa omenti ventriculo adtensa transisse (*x*).

Verum

(*b*) *Ep. posth.* p. 62.

(*i*) WHARTON *adenograph.* GLISSON *de ventric. & intest.* c. 3. p. 134. Etiam per omentum BRØEN. NILOE *de ferment. & nutrit.* qui non est ad manus.

(*k*) RHOD *mentiss.* n. 31. GLISSON.

(*l*) Apud DEUSING *alim. depur.* n. 18.

(*m*) GLISSON.

(*n*) *Esame d'alcuni canaletti.*

(*o*) p. 18. seq.

(*p*) p. 20.

(*q*) p. 21. 49.

(*r*) p. 29. 42.

(*s*) p. 20.

(*t*) p. 42.

(*u*) p. 46. 47. 48.

(*w*) p. 95.

(*x*) KLAUNIG *obs.* 15.

Verum alba quidem in ventriculo vasa nuperior industria non (γ) reperit, neque admiserunt viri in vivis animalibus incidendis plurima experti; & ipse Cl. BRUMI (α) tamen de proprio experimento dubium se esse demonstrat, neque testimonium dicere voluit, quem socium suorum experimentorum dixerat, PALATIUS (α).

Et ego in cane vasa lymphatica ab omento in ventriculum venientia vidi, qua sede eorum erant trunculi.

§. XXIII. Pori inorganici.

Avide ejusmodi poros physiologi aliqui quæsierunt, per quos credebant, phænomena aliqua commode explicari, celerem nempe aquarum medicatarum ad venas commeatum; hydropici laticis per intestina, & imprimis per vomitum celerrimam expurgationem (a^*), earundem aquarum a cibis receptum odorem (b), fetidi fetus & putridi pædorem in vomitu matris conspicuum (c).

Non hic poros volumus, qui in venas ex ventriculi cavea pateant. Sed poros, qui per ipsam naturam solidam partium ventriculi faciant sibi viam: Et primo patent a cavo abdominis, sive a membrana ventriculi externa, in ejus cavum pori. Nam in experimentis, ventriculus inversus, & in aquam demissus, aquam infusam sorbet per villosam tunicam, & per extimam membranam guttatim dimittit (d).

Deinde contrario ductu ostenditur, poros aliquos ducere a cavo ventriculo, per ejus externam tunicam, ad abdominis cavum. Nam ventriculus absque inversione, aquam, qua repletus fuerat, clausis ostiis, per villosam tunicam sorbtam, de omni ambitu externæ tunicæ pariter dimisit, minimis stillis (e). Inversus & repletus, cum nunc peritonæum esset interius

(γ) DRELINCOURT *canic.* II. 17. BRUNNER *de duoden.* p. 61. J. HENR. PAULI in egregio libro *anat. Bilfianæ anat.* p. 49. 51.

(α) p. 74.

(α) p. 24.

(a^*) *Obs. of a Societ. at Lond.* T. II. p. 298. MARCELL. DONAT. *hist.* p. 424. *Eph. Nat. Cur.* Dec. III. ann. 9. 10. p. 57.

(b) *Hist. de l'Acad.* 1721. *hist.* I.

(c) LA MOTTE *obs.* 238.

(d) KAAUW *de perspir.* n. 189. 190. VIRUSS. *nov. vas. syst.* p. 33. 34. MORIN. p. 201. *Mém. de l'Acad.* 1701. p. 201. Conf. etiam de experimento MONCONIS *voyag.* T. II. P. 2. p. 47. & imprimis J. Guil. PAULI *progr. de syst.* Wolf.

(e) KAAUW n. 563. MORIN, *ibid.* p. 200. MERY *Hist. de* 1700. p. 13.

terius, & aquam sorberet, aquam etiam transmisit, minus quidem celeriter (*f*).

Vias autem peculiares esse creditum est, quod eas aer (*g*) non sequatur, etsi aquæ patent: similesque viæ etiam in urinaria vesica, paria per experimenta ostenduntur, & in intestinis.

Satis novi, vulgo hæc ita exponi (*h*), ut in ventriculo inverso aqua in vasa nunc resecta, & ostiis suis apertis introrsum patula, resumatur: deinde per villos exhalantes (*i*) jam ostensos destillet: Et contrario modo in ventriculo non inverso per villos venosos (*k*), pariter ostensos, re-forbeatur, & per truncos vasorum extus resectos, depluat.

Sed repondet ILL. KAAUWIUS (*l*), omentum, & quæ lienem & reliqua, quæ poterant facere, ne externa vasa hiarent aperta super ventriculum se congestisse, & tamen eundem fuisse experimenti successum: & J. G. PAULI manifesto confirmat, non per vasa, sed undique aquam perstillare (*l**).

Mihi res videtur simplicissima. Cutis ipsa, absque illa de truncis resectis suspicione, & corium, nisi crassissimum fuerit, aquam, & potissimum calidam transmittit (*m*). Et bilis manifesto per vias non vasculosas in exteriorem faciem vesiculæ penetrat.

Utique ergo, ut in aliis corporibus, ita in nervea ventriculi, & in peritonæo pori sunt inorganici, quos aqua penetrare idonea est. Omnes membranæ corporis humani, quæ saccum faciunt, inversæ aquam dimittunt (*n*). Vesicæ apud tonsores pannorum flocculis replentur, & ova salinariorum in muria cocta saliantur.

Num ideo in vivo animale humor per eos poros vere penetret, possit dubitari. Ostenditur, vesicam urinariam plenissimam repertam esse, absque ulla lotii in abdomen effusione, cum exitus urinæ per ureterem interceptus esset. Ventriculus ob clausum pylorum, cibis & potui imper-vius (*p*), extenditur in immensam molem, indicio, potum non adeo

X 2

facilem

(*f*) J. G. PAULI.

(*g*) MERY. *hist. de l'Acad.* 1700. p. 13.

(*h*) LANGGUTH. n. 30.

(*i*) p. 137.

(*k*) Ibid.

(*l*) n. 19.

(*l**) L. c.

(*m*) Conf. L. XII. p. 85.

(*n*) DEIDIER p. 74.

(*o*) FRANK *diap. def.*

(*p*) p. 136.

facilem viam reperire, per quam effugiat. In aquam hydropicam potus se non admiscet, quæ coagulabilis sit indolis, quale nihil bibimus. Et in sano homine, etsi plurimum bibit, præter vaporem nihil est in abdomine. Cum cæruleo pigmento ventriculum vivi canis replerem, tinxit lactea vasa, cæterum in abdomen is color non exiit, neque se, ut fuerat necesse, suo colore extulit.

Crediderim in Cl. virorum experimentis pondus aquæ vim ejus penetrabilem adjuvare. Et in cadavere, uti continuo, exhalante aquula privatæ, membranæ nostræ siccantur, ita pori inanes nascuntur, in quos aqua subit, quos in vivo animale aqua replebat, vaporve vilcidulus. Etiam per experimenta certum est, in animale, cui clausum est abdomen, & omnia compressa, minus bene per villos aquam in ventriculum penetrare (q). Aliquid viam sibi facere posse, quando via per pylorum clausa est, & urgat externa pressio, non negaverim: aliquid etiam valde tenue id iter legere non recuso; patulam esse viam, & memoria dignam copiam aquæ transmittere non video.

S E C T I O I I.

F A M E S E T S I T I S.

§. I.

I Nevitabile hic reperi vitium in ordine, quo ciborum coctionem propono. Aliqua enim supersunt prius explicanda, ut famis sedes & causa intelligatur. Et tamen famem prius exponere necesse est, quam cibos recenseamus, qui ob famem sumuntur, aut eorum ipsorum ciborum coctionem exponamus. Quare superest, ut caveamus, ne recipiamus aliquid, quod verum non sit; quin posteriori loco plenius aliqua retractemus, evitare non poterimus.

§. II. *Necessitas ciborum potusque.*

In eo sapientia animalium conservatrix elucet, quod ad ea, quæ ipsis utilia sunt, & præmiis adliciantur, & cogantur poenis. Vitam animalis ad

ad definitum terminum protrahi DEO visum est: Sed eo protrahi nequit, absque cibo & potu. Ergo invitavit nos suavi gustu, qui est in cibo sumendo, potuque: & eam suavitatem auxit in ratione necessitatis. Malignus est divitis otiosi appetitus, quem vix ex ultimis Indiis repetita aromata fuscitent. Rustico ab aratro reduci, venatori qui velocia animalia pertinacia insequendi superavit, tanta est in nigro & vetusto pane edendo voluptas, aut in aqua frigida haurienda, ut omnes Petroniorum delicias superet, quando naturæ satisfacit.

Et tamen CREATOR hominem, & perinde animal, ad quietem & inertiam pronum, cui labor molestus sit, noluit soli voluptati regendæ permittere. Addidit adiutorem severissimum sensuum, dolorem, summum, immanem, intolerabilem quem ut vitet, etiam pigrum animal potum quærat, & pro cibo laboret. Oportet autem sermonis facere initium ab ea ipsa necessitate, propter quam OPTIMA RERUM natura divina his tormentis nos jussit esse obnoxior.

§. III. *Decrementum humorum & partium solidarum.*

Cum homo quotidie, modicis positis calculis, ad uncias quinquaginta per cutem perspiret (a), & tantumdem fere per lotium amittat (b), aliquid etiam per alvum, per sputum, aliisve modis ipsi decedat, facile intelligitur, non posse fieri, quin corpus insigniter decreascit, si nihil redderetur amittenti.

Omne famelicum animal amissam partem sui macie fatetur: & pondere evidentissime minuitur, etiam quatuor in viginti quatuor horis libris (c). Primus adeps disparet, celeritate incredibili (d): sic pisces hieme macilefcunt, & testudines (e); & marmotæ vere macilentæ sunt (f). Macilentissimæ (g) fuerunt asitæ illæ feminæ omnes, quarum historiæ continuo legentur. Qui fame perierunt, in iis fasciculum fibrarum nitidissimi, & quasi argentei fuerunt (g*). Sed omnino brevi & lac (h) desi-

X 3 nit

(a) L. XII. p. 68. inter uncias 60. & 30.

(b) Ibid.

(c) ROBINSON *Essay* II. p. 454. ad uncias 42. & 18. on food and discharg. p. 84.

(d) In alaudarum exemplo L. I. p. 41.

(e) *Oeconom. Nachricht.* T. VI. p. 329. seqq.

(f) *Hist. des terres austral.* T. II. p. 68.

(g) Ray *Wisdom of God* p. 292. Sed conf. L. I. p. 41.

(g*) *Præf. ad hort. florent.* p. LIV.

(h) Vide iconem in Cl. LOSSAV. *casu ined.* Loss. obs. 21. L. I. &c.

nit generari, ut solum antiquum & rancidum supersit, & semen, & pus (i) nunc cessant suppeditari. Etiam alii humores peculiare nulli nunc parantur, & serpentes (i*) absque periculo mordent.

Ipsa autem sanguinis materies, non solus adeps evanescit. Nam inedia refrigerat in principio, cum a sanguine calor sit (k). Et in homine a fame enecto venæ non conspicuæ, inque ipsa vena cava sanguis fere nullus fuit (l).

Hanc partem decrementi manifestissime in ranis vidi, quibus sicubi jejunæ incidebantur, dimidia fere vasa (m), arteriæ pariter venæque, inania erant, paucis flavisque globulis relictis; quæ ipsæ ranæ, quoties bene pastæ experimento subiciebantur, ruberrimo sanguine plenas habebant venas arteriasque.

Sed & causa virium, quæcunque demum ea sit, & a fame dispareret (n), & sarcitur edendo. Mirum est, quam celeriter jumenta, ad mortem usque fatigata, a bono sibi que proprio cibo, aut a spirituofo vino, vires ad laborem iterque recuperent. A fame deliquia animi (o). Omnes illæ jejunatrices, nam fere feminæ sunt, quæ absque cibo vixerunt, debilissimæ (p) eadem lectoque fere adfixæ fuerunt: debilissima etiam animalia (q), quæ diu absque cibo vixerunt: debiles & emaciati homines, quibus ob ventriculi vitium cibus maligne ad sanguinem pervenit (q*).

§. IV. *Humorum acrimonia spontanea.*

Prima ergo cibi sumendi necessitas fuit, ut materies humorum humanorum, & proculdubio etiam partium firmarum restitueretur: quam in pueris, & iis omnibus

(i) KNIGHT *vindic.* p. 82.

(i*) BIRCH l. c.

(k) Ad quatuor gradus in biduo MARTIN. *anim. simil.* p. 224. Sic frigida fuit jejunatrix J. NAUNTON. BIRCH T. II. p. 387.

(l) DIEMERBROEK *anat.* p. 299. HARTMAN *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 7. obs. 18.* Ab inanitate venarum famelicis interire GALEN. *usu part.* L. IV. n. 7.

(m) *De motu sang. Exp.* 71. 73. 74. 75. 78. 81. 84. 86. 172. 182. 218. 219. 225. 226. 233.

(n) Arabs in deserto languens THEVENOT T. II. c. 28.

(o) GAGE in *algem. Reis.* p. 658.

(p) JOHANNA NAUNTON. BIRCH. T. II. p. 387. SIBBALD *append. to the natural hist. of Fife.* FANTON. *diff. anat.* p. 39. BIRCH T. II. p. 387. RAULIN *obsf. de med.* p. 250. Sic qui sola eucharistia se sustentabat erat debilissimus LORRY *des alim.* p. 241.

(q) Canis STALPAART l. c. Serpens caudifonus BIRCH T. II. p. 491.

(q*) FANTON *diff.* p. 39. &c. Conf. de vitiis œsophagi p. 100. 101.

omnibus, qui incrementum suum nondum absolverunt, ex cibis necesse sit repeti: & in adultis etiam, plenæque staturæ mortalibus, pro iis particulis solidis suffici (*a*), quas ostendemus & ipsas multo vitæ usu deteri.

Sed celerior est altera necessitas. Nempe & sanguis noster, & omnes humores humani, ex sua indole ad salis urinosi naturam proclives, sibi relictæ (*b*), calido loco, celeriter putrescunt, acres fiunt, & ad vitam alendam ita inidonei, ut continuo, vel a levi illa in modica febre subnata putredine, & ventriculi, & intestinorum motus peristalticus destruat. Pereunt ergo cibo destituti homines, etsi sanguinem in vasis habent (*c*).

Neque in humoribus de corpore animali exeuntibus solis hanc degenerationem locum habere; sed eam in vitæ exercitio (*d*) etiam celerius supervenire, omnia docent.

Ostendimus, etiam modico a jejunio fætere animam (*e*), etiam in purissimo feminæ corpore. Sic lac continuo rancescit, & urinæ intoleranda fit acrimonia. Angli (*f*) & olim BONTÉKOE lotium suum bibebant in alto mari, ab omni aquæ commeatu semoti, ut sitim sedarent: sed ea paucis diebus ita acris facta est, ut bibere nequirent, & sanguinis modo ruberet.

Sed diutius si inedia protracta fuerit, ab erosione ut videtur nervis, dolores non tolerandi nascuntur (*g*), & vasa rumpuntur, ut hæmorrhagiæ narium (*h*) superveniant, & sanguis in ventriculum avicularum effusus visus sit (*i*), inque intestina (*k*). Celeriter etiam mens emovetur (*l*), & morositas primo atque mentis pene alienatio (*m*), & epilepsia, inde
demum

(*a*) L. XXX.

(*b*) L. V. p. 83. 84.

(*c*) In LEHNFEELSIÆ & SCHREYERÆ exemplis.

(*d*) L. V. p. 84. 85.

(*e*) L. XVIII. p. 53. Os scorbuticum & gingivæ cruentæ in jejunatrice Johanna NAUNTON BIRCH T. II. p. 386.

(*f*) *Voy. aux terr. austr.* T. I. p. 187. & nuper ann. 1762. in *Lond. Chron.*

(*g*) BIRCH T. II. p. 331.

(*h*) In *historia addita* T. II. *Itin.* ROBINS. CRUSOE.

(*i*) HARTMANN l. c.

(*k*) CASP. a REYES p. 736.

(*l*) Die tertio in sylva L. Mag. 1752. & quarto *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 2. obs. 2.* Sub ruinis die septimo BOCCON. *obs. di fific* p. 5. & fere perinde *Lond. Chron.* 1759. p. 355. Die decimo L. Mag. 1735. p. 627. in fodina.

(*m*) CHARDIN. *Voyag.* T. VII. p. 355.

(*n*) WAINWRIGHT *of meat.* p. 172.

demum delirium (*n*), deinde plenus furor (*o*) superveniat, mortemque fere præcedat.

Quare ut ab acuto aliquo morbo, ita ex fame, homines celeriter pereunt, eo promptius, quo quisque junior fuerit (*p*) & robustior. Sunt, qui primo (*q*) secundo & tertio (*r*) & quarto (*s*) die perierint, ut inter COMITIS UGOLINI filios, quos Pisani in carcere necarunt, juniores priores exanimati, reliqui, & quo adultiores, eo diutius vixerint (*t*), & die quinto & sexto (*u*) interierint: Pater ut omnibus ætate provectior, octavo nondum elapso (*w*) vitam reliquit. Melancholicus qui ad septimum diem cibo & potu abstinuit (*x*) eo die exspiravit. Alii septimo (*y*) extincti fuerunt, aut nono demum, ut princeps Sueciæ nycopingiæ in carcere desertus (*z*).

Undecimo hominem perire PLINIUS (*a*). Decimo tertio die obiit melancholica virgo haarlemensis (*a**), & 19. demum, qui voluntaria fame vitam abdicabat (*b*); & vigesimo gravida, quæ omnia revomebat (*c*); & vigesimo primo puerpera (*d*); & demum die 28mo alius (*e*).

§. V. *Cur animalia & homines nonnulli diu absque cibo obdurent.*

Non possum hic omittere exempla tot hominum & animalium, quæ diu absque cibo demum etiam absque potu supervivunt. Neque enim rationem alioquin reddere possem, cur fames necessario enecet, & tamen aliquibus cum conditionibus eadem diutissime toleretur.

Et

(*e*) LERY *voy. de l'Amer.* p. 409. BORELL. *Cent. III. obs.* 81. (die 3.) RADZIVIL *Itin. Palest.* p. 19. TULP. *L. I. c.* 43. *Voyag. à la mer du Sud.* p. 145. TULP. *I. c.* 43. *Lond. Magaz.* 1752. M. Oct. KAAUW *impet. fac.* n. 456.

(*p*) In scopulo Aug. a LAURENTIO *discept.* I. p. 30.

(*q*) Juniores inedia minus ferunt CELSUS.

(*r*) Ibid.

(*s*) CARDAN. *in aphor.* n. 42. SALA *Alim. facult.* II. p. 32.

(*t*) GARDAN.

(*u*) SALA *I. c.*

(*w*) CARDANUS. SALA.

(*x*) MARC. DON. p. 364.

(*y*) SANCASSANI *dilucidaz.* p. 90. *Conf. Lond. Chron.* I. c.

(*z*) Eruditiss. & disertissimus DAHLIN in *historia Suecica* T. II. p. 402.

(*a*) L. XI. c. 52.

(*a**) PAW *Ep. XIII.* CRAANEN p. 223.

(*b*) ALBERTI *med. leg.* T. I. p. 372.

(*c*) STALPAART *Cent. II. obs.* 15.

(*d*) HOR. AUGEN *de venæ sect.* L. VI. p. 239.

(*e*) KAAUW *Impet. fac.* n. 456.

Et primum infecta (a), ut hieme nihil amittunt, ita nihil edunt; ut polypi (b), vespæ (c), hirudines in aqua (d) servatæ, pisces in limo sepulti (e), aut in aqua sola, qui toto anno (f) edurant.

Sic papilio, brevi equidem vitæ destinatus (g) absque cibo vivit (h); & vermis casearius ad septimum mensem supervixit, ut etiam transformatione sua defungeretur (i), Oestrum pari quidem ex causa ne os quidem habet (k). Formicaleo (k*) sex mensium jejunium tolerat: & hirudo bene pasta etiam octo mensibus demum elapsis cutem, ut fugat invadit (k**). Aranæ ad multos menses cibo carent (l), tum scorpius (m), & cancer marinus (n) totis 18. mensibus.

Sic etiam classis serpentum, aut quadrupedum frigidorum, absque cibis diutissime victitat, ut vipera & caudifona (o), & vulgaris (p), & cerastes (q), & anguis (r). Salamandra per annum (s), chamæleon tantumdem (t), &

(a) LYONNET *theolog. des Insect.* p. 255. REDI *anim. viv.* p. 57.

(b) TREMBLEY p. 114. 116. BAKER p. 137.

(c) REAUMUR *hist. des insect.* T. VI. p. 268.

(d) VALISNER. T. II. p. 451. ad tres annos PLEMP. *valet. togat.* p. 237.

(e) *Oeconom. Nachricht.* T. VI. p. 329. seq.

(f) BATHURST *prælect.* p. 201. PERRAULT *Ess. de phys.* T. III. p. 169.

(g) Octo dierum de GEER p. 246.

(h) REAUMUR *Mém.* T. I. p. 640. GEOFROI T. II. p. 5. *Tr. des meuriers blancs* p. 64. De GEER. *Mém.* II. p. 55. du HAMEL *insect. de l'Ang.* p. 24. 25. Nisi florum aliqui succum degustant, nam saccharum amant SWAMMERDAM. Nempe iis animalibus, quando in volatilem naturam transeunt, ventriculus & intestina arctantur SWAMMERDAM p. 678. Neque post venerem locustæ edunt ZINANNI *cavalett.* p. 48.

(i) *Hist. de l'Acad.* 1702. p. 25.

(k) REAUMUR T. VI. p. 354. *Mém. de 1704.* p. 238. Perit tamen.

(k*) GEOFROI *Ins. aut de Paris* II. p. 431.

(k**) K. Sw. *wëtensk. Handl.* 1760. p. 135.

(l) JOBLOT I. p. 105. Diu ARISTOT. *hist. anim.* L. VIII. c. 4.

(m) *Hummer* KALM. *americ. resal.* p. 81. 82.

(n) REDI.

(o) Quinque, sex mensibus MRAD. *of poisons.* p. 12. Quatuor TYSON *Phil. tr.* n. 144. Tribus quatuorve mensibus SEVERIN. p. 250. Sex mensibus JOBLOT. I. p. 102.

(p) Multis mensibus VALISN. III. p. 47. Novem mensibus REDI *viper.* p. 22. *Decem de anim. vir.* p. 55. Undecim mensibus DE SAULT *de la goutte* p. 63. Addit PERRAULT I. c. etiam crescere. Anno integro *Mém. de 1704.* p. 173. Captos non edere CHARAS p. 5.

(q) Quinque annis SHAW. p. 429. ut etiam cutem mutaret: perit tamen ultimo BIRCH T. II. p. 393.

(r) Quinque mensibus SEVERIN. p. 247. decem BELLON. *obs.* p. 219.

(s) JACOBÆUS p. 117.

(t) Quinque mensibus PARISINI. Anno BELLON. I. c. add. PACHLIN. p. 389.

& lacerta (u), & crocodilus captus (w), perinde vitæ absque cibo tenaces fuerunt. Ita ranæ in aqua sola (x), aut in hibernaculo lutofo (y), ore optime clauso, & absque motu (z), etiam per annum cibo carent (o). Etiam diutius vivunt testudines & ad octodecim menses (b).

Inter calida animalia, aliqua ob pigritiam (c) longo etiam tempore absque cibo vivunt; glires hibernantes tota hieme (d) per inediam tranfigunt: tum melis (e), mus montanus, ursus (f). Manis duobus mensibus absque cibo fuit (g).

Minus ferunt cibi desiderium agilia, & calidi sanguinis animalia, & tamen cum pleraque homine robustiora sunt, famem, ut a sua vitæ conditione vix separabile malum, norunt satis diu tolerare; lupus ad quinque dies (h): Ossifraga diebus septem (i), catus sylvestris diebus viginti (k); canis ad 25. dies (l), & ad 41 (m), phoca quatuor septimanis (n). Capo jam octavo die interiit (o).

§. VI.

- (u) ID. p. 118. Bimestri tempore PARIS. octo mensibus REDI *anim. viv.* p. 12.
 (w) Octo mensibus RICHER. *voyag. de Cayenne* p. 323.
 (x) JACOBÆUS p. 118. Quatuor mensibus BLANCAARD *Jaarregister* I. Cent. IV. n. 69.
 (y) VALISNER. T. II. p. 436. *Lettres edifiantes* T. XVI. p. 10. FRÉGER *voy.* p. 150. *Phil. transf.* n. 194.
 (z) *Oeconom. Nachricht.* T. VI. p. 335.
 (a) BATHURST I C. p. 197.
 (b) CALDERI p. 30. REDI *anim. viv.* p. 55.
 (c) Haut sive ignavus ad tres septimanas THEVET *Franc. antartique* p. 976.
 (d) SARRAZIN. *Hist. de l'Acad.* 1714. p. 27. In domo educatus excitabatur singulo tri-duo & quatruiduo, & edebat FANTON. Ed. II. p. 41.
 (e) BUFFON. T. VII. p. 107. Mense integro REDI *anim. viv.* p. 55.
 (f) SARRAZIN I C. ÆLIANUS *anim.* L. VI. c. d. HILLERSTROM *jämtelands diursfänge* p. 15. CHARLEVOIX *hist. nat. de la nouvelle france* T. III. p. 117. FIELSTIOM *lap-pornas biornfänge. Beskr. af Satacunda bürad.* p. 64. Vulgo creditur de glandulis in pedum planta lacteum succum sugere BUFFON. T. VIII. p. 161. ÆLIANUS. RUGE *förmustige tankar.* CHARLEVOIX. LEHMAN *Berg. Chronica* p. 340. BOYLE *de frigore* p. 23. Sed repugnat exemplum glirium, & murium montanorum, quibus similis hiemis absque cibo tolerantia, neque ejusmodi penus est. Neque habent accuratiora scire idonei viri FIELLSTRÖM & HILLERSTRÖM, aliamque dat iste rationem, pilas resinæ & foliorum abjetis & formicarum devoratas, & motus peristaltici defectum add. *Satacunda bürad.*
 (g) K. SWENSK. *Acad. Handl.* T. X. p. 267.
 (h) FABER *ad bernandez* p. 488.
 (i) CAII *anim. rar.* p. 87.
 (k) REDUS *anim. viv.* p. 55.
 (l) IDEM *ibid.*
 (m) *Hist. de l'Acad.* 1706. p. 6. paucissimo cum cibo.
 (n) REDI *Insect.* p. 124.
 (o) *Anim. viv.* p. 54.

§. VI. *Homines diu jejuni.*

Univerſa hiſtoria medica a primis temporibus plena eſt hominum, ſed potiffimum feminarum, quæ menſibus integris, demum annis, abſque cibo vixerunt. Neque, ſi fraudulentæ aliquæ hiſtoriæ (a) intercedunt, quarum aliquam ipſe vidi (b), neganda fides eſt veris rerum documentis, cum præterea nuperis temporibus ſumma cum cura obſervati (c) homines, vere abſque cibo, potu, & excrementis, diu vixerint.

Tres quatuorve dies jejulant gaſpeſii (d), quoties eos dira urget neceſſitas. Quarto die ſervatus eſt qui in ſcopulo vixerat (e). Quinti diei perfectio jejunio ſanata ſtulta (f). Quinto die vivebat, & refocillatus eſt ille in deſerto Arabs (g). Quintum in diem & ſextum fa-
mes (h) toleratur a Tartariſ (i), & ad ſeptimum (k): tum ab eo qui ſub nive vixerat (l), & ab alio (m), ut iter acceleraret voluntario jejunatori; & ſunt in Græcia calojeri, qui non ultra ſexies in jejunio quadrigesimali cibum admittunt (n). Octavo die puella, quæ ob impactam gulæ teſtam abſque cibo & potu fuerat, ea ejeſta convaluit (o).

Octiduo jejunatores aliqui ſacri obdurant, etiam ſæpius repetito periculo (p); & novem diebus in India (q). Nono die (r), & decimo
Y 2 super-

(a) REGIUS *phyſiol.* p. 17. WIERUS *de jejun. commentit.* HILD. *Cent. V. obſ.* 33. qui & alias hiſtorias habet, tum SCHURIG p. 220. add. SWALWE *querel. ventric.* p. 82. 291.

(b) *Chriſtiane* KRAZER in arce thorberg ſervatæ, quæ ad cibum rediit, cum ſervator præfectus ſucceſſiſſet indulgenti. Exſtat de ea libellus CL. RITTERI.

(c) Cuſtodes adhibiti HAMILTON *voy to Eaſt. Ind.* I. p. 153. tum in hiſtoria puellæ ſpirenſis, Apoll SCHREYERÆ, Johanne IEHNFEELS. *Puer Journ. de Med.* T. 17. p. 441.

(d) Le CLERK *nouv. deſcr. de la Gaſpeſie* p. 108. Quatuor etiam diebus ille apud C. a REYES p. 732.

(e) *Aug.* a LAURENTIIS l. c.

(f) PLANQUE *bibl.* I. p. 60.

(g) THEVENOT.

(h) SAAR. *Oſtind. Reiſ.* p. 125.

(i) *Voy. au Nord.* T. VI. p. 455.

(a) SWALWE *querel. ventr.* p. 84.

(l) *Phil. tranſ.* n. 337.

(m) BLOKS *bedänkiande ofwer Eſthers Iohns dottars foſtrande* p. 9.

(n) De BRUYN *Kleyn azien.* p. 71.

(o) HOOGLIED *wondſchouw.* p. 195. Octo diebus in febre PISONI *ſpicileg.* p. 169.

(p) STELLA *del tabaco* p. 303. & apud MARC. DON. L. IV. c. 12. & SCHURIG *Chy-
lolog.* p. 185. FABER p. 734.

(q) FRYE *trav.* p. 103.

(r) *Lond. Chron.* 1759 p. 315.

(s) BOCCONE *muſ. di fiſic.* p. 5. Strangurioſus PISONI l. c.

superfuit casu (*s*) iste; alterque voluntarie asitos (*t*). Duodecim dies in apofitia (*u*) superati; & vita in alio exemplo cum minimo cibo (*w*). tolerata. Quatuordecim dierum jejunium in melancholico (*x*), Decimo quinto die (*y*), & decimo sexto alius servatus est, qui sub ruinis vixerat, sed ii equidem homines brevi vitales superfuerunt (*z*). Diebus quindecim (*a*) ex odio, & etiam viginti alia cibis abstinuit; & 17. diebus melancholica (*c*). Dies 18. absque cibo vixit scorbutica (*d*) : Dierum undecim 20. & 30. inedia toleravit, qui se Clementi XI. obtulit (*e*) & 25. diebus, sed isti aqua adjuti (*f*). Dies 27. cum perpetuo vomitu (*g*) cibo alius caruit. Post trigesimum jejunatrix vestalis servata est (*h*). Ad mensem sola cum calida supervivunt in Madure, provincia chersonesi coromandelicæ (*i*). Ad mensem etiam solo cum potu puella Valisnerio dicta (*k*). Ad trigesimum quintum diem absque cibo, aqua cum spiritu nitri sumta, phthisicum hominem sola aluit (*l*).

Paucissimo cum cibo, sed frigido loco, homines aliqui ad 35. diem vixerunt (*m*). Alius 22. dies etiam potu abstinuit, ex tristi adfectu (*n*), & subinde ad 20. & 25. dies alia (*o*), & ad 30. (*p*), & 33. (*p*^{*}), & (*q*) demum ad quadraginta. Vetusta est *απρως* illa HERACLIDIS (*r*), quæ cum absque spiritu quadraginta dies vitam toleraverit, procul dubio & absque cibo

(*s*) Melancholicus apud FABRUM & hysterica apud la METTRIE p. 6. Add. RHOD. obs. 55 & 57.

(*u*) Eph. Nat. Cur. Vol VI. P. I. obs. 51.

(*w*) PONTOPIDAN. Hist. Norveg. p. 177.

(*x*) PLOT. nat. hist. of Staffordshir. p. 287.

(*y*) Hist. de l'Acad. 1705 p. 6.

(*z*) RZACZYNSKI Hist. Natur. Polon. p. 372.

(*a*) HELWIG obs. 73. And. SILVA Conf. 13.

(*c*) HELWIG obs. 9.

(*d*) De GORTER de fame & siti p. 50.

(*e*) CARDAN subt p. 357.

(*f*) BIRCH T. IV. p. 28.

(*g*) MATH. de GRADIBUS.

(*h*) LABAT voy. d'Italie T. IV. p. 102.

(*i*) Letr. edif. T. XVI.

(*k*) Gal. Min. T. VII. p. 153.

(*l*) CHRYNE Diseas. of bod and mind. p. 109.

(*m*) Phil. transf. Vol. 49. P. 2.

(*n*) PANAKOL. Pentecost. V. obs. 20.

(*o*) Journ. de med. 1756. Maj

(*p*) SIBBALD app to the natural hist of fife.

(*p*^{*}) Hysterica Journ. de Med. T. 17. p. 415.

(*q*) Absque potu BIRCH T. II. p. 389. etiam repetito.

(*r*) Conf. L. VIII. p. 266.

cibo fuit. Eosdem quadraginta dies ex superstitione aliqua eduravit G. BERNHARDI, quam nobis historiam memini ILL. olim collegam nostrum RICHTERUM (s) memini narravisse, etli & alibi descripta exstat.

Melancholica puella menses integros absque cibo & potu vixit (t). Ad diem quadragessimum sextum (u) sed aqua usus, ægrotus superfuit VALISNERIO dictus. Pene nullo cum cibo, femina 50. (w) demum die interiit. Solo pene potu ad 55. diem vita (x) protracta. Dies 34. deinde 54. ex moerore alia cibis abstinuit (y). Mors post asitiam duorum mensium ex tuberculis os ventriculi cludentibus (z) natam. Ad duos menses protractæ inediæ alia est BORELLI historia (a). Ad 69. dies ante mortem cum delirio (b) apositia. Decem septimanarum etiam absque potu (c).

Johanna NAUNTON nobilis virgo (d), sed indigens, cibis abstinit, ne paupertatem fateretur, & 78. diebus vix nisi succo limonum se sustentavit. In melancholica multarum septimanarum abstinentia (e). Ad 72. etiam dies femina in caverna sola cum pluvia vixit (f). Virgo alia ab omni cibo per 80. dies abstinuit, sola aquula contenta (g).

Et magis atque magis miraculum crescit. Quatuor mensibus absque cibo & potu vixit Margaritha LAUWERIA nostra (h): ad sex menses alia virgo (i), & ex spasmo cynico alia (k), & alia octo mensibus,

Y 3

cum

(s) De morte sine morbo p. 16. DETHARDING de inedia 40. dierum. In descriptione asitiæ ESTHERIS DÖBEL & Bresl. Saml. 1719. M. Sept. Similes sunt historiæ apud CARDANUM venen. p. 320. & HEINRICI ab HASSELT. apud WIERUM de comment. jejun. p. 761. PAW. Epist. p. 13. cum aqua tamen, & in Nouv. de la Rep. des Lettres 1685. Febr. & Episcopi spirensis a PONTANO descripta, & in hysterica Opusc. scient. XIII. p. 462. & apud PLOT l. c. p. 287. & in gravida HILD. Cent. IV. obs. 30. Ad diem 45. cum potu ORTESCHI diar. p. 7.

(t) STALPAART v. der WIEL Cent. II. obs. 15. Similis historia est apud VALISNERII. T. II. p. 501. ex CESTONO.

(u) Oper. T. II. p. 509. Tantumdem dies jejunavit alius apud ALEXANDRUM BENEDICTUM oper. L. XI. c. 10. & 42. dies: alius cum aliquo potu apud G. v. SWIETEN T. III. p. 508.

(w) FANTON. diff. anat. p. 39.

(x) RAULIN. obs. p. 200.

(y) Essay of a Societ. at Edimb. V. P. 2. n. 43.

(z) FERNEL Pathol. L. VI. c. 1.

(a) Obs. 24. Cent. III.

(b) Journ. de med. 1757 Fevr.

(c) PLOT natural histor of oxfordshir. p. 200.

(d) BIRCH T. II. p. 186.

(e) LOSS obs. 1. L. I.

(f) REYES Quæst. 58.

(g) HAMILTON l. c.

(h) Sig. KOENIG in historia ejus morbi p. 8.

(i) VANDERMOND Journ. de med. IV. n. 4.

(k) Galer. di Minerva. T. VII. p. 269.

cum omnia revomeret (*l*) & 35. septimanis a lapsu & contuso dorso (*m*).

Ad annum usque duæ CAJO (*n*) dictæ, ad 13. mensem alia (*o*). Annum superavit Maria JEHNFELS (*o**). Quatuordecim menses alia (*p*): sedecim virgo Martha TAYLOR (*q*).

Octodecim mensibus astita fuit in virgine hadersleviensi (*r*), & per annos apud alios (*s*). Trigesimo nunc mense puer (*s**) jejunat superstes.

Triennis & ultra fuit nostræ Apolloniæ SCHREYERIE abstinentia (*t*), quæ & cibo caruit & potu. Et alia pene similis, cum paucissimo certe cibo (*u*), est spirensis illa G. BUCCOLDIANI (*w*), & alia RONDELETTI (*x*) historia.

Quatuor annis jejunavit puella BRUNSWICENSIS (*y*). Longissima etiam fuit abstinentia puellæ confolentanæ (*z*), quæ præterea potu caruit.

Sexennem habet aliam PLANQUE (*a*): Septennem HORST (*b*). Novem annis jejunavit Catharina BINDERZ (*c*). Decem annorum (*d*) pene plenam cibi abstinentiam, potus absentiam annorum pene sex, ESTHERA Johns dotter tulit, de qua celebri puella DÖBELIUS scripsit & BLOCKIUS, paralytica quidem. Decem annorum aliæ (*e*) abstinentiæ narrantur.

Octode-

(*l*) C. a REYRS p. 736.

(*m*) *Journal. des Sav.* 1681. n. 18. *Nouv. de la rep. des lettr.* 1688. apr.

(*n*) *Ephemer.* p. 230.

(*o*) *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 3. obs. 173.

(*o**) LOSSAU *Beschreib. eines casus ined.*

(*p*) BESSE *Analys.* p. 470. Et pene integra per annum abstinentia BURCHARD de Secret. p. 31.

(*q*) BIRCH T. II. p. 390

(*r*) In historia *Estheræ Johns dotter.*

(*s*) SANCTOR. in 1. *fen. avic.* p. 127.

(*s**) *Journ. med.* T. 17. p. 439. seqq.

(*t*) P. LENTULUS in ejus historia. HILDANUS in *Epist. ined.* & *Epist.* 69. & Cent. III. obs. 85.

(*u*) SCHRADER obs. 1. & plene abstinens QUERCETAN. *diat.* p. 91.

(*w*) Prodiit cum Apoll. SCHREYER historia.

(*x*) De pisc. p. 29.

(*y*) HORST ad DONAT. *hisor.* p. 650.

(*z*) QUERCET HORST p. 652. &c.

(*a*) *Bibl.* p. 31.

(*b*) p. 651.

(*c*) Apud LENTULUM.

(*d*) Multis libellis celebrata. Conf. etiam *Bresl. Saml.* 1723. M. Maj. SCHURIG p. 200.

(*e*) PLANQUE p. 74. & alia SMETIUS *miscell.* L. X. p. 551.

Octodecim annorum abstinentiæ sed cum aquæ usu (*f*), exemplum legitur. Et omnes superat historia astitiæ 50. (*g*) annorum, etsi ea ægra lactis serum, aut certe aquam admisit.

Longe plures historias apud collectores varios reperias (*h*).

In horum casuum longe plerisque ciborum usus denique restitutus est (*i*).

§. VII. *Uti has abstinentiæ longissimæ historias liceat interpretari.*

Inveniendum est, quare contra communem legem, hi mortales ciborum usu potuerint carere, & quare aliqua animalia eo præsidio careant.

Homines quidem, qui cibo diu abstinuerunt, fere ad unum omnes melancholici fuerunt, aut hystericæ (*a*) plerumque feminæ, & demum aliquæ sensu pene omni destitutæ (*b*) stupidæ (*c*), lethargicæ (*d*), demum stultæ (*e*), aut a nervis destructis (*f*) insensiles.

In his quidem ægris naturæ stimulos per surda organa anima non audivit (*g*), in plurimis etiam perpetuam per desidiæ, & lectulariam vitam omnis alibilis humoris consumptio ita sufflaminata est (*h*), ut MARIA illa JEHNFEELS corium nitidum non maculaverit, in quod insuta fuerat

(*f*) *Phil. transf.* n. 462. & cum sero limpidio *Phil. transf.* n. 466. tamen ut debilis esset.

(*g*) *Ess. of a Societ. at Edimb* T. V. P. 2. n. 44.

(*h*) Cl. LOSSAU. SCHURIG *Chylol.* c. 11. HORST ad DONATUM SACHS *Gammamol.* p. 444. Add. CONRING de *calid. innato* c. 18. HILDAN. p. 415 *Cent. II. obs.* 40: 42. *Bresl. Saml.* 1719. Sept. 1723. Mart. 1726. Jan. MACAS. *prompt.* p. 969. *J. med.* T. 17 p. 415.

(*i*) SCHREYER. JEHNFEELSIA: ægra SIBBALDI l. c. Virgo dicta PANAROLO: Stultus N. de la Rep des Letr. 1685. Febr. tum apud PLOT. *oxfordsh.* p. 200. REYES *Quæst.* 58. SMET. SCHRADER. *Johnsdotter.* QUERCETAN p. 91. *Galer. di Minerv.* II. p. 269. T. VII. p. 153. *Journ. de med.* IV. n. 4.

(*a*) *Ess. of Edimb.* T. V. P. II. n. 43. *Journ. de Med.* T. XVII p. 435. Melancholica fuit LOSS. l. c. MARTHA TAYLOR & ESTHER. Ex tristi affectu PANAROL. 20. Ex furore uterino *Journ. de Med.* 1756. May. T. 17 p. 135.

(*b*) BARTHOL. *Cent.* IV. hist. 82. *Ess. of Edimb.* V. II. n. 43.

(*c*) Apud SYLVAM, & puella consolentanea RHOD. C. II. n. 55.

(*d*) JEHNFEELSIA apud LOSSAU *cas. ined.* & MACAS. *promptuart* p. 946.

(*e*) Stulta fuit Apollonia nostra SCHREYER apud LENTULUM & HORST L. II. *obs.* 15. Stultus ille in N. de la republ. des Lettres 1685. Febr. Stulta apud PLANQUE p. 64. Maniacus apud FABR. in HERNANDEZ p. 734. Delira illa in *Journal. de Medec.* 1757. M. Febr.

(*f*) *Journ. des Sav.* 1688. n. 18. a rota medullam spinalem vexante.

(*g*) Ita in sene FISCHER de Senio p. 111. nullius cibi cupido.

(*h*) Cl. BECCARI *Comm. Bonon.* T. II. P. I.

fuerat, nec lintea alia, quam Cl. PLANQUE memorat (i). Fæces plerumque in astitia nullæ emittuntur (k).

In animalibus hibernantibus circuitus sanguinis pene nullus est, ut etiam sanguis frigescat (l). Pulsus in ciborum abstinentia plerumque exiguus (l*), & ventriculi tritus omnino nullus est, siquidem faeces non egeruntur, easque vere collectas habent (m) in intestinis. Insectis tota vita hieme fere suspenditur (n), nullusque est, ne in corde quidem motus (o), & nihil perspirant (p).

Sed etiam memoria dignum est, multos abstinentium hominum aqua (q) libere esse usos, quæ certe magnam partem eorum malorum temperat, ex fame oriundorum. Ita & pisces aquæ habuerunt usum (r). Nam aqua certe sanguinis putredinem admista impedit, dum sales diluit, & debilitat, olea dividit, ventriculi molestem rosionem moderatur; habet etiam, ut alias disquiretur, nonnihil particularum nutrientium. Canis absque potu pene rabidus factus est (s). Aquæ solius usu absque cibo pessimæ variolæ sanatæ (t), & vulgo ea curatione in calidis regionibus utuntur Neapoli, Malthæ, in Asia calidiori (t*).

§. VIII.

(i) Nullus sudor *Journal de Medec.* l. c. & cutis sicca, tum in virgine haderslebensii. Vix speculum maculat puer *Journ. med.* t. 17. p. 441.

(k) L. XXIV. Nullæ faeces PLANQUE p. 64. 74. & in puella consolentanea, tum apud STALPAART l. c. & in obs. Cl. SAMPSON *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. obs. 173.* & in M. TAYLOR & *Journ. des Sav.* 1688. n. 18. & *Journ. de Med.* T. IV. P. 4. t. 17. l. c.

(l) L. V. p. 129.

(l*) Vide puerum *Journ. de Med.* T. XVII. p. 442. Etiam SCHREYER pulsus profundus & obscurus fuit HIEDAN. *Epist. ad LENT.* ann. 1607. data, & nullus omnino, nec respiratio, apud STALPAART l. c.

(m) In urso FIELSTROM l. c. HILLERSTROEM l. c. ROBERG de urso p. 29. *Oecon. beskr. of satacunda häräd.* p. 64. In homine fame coacto AURIVILL. *læs. mot. vermicular.* p. 9.

(n) L. IV. p. 437.

(p) Ita de viperis MEAD. *of poisons* p. 12. de testudine CALDESI.

(q) In exemplis SANCTORII. *Phil. transf.* n. 463. 466. MARC DON. L. IV. c. 12. *Hist. des Voy.* L. XII. p. 103. LISTER. *de humor.* c. 261. 271. *Mem. de l'Acad. des scienc.* 1704. p. 172. RIVIN. *de agrest. vit. salubrit.* RAULIN. *obs.* p. 270. CHEYNE PAW. *Edimb. Soc.* V. P. 2. VALISN. T. II. p. 501. 509. *Gal. di Min.* T. VII. p. 153. BIRCH T. IV. p. 288. T. II. p. 387. C. a REYES *Quest.* 58. SIBBALD *append. ad hist. natural. Com. Fife.* HAMILTON l. c. G. V. SWIFTEN T. III. p. 508 ORTESCHI Capo absque potu octiduo, cum aquæ copia 24. dies obduravit REDD p. 54. Canis cum aqua 36. absque ea 25. diebus vixit, *Id.* p. 55.

(r) BATHURST *prælect.* p. 201. PLEMP. *valet. togat.* p. 237. GUMILLA *hist. natur. de orinoque* Il. p. 37.

(s) POZZI p. 77.

(t) BUCHNER *miscell.* 1727. p. 521.

(t*) p. 172.

§. VIII. *Sanguinis dilutio necessaria.*

Verum etiam citius cogitur sibi relictus sanguis, quam quidem in lixiviosam naturam abit.

Vix de vena emissus in grumum (a) densatur; inque ipsis vasis nostris & sæpe (b) densaretur, & perpetuo spissaretur, nisi cum aquæ copia, quæ satis sit, ipso motu suo subigeretur.

Eam spissitatem motus quidem, sed non solus, inhibet, siquidem ipse motus ad eam ipsam degenerationem confert; cum præterea sanguis ruber ex sua natura per nullum organum excretorium de vasis nostris decedat, per omnia vero decedat aqueus humor: neque quidquam ei addatur conspicui humoris, nisi quod bibitur. Non posset omnino fieri, quin sanguis ruber continuo aqua sua privatus consistat in grumi modum, nisi aquæ vis epota per venas in massam sanguinis rediret.

Hæc peculiaris aquæ necessitas sitis necessitatem fecit, quæ sit bibendi appetitus. Sunt equidem iterum, ut de cibo vidimus, & homines, & animalia, quæ potu non egent.

Et primum carnivora insecta, avesque (c) rapaces (d) & unguiculae, omnino non bibunt, & demum animalia aliqua quadrupeda, quæ raptu vivunt, parum bibunt, & raro: canes tamen frequenter & abunde (e). Felis zibethica semel in mense bibit (f).

Ob peculiares aliquas causas aliqua animalia diu abstinent potui, ut cameli, & dromedarii (g), hi propter aquæ penuriam, quam in ventriculi profundis cellulis (h) circumferunt: Oves in nonnullis pascuis alpinis (i),
puto

(a) L. V. p. 16. &c.

(b) Ibid.

(c) ARISTOTELES *gener. anim.* L. III. c. 1. *Histor.* L. VIII. c. 3. Excipit tinnunculum & milvum. Halææ tamen bibisse vidit BORRICHIVS *sapient. hermet.* p. 265. Alcyon, piscivora, non bibit FRISCH. *miscell. Berolin.* Cent. II.

(d) Non sitire aves TANGREDUS LATINIUS *de fame & siti* p. 94. Sed bibunt granivoræ.

(e) De fele. *Hist. de l'Acad.* 1713. p. 138. 139. quæ 19. mensibus totis non bibit lb.

(f) *Phil. transf.* n. 30. add. L. XII. p. 89.

(g) Sexto die RADZIVIL *it. palest.* p. 214. etiam decimo quinto RUSSEL *nat. hist. of Aleppo* p. 56. add. TAVERNIER *voy. de Perse.* p. 130. Tota æstate, ut mihi, dromedarii custos narravit.

(h) PERRAULT in *hist. Dromedarii.*

(i) VIRIDET *bon chyle* p. 12. in monte Ruble *ditionis sanensis.* In Anglia, puto nimis laxè locutus, BELLON *obs.* p. 280.

puto ob humorem copiosum stirpium alpinarum potu non invitæ carent, tum lues & equi in Jamaica insula (*k*), inque insula Guahaboa, ob aerem, ut creditur, humidissimum.

Homini potum non naturalem esse, neque (*l*) bibiturum, si præscripto a natura victu vegetabili contentus viverent, fuit conjectura.

Ad triduum quidem sitis sustinetur (*m*): & fuerunt etiam qui longiori tempore potu abstinuerunt, diebus septem (*n*), & octo (*o*), & ad decimum & duodecimum, cum asitia (*p*), & ad decimum aut quindecimum (*q*), & demum ad quadraginta (*r*), & 45 (*s*), & sexaginta (*t*), & septuaginta (*u*) dies, & quatuor (*u*^{*}), & sex menses (*w*); & inter asitos illos multi, ut Esther illa Suecica, annis pene sex (*x*), & alia per 15. annos (*y*) potu caruerunt.

Deinde fuerunt, qui omnino non senserunt sitis necessitatem (*z*), ne in desertis quidem æstuosis Libyæ (*a*), etiam integræ, ut videtur, gentes (*b*).

Et novi omnino fuisse, qui ob hydropem (*c*) ad abstinentioniam potus pertinaciter animum adplicarent, iidemque siti denique caruerunt (*d*), & porro perpetuo potus necessitatem ignoraverunt (*e*). Cujusmodi exemplum sanati a parcissimo potu hydropis, in nobili viro mihi notum est. Ichthyophagos negat bibere DIODORUS (*f*). Causam harum exceptionum vel in morbosa insensilitate quæras, ut in iis qui cibo abstinent; aut in maxima

(*k*) STUBBE *Phil. transf.* n. 27. Conf. L. XII. p. 89.

(*l*) BAYNARD *of cold. bathing.* p. 329.

(*m*) SAAR *Ostind. Reise* p. 129.

(*n*) FABER ad HERNAND. p. 533. TOZZI *in art. med. Gal.* p. 94. *Lond. Chron.* 1759. p. 315.

(*o*) FABER & in puella HOOGVLIETI.

(*p*) In hysterica la METTRIE *obs.* II.

(*q*) DAMPIER *travels* T. I. p. 320.

(*r*) BIRCH T. II. p. 389. *N. de la Rep. des lettres*, 1685. Febr. Hic stultus & asitus.

(*s*) FABER *ibid.*

(*t*) MARCORELLE *Mém. des Sav. étrang.* T. I. p. 193. 194.

(*u*) PLOT. *natur. hist. of Oxfordshire*, cum & cibo abstineret.

(*u*^{*}) *Journ. med.* 1762. Jan. in gravida.

(*w*) WELSCH *Episagm.* p. 84. *Journ. de Med.* T. IV. p. 4.

(*x*) Ab anno 1707. ad 1712.

(*y*) PLANQUE p. 74.

(*z*) Non bibentes BORELL. *Cent. II. obs.* 68. RHOD. *Cent. II. obs.* 56. LOTICH *obs.* I. c. I. L. IV.

(*a*) PYRRHO apud LAERT, p. 1048.

(*b*) DIODOR. *Sicul. Bibl.* L. III. c. 18. de Ichthyop bagis

(*c*) MEAD. *monita.* p. 149.

(*d*) Die decimo quinto PANAROL. *Pentec.* IV. n, 38.

(*e*) PLINIUS L. VII. c. 18. PANAROLUS.

(*f*) L. III. c. 18.

maxima ubertate salivæ & succorum os faucesque irrorantium. Aut demum in resorptione aërea, quæ in nonnullis exemplis est manifestissima (g), cum urinæ copię adsumptum humorem longe superaverit. Libras quatuor ad sex quotidie rejiciebat puella, cui omnis, potus sex uncias (h) non excedebat.

§. IX. *Sitis sedes & natura.*

Celerior tamen in universum est necessitas sitis, & intra paucas horas intolerabilis; si præterea æstuosum cælum accesserit (a). Notissima est historia sitis crudelissimæ, quam Angli a regulo Bengalæ in angustum carcerem stipati passi sunt: & Lysimachi, fortissimi inter Alexandri successores (b), celebre pariter existat exemplum, quem sitis cum exercitu hosti coegit se tradere. Ita Caroli V. in africanam expeditio id maximum habuit incommodum, quod ex aquæ inopia plurimi milites perirent (b*). Augetur præterea dira sitis, quoties aqua de hominis sanguine liberius secessit, ut in hydropicis, in homine, cui de vulnere oesophagi potus in thoracis cavum effluebat (c), in diabete (c*). Maxima est etiam in vulneratis, aut in rota suspensis (d), & in universum in viscerum inflammationibus (e), tum in iis, quibus putridus humor in ventriculum adspirat. Libræ 12. aquæ vix sitim sedabant (f) hominis, cui vomica erat in hepate.

Denique in ventriculi inflammatione sitis summa est (g); etiam a bile in ventriculum reflua (h).

Inter externas causas augetur a sale, potissimum muriatico, cujus basis alcalina est (i); ab aromatibus calidis; ab acribus alcalinis (i*); ab

Z 2

oleis

- (g) Conf. *historia monial.* PISAN. p. 30.
 (h) *Abstinent. consolentan.* p. 127. 128. & plurimi alii casus L. XII. p. 89. 90.
 (a) Aegyptii sitem ferre nequeunt P. ALF. *hist. nat.* I. p. 36.
 (b) PLUTARCH. *de sanit. tuend.*
 (b*) P. JOV. *hist.* L. III. p. 787.
 (c) *Verband. van de holl. maatsch.* T. II.
 (c*) RUYSCH *obs.* XIII. PISSINIUS *de diabete* p. 7.
 (d) HUNAULD *de la rage* p. 19.
 (e) Conf. BONNETTI *sepulcr.*
 (f) BOERHAAVE *prax* I. p. 180. Add. BONNETT p. 25. & ILL. ANON. *de febr. interm.* p. 29.
 (g) BONNET *sepulcr.* T. II. p. 22. 23.
 (h) BONNET p. 22. 27.
 (i) COLBATCH *opusc.* p. 551.
 (i*) Injecto in venas infuso cantharidum BAGLIV *vesicant* Exp. 2.

oleis salivam supprimentibus; ab iis omnibus, quæ per sudorem (*k*) perspirationem, urinam, alvum, humorem corporis humani disperdunt (*l*); ab iis, quæ humores nostros acres reddunt aut viscidos.

Ex his ipsis phænomenis finis potus sumendi intelligitur esse, ut & humorem amissum reparet, & acrimoniam minuât, quæ in humoribus nostris nascitur.

Natura sitis in siccitate (*m*) est, quam humor natus non contempe- rat, in lingua, ore, palato, faucibus (*n*), oesophago, ventriculo: ne- que enim etiam istam de sede sitis excludi posse ostendunt historiæ, quas modo enarravimus, in quibus manifesto in ventriculo fomes fuit mali: hinc in illis modo dictis dromedariis, quorum ventriculus humore non caret, sitis etiam nulla est. Idem vero fuerit, sive omnino aquæ ad- est indigentia: sive humor, quem oporteret ex iis osculis secerni, vi- scidus nunc factus sit & immeabilis, quod iterum in febre accidit, ut illud in diabete, hydrope, vulnere oesophagi.

Cum siccitatis molestissimo sensu sitis conjungitur: a sola enim siccitate omnes fibræ animales, & etiam nervi, vel potissimum, celeriter indure- scunt, & in aridos, fragiles, pene friabiles funiculos mutantur. Si diu- turnius malum fuerit, ardor aliquis, & amaror conjungitur.

Neque remittit sensus ingratisissimus, nisi reparata aquæ in sanguine abundantia, & restituta libertate exhalationis aquosæ in ore, faucibus, ventriculo, eadem partes iterum irrigentur.

Incisiones siti extinctorum raræ sunt. In cane Cl. Pozzius (*o*) vi- dit, ventriculum rubrum, bilem peracrem, urinam perpaucam. Mors a siti per putredinem humorum & febrem acutissimam nasci videtur. Ca- nis ille fere ad rabiem ex siti actus fuerat (*p*). Post hydrophobiam ven- triculus gangrænosus (*q*).

Deinde

(*k*) Inde, puto, maxima illa in quartana febre sitis, ut infans ad sex mensuras Würten- bergicas in 24 horas siccet *Stut. an. d. Saml.* n. 3.

(*l*) Ut in illo oesophagi vulnere.

(*m*) GORTER *de sit.* p. 5.

(*n*) Sæpe tantum in suprema gula residere GARR p. 23. In ore & faucibus GORTER p. 7. In faucibus BORRILL *de ot. anim.* P. II. prop. 63. Hinc, puto ab inflammatione, post diuturnam situm bibendi impotentia GAGE *itin. Mexic.*

(*o*) p. 77.

(*p*) IDEM p. 78.

(*q*) DARLUS *Journ. de Med.* T. III. P. 2.

Deinde spissitudinis signa adparuerunt. Catellus absque cibo & potu a VALSALVA servatus, incisus sanguinem omnem habuit viscidissimum (r).

§. X. Famis necessitas.

Nunc quidem aqua simplex maximæ parti ejus indicationi respondet, quam hætenus diximus. Diluit equidem etiam præcipue sanguinem; globulis se interponit; aque mutuo contractu eos distinet; gelatinam lymphæ adtenuat; mobilia reddit omnia; fibras molestissime aridas humectat. Deinde etiam sales omnes solvit & debilitat, particulas putrescentes dispergit, acrimoniam omnem subigit: ut omnino a sola aqua somni usum nautæ cibus destituti recuperaverint (a). A tantillo sui sudoris supplemento, quem de vestibus suis fugebat, in illa Bengalensi cella sensit se refocillari, & vitam conservavit Anglorum præses HOLLWELL.

Quare in exemplis, quæ recensuimus, diuturnæ inediæ, longe præterea aqua causa fuit sustentatæ vitæ. Hinc etiam, qui potu abstinent (b) intra 60. dies, pondere diminutus est septem librarum, quod bibendo reparatum est.

Adjuvat autem in siti admixtus ad potum acor. Is enim peculiariter irritabilem naturam osculorum excretoriorum salivæ, humorisque exhalantis oesophagi & ventriculi, aptus est provocare, ut novo salivæ suæ liquoris adfluxu, eas partes consoletur. Sed idem etiam acor acrimoniam urinose magis, quam sola aqua resistit.

Deficit tamen in aqua copia sufficiens particularum densarum, oleosarum, gelatinosarum, quæ ad reparandam lympham sanguinis coagulabilem, fibrasque struendas sufficiat. Hinc in animalibus sola aqua contentis, pinguedo nulla (c). Sanguis aquosus, neque coagulabilis, viriumque defectus inevitabilis (d). Absque cibo pus non generatur in vulneribus, post cibationem abunde (e).

Ergo famis, alter vitæ custos, addita est, quæ esculenta imperet, in quibus farina, oleum, gelatina, majori copia contineantur, possintque nova elementa & fluidis partibus sufficere, & solidis.

Z 3

§. XI.

(r) *Caus. & sed. morb.*

(a) LISTER *hum. c. 26. p. 271.*

(b) MARCORELLE *Mém. des sav. étrang. p. 194.*

(c) RIVIN. *de agrest. cib. sanit.*

(d) IDEM *ibid.*

(e) KNIETH *vindicat. p. 82.*

§. XI. *Famis phenomena.*

Sensus est ingratus, dolerisque genus acrius & quasi lacerans, in solo quidem ventriculo.

Una bilis acerrima in ventriculum redit (*a*) & somnus disparet, & debilitas (*b*) succedit, & animi deliquium (*c*) & oscitatio, & ex humorum acrimonia fætet anima (*d*), & os totum excoriatur, & magis atque magis incitatur sanguinis degeneratio, ut lac acre, rancidum, urina (*e*) fætore fiat intolerabili.

Tandem vasa rumpuntur, sanguis effunditur in ventriculum (*f*), per nares (*g*), perque intestina (*h*), faucesque tument (*i*), & mens emoveatur, & vera succedit mania (*k*), & denique mors paulo serius ocyum sequitur (*l*).

Adeo vero sævi sunt dolores, ut omnia a natura humana aliena alimenta subigere cogant, tendines boum (*m*), corium (*n*), integros currus, calceos, res horridas, putridasque (*o*); ut lupum doceant lignum (*p*) julos betulæ, muscum, lutum, lapidesque vorare (*q*); ut obstinatus animus illius *Johanna NAUNTON* ad cibos sumendos fuerit compulsus (*r*); demumque adeo sanctissimos instinctus fortior vis mali destruit, ut amicus amicum suum devoraverit, propriosque infantes tenerrimæ matres

(*a*) MORGAGN. *Adv.* III. p. 55. GORTER *de fame* n. 23. Icterus bilisque vomitus FANTON. l. c. & ipse vidi, in cane & fele, ab inedia ventriculum bile plenum fuisse.

(*b*) FANTON. *Diff. anat.* p. 39.

(*c*) GAGE l. c. BOYLE *of frost.* app. p. 27. VIRIBET *bon chyle* p. 299. 210. Ex soda, nisi ederet *Miscell. Berl.* T. VI. p. 81.

(*d*) p. 167.

(*e*) Ibid.

(*f*) Ibid.

(*g*) Ibid.

(*h*) Ibid.

(*i*) *Lond. Chron.* 1759. p. 315.

(*k*) p. 163.

(*l*) Ibid.

(*m*) SCHELHAMMER p. CXXIV.

(*n*) OEXMELIN. *Hist. des Avant.* V. p. 154. Rhegienses in obâdione DIODOR L. XIV. c. 12. Siamenses naufragi TACHARD L. II. p. 211. Naufragioræ Bengalensis *hist. d'un naufr.* Addit LERIUS se famem non reformidaturum, dum coria & pelles suppeterent in itin. *Bresil* p. 408.

(*o*) Pellem bubali in ora bengalæ deserta *Hist. d'un naufrage.*

(*p*) FABER ad HERNAND. p. 488. 813.

(*q*) PONTOPPIDAN II. p. 36. 37. SCHURIG p. 305.

(*r*) BACH T. II. p. 387.

tres (*s*) coxerint , & militibus rapturis (*t*) eripuerint. Demum violentas sibi aliqui manus (*u*) intulerunt : adeo serio natura necessitatem parandi cibi homini inculcavit.

Ventriculus una vehementer arctatur (*w*) , quæ forte est ratio , quare frequenter satis legas , eos , qui a longa inedia ad cibationem redeunt , delinquere (*x*) animo, dolere (*y*) , ægrotare , & denique perire (*z*) nisi mollientibus medicamentis utantur (*a*) , aut lente valde ad cibum redeant , parce sumendo , non quantum appetitus posceret , sed quantum ferret ventriculi conditio.

Consumitur a fame adeps & humor , ut nitidissima viscera sint animalia fame enectorum (*a*^{*}) , & argentei fibrarum fasciculi (*a*^{**}).

§. XII. *Famis causa proxima.*

Famem urgent & excitant robur corporis ut in Milone (*b*) , in leonibus (*c*) , aliisque (*d*) animalibus (*e*) summi roboris : deinde robur peculiare ventriculi ; labor omnis generis (*f*) quo corpus exercetur :
eo

(*s*) TULP. l. c.

(*t*) In obsidione Samariæ Reg. II. c. 6. c. Hierosolymæ apud JOSEPHUM , & oppidi SAN- CERRE in relatione LERYI tum apud Gaspesios frequenter LE CLERC , & apud Americanos venatores , qui Anglicas colonias in hudsoniano sinu frequentant ELLIS.

(*u*) TULP.

(*w*) Ex tenui diætâ ventriculus intestino non major COLLINS p. 264. & in asita SCHURIG p. 200. LITTEr Mém. de 1716. RUYSCH obs. 68. f. 56. add SANTORIN. p. 164.

(*x*) TACHART II. p. 323.

(*y*) Nouv. de la rep. des Lettres 1685. fevr. BONTEKOE voyag. p. 277.

(*z*) AVICENNA p 61. b. KERKRING obs. p. 80. LERY sub fin. itin SAAR Ostind. Reis. p. 125. BEWERWYCK Schat. der ongezondh. p. 211. de peste Leidensi , & de BERNHARDO illo fanatico DETHARDING : & BAYER loc. nov. testam. p. 12. Etiam a siti, quando nimium bibunt, cameli pereunt. RUSSEL alepp p. 56.

(*a*) Lactis usus ille apud CARDANUM var. p. 320. humectantibus CL. LOSSAU obs. 21. L. I.

(*a*^{*}) REDD anim. viv. p. 81. adv. HAYMAN Comm. III. p. 318.

(*a*^{**}) COCCHI hort. flor. præf. p. LIV.

(*b*) Turkinenses maxime voraces, tamquam fortissimos, in militum selectu præferunt DAMPIER Trav. p. 71.

(*c*) Leo quotidie libras carnis vorat 20.

(*d*) Lupus ad 22. FABER ad HERNAND. p. 488.

(*e*) Hinc chalybs appetitum auget.

(*f*) Dithmarsii messis tempore sexies in die cibum capiunt SCHELHAMMER ars med. II. p. 86. Hinc ille coquus, quem ALEXANDER ADAM coquis præferebat : nocturnum nempe iter prandium gratum facit PLUTARCH. sanit. tuend. Hinc in somno nulla fames gliribus, expergiscentes vorant iidem FANTON. diff. anat. p. 41.

eo magis, si præterea in frigido aere fuerit susceptus (*g*); ut etiam in borealibus regionibus (*h*) major sit famis potestas.

Adjuvant famem lumbrici (*i*) qui partem consumunt succi utilis. & laxitas pylori (*k*), quæ facit, ut ventriculus pene continuo inaniatur, quæ eadem voracissimis animalibus nativa inest (*l*).

Plerumque etiam acida quæque (*m*), ut cremor tartari, succus limonum, & quæ sunt ejusmodi, famem sustentant, dum, puto, succi in ventriculum confluentis augment copiam, & putredinem, fami inimicam superant. Inter numerosos fructus, quibus Indi orientales delectantur, plerique sunt acidi.

Sed etiam nervorum sensibilitas major famem facit majorem (*n*).

Est denique ignota conditio, quæ facit, ut homines aliqui super reliquorum mores, in fame (*o*), in copia ciborum (*p*) in superandis demum absurdis (*q*) & difficillimis cibus, excelluerint.

Inter animalia, brevi vitæ destinata, insecta etiam voracissima sunt. Eruca nihil nisi vorat & egerit (*r*).

Proxima

(*g*) SUIDAS p. 447. Conf. L. XII. p. 70. VIRIDET bon chyle p. 209. 210.

(*h*) Qui Grönländiam adeunt sunt famelici LIND health. of seamen. p. 23. BOYLE of frost. app. p. 27. Nautæ in Magellanica pene insatiabiles hist. des terres austr. I. p. 217. Multo plus annonæ paratur navibus septentrionem adeuntibus, quam austrum petentibus PONTOPPID. II. p. 499.

(*i*) TRALEIANUS L. VII. c. 4. Bulimus sanatus ejecto verme Phil. transf. n. 264. BONNET p. 15. 16. Bulimus a pediculis in ventriculo SENAC. Ess. p. 604. BONNET obs. 9. p. 17.

(*k*) RUYSCH obs. 74. LAMY disc. anat.

(*l*) Sic cum vomitu perpetuo famens Phil. transf. n. 476.

(*m*) HELMONT sextupl. digest. n. 12. p. 168. VIRIDET bon chyle p. 107. BAYLE corp. anim. p. 112. LISTER hum. c. 5.

(*n*) In tetano universali endemie BARRERE france equinox. p. 73.

(*o*) SCHURIG p. 185. Phil. transf. n. 264. HILD. L. IV. p. 31. CRAUSE egrot bulim. Jen. 1695. Acadenses DIERVILLE p. 155. Nigritæ Hist. des Voy. L. IX. p. 322.

(*p*) Vitulum aliquis edisse dicitur MARC. DON p. 203. MILO bovem. Panes bilibres stomachicus PRAXAGORÆ famulus ASCLEPIADES apud CÆLIUM tard. affect. L. III. c. 2. Vorax cantienfis celebris fuit CHARLTON Enquiries of nutrition p. 79.

(*q*) Eph. Nat. Cur. Cent. II p. 195. BOYLE de util Phil. Exp. p. 195. WALTHER thesaur. n. 88. BOEHMER Diss. de polyphago RZADSCZYNSKI hist. nat. Polon. p. 450. G. A. HAMBERGER de imbecillit. ventr. per est. KUNDMANN Seltenh. p. 1063. 1066. TILING vass. brev. p. 398. MORRIUS inst. p. 164. LEIGH. natur. hist. of Lancashire. p. 301. CARDAN. var. p. 195. Physiol. bat. p. 80. REINES varior. p. 74.

(*r*) SWAMMERDAM p. 575.

Proxima denique famis causa, ex collectis animalium phænomenis, videtur tritus esse, quando ventriculi (s) nervosa juga tenui (t) villosa crusta obducta, inque ventriculum pendula, super se invicem confricantur, quem motum, & ventriculo proprium, & a septo transverso, musculisque abdominis superadditum, interim tanquam ostensum liceat mihi sumere (u). Addit Vir. ILL. videri nervos eos prurientes reddi a sanguine in eas plicas congesto, ut in omni irritatione fit (w). Non bene hæc sententia refutatur, quod ventriculus ultra tertias contrahi nequeat (x). Ostendemus enim, contrahi, ut nulla cavea supersit (y). Voraci homini angustus ventriculus (z).

Ex aliis enim experimentis, exque sensu intolerabili frictionis cujusque in nuda cute factæ, licet æstimare, quam acris debeat sensus esse numerosorum nervorum, tantum non penitus nudorum, contra se invicem confrictorum. Ad solum ostium sinistrum non retulerim (a).

Hinc etiam intelligitur, quare adeo lenta famis sit, & diuturna inedia, in serpentum genere (b), quibus tritus vix ullus est, cum ventriculus parum carnosus sit, vis autem abdominis & septi transversi omnino nulla. Et quare in capone (c), quem exempli loco cito, omnium celerissima mors supervenerit; celerior quam in cane, fele, aliisque carnivoris (d). Multo nempe gallinaceo genere, quam ulli quadrupedum, fortior est in ventriculo tritus. Etiam insectis (e), quorum minor est motus peristalticus, hieme nulla famis est, æstate plurima (f), eo major, quo calor æstuosior (g).

De

(s) In oesophagi flexu sedem famis ponit VIRIDET bon chyle. Sed sensu hic licet uti.

(t) p. 133.

(u) Sect. IV.

(w) SENAC. *Ess. de phys.* T. III. p. 594. 595.

(x) *Elem. de physiol.* p. 219.

(y) Sect. IV.

(z) ETTMULLER *progr. ad disp.* FRIDERICI. BONNET *obs.* 10. conf. p. 123.

(a) Conf. DUVERNEY II. p. 184.

(b) p. 169.

(c) p. 176. 170.

(d) p. 170. Ab amara bile in ventriculum fluente, appetitus deletus BONNET.

(e) LYONNET p. 255.

(f) BAKER p. 137. 142. de polypis TREMBLEY p. 114. 116.

(g) TREMBLEY p. 186.

De succo gastrico sum timidior. Is utique in jejunantibus abundat, & de ore profluit, & acrior fit, & sensus quidam rosionis in fame videtur percipi. Et tamen cum eum humorem ad lixiviosam naturam vergere (b) certum sit, ea vero appetitum potius minuat, atque acor manifesto appetitui sit amicior, credam potius, quoties per moram factus est acrior, humorem ventriculi appetitum delere, uti efficaciter ab omni putrido liquamine deletur. Hinc forte appetitus aliquot a pastus tempore horis minuitur, si absque cibo manseris, dum interim os amarescit.

Reliquias ciborum (k) qui pro fermento causaque famis habuerunt, videntur obliti fuisse, inanem demum ventriculum famem facere (l).

Mentis esse officium, & nihil habere mechanici, ex hypothese dictum est (m).

§. XIII. Quæ famem auferant.

Famis finis est, hominem ad sumendum cibum compellere; ne ante diem destruat. Cibus sumtus utrique fini satis facit; nam reddit sanguini tenuem, subacidum chylum, a putredinosa natura alienum, qui sanguinem in mediocritatem (a) acidam inter & urinofam naturam reducat. Idem sanguinem diluit; & adtert ad ejus massam oleum, gelatinam, aquam, sales necessarios, materiem nempe omnium partium firmarum & fluentium, quæ reparatione indigent.

Sed uti necessitatem famis cibus tollit, ita tollit famem ipsam. Cibus enim, dum ventriculum replet, & distendit, tritum rugarum (b) sensillum diminuit, easque a mutuis urget contactibus; & oblinat villosam tunicam miti materie, & acrimoniam obruit, si quæ in succo gastrico nata est, Sensationem delebat potum atramentum, inde apositia successit.

Alio modo fames destruitur (c), a nervosa quidem adfectione, siue cerebrum

(b) p. 143.

(k) WILLIS *ferm.* p. 25. VERHEYEN L II. p. 257. 258. BARTHOLIN. p. 79. GEISSON p. 325. W. SENGUARD *philos natur.* p. 416.

(l) Add. GORTER l. c. p. 11.

(m) NENTER. *physiol.* p. 190.

(a) HALES *hemastat.* p. 218.

(b) p. 185.

(c) BECK *palpit. cord.* p. 26.

cerebrum insensibile fuerit (*d*), aut ligati nervi (*e*); sive tristis fuerit aliqua animi passio (*f*); sive desiderium vehemens: sive mechanici quid, ut a vertigine per rotationem mota (*g*). Sive sensus nervorum ab oleo, opio (*h*), nicotiana, spiritu vini, plumbo (*h*^{*}), diminutus: sive potus calidus (*i*) nimia copia sumtus fuerit, qui ventriculum maceret, debilitet, reddatque tenuem & inertem (*k*). Videtur per hæc omnia vel impediri nascituram in nervis famis sensationem: vel natam intercipi, ne ad cerebrum perveniat.

Tollit etiam famem plerumque putredinosum omne, sive in cibo fuerit ingestum; sive intus ab ulcere aliquo, aut ab hepate (*l*) corrupto fuerit inspiratum. Vetulam dissecui, quæ multis annis sola cerevisia tenui vixit, quod ejus ventriculus aperto ulcere in colon pateret, ut olidis scybalis in stomachum aperta via esset. Et pleræque apositiæ, quas vidi insuperabiles, a vitio fuerunt hepatis, putridæque bilis (*m*).

Nauseam hic addas, oppositum fami malum, in quo ciborum desiderium destruitur. Infinitæ ejus causæ sunt, potissima vero putridum aliquid in ventriculo hærens, vel simplex ejus putridi idea. Cum quatuor mensibus in ventriculo lactes cyprini indigesti remanerent, eo toto tempore cibi superfuit horror (*n*).

A a 2

SECT.

(*d*) Apoplecticus neque bibens, neque cibos desiderans VIRIDET l. c. p. 460. Senex quem citavi L. XVII.

(*e*) BRUNN *Disp.* p. 38. &c. WILLIS p. 172.

(*f*) BRUNNER *duoden.* p. 32. Inde pleræque inedia p. 175.

(*g*) HAYMAN *Comm.* T. III. p. 312.

(*h*) DARVIEUX *Mém.* T. III. p. 21. 22.

(*h*^{*}) Paralysis, cibi non cocti a saccharo saturni HILDEFELD p. 57.

(*i*) Mala ventriculi a Theae potu habet BOERHAAVE *prælect.* in *propr. instit.* n. 75. Cardialgia inde facta VIRIDET *bon chyle* p. 563. Syncope HARTSOEKER *conf. phys.* p. 53. ZWINGER *de Thea helvet.* p. 5. Etiam chorda tensa a vapore calidæ continuo laxatur ARBUTHNOT. *of air.* p. 61.

(*k*) IN SCHRADERI inedia trienni nihil mali fuit nisi ventriculus tenuis & intestini *obs* 1. Add. BONET. adde asitos & adipos ob villosam non continuam ventriculi VIRIDET p. 109. 40.

(*l*) BONNET T. II. L. III. S. I. *obs.* 15. 10. 6. *Conf.* GHERLI *obs.* 57. *Cent.* II.

(*m*) Asitiæ sedes plerumque, aut semper, in hepate LIEUTAUD *precis.* p. 416.

(*n*) STORCH *Krankh. schwang. Frauen* p. 241.

SECTIO III.

CIBUS POTUSQUE.

§. I. *Auscultandum utrique sensui.*

SUbtilitas fuerit, famem sitimve alio nomine quam dolorem dicere, aut peculiarem sensum (a) efficere, ad quem pertineant.

Fidi autem naturæ (b) duces sunt, utraque, si ea sola, absque idearum adfociatione audiatur: neque necesse est, quantum sit nutriendum, ex pondere (c) aut perspirationis modo metiri, ipsa enim fames superstes jubet ultra cibari, sedatus amor edendi docet abstinere. Itaque animalia omnia indocta modum tenent alimentorum.

Cum porro eadem causæ sitim faciant, quæ faciunt necessitatem bibendi [defectus nempe humoris (d) acrimonia humorum; aut visciditas] æquum est eadem mensura & finem obtineri ob quem bibitur, & terminum facere desiderii. Reparato enim humore, sublata acrimonia, visciditate resoluta, nihil causæ est, cur ultra bibatur; & famis eadem est ratio. Adeo fidelis autem est horum desideriorum vox, ut etiam speciem cibi, potusque omnino aptissime distinguant. In febribus acutis veram (e) curationem ipsa sitis indicat, aquam subfrigidam cum acido humore mistam: & ipsa fames suo silentio edere vetat, quo tempore putredo humorem imminens, non finit cibum sumere, absque certa corruptione, iterum morbum auctura.

Est etiam aliquanto plus in fame commodi. Sæpe ægroti minus solitum cibum magno desiderio flagitant. Id desiderium suadent maximi medici (f) pro norma haberi. Ita acidi (g) succi, plerisque aliis medicis

(a) GORTER esse gustum internum PERBAULT *du gout*.

(b) WAINWRIGHT *of meat*. p. 157.

(c) GORTER *de fame*. p. 71. 75.

(d) p. 180.

(e) Felix eorum usus in malignis & pestilentialibus febribus confirmatur a doctissimo A. COCCHI *del vitto pitagorico*.

(f) G. V. SWIETEN T. II. p. 231 BRUNNER apud DANIEL *Beyträge* II. p. 96. BOHN *offic. med. dupl. diff.* 3. n. 6. APPERLEY *obss.* p. 185. *Essay of a Societ at Edimb.* T. V. P. 2. n. 46. Citriorum libris quatuor superata atrophia PANAROL. L. II. *obs.* 38.

(g) Cucumeres acidi OSHME II. p. 59. add. DANIEL l. c. Brassica FABRIC. *sciagraph.* *Butisbac* p. 32. Pepones in anorexia PEIRESCI *vita* p. 21. Melongena MARC. DON L. VI. c. 5.

medicis suspecti, etiam in dysenteria putredinosa, salubres fuerunt, & in acutis (*b*) morbis.

Ita falsamenta (*i*), adeo parum diversa a sale ammoniaco, quem laudabat M U Y S I U S, ab ipso naturæ instinctu in febribus intermittentibus poscuntur, optimo eventu, si auscultatum fuerit.

In marcore ostrea, mitissimum cibum, utiliter desiderata lego (*k*), & in phthisi fraga (*l*).

In ascite cerevisia, diuretica ut puto, cum desiderio pota morbum superavit (*m*).

§. II. *Homo omnivorus est.*

Si ex appetitu iudicium petere licet de cibo a natura homini destinato, sequetur omnino, pene ad omne genus ciborum hominem natum esse, cum pene nullum sit in mari terrave plantarum & animalium genus, quod gens aliqua in cibum non receperit; neque venenatis fungis, neque animalibus pariter venenosis (*a*), neque iis exceptis cibis, a quibus propter fætores natura nostra abstineat (*b*).

Quare, cum quæstio sæpius sit agitata (*c*), num herbivorus homo sit, num pariter carnivorus, de ea poterat vel ex naturæ appetitu definiri.

Sed etiam reliqua consentiunt. Homini enim inter carnivora animalia & herbivora media est fabrica, & de utraque habet, ut credas tamen aliquanto propius ad herbivora accedere.

Differre dicuntur hæ classes, ventriculo, dentibus, intestinis, & etiam potissimum cæco intestino. Ventriculus tamen etiam in herbivoro equo hu-

A a 3 mani

(*b*) Etiam cerevisia, ut puto, tenuis HAGEDORN *Cent.* II. n. 49.

(*i*) SCHULHAMMER *Ars med.* T. III, p. 287. HELWIG *obs.* 155. add. *Eph. Nat. Cur.* Vol. X. * *obs.* 59. *Bresl. Saml.* 1724. p. 440. & in anorexia WIGAN *Itiner. philiatr.* p. 58. & C. TRIËN p. 2. in aliis malis. Feliciter in febre salis usus fuerat TRALLIANUS L. XII. p. 748. 766.

(*k*) TULP. II. c. 8.

(*l*) DANIEL I. c. p. 88.

(*m*) PECHLIN. I. *obs.* 63.

(*a*) Japonenses *Hist. des Japonois* p. 162. Fungis venenatis Russi.

(*b*) Conf. paulo post. n. 5.

(*c*) Contra victum animale WALLIS *Phil. transf.* n. 269. *Auct. tr. des dispenses de Careme* P. I. c. 7. ROUSSEAU *tr. de l'égalité* not. 4. & nuper COCCHI *de victu pythagorico* Contra vegetabilem ANDRY *des alimens* I. p. 19. TYSON *Phil. transf.* n. 269. ARBUTHNOT *of alim.* BIANCHI sive I. PLANCUS *vir cel. de victu pythagorico.*

mani est similis (d), tum in porco, ex sua natura radicibus & fructibus arborum viventi, qui demum per hominis societatem omnivorus fit (e).

Dentes iterum cum equo conveniunt, cum caninos paucos (f), plures molares planos homo habeat, tricuspides (g) vero, quales carnivora animalia, nullos, solamque pene earum cuspidum umbram. Non adeo videtur natus esse ad ossa dentibus confringenda, nempe non esse rapax animal.

Intestina universa longiora, & quæ inter ea crassa dicuntur, ea largiora sunt, & in herbivoris (h, animalibus, & in homine.

Iterum carnivoris cæcum intestinum breve (i) & curvum, herbivoris plerumque longum (k) est & grande. Ea in particula homo ad utramque naturam accedit: graciliorem enim, quam ipsa carnivora animalia, & nullius momenti appendiculam habet, cæcum vero intestinum etsi amplum, tamen breve (l). Crassa porro intestina multo quam in carnivoris longiora habet, si cum canis recto intestino comparaveris, aut alterius animalis carnivori. Deinde idem colon humanum cellulis (m) interrumpitur, quod in iisdem animalibus carnivoris simplex est.

Si præterea, quos nunc addemus, ciborum varii generis ab homine adsumptorum, eventus addideris, apparebit, hominem salubriter, & diu vel solo vegetabili cibo, vel solo animale victu, vel commisto utroque vitam posse sustentare.

Pygmæus ille pene homo, & omnivorus est, & liquores spirituosos concupit (n).

Est etiam in aliis animalibus, certe plerisque, aliqua in victu variando libertas (o). Nam inter manifesta herbivora, vaccæ (p),
oves

(d) p. 128 & ubique Cl. BERTIN *Mém. de 1546.*

(e) Non ergo debuit carnosus granivorarum animalium ventriculus hic produci, qui homini non sit datus ANDREY l. c.

(f) p. 25.

(g) p. 27. TYSON *Phil. transf.* n. 269.

(h) MONRO *comp. anat.*

(i) Conf. interim *Comm. BOERH. T. I. p. 405.*

(k) Ibid. TYSON *ibid.*

(l) Cum herbivoris consentire TYSON, non undique vere.

(m) Vide *Comment. Boerb. T. I. p. 525.* & GREW t. 23. in viverra, cane, felle.

(n) TYSON p. 30.

(o) BRADLEY *improvem. of garden.* p. 27.

(p) ZORGDRAGER *Walfischfang.* PONTOPPIDAN II. p. 11. PETRERE *relat.* p. 8. Etiam ossa vaccina rodunt, KALM *Amerresal.* p. 129 Pecora folis piscibus putridis aluntur circa Mascate Ovington *Voyag.* T. II. p. 130. & apud Tartaros *Jupi. hist. des Chinois* p. 82. De Gedrosia olim PLUTARCHUS in ALEXANDRI vita, & nuper THEVENOT *itin.* T. II. L. 3. c. 5.

oves (q), equi (r) discunt piscibus vivere: Sed etiam carnibus equos (s) in arabia littorali, & cuniculos sanguine humano (t) pinguescere, & apros, radicivorum animal, pelles avium, & capreolorum, fetusque suos & humanos devorare (u); & gallinas, cum suo granis commolendis destinato ventriculo, tamen araneas, insecta, lumbricos, carnem concisam, ova amare: ut etiam pulli calecutici nuper nati ovis bene alantur, & pereant iidem cum acido odore, si nimis mature iis fagopyrum propinatum fuerit (w). Porro cornices & carne vivunt & granis (w*). Sed etiam gyri- nus lenticulam aquaticam pascit; idem ranæ indutus personam, insecta rapit, & potissimum cochleas (x): talpæ & radices & serpentes vermes- que (y) sectantur; & erucæ aliquæ herbivoræ aluntur vermibus & erucis (z). Sed ipsæ cochleæ & gramen pascuntur (a) & se mutuo devorant. Contra canis (b), & felis carnivora, discit pane uti, aliisque vegetabili- bus, & milvum pane vixisse ALDROVANDUS auctor est, & aquilam (c) pane & hordeo se sustentasse BORRICHIVS testatur, gravis au- tor. Alia animalia aliunde omivora sunt; erinaceus (c*), cancer (c**).

Hæc eo minus debent abscondita videri, cum & ipsa animalia tamen ve- getabilibus succis alantur, unoque gradu intermedio leo a gramine distet, quod in bovis carnes mutatum rapit: atque adeo non maximum inter succos animales & vegetabiles discrimen sit (d).

Est equidem in plantis aliquanto pronior ad acidam natura (e), ad urinofam in animalibus. Sed tamen etiam plantæ in acervos congestæ, putre-

- (q) ZORGDRAGER *Walfischfang* p. 70. tum ARRIANUS. PLUTARCHUS in ALEXAN-
DRO. PEYRERE: HORREBOW *de Island* p. 229.
(r) ZORGDRAGER p. 70. *Phil. transf.* n. 289.
(s) RADZIVIL *Iter. palest.* p. 215.
(t) BEHKENS *diat.* p. 175.
(u) BUFFON T. V p. 119.
(w) *Hanov. Seltenh.* p. 147.
(w*) *Natunlyke historie* T. IV. p. 36.
(x) SWAMMERDAM *bibl.* p. 825. *Leipz. Saml.* T. V. p. 752. 753. & scarabæos
JACOBÆUS p. 9. 49.
(y) BROWNE *err. populi*.
(z) DE GER p. 202.
(a) LISTER *de cochl.* p. 90.
(b) Uvis, piris, pomis, REAUMUR *Mém. de 1752.* p. 491.
(c) *Hermet. Aegypt. sap.* p. 175.
(c*) LINN. *Oelandiska resa* p. 265. Hinc neque cæcum habet, neque colon *Phil. transf.* n. 269.
(c**) BASTER *uytspanning* T. II. p. 12.
(d) NEEDHAM *microsc. obs.* p. 271. SHAW p. 155. 156. BRADLEY *improver.* p. 27.
(e) Vide panis analysin *Mém. de l'Acad.* 1732. p. 29.

putrescunt & fætent (f), & per putredinem volatilem falem urinosi (g) generis fundunt & destillantem dant humorem alcalinum (h), & per ambustionem fixum lixivum falem.

Denique omnibus comparatis, proprie sola gelatina nutrit (i). Atqui gelatina (k) non in sola animalium lymphâ, sed in farina pariter vegetabilium habitat. Olim in pane extracti gummosi vim invenit Cl. GEOFROI, ad 6. drachmas in 32. (l).

Deinde ut ILL. J. Bartholomæus BECCARI (m) in farina tritici duplicem reperit materiem, alteram pulveream amylaceam, alteram glutinosam aquæ non miscibilem; amylacea illa, vegetabilis naturæ tenacior, acidum elementum continet, & cum aqua vinosam naturam induit, cum lixivo fale fervet (n) & syrupum violarum parco quidem rubore tingit (o), deque eadem subiecto igne acidus spiritus destillat (p).

Contra pars glutinosa ad animale indolem accedit (q) & ad cadaveris modum putrescit (r), inque aqua diffusa cum acidis fervet (r), aliaque lixiviosæ naturæ signa dat (s), igneque subdito spiritum urinosum (t) & oleum suppeditat.

Eadem nuper suis experimentis auxit & confirmavit CLAR. KESSELMAYER (u).

Gluten (w) quidem, ex tritici eluta farina dupla amyli portione eduxit insipidum, adhærescens, in ore non solubile, laminosum, in aqua

vix

(f) BOYLE *Hist. of the air* p. 45. cum cadaveroso fæto. Mentha apud STALE *Chem. fundam.* T. III. p. 114. Brassica apud ROGERS p. 41. Inde morbus malignus ibid.

(g) WEDER *de sale volat. plant.* in ampla certe gente nasturcinarum, quarum plurimæ in cibum recipiuntur. Sed ex acetosa æque partes volatiles educuntur, ut ex cochlearia *Mém. des Sav. estrang.* T. II. p. 330. Ex melissa putrida sal volatilis urinosus HOFMAN *labor. Altd.* Ex pomo citrio putrido alcali volatile *Phil. transf.* n. 392.

(h) Ex tritico PUTATUS *viçl. acut.* p. 74. 75. Ex plantis cichoraceis TACHEN *kipp. chem.*

(i) LUDWIG *de viçlu anim.* LORRY *tr. des alim.* p. 22. &c.

(k) KESSELRING. GEOFROI *Mém. de 1732.* p. 29.

(l) *Mém. l. c.*

(n) *Comm. Bonon.* T. II. P. I. p. 123.

(n) p. 123. 124.

(o) p. 125.

(p) p. 126.

(q) p. 123.

(r) p. 124.

(s) p. 125.

(t) *Ibid.*

(u) p. 126.

(w) In Diss. argentorati *defensa de quorundam vegetabilium nutriente principio.*

vix mutabile, siccitate in verum gluten rediturum, deque eodem superque ignem stillaverunt (x) vapores albi & spiritus empyreumaticus, cum acore fervens (z), & oleum: carbonem vero reliquit insipidum.

Eadem sponte computrescit (a), & caseum olet fætidissimum, & aquam imprægnat vi urinosa, ut cum acidis quibusque ferveat.

Contra amylacea pars, omnino ut apud BECCARIUM, cum aqua macerata non putrescit, & odorem spirat acidum, & succos cæruleos rubro colore (b) imbuunt, eademque subjecto igne dat spiritum acidum (c), inque carbone salem fixum lixiviosum relinquit.

Portiones etiam harum in farina partium definivit vir Cl. ut spelta glutinosi habeat plurimum, ad libram, triticum hibernum uncias decem, & eo minus ut fuerit vilior farina (d). In secali amyli minus est, glutinis nihil (e); in hordeo fere perinde (f): in avena (g) minus, quam in hordeo mucaginis amylacæ; quæ in mayz acida sit (h). Pisi (i) plus habent partium nutritiarum, phaseoli (k), lentesque (l) minus, solanum (m) tuberosum perparcum alibile.

Denique etiam hoc perspicax vidit, glutinosam partem cum aceto subactam (n) in amylaceam abire, atque adeo in ipsa planta acidi abundantiam amyllum facere, quæ ut dissipata fuerit, gluten nascatur.

In pane denique cocto glutinosum ab amylaceo non distinguitur, & videtur, acorem nunc per totam massam diffusum esse, qui in solo amylo habitaverat (o).

Dudum

- (x) p. 5.
- (y) p. 9.
- (z) p. 10.
- (a) p. 8. 9.
- (b) p. 7.
- (c) p. 8.
- (d) p. 15.
- (e) p. 20.
- (f) p. 22.
- (g) p. 23.
- (h) p. 24.
- (i) p. 27.
- (k) p. 26.
- (l) p. 28.
- (m) p. 30. 31.
- (n) p. 12.
- (o) p. 15.
- (p) *Traité des aliments* T. I. p. 325.

Dudum ex fermentatis pisib. salem volatilem adscendere vidit Cl. LEMERY (p), cum ignem subiecisset, & optimum, qui absque fermentatione novissimus prodisset.

Adparet adeo, etiam in farinosis urinosum & glutinosum, quod in animalibus est, elementum latere, neque adeo quidquam ad alendum deficere.

§. III. *Cibus vegetabilis.*

Historia primæva hominem in asia mediterranea reperit, fervido sub cælo, feraci dactylorum, & fructuum sponte nascentium. Ex RUMPTIANO enim opere nostris cum herbarum indigenarum catalogis comparato, intelligimus, immensum esse regionum calidarum in ferendis diversis, & numerosis fructibus horæis (a) herbisque sponte edulibus privilegium. Nullum fructum sponte edulem Europa præter baccas protulit.

Ea ergo in opportunitate, cum neque ad agrum colendum metallorum usus, aut animalium subigendorum ratio inventa esset: neque ad occidendas feroces belluas homini armorum esset satis: neque sepes, & stabula nosset exstruere, quibus mitiorum animalium secula captiva concluderet: videtur victus ab arboribus esse repetitus. Etiam id in itineribus didici, quacumque homo securim non adhibuisset, per vastam illam americanam, per africanam, per borealem Sibiriam, per antiquam Islandiam ubicunque ferax est, ibi sylvam fuisse, que per sub assyrico cælo potissimum palmarum fuit. Ad selectum autem cibi saporem (b) procul dubio duce homo usus est; deinde historia eventus: ut enim quisque ab ignorato fructu bene habuisset, aut male, ita filios docuit nepotesque. Hæc prima fuit & diæteticæ origo & medicinæ (c). Nam homines in analepticas, in refrigerantes, in acidas, in alvum laxantes, in emeticas, in narcoticas, in variarum vitium plantas per peregrinationes incidisse est probabile. Vegetabilis ergo vita prima fuit, fructuum, herbarumque & radicum, crudorum omnium. Et etiam nunc, eodem sub cælo, pene eodem modo vivitur. Ita Persæ apud KÆMPFERUM (d) in palmetis folis dactylis

(a) Omnes pene refrigerant conf. PAXMAN med. ind. p. 16.

(b) Spéc. de la Nat. VI. p. 13.

(c) Vult olim HENRIER in orat. inaugur.

(d) Amoenit. Exot. Fasc. IV. Relat. 9. In Ægypto multæ familiæ folis vivunt dactylis HASSELQUIST p. 501. Musam addunt alii p. 494.

Œylis beati vivunt. Bramines (*e*) vegetabili victu etiam nunc utuntur, pomis fere & aqua (*f*). Iisdem & lacte caprillo Arabes aliqui vitam sustentant (*g*), populorum antiquissimi, morumque aurei seculi tenacissimi. Cucumeribus pene folis, & crudis, constantinopolitani cives plerique (*h*) aluntur.

Etiam ad græcos Poetas, multo quidem posterioris ævi, ea fama manavit. Glandes (*i*), sub multo deteriori cælo, & arbutos fetus nominant; illas equidem in Græcia & Hispania hætenus edules. In Suecia autem in cibos fuisse receptas, & de earum usu ex legibus constare, de nostra glandium acerba specie ægrius credo (*k*). Castaneis, adfini glandium fructu, apenninicolæ fere unice vitam tolerant (*l*).

Uti sensim per novum orbem se hominum genus dilatatum extendit, ita ex regionum varietate alii & alii terræ fructus in cibum sunt recepti; melones, herbæ succulentæ, ipsi musci, lichenes (*m*), & fungi. Natura enim humana nihil detrectat, nec gramina quidem, quæ puerum edentem vidi, & quæ eadem ille TULPIANUS (*n*) edit, nec filipendulæ radices (*o*), plantasque venenatas (*p*). Cortices arborum tritas pini & abjetis boreales gentes (*q*) non dedignantur. Gummi quod arabicum dicunt, mauros (*r*) alit.

Sensim artes inventæ, & primum, puto, radices effossæ sunt, quæ in regionibus fervidis multæ & bonæ nascuntur: Cassava (*s*) certe panem insulis sacchariferis ministrat, nymphaeæ radix, & papiri Ægyptios

B b 2

(*e*) GROSE *voyag.* p. 297.

(*f*) SUIDAS p. 454.

(*g*) RADZIVIL p. 215.

(*h*) TOURNEF *Voy. au Lev.* II. p. 286.

(*i*) In Hispania secundis mensibus glandes inferuntur PLIN. L. XVI. c. 5. Iis vescuntur Lusitani STRABO & *descr. Afr. occid.* L. V. p. 350. In Africa & Hispania edules sunt REDI *Lett.* T. V. p. 44. 46. & inter nuperos facetissimus CERVANTES in II. heroicorum equitis D. QUTCHOTTE c. 67. Est *Quercus fr. eduli* Enzina apud CARDAN. *subtil.* L. VIII. *Quercus parva sive phagus Græcor.* & *Esculus* PEINII I. B. T. I. L. II. p. 74. Etiam Japonenses glandibus vescuntur *Hist. des Japon.* p. 176.

(*k*) GADD. *Frostnäster.* RUDBECK *atlant.*

(*l*) PINELLI *de acido sang.* p. 72. 73.

(*m*) Japonenses, Algonquini LAFITEAU *mœurs des Sauvages* T. II. p. 92.

(*n*) L. IV. *obs.* 10. p. 296. Alius apud RASCZYNSKI p. 355. Alius apud KERGER *ferment.* p. 187.

(*o*) Veteres sueci; ari aquatici radices nuperis.

(*p*) Japonenses l. c. p. 162.

(*q*) HÖGSTROM *lapland.* p. 24. LÖCHSTÖR *method. med.*

(*r*) ADANSON *relat.* p. 38. Caravana abyssinica eo vixit HÄSSLEQUIST p. 532.

(*s*) A COSTA. WATTE p. 101.

ptos aluit. Hottentotti multas radices in usum recipiunt: Inhames & Solana, illa quidem in America calida, hæc in Peruvia ipsa, plurimo usu veniunt. Ipsi Jakuti, aliique per sibiriam Tartari, radices varias lathyri, hedyfari, liliorum, & quas non alias in cibum recipiunt.

Aliquanto ultra profecti in artibus homines demum gramineas plantas peculiari studio excolere ceperunt, quarum farinosa semina multum alimenti suppeterent, & plus, quam horæi fructus, redderent virium, & præterea non perinde usu absumerentur, sed circa hominum tabernacula ea copia, qua esset necesse, possent excoli, & ad remotos usus servari. Ergo Mayz in America continente (t), in Africa milii genera varia, oryza in India orientali, sesamum in calidioribus Asiæ regionibus, ubi triticum deficit (u), triticum & aliæ plantæ ejus tribus in Asia citeriori, & in Europa magna copia cultæ, necessitatem fructuum horæorum, glandiumque minuerunt. TRIPTOLEMUS, agri colendi auctor, glandibus otium fecit.

Maturre etiam mitia animalia, oves, bovesque; etiam capras, equos & camelos hominum industria jugo suo subjecit, habuitque paratas inde dapes, lac ex feminini lactis familiaritate notum: exque lacte paratum pro varietate regionum caseum, butyrumve. Lactis analysis fere quæ plantarum est, succosque dat acidos (w), absque fere urinoso sale: Sed etiam fermentationem concipit & destillando dat spiritum inflammabilem (x*), ut mihi, ægrius credenti, de equino lacte fidus testis Gmelinus confirmavit, a juventute familiaris meus (x*).

Probabile fit, & ostendunt primævæ historiæ, diu, & aliquot puto seculis, vegetabili cibo solo & lacte (y) homines contentos fuisse. Nominant fabulæ Hyperboreum, Martis filium (z), aut PROMETHEUM (a) aut Pygmalioni coævus (b) homines suis civibus detestatos (c), qui primi sustinuerint aratori bovi jugulum aperire, aut mitissimæ ovi se præstare carnifices.

Erat

(t) A COSTA *hist. natur.* L. IV. c. 16.

(u) DIODOR. L. XIX. c. 13.

(w) GÉOFROI *Mém. de l'Acad.* 1732. p. 22.

(x) LISTER *de hum.* p. 134.

(x*) Vide L. XXVIII. S. 1.

(y) Ante diluvium eam fuisse diætam HERCULET *med. Theol.* P. I. & olim patres ut TERTULLIANUS in *Epist. de cib. Judaico* & HIERONYMUS adversus JOVIANUM. L. I.

(z) PEIN. L. VII. c. 5.

(a) Ibid.

(b) PORPHYRIUS *περὶ ἀποχῆς* L. IV.

(c) Homines facinorosos *infirm. valet tuend.* p. 119.

Erat enim satis virium alibilibum in iis, quæ enumeravimus, vegetabilibus, ut inde homo vitam sustentaret, magnæque etiam nunc religiones, gentesque, nihil ultra in cibum recipiunt. Etiam unica harum dapum vita commode alitur. Solo fructu cacao (*d*) nautæ integro mense læti vixerunt. Castaneis (*e*) fere solis, ii quos dixi, appenninicolæ, & Chii in obsidione urbis (*f*) suæ se sustentarunt; hordeo tosto canarienses (*g*) insulani; fabis cum pane (*h*); aut fabis solis, alii (*i*). Fagus prunifera illa californiam nutrit (*k*). Aqua salicis, aqua hordei & oryza in lacte amygdalato ex febre Spahani convaluit celebris itinerum scriptor, eques CHARDIN (*l*). Pane & aqua ad remum damnati aluntur, & etiam alii casu ad eum cibum compulsi (*m*). Pomis & aqua Brachmanes (*n*) fenescunt. Pane, succo limonum, & oleo Ligures (*o*) genuensis oræ montanæ incolæ; Melle, Mandioca [f. Cassava] & pomis acajou (*p*) Brasiliiani vivunt. Solis fructibus horæis RONDELETIUS (*q*). Solis ficibus MOSCHUS & ANTIMOLON sophistæ (*r*). Dactylis cum lacte Arabes (*s*). Sponte nascentibus herbis, radicibus & aqua primi in Thebaide (*t*) eremitæ. Gummi milio & lacte Senegallenses (*u*). Leguminibus absque igne juvenis Ægyptius (*w*). Rhizophagos, & hylophagos æthiopes DIODORUS habet (*x*).

B b 3

Newto-

(*d*) FUNNEL voyage p. 59. Chocolata sola alii AVANZINI de chocolata p. 20. & ad senium usque gubernator insulæ GUADALOUPE de MIEHAU du cacao. tum aliquot annis l. Fr. GABRIELLI apud SERAFINUM p. 14.

(*e*) PINELLI.

(*f*) PLIN. L. XVI. c. 5.

(*g*) SPRAT hist. of the Royal. Societ. p. 212.

(*h*) Ad triremes damnati Hamburg. Magaz. T. XXI.

(*i*) MUNDIN Escult. c. 2.

(*k*) Apud Mich. de VENEGAS in hist. Californ.

(*l*) Voyag. T. III. p. 189. Conf. p. 176.

(*m*) Phthificus in carcere. MANETTI ad SAUVAGES p. 116. WILLEIS Pharm. II. p. 70. Alius, arthriticus CRATON consil. L. IV. p. 110. Add. CAMER. Cent. IV. c. 5. 6. la METTRIE p. 153. Apoll. Med. p. 41. b. MEAD. monit. p. 203.

(*n*) SUIDAS p. 454.

(*o*) PINELLI p. 73.

(*p*) PISO hist. brasil. L. I. p. 12. 15. add. LERY p. 109.

(*q*) STOLLER Histor. der medicin. Gelarth.

(*r*) ATHENÆUS.

(*s*) RADZIVIL p. 215. conf. p. 194.

(*t*) Conf. vitas PAULI & ANTONII, & FRANCISCUM BACON de VERUL. hist. vit. & mort. p. 139. 179.

(*u*) ADANSON l. c.

(*w*) GALEN facult. anim.

(*x*) L. III. c. 23. 24.

NEWTONUS, dum optica scribebat, solo pene vino, pane & aqua vixit (y).

Denique & solo lacte, & ex ejus diminutione aliqua, fero, de quo pinguedo plurima secessit, vita etiam ad multos annos sustentatur. Lacte vixit vir eruditus *Vincentius PLACCIVS* Hamburgensis Professor. Lacte & pane alius (z) 20. annis, & olim nomades (a): & is victus adversus podagram (b) tabemque (c), in consuetudinem abiit. Lacte, & pauco, diebus 37. Bergomolettanæ feminæ vixerunt, & alii per menses homines (d), Vix alius cibus alteri per 26. annos fuit (e). Tota vita *PHILINUS* (f) lacte se sustentavit. Hydrogalacte per tres annos puella (g). Sed fero omnino lactis solo per 18. annos vixit *FERGUSON* (h), & femina per 16. annos (i); summusque testis *BOERHAAVIUS* (k). Cum pane biscocto magnos inter labores alii (l). Imo, cum alter porcus lacte, fero alter, aut aquato certe lacte (m), aleretur, iste potius obesior factus est (n). Nostri etiam Alpicolæ plurimos porcos solo tenui lactis fero educant, quod & de caseo superest, & de recocta.

Vita animali plurimi Monachi carent (o) olimque Philosophi (p); alique (q) multi, inter quos est de nostra cognatione vir decrepiti nunc senii, totique familiæ superstes, qui nunquam carnem gustavit. Et in

- (y) *CHEYNE diseas. of body and mind. T. II. c. 2. p. 80.*
 (z) *BAYNARD p. 470.*
 (a) *Add. GREISEL Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 1. obs. 141.*
 (b) *FOREST L. IV. c. 10. NARDI Noct, Genial. p. 61.*
 (c) *SOMIS raggionam p. 124.*
 (d) *COLUMELLE L. VII. d. 2. Numidæ lacte vivunt cum farina SALVST. p. 216.*
Eas puto vult gentes ARETÆUS curat, diut. I. c. 8.
 (e) *Journ. de Med. 1760. Aug.*
 (f) *Apud THEOPHRASTUM.*
 (g) *BUCHNER Miscell. 1728. p. 979.*
 (h) *Phil. transf. n. 466. UMERVILLE proprio lib.*
 (i) *BRUYERIN. L. II. c. 6.*
 (k) *G. V. SWIETEN Comn. T. I p. 115. Prælect. Boerb. T. I. p. 121.*
 (l) *MARTIN Western. Isl. p. 203.*
 (m) *CHEYNE Sanit. infirm. tuend. p. 233.*
 (n) *CHEYNE diseas. of body and mind. p. 130.*
 (o) *RECEUIL Obs. XI. In M. Catharinæ longævi & sani HAYMAN reyzem T. II. p. 182. 183. Monachi de la trappe ap. HECQUE pharmac. p. 290. Reiseliani, non romani, monachi apud ÅCRÉEL nye Sverige p. 442.*
 (p) *ZENO. PLOTINUS, CHRYSANTIUS, apud PLEMP. valetud. tegat. p. 116. 157.*
 (q) *HEERS obs. p. 247.*

in universum in regionibus calidis parvus carniū usus est (r); primumque, ad quod in adversa valetudine stomachus horret, caro est, dum fructus horæos, acoremque vegetabilem appetit. Ferunt etiam facilius, etiam majorem eorum ciborum usum, qui nobis nimis refrigerare videntur, ii homines, qui in iis calidis regionibus vivunt, & sunt in Persia, qui 35. pondo melonum absque malo vorant (s).

§. IV. *Cur ad carnes sit ventum.*

Salubris utique victus est excarnis, quem hactenus descripsimus, ut & hominem suum bene alat (a), & vitam ad multos annos producat (b), & morbos ex aliqua nimia sanguinis acrimonia & spissitudine ortos, aut arceat (c), aut sanet (d).

Sensus etiam Brachmanibus accuratiores esse legas (e), & athletas tritico & caseo pastos fuisse, ante PYTHAGORAM (f) iatraliptem.

In universum tamen sunt sua incommoda victu vegetabili. Sæpe tentavi, ob podagram; ob bilem putrescibilem, quæ faciebat, ut carnes non ferrem absque agrypnia. Semper sensi debilitatum (g) universum corpus, ad labores, ad venerem inertius.

Ita

(r) Minoræ CLEGHORNE p. 55. in Persia CHARDIN. L. IV. p. 166. in India IBID. in Italia RAI topogr. observ. p. 395. in Ægypto, æstuosis mensibus MAILLET II. p. 227.

(s) CHARDIN. L. IV. p. 51.

(a) BARRY tripl. digest. p. 97. CHEYNE of health and long life.

(b) Tr. des dispensés ou Cérème T. 2. p. 14. In Theologia sua Medicina HERCULETUS longævitatē antidiluvianā ab usu carniū diminuatā fuisse dixit

(c) Nulla podagra in Apennino ob acidī abundantiam PINELLI. Firmiori fuisse valetudine nobilem familiam, cum ob paupertatem pomis, pane & aqua sustentaretur BAYNARD p. 459. Similia SINOPEUS habet purerg III. p. 63. 64. Pulchræ sunt, quæ Castaneis vivunt folis TARGIONI viag. I. c.

(d.) In t be FOREST In hæmoptoe cum fatido halitu, a carcere & aqua mera sanitas restituta WILLIS Pharm II. p. 70. Phthisis superata MANETTI I. c. Podagra lactis usu sanata LOBB p. 270. BAYNARD. I. c. GREISEI. victu tenui PORPHYRIUS APOLLO. MEAD monit. p. 205. CRATO Consil. L. I. p. 102. & 106. RAHN ad RONCALL. Europ. med. p. 115. LOBB. p. 216. 22. CAMER. Cent. IV. obs. 5. 6. &c. Epilepsia CHEYNE fibr. lax. caries Tibiæ DEIDIER consult III. p. 96 Benjani minus morboſi CHARDIN IV, p. 80. 181. Febres tertianas evitant, qui horæis fructibus multum utuntur CLEGHORNE p. 179

(e) GROSS voy. p. 297. add NEWTONI exemplum.

(f) SCHULZE de Athlet.

(g) Etiam CHEYNE of the gout. p. 18. 19. ROBINSON Essays of Oecon. p. 354.

Ita expertus est *J. Theophilus* DESAGULIERS (*b*), ita plurimi eorum, quos citavi (*i*). Macilenti sunt illi Reiseliani (*k*). Itaque robusti homines tenerum victum vix tolerant (*l*), & ad duros cibos redeuntes melius convalescunt (*m*).

Robur fibræ a vegetabilibus succis, & ab aqua minuitur (*n*), & solidum stamen ab ea diæta non sine periculo relaxatur (*o*) & sanguis flavus manet, faciesque pallida (*p*). Ex victu hordeaceo & ptisana frequens anasarca. Hispaniolæ incolæ debiles ob cibum potissimum vegetabilem (*r*). Sola pulte robur suum non alere possunt Americani, nisi carne vel piscibus se confirment (*s*).

Video objici, gentes solis vegetabilibus usas, feroces tamen (*t*). Sed mihi utique videtur, quemque populum aratorem mitiorem esse, deinde pastorem, ferocissimos populos venatores, qui solis pene carnibus vivunt.

Et est omnino inter plantas succosque humanos minor, quam inter eosdem succos & animalia similitudo. Plantæ pleræque acescunt: & ostenditur proprio loco, quam pertinax plerisque natura acida inhæreat (*u*). Et tamen eam vincere oportet, ut nostri fiant.

Quæ plantæ aromaticæ sunt, eæ omnino parum faciunt ad alendum, cum viscido illo blando destituuntur, quod ad priores fibras adhærescendo nutrit.

Quæ alcalescunt, eæ ita succulentæ sunt, ut præter aquam exiguum quid farinosi superfit, idque ipsum nimis acre, cui parum cum chylo, & cum sanguine ipso conveniat.

Omnes quidem plantæ alere possunt, sed parciori parte sui, sola, quam exiguum pleræque continent, farina; & ejus farinæ gelatinosa parte. Hinc immensa vis pabuli vegetabilis requiritur, & vacca batava 46. libras
graminis

(*b*) Apud LOBB. p. 218. 219.

(*i*) FERGUSON conf p. 198.

(*k*) ACRELL l. c.

(*l*) BENNET *theatr. tabid.* p. 4.

(*m*) SWALWE *querel ventr.* p. 107.

(*n*) ROBINSON *Oeconom.* ed. II. p. 314.

(*o*) KINNEIR *nerves* p. 93.

(*p*) STURBE *phlebot.* p. 117.

(*q*) MONRO *de hydrope* p. 9.

(*r*) CHARLEVOIX *hist. de S. Domingue.*

(*s*) LAFITAU p. 89.

(*t*) MACKENZIE *hist. of health* p. 49.

(*u*) L. XIX. Sect. V.

graminis intra 24. horas consumit, non triplo homine pondero-
fior (u*).

Et etiam eo majoribus viribus eget, & longiori vitæ labore, ut ace-
scens farina in glutinis alcaliscentis naturam transeat,

Hæc est causa, quare vegetabiles cibi minus nutrant, & minus dent
roboris.

Peculiariter etiam lac cum pane facile aut sodam facit, aut in con-
gula mutatur (w) etiam valde diuturna, & magna datura mala (x),
inque ipsos denique calculos transitura, qui per anum descendunt (y).

Acida vero nimia, ipsaque poma citria (z), villosam tunicam ero-
dunt, & colicam fecerunt pictonum (a).

Horæi cibi frigoris sensum in ventriculo faciunt, ex cucurbitaceis fru-
ctibus etiam graviolem & periculofum (b).

Farinofa cum aqua cocta in lentam pafam coeunt, quæ in ventriculo
hærens cepheam fecit & fctomiam (c). Eadem fere omnia etiam flatu-
bus abundant, ut quorum pars magna (d) fit aer. Etiam in florente
planta tantum eft aeris, ut ventriculus inde ovibus crepet & equis,
nifi incifo intestino fanarentur (e). Ex pifis vehemens colica (f).

In obfidione farinofa aquofum fecerunt larguorem (g).

Ex victu gramineo dysenterix epidemicæ dicuntur fuiffe (h) natæ.
Ex antifeorbuticis fummus fætor oris in hypochondriacis (i).

Multæ

(u*) BOERHAAVE *prax.* I. p. 171.

(w) ZELST *de podag.* p. 34.

(x) LA METTRIE *obs.* 48. MONGIN *d'un Epiploze petrific.*

(y) MONGIN *ibid*

(z) ORTLOB apud ADOLPHI *oper.* p. 311.

(a) TRONCHIN *colic. pic.* p. 84.

(b) HASSELQUIST *de batech.*

(c) ANDRY *tr. des alim.* p. 293.

(d) HALLS *veget. stat. exp.* 57. Pisorum integra tertia pars est aer.

(e) CHESLDEN *anat.* p. 161. *Corps d'observ. de Rennes* II. p. 84. Ex lupinis potit
hippopotamus HASSELQUIST p. 202.

(f) *Tr. des dispens. du careme* p. 106. 107.

(g) HIPPOCR. *de diata* L. II p. 216. LIND.

(h) XERXIS ex Græcia profugi exercitus HERODOTUS L. VIII. c. 115.

(i) BOERHAAVE *prax.* I. p. 169.

Multæ etiam inter plantas venenatæ sunt, fungi (*k*), umbelliferarum sæpe radices, etiam pulcherrima poma (*l*), quæ novi orbis inventoribus frequenter imposuerunt.

Denique in regionibus ad boream valde vergentibus raritas est vegetabilium, cum neque fructus horæos tellus ferat, neque etiam radices (*m*), edules satis abunde reddat; sed neque graminis demum ferat tantum, quantum miseris incolis ad stipanda tibialia, & arcendum frigus est necesse. Ibi, cum terra noverca hominem neget nutrire, mare fere eam curam suscipit, pisciumque abundantiam suppeditat.

§. V. *Victus animalis. Pisces.*

Nescio an non primi inter animalia pisces in cibum sint recepti. Muti cum sint, non poterant eos sui doloris testes planctus edere, a quibus ante adsuetudinem credam haud multo segnius homines ad misericordiam commotos fuisse, quam nunc commoverentur, quando familiare sibi, carumque animal jugulant. Benjani etiam in antiquissima religione carent animali victu, præter pisces: & Ægyptii, qui Israelis tempore videntur armentorum sanguine abstinuisse, pisces tamen in usus suos traxerunt, & nostro aevo (*a*) trahunt, iis mensibus, quibus carne abstinent. Plures etiam longe populos reperio ichthyophagos, quam carnivoros.

Porro piscium natura inter vegetabilia & animalia ambigit. Putrescunt equidem, & celeriter quidem (*b*), & plus dant fætidæ alcalini liquoris, quam carnes bubulæ (*c*), etsi ob aquæ (*d*) copiam minus habent salis sicci (*e*).

Gelati-

(*k*) Frequentes inde monspeli morbi GUIARD p. 295.

(*l*) Manganilla DAMPIER I. p. 39. ORXMELIN *avantur* p. 16. 17. *Journ. de medec.* 1757. Dec. Ricini tertia species amygdalarum similis, tamen vehementer purgat LEWIS *mater. med.* p. 469.

(*m*) Iosa cassava recens & succi plena WAFER p. 101. Mel colchidis venenatum DIODOR. L. XIV. c. 27.

(*n*) *Hamb. Patriot.* T. III. p. 404. & imprimis EGERE *Gamle Grönlands nye perlystrat.* Et circa hudsonbay a *voyag. for the discovery of the northwest passage* p. 218.

(*a*) MAILLET l. c.

(*b*) *Mém. sur la maniere de rassembler &c.* p. 53, hinc spiritum debilitant in quo suspenduntur.

(*c*) *Mém. de l'Acad.* 1732. p. 23.

(*d*) BOYLE *chym. scept.* P. II.

(*e*) LEMERY *cours de chymie.*

Gelatinam etiam suppeditant (*f*), pene æque abundantem; cæterum paucissimi cum sint sanguinis, & pinguedinem vel nullam habeant, vel perpauca, cum gelatina etiam aquosa sit & tenuior, minus utique alunt, minus sanguinis rubri faciunt, minusque dant roboris, quam carnes: ut eam debilitatem & ipse expertus perceperim, & invenias tempore quadragesimali ab aliis esse perceptam (*g*). Non adeo absque ratione monachi, generationi non destinati, a Romana ecclesia aut ad majorem, aut ad unicum piscium usum, legibus adstringuntur (*h*).

Et tamen multæ sunt, etiam nunc, gentes quæ pene ex solis piscibus vitam sustentant: miseri primo incolæ novæ Hollandiæ (*i*), quibus præter pisciculos a recedente mari in soveolis per arenosa littora desertos, nullum nutrimentum suppetit: Deinde circa persicum finum, & in Arabico littore, & in Persico: nam circa Mascata (*k*), ipsa pecora diximus piscibus, & quidem putridis, ali: & eos circa Æthiopiæ fines ichthyophagi populi olim exstiterunt (*l*). Piscibus etiam Africani aliqui pene solis vivunt (*m*).

Sic in littore Kermanico (*n*) & Gedrosico (*o*), & olim & populi Babylonæ finitimi (*p*), & circa Araxem (*q*) alii piscibus unice se suaque pecora aluerunt, & nunc alunt (*r*).

Eadem, & major sub boreali cælo ejus victus est necessitas. In aridis enim sinus Persici plantæ tamen sunt, vicinæque palmæ: hic sub severissimo cælo ne gramina quidem adulescunt. Incipit is ex piscibus victus in insulis Hebridibus (*s*). Scotiæ vicinis, & in Orcadibus (*t*); transit in

C c 2

proxi-

(*f*) Caro bubula dat ex unciis quatuor extracti grana 108. vitulina grana 174. cyprinus grana 152. lucius grana 168. cancer carnivorus grana 177. Vipera grana 108. Ranæ nullam gelatinam dederunt, testudo perpauca. Ex *Mém. de 1730* 1732.

(*g*) Carthusiani pallidi, & debiles PECHLIN *obs.* p. 513. Bajulis a piscium usu minus est virium 10.

(*h*) Magis naturalem esse victum *macrum* HECQUET *tr. des dispenses du carême.*

(*i*) Apud DAMPIER.

(*k*) OVINGTON.

(*l*) HERODOT. L. III. p. 193. DIODORUS Sic. L. III. c. 16.

(*m*) Tamen cum nucleo palmæ LABAT *afriq. occid.* V. p. 168.

(*n*) NEARCHUS. PLUTARCHUS.

(*o*) NEARCHUS apud ARRIANUM in ind. DIODOR. STRABO L. XV. p. 470.

(*p*) STRABO L. XVI. p. 512.

(*q*) HERODOT. L. I. p. 94.

(*r*) TAVERNIER L. I. c. 9. p. 258. THEVENOT.

(*s*) MARTIN. *West. Isl.* p. 267. 373.

(*t*) MARTIN p. 373.

proximam Färö (*u*), & in Islandiam (*w*), & Lapyoniam (*x*), tum in Grönlandiam (*y*), ubi omnino nihil suppetit alendo homini aptum. Pergit ea consuetudo in congenerem gentem Samojedorum, Ostiacorum (*z*), easque gentes, quæ habitant Jeniseæ fl. & Ob. & Tass. frigidissima ostia.

Etiam in nova Marchia piscatores solis fere piscibus se sustentant (*a*). Sola testudine in America prædones itineratores sæpe diu vixerunt. Severiores inter religiosos Romanensium ordines, ut carthusiani; etiam virgines moniales aliquæ, idem vitæ genus sequuntur; singuli demum passim homines (*b*).

Tantum etiam valuit religio, ut ex ovariis sturionum (*c*), & belugæ piscis (*d*), & cyprini (*e*), sale conditis, contusis, inque sole siccatis & in sphæras compactis, oleoque submersis, cibus *caviar*; ex cephalo vero sive mugilis ovis sale adpersis, & pondere imposito pressis (*f*), folique expositis *ωα ταριχα* sive *boutargue* eodem scopo parentur, quorum utrumque ciborum genus per gentes græcæ ecclesiæ addictas maxima copia consumitur, etsi Philosopho itineratori TOURNEFORTIO detestabile visum est (*g*).

Miramur hodie, maxime qui a mari remoti habitamus, & vivos pene pisces desideramus, quos solos edere placuit, ut potuerit antiquitas sibi in putrido humore eorum animalium placere. Encrasicholum (*h*) feras, ex quo super prunas in aceto soluto optimum fit garum (*i*).

Sed

(*u*) DEBES p. 279.

(*w*) PEYERRE *relat.* p. 8. ANDERSON p. 116. 120. *Melanges* I. p. 199.

(*x*) ANDERSON p. 120. Hi tamen & Islandi & Faröenses etiam alium cibum edunt.

(*y*) ANDERSON p. 251.

(*z*) *Relat. des Voy. au Nord.* p. 8. IDES. p. 55.

(*a*) RICHTER *Ichthyothéol.* p. 328.

(*b*) LEIGH. *natur hist of Lancash.* p. 141.

(*c*) TOURN. *voyag. au Levant.* T. III. p. 110. *Miss. du Levant.* II. p. 204. HARVEY *gener. anim.* p. 6. CATESBY II. p. XXXIV. QUIQUERAN *provinc. laud.* p. 426. PANCIBOLL *invent. novant.* T. II. p. 308. GERING *disp. de piscat. Salm.* p. 20. BRADLEY *countr. lad. dir.* T. II. p. 23. AVRIL *Voy. L. II.* p. 96. PECHLIN *purg.* p. 450.

(*d*) *Diction. du Comm* II. p. 491. PERRY *state of Moscow. Voy. au Nord.* VII. p. 326.

(*e*) Salmone apud suecos. GERING *diff. de eo pisce.*

(*f*) TOURN. *Voy. I. I.* p. 931. PECHLIN I. C. PANCIBOLL. *Quiqueran.* p. 42. Ex mugile & cyprino HARVEI. Ex pisce *boury* aut *boutry* in Ægypto *Relat. des Miss.* T. VI. p. 241.

(*g*) L. C. Caspio tamen ex mari melius eorum ovorum genus, quam ex Euxino, adferri fatetur III. p. 259.

(*h*) ÆLIAN.

(*i*) RONDELET p. 210.

Sed veterum garum mera erat putredo (*k*), quam tamen auro (*l*) contra rependebant. Parabatur ex pisce primum garo (*m*), deinde posteriori tempore ex scombri (*n*), in Hispania, interaneis, quæ abjici solent, cum vino putrefactis.

Neque penitus gari usus obsolevit, cum in Lotharingia (*o*), in Tun-
kino (*p*). ex squillis & cancris fætidissimis, in Aracan ex piscibus (*q*)
etiam nunc paretur. Alia demum fæx non colata (*r*), & vinum
gari romanis in usu fuerunt. Iis horridis putrilaginibus suum cibum in-
tingebant, orbis domini.

Eo minus mireris Arabes (*r**) locustas edere, tum Mauros (*s*), &
Californiæ incolas (*t*), & Æthiopes aliasque (*u*) gentes; & cicadas
ab aliis (*w*), ab aliis bufones (*x*), in cibum recipi, ab aliis araneos,
scorpionesque (*y*).

Parum enim hæc a piscibus differunt, cum quibus conveniunt frigido
sanguine, & natura putredinosa.

Cæterum frequentior piscium usus in sanguine noxium facit acrimoniæ
genus, ex quo scabies (*z*), mutata epidermis (*a*), morbus pedicula-
ris (*b*), lepra (*c*), scorbutus (*d*), ulcera maligna (*e*), febres (*f*) sequuntur. In

C c 3

ipsis

- (*k*) SUIDAS, SENEC.
(*l*) CONGIUS 2000. num. vendebatur?
(*m*) PLIN. L XXXI. n. 43. ATHENÆUS L. III. MARTIALIS.
(*n*) Etiam thynni intestinis, & lupo, & apua PLIN. ibid. n. 44. Ex siluro & aliis
CARL. Chron. L. II. c. 1.
(*o*) STEPHANUS de nutrimentis. p. 55.
(*p*) GERVAISE voy. au Siam. p. 105. LOUBERE. Ex piscibus in Tunkin DAMPIER
Voyag. L. II. p. 28.
(*q*) OVINGTON.
(*r*) PLIN. n. 44.
(*r**) HASSELQUIST p. 414. 415.
(*s*) ADANSON relat. p. 88.
(*t*) M. de VENEGAS Hist. of Calif. T. II. p. 38.
(*u*) In insulis Bashee DAMPIER Voy. I. p. 430. cui non displicuerunt, In Tonkin
ID. Persæ pauperiores iisdem vescuntur KÆMPFER de palmet.
(*w*) SALA de aliment. p. 8.
(*x*) Absque noxa Gall. di Min. T. VI. p. 310.
(*y*) BARTHOL. Cent. IV. Hist. 95. Bresl. Saml. 1725. M. Apr. RHOD obs. 91. Cent.
III. SALA l. c.
(*z*) Epidemica ex usu Sardinarum Mém de l'acad. 1749. p. 134
(*a*) Ex pisce asello Lingfisch, ejusque potissimum hepate MARTIN p. 190.
(*b*) Apud Acridophagos DIOD. L. III c. 29.
(*c*) In insulis Shettlandicis & Orcadibus pingui ex hepate MARTIN p. 373. In Faro
DEBES p. 279.
(*d*) CHEYNE infirm. valet tuend. p. 61.
(*e*) Ex locustis VENEGAS l. c.
(*f*) Pisces ex Albi STÖLLER Wachsthum p. 40.

ipsis animalibus, quæ piscibus pascuntur, rancidus (g), adeps est & fluidus, lac ingratum (h) carnesque fætidæ (i).

§. VI. Carnes.

Incertum est, quo tempore carniū usus inter homines invaluerit: & possit credi, a diluvio (a) primordia ejus mutationis repetenda esse, cum arbores fructiferæ nondum ita convaluissent, ut cibi esset satis: etsi neque ea monumenta directe ad rem faciunt.

Necessitatem credas has cruentas & immites dapes introduxisse; si animalia domestica prima in usus hominum cesserunt, ut ex sacrificiis (b) possis suspicari, non satis tamen firma conjectura. Vel vindictæ genus fuerit, si animalia ferocia, & noxia superata victoris hominis iram suo cadavere placarunt, uti ira etiam furorque bellicus homines anthropophagos reddidit, non quod humana carne ut cibo familiari alantur, sed quod hostes suos non satis reputent se ultos esse, nisi etiam mortuos lacerent (c).

Ex utraque causa carniū usus a suis principiis celeriter & continuo invaluit, frustra repugnantibus, ut aliqua vetusta documenta habent (d), legibus, & frustra revocante pristinam simplicitatem PYTHAGORA: si quidem revocare admisus est, nam alii ajunt, soli bovi aratori & arieti ejus viri leges pepercisse (e), aut solis nonnullis animalium partibus (f).

Præcipua utilium carniū penus est ex animalibus herbivoris (g), quorum lac mite, urinæque & fæcum modicus fætor, caro ipsa neque prædura est, neque fætida, & multum habet gelatinæ, potissimum junior

(g) In porcis BIRCH T. I. p. 376. BOYLE *possib. of resurr.* BEHRENS *diet.* p. 188.

(h) KALM *Amer. resa* p. 129 In avibus FRÄNK *Anmerk* II. p. 448.

(i) Apud Tartaros Jupi *hist. des Chinois* p. 82. Notus est pisculentus sapor avium pisces rapientium BOHN *menstr. anim.* p. 476.

(a) Genes. IX. v. 3.

(b) Abelis Genes. IV. v. 4.

(c) Anthropophagos veros exstitisse in Brasilia defendit PISO *de re natur.* L. I. p. 14. Sed negat, post tot itinera, DAMPIER se gentem Anthropophagam reperisse I. p. 485.

(d) PORPHYRIUS l. c.

(e) SUIDAS III p. 243. add. LAERT. L. VIII. c. 1.

(f) Melanuro: mullo pisci; cordi: vulvæ l. p. 234. A corde & alba gallina & moriciniis abstinuisse ÆLIANUS L. IV. c. 17.

(g) CHEYNE *inf. val. tuend.* p. 34.

nior (*b*). Bos, & ovis macellum pene soli ingrediuntur: Equus, nihilo immundior, asinus, camelus, hircus (*i*), Tartaris, Patagonibus (*k*) & Arabibus solis placent. Lepus & cuniculus, & ejus classis in india animalia, pariter sed rariori sunt in usu, cum ea non sint domestica.

Carnivora quadrupeda parcius (*l*), in mensas hominum recipiuntur (*m*). Plus habent falis urinosi (*n*), inque ipsa carne ferinus odor residet. Qui canis, aut vulpis, aut felis, odorem norunt, vix credant iis, qui leonis (*o*), & tigridis (*p*), carnem vitulinæ comparant. Ipsa cornix cornicis carnem ingestam non potest coquere, & deglutitam vomitu rejicit (*q*).

Europæi, eorum animalium usum olim non dedignati, dudum deseruerunt, nam catelli inter H I P P O C R A T I C I temporis cibos reperiuntur (*r*). Chineses nihil detrectant simile (*s*). Nigritæ oræ auriferæ canem, catum, elephantum, intestina, aves cum interaneis devorant (*t*). Sic tartari Jakuti, alique. Avium aliquis est delectus. Carnivoræ, ut gens aquilarum, & accipitrum, & noctuarum, & piscivoræ, numquam nisi in ultima necessitate admittuntur, ob fætorem, putridamque carnium naturam.

Granivoræ, herbivoræ, etiam insectivoræ sunt in deliciis: ut tamen, quæ alba sunt carne, totum nempe Gallinaceum genus & pavoninum, optimum & saluberrimum alimentum homini præstent: non ita quibus caro fusca est, quibus omnibus etiam firmiores sunt fibræ, & ægrius superantur.

§. VII. Carnium commoda.

Non dubium est in carne alimenti esse plurimum: quæ succos contineat

(*b*) Vide G E O F F R O I *Mém. de* 1730. Tardius quam vervecem & bovem digeri ROBINSON *food and discharg* p. 95. Mihi semper aliter visum.

(*i*) Edi posse absque noxa, sed ob virus vitari. FORT. FIDELIS *relat. Méd.* L. I. p. 135.

(*k*) Equina fere vivunt *voy. a la mer du sud.* p. 295.

(*l*) Conf. LORRY *tr. des alim.* p. 370.

(*m*) LEMERY. Plurimum viperæ insectivoræ.

(*n*) Ad mundandos pannos ad modum bilis utile GESNER. *hist. quadrup.* p. 189.

(*o*) SHAW. *trav.* p. 172.

(*p*) Americanæ PISO *hist. nat. ind.* L. III. p. 103.

(*q*) CHAYNE *infirm valet. tuend.* p. 34.

(*r*) Σκυλακία. In Africa canina adhuc utuntur SHAW p. 134.

(*s*) Glires, feles, *hist. des Chinois* p. 362.

(*t*) *Hist. des Voyag.* L. IX. p. 318.

tineat (a) nostrorum simillimos. Gelatina quæ est in vituli fibris, nihil fere differt a lymphâ sanguinis humani: parum ab adipe adeps; lac a lacte pene nihil. Ut adeo in humanos humores animalium succi transeant, pene sola extractione est opus, deinde transfusione. Firmior etiam gelatina, & densior ex quadrupedum carne cogitur, minusque aquosa sunt ea omnia, quæ ex animalibus prodeunt.

Quare robur majus est ab eo alimento (b). Robur enim pendet ab eo reparato, quod est amissum, aque copia rubrorum globulorum, & a tenacitate glutinis fibrarum.

Ipsa animalia carnivora pro sua natura multo plus habent virium. Etiam dictum est, vivaciores esse aves carnivoras (c), & aquilas rostrum mutare. Sed ea nimia sunt. & a Psittaci exemplo refelluntur, quam avem fructivoram omnium certa fide notarum avium vivacissimam esse per experimenta constat.

Integras ergo gentes, venatorias imprimis, carnibus vixisse nihil habet insoliti, quales olim Scythæ fuerunt, nunc Tartari (e) etiam Mongoli (f). Spernunt panem Arabes (g). Deinde veteres Æthiopes (h) olim aratrum non curabant: nunc mutatis rerum vicibus didicerunt frumenta colere (i). Priscis afri caro ferarum erat pro pabulo (k). Sic nigritæ Goreenses victum vegetabilem nostro ævo contemnunt (l), & ferocissimi Gallæi (m). Sed etiam Brasiiliæ indigenæ absque vegetabili cibo olim vixerunt (n).

Equina diximus carne fere sola Patagones vitam (o) alere: Laponæ potissimum avibus & piscibus vivunt, cum perpaucis plantis (p).

Americæ

(a) Repete ex *Mém. de l'acad.* 1730.

(b) WAINNEWRIGHT *of meat* p. 190. CASTELLAN *de carniarum esu* L. I. c. 2. ROBINSON *Oeconom.* p. 314 add. LUDWIG *vict. anim.*

(c) Fr. BACO *hist. vit. & mort.* p. 82.

(e) *Algern. Reis.* T. VII. p. 78.

(f) *Recueil d'observ.* T. II. p. 241. *Relat. des miss.* T. I. p. 21. *Relat. des Voy. au Nord.* II. p. 103.

(g) RADZIVIL p. 215.

(h) PRIN. L. VII. p. 373. HERODOTUS L. III. p. 163. Aqua sola cum carne cocta ali scripsit.

(i) LUDOLPH. *hist. eth.* L. I. c. 9. Hier. de LOBO *relat. d'Abissin.* p. 85.

(k) SALUST *Jugurth* p. 112. Ed. Glasg.

(l) BUFFON T. III. p. 460.

(m) LUDOLPH L. I. c. 16. absque pane aut lacte.

(n) P. Michael Angelus de GUATTANI.

(o) *Voyag. a la Mer du Sud.* p. 295.

(p) LINN. *Flor. Lapon.* p. 70.

Americæ septentrionalis populi *Esquimantzi* c & sola carne (*q*) [cum piscibus] & sæpe cruda, vitam tolerant.

Etiam atavi nostri Germani (*r*) veteres, & Britanni (*s*), carnibus solis vixerunt, tantum ut lac addederent. Et cum piscibus suis carnes, etiam putridas conjungunt Färöenses (*t*). Venatores illi Boucaniers, hominum durissimi, sola carne aprorum longissimo tempore per solitudines Americæ vitam sustentarunt: & passim post naufragia varii (*u*).

Singuli etiam homines a prima ætate solis carnibus vixerunt (*w*). Fortissimi athletæ (*x*) solis olim caprillis carnibus alebantur. Normannus vagabundus (*y*) sola carne cruda summum robur adtigit, tum in insula *Juan Fernando Alexander SELKIRK* (*z*).

Dudum est adnotatum, eas gentes robustissimas esse (*a*), quæ carnibus & iis crudis vivunt, ut Tartaros, Brasilianos, Esquimantficos (*b*), tum venatores, quos diximus. Maximum robur fuit puellæ (*c*) ex incognita gente in Galliam advenæ & solis crudis carnibus victitantis. Semestris puella (*d*) Magellanica crudivora dentes habebat multos, & sola absque auxilio incedebat; imo, qui sola carne vixerant, cum ad panem redirent, de robore suo multum amiserunt: (*e*). Et macrobii olim, ut ex publico testimonio audiebant, illi Æthiopes (*f*) carnivori fuerunt. Arabes absque pane ad senium perveniunt (*g*), & cum sua sarcophagia Islandi (*h*).

§. VIII.

- (*q*) ELLIS *hudsonbay* p. 139. CHARLEVOIX *nouv. France* III. p. 179.
 (*r*) EX POSSIDONIO MEIBOM *de cerevis.* c. 2.
 (*s*) CÆSAR *bell gall.* L V.
 (*t*) Sebum ovillum vetustum in paludibus defossum DEBES. p. 219. 275. 312.
 (*u*) Angli carne cruda per tres menses vixerunt *Voy. a la mer du sud.* p. 278.
 (*w*) TOZZI *de sex reb. non natur.*
 (*x*) ATHENÆUS. NONNUS p. 176.
 (*y*) DU TERTRE *hist des Iles Antill.* p. 146. 147. Add. ORKMELIN *hist. des avant.* I. p. 122. & *Voy. de Harmanfon* p. 429.
 (*z*) DAMP *Voy. aux terr. austr.* T. II. p. 188. 191. paucis cum herbis.
 (*a*) Etiam LEEUWENHOECK *Epist.* 160. p. 169.
 (*b*) CHARLEVOIX l. c.
 (*c*) In proprio libello & *allgem. Magaz.* T. VII.
 (*d*) *Voy. des V. vais.* par le détroit de Magell. p. 321.
 (*e*) CHARLEVOIX *nouv. franc.* T. III. p. 211. du TERTRE l. c. Agilitatem amisit, qua triginta leucas cursu intra unum diem relegerat. Sic ALEX. SELKIRK.
 (*f*) HERODOTUS.
 (*g*) 100. & 120. annos THEVET *cosmogr du levant.* p. 112.
 (*h*) ANDERSON p. 116. Addunt tamen serum lactis, tum färöenses DEBES p. 275.

§. VIII. *Carnei victus incommoda.*

Natura nutritia est in gelatina plastica. Ea mitis (a), & modice salsa plurimum requirit aquæ, & olei aliquantum.

Quoties sal abundat, jam acris, & fluida gelatina fit, & naturam adhærentem amittit. Quare intelligitur, merum victum animale non (b) præstare ejusmodi alimentum, quale ad nutritionem (c) optimum fit. Nimiam enim habet salis urinosi portionem.

Diximus, quæ ex victu pisculento incommoda fiant (d). Similia certe ex victu carneo superveniunt. Abundat nempe sal urinosus, sætidi fiunt humores, etiam anima (e), urina gravis est & sudor (f): inde pruritus (g), scabies (h), lepra (i). Sed in ipsis humoribus sales alcalinis (k) proximi gignuntur. Et paulatim habitus totius corporis patitur (l), obrepunt diarrhœæ (m), dysenteriae (n), febres (o) periculosæ (p), hæmorrhagiæ per omnes corporis canales (q).

Ex iisdem causis scorbutus (r) invalescit in obsessis (s) urbibus, & in navibus longos marium tractus penerrantibus (t) familiaris, in quibus parcitas est victus vegetabilis: deinde in regionibus frigidis (u),
in

(a) Recte neque salem, neque terram, neque oleum, neque aquam debere nimis abundare LORRY l. c. p. 70.

(b) LANGRISH *practice* p. 27.

(c) Scorbuticorum vulnera non sanantur PYRARD *Voyag.* III. p. 38.

(d) p. 105

(e) BRUYERIN L. VI. c. 1. HUXHAM p. 63. Res in canibus in vulgus nota est.

(f) in Athleta illo, quem ex ATHENÆO & NONNO citavimus, tum HUXHAMII testimonio in carnivoro homine.

(g) HUXHAM p. 68.

(h) Ex sultæ abusu in Westphalia PLEMP *valet. togat.* p. 161.

(i) Insularis MARTIN. p. 285.

(k) HUXHAM *fore throat.* p. 65. & 62.

(l) In Anglis *Voy. de la mer du sud* p. 278.

(m) Ab echinis marinis TOZZI *de sex reb. non natur.*

(n) Anglis in India carnivoris CHARDIN. L. IV. p. 180. 181.

(o) HUXHAM p. 63.

(p) Hæcticæ HUXHAM p. 68. ex ipsis quidem salibus alcalinis: sed ex victu carneo p. 62. febris nata est. Etiam Lusciniæ ex nimio usu vermium farinæ marcescunt *Aetologie* p. 60.

(q) HUXHAM p. 68.

(r) *Comm. Litt. Nor.* 1738. p. 60. h. 15. CHEYNE *sanit. infirm.* p. 200. & in Eben Ezer novæ Georgiæ oppido BOLZ *historiæ Salzburgerensium Cont.* I. p. 332.

(s) Jam Olaus MAGNUS: tum BACHSTROM *de scorbuto* p. 5. 6. 15. 16. In obsessio monasterio Bethlehemi HASSELQUIST p. 154.

(t) *Algern. Reis.* L. III. c. 1. p. 119. COCKBURN *seadiseases* PYRARD III. p. 35. ANDERSON p. 27.

in quibus putrida corruptio lentiora, quam in calidis, mala facit. Ea enim putrida degeneratio in eo morbo manifestissima est. Memini, cum imprudenti consilio male obsequiosus homo herniosus, cætera sanus, diu sola carne assa vixisset, in veram & funestam incidisse hecticam febrem.

Ipsam jus vitulinum BOERHAAVIUS ferre non potuit, in quo tamen multus superest acor (w). Qui carnibus per 30. annos abstinerat, cum ad earum usum rediret, in phrenitidem & convulsiones incidit (x). Ipse fætor alcalinus (y) macellorum aerem inficit, & in vicina pestilentiores reddidit variolas. Sic a vapore putrido sentinæ funesta febris putrida (z) nata est.

Inter partes animales ovi natura ab acida remotissima est (z*): durissima eadem coctu sunt, & periculosi abusus (z**).

Deterior, si quid deterius esse potest, cibus est nimis pinguis (z†). Et obstruit enim, & putrefacit. In cute stagnans oleum rancidum sua rodens acrimonia, facit lepram, ut ex hepate piscium in Hebridibus insulis, & ex sebo (a) putrido in Färö. Qui ossibus cadaverum effractis, medulla in caritate annonæ voluerunt vitam sustentare, perierunt continuo (b). Sic porci porcina carne pasti propria peste interierunt (c). Acrimonia rancida omnium est teterrima (d). Plerumque tamen ipse stomachus id veneni genus refutat (e), aut natura olei vim per lactea non finit transire. Villos in homine, nimis pingui carne abutente, adipe plenos & obstru-ctos ostendit LIEBERKUHNIIUS (f).

D d 2

Putredo

(n) Monkii nautæ ad unum pene omnes extincti ZORGDRAGER p. 64. 65. Sic nautæ Lassenii, in nave IRKUZK orientales asiæ fines indagaturi.

(w) G. V. SWIETEN Comm. T. I. p. 115.

(x) Journ. de Medec. 1760. Aout.

(y) ROGERS p. 47.

(z) RUTTY p. 148.

(z*) PRINGLE p. 416. Vitellus minime omnium fermentat.

(z**) Mors a duris ovis 18. adsumtis LINN Skonska resa p. 300.

(z†) LUDWIG l. c.

(a) Apud Färöenses p. 209. hebridenses MARTIN. p. 285. 273.

(b) AVENZOAR Theisr. T. III. c. 4.

(c) PETIT de morib. Anthropoph.

(d) BOERHAAVE Mém. de l'acad. de Chir. T. I. p. 129.

(e) Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. obs. 253. instar sebi coacta.

(f) Apud LORSECKE von Arzneymitt. p. 111.

Putredo ipsa carnes veneno facit similes, ut hypercatharhes inde nascantur (g): adeo non reddit digestibiles (h), etsi reddit molliores, forte & iis sapidiore, qui fætorem non timent.

§. IX. *Victus mistus.*

Quare natura nos ipsa in viam reducit. Sola vegetabilia debilitant (a), nisi multus labor copiae accesserit, solisque ardor. Sola animalia putrefaciunt. Utrumque ergo victum oportet commiscere, ut & vires a carnibus sufficiantur: & putredo per vegetabilem victum avertatur.

Scorbuti summum & pene solum auxilium est, in herbis recentibus (b), & in horæis fructibus (c), maxime acidis, ipsoque in citrio (d) pomo. Quibus herbæ recentes suppetebant, nullus erat scorbutus circa Temeswariam, cum præsidarii eo morbo vulgo perirent (e). Et soluta obsidione, atque reddita copia vegetabilium, sponte evanuit (f). Lepra insularum hebridum sale cum acetosa superatur (g).

Porci, ex piscium marinorum usu rancidi, restituntur dato ante mortem frumento (h).

Ergo uterque victus ita temperandus, ut aliquantum præponderet vegetabilis, sub coenam etiam magis, quia nocte minus recte digeritur, atque adeo major a putredine metus est. Deinde in regionibus calidis, morbisque acutis (i) vegetabilem victum augere oportet, in frigidis plus
carnium

(g) Conf. LANGRISH. *practice* p. 356. Ovum putidum vomitum movet BELLIN. *opusc.* p. 28.

(h) KNIGHT *vindicat.* p. 16.

(a) p. 200. 201.

(b) COCKBURN *seadiseas.* p. 214. In classe, quæ in Peruviam adplicaverat *Voy. de la flotte de Nassau* p. 80. 81. Add. *Voy de Verhoeven* p. 20. *Voy. des terr. austr.* T. II. p. 27. BACHSTRÖM p. 8. 11. 18. &c. In Sibiria FERBER *ager. hort. pref.* p. 17. In Islandia ANDERSON p. 27. In Madagascaria oryza nuper nata salutaris fuit I. *Voy. aux Ind. Orient.* p. 328. Bethlehem nasturtium aquaticum HASSELQUIST p. 155. Scorbutus cum mania superatus victu vegetabili ORTESCHI *diar.* p. 140.

(c) In Nova Zembla *Trois. Voy. au Nord.* p. 200. ex fructu pruni simili salus. In Hudsonsbay ex rubo ZORGDRAGER p. 64. 65. Add. PYRARD l. c.

(d) SAND. *abscess. ventr.* n. 21. LISTER. LIND *on scurvy* p. 144. BOERH. *Prax. med.* I. p. 190. *Saml. von Reis.* T. III. p. 449. HUXHAM *fevers.* p. 260. 261. Hinc divites minus ægrotant nautis.

(e) BACHSTRÖM p. 6.

(f) IDEM p. 25.

(g) MARTIN. p. 285.

(h) BIRCH T. I. p. 376.

(i) Diarrhoea utilis in maniacis, quæ ex multo horæorum usu cietur G. v. SWIETEN T. III. p. 480.

carnium permitti potest. Ut præterea quisque magis vehementis est temperii, ut viribus valet, & ætate est ad robur aptiore, ita carnes minus fert, melius iis usus, si plus in ejus humoribus erit phlegmatis, minusque in solidis partibus virium.

Hæc omnia ipsa magistra experientia cunctas pene gentes docuit, quotquot in quieta republica moribus reguntur (*k*). Panem nempe, vel aliquid ex cerealibus paratum panisque simile, omnes edunt, oryzam, cassavam, sago, inhames, patatas, mayz, milium, sorghum, triticum, zeam, hordeum, ut quæque terra aptior est his aut illis producendis (*l*). Ita enim acescente farina victus (*m*) carneus apte contemperatur. Paucae sunt gentes, quæ arare detrectant, paneque carent, aut vagæ (*n*), aut sub eo cælo viventes, quod cerealia non maturat (*o*).

Cæterum non est omittendum, consuetudinem multum posse ad tolerandos etiam deteriores cibos. Cicutæ anus attica adsuevit (*p*); venenis variis MITHRIDATES Ponticus. Tritum subtiliter vitrum, Germanus nescio quis absque vitio deglutiebat (*q*). Ipsum arsenicum (*r*) studiosus paulatim ferre didicit, cum adipe ejus violentiam moderaretur, ut demum plusculum tetri veneni absque malo toleraret.

Eam consuetudinis vim ita interpretor, ut nervi ventriculi sensiles ab acrimonia venenata perculsi occallescant, vimque amittant sentiendi, uti a luce nimia oculi, ab acri cibo potuve linguæ papillæ, a frictione repetita, & ab oleo vitrioli, cutis sensum sensim amittunt.

§. X. *Fossilia non alunt.*

Ex minerali regno nihil sibi sumit homo, præter aquam, si eo placet referre, salemque. Instrumentum coquendorum ciborum nobis non est hujusmodi, ut ex iis nimis duris, nimisque simplicibus corporibus aliquid

D d 3

utile

(*k*) Etiam feroces Americæ septentrionalis populi CHERAKISI, *Irokeſi*, & Africani qui suos vendant liberos.

(*l*) Catalogum plenissimum dedit SLOANIUS. Fungos pani admiscet Ruscinonenses v. MONNIER p. CCVII.

(*m*) Lacti præfert MALOUIN *Chym.* I. p. 224.

(*n*) Arabes apud RADZIVIL p. 215. Tartari LUCA I. c. Britanni CÆSAR L. V.

(*o*) Grönlandi ANDERSON p. 251. Insulani Scotiæ vicini MARTIN. p. 373. Lapones, ali.

(*p*) GAL. *Simpl. med. fac.* L. III. c. 18.

(*q*) PANAROL *pentec.* IV. obs. 6.

(*r*) KRUGER *diatet.* p. 22.

utile extrahere possit: & si in acri aliquo liquore solveris, non tamen, ut sunt aspera hæc elementa, ad nostras fibras adhærescunt.

Lapides equidem aves (a) devorant, sed, ut alibi ostendemus, non digerunt. Qui homines filices (b) deglutierunt, magnos inde dolores & languores passi sunt. Nuper veterator per urbem meam patriam iter fecit, puerumque circumduxit, quem aiebat, male ficta fabula usus, in deserta insula, ab ipsa necessitate compulsus, lapides didicisse edere. Deglutiebat utique miser filices: Sed inventum est, nebulonem infelici puero sub noctem purgans medicamentum obtrussisse, ex quo, multo cum dolore, lapides decederent: huicque demum miserrima servitute infelix juvenis est ereptus, juvenum quorundam Bernatium felice curiositate.

Terram utique nonnulla animalia edunt, eaque aluntur lumbrici (c), vermes tipularum (d), ephemerorum (d*), aſili (e). Arenam tellinæ (f) vorant & cochleæ (g), & lumbrici marini (h); testas ranæ, quas optime digerunt (i); saxa balani (k), vermesque (l) proprii lapidi vori. Homini ea pica subinde accidit, ut margam, terram, arenam scriptoriam (m), testas echinorum (n) devoret; ut lupi, & apri (o) terram, quando eos fames edomuit, ingurgitant. Sed ex iis naturæ inimicis dapibus scirrhi mesenterici, & passim mortes succedunt; neque credo GUMILLÆ, qui Ottomachos suos terram, & sabulum, & cretam, absque malo devorare scribit (p). Fuscæ legas, ut in America Anglica (q) miseri Salzburgerensium pueri ab ea ipsa terræ pica ad internecionem deleti

(a) Vide Sect. IV.

(b) *Phil. transf.* n. 253.

(c) *REDI anim. nell' anim.* p. 53. *VALISNERI oper.* T. III. p. 463.

(d) *REAUMUR Mém. pour l'Hist. des Insect.* V. p. 12.

(d*) *SWAMMERDAM bibl.* p. 249.

(e) *IDEM* p. 660.

(f) *BORELL.*

(g) *SWAMMERDAM bibl.* p. 173.

(h) *KALM. resa* T. II. p. 105.

(i) *Leipz. Saml.* T. V. p. 352. 353.

(k) *BONANNI recreat.* p. 236. 237. *BORELL. II. Prop.* 192. Negat tamen *LYONNET infect. Theol.* p. 258.

(l) *La VOYE Journ. Sav.* n. 32. Etiam polypi marini & lumbrici *VALISN. I.* p. 243.

(m) *REINES var.* p. 35.

(n) *TOZZI l. c.*

(o) *BUFFON T. V.* p. 119.

(p) *Hist. Nat. de l'orenoq.* p. 271. 282.

(q) In *Cl. BOLZII relationibus.*

nem deleti fuerint, & par est BROWNII (*r*) testimonium. Terra in ventriculis & intestinis caporum & cuniculorum (*r*^{*}) non mutatur (*s*). Ex luto quidem veram gelatinam gustu gratam (*t*) paravit Cl. WIDMER, haftenus solus. Neque alibilem esse farinam fossilem, recte ostendit Cl. SCHÆFFERUS (*u*). Calx cani obtrusa alvum & urinam movit; miserumque animal emaciavit (*w*). Arenas a perdicibus devoratas inter carnes occurrisse experimentum est a SCALIGERO prolatum, aliis quidem studiis eminente (*x*).

Metallorum etiam deterior est conditio. Etsi enim plumbum a muribus rodi dictum (*z*) est, & struthiocameli (*a*), atque casuarii nummos cupreos & ferramenta devorant, suntque nonnulla (*b*) experimenta, ex quibus credas ostendi, solvi in eorum stomachis ea metalla, tamen non aliis metallis, & omnino perire (*c*) ostendetur. Etsi porro terram ferri utique in hominis ventriculo solvi novimus, quod & ab aqua simplici solvatur; etsi idem metallum certo in sanguinem (*d*) venit, adque rubros globulos constituendos confert, nulla tamen in eo metallo aut saporis gratia est, quæ faciat ut admittatur: nulla in dentibus vis, qua subigatur; nihil etiam glutinosi, quod adhærescat: ut omnino in partibus firmis vix ullum reperiatur (*e*). Sed id ferrum mistum aquis, mistum plantarum succis, & solutum, in sanguinem advenit (*f*).

Hydrargyrus per intestina immutatus descendit (*g*) aut in sanguinem quidem recipitur, nihil tamen mutatus, cum fluidus in ossium cellulis & redivivus (*h*) reperiatur. Gallinam bracteis tenuissimis argenteis aureisve
pastam

(*r*) Ex marga subdulci *Nat. Hist. of Jam.* p. 64.

(*r*^{*}) *De terr. Nucerin.* p. 47.

(*s*) AL. DELLA FABBRA *de arthrit.* p. 24.

(*t*) *Marggräf. Bad.* p. 197.

(*u*) *Vom Bergmeel* p. 35.

(*w*) SCHINZ *de calce* n. 43.

(*x*) In ARIST *de plant.* p. 40.

(*z*) p. 14.

(*a*) *Scēt.* IV.

(*b*) Conf. interim *Comm. in Praecl.* Boerb. T. I. p. 270. 271.

(*c*) L. XIX. *Scēt.* IV.

(*d*) L. V. p. 118. 120.

(*e*) p. 118.

(*f*) p. 123.

(*g*) JORDAN *de peste* p. 575. 576. ubi subrideas ad medicorum metum. ROBAR. in *con-*
radicē. GALENI. In cane WEPFER *cicut.* p. 299.

(*h*) L. XII. p. 85. 86.

pastam posuisse argentea ova, & habuisse viscera inargentata & deaurata, non credas ex alio referenti SCHNEIDERO (*i*), cum per annum aliis in periculis, eadem aves hæc eadem metalla fideliter per alvum reddiderint (*k*).

Plumbum ex malignioribus venenis est, lentum (*l*) sed potens. Eo infectum vinum, aut vitiatum ex tectis (*m*) plumbatis aqua (*n*), peristalticum motum destruit, & colicos dolores pene insanabiles excitat. Etiam ex polline tritæ cerussæ respirato colica pictonum (*o*). Sed omnino inflammationes ventriculi (*o**), & ulcus, & funesta asthmata (*p*) idem metallum facit.

Cuprum promptius venenum est, & aut ventriculum continuo subvertit, aut omnino enecat, etiam canes (*q*), avesque (*r*); nihilo benignius in hominibus (*s*), etiam aerem pestilente fumo imprægnaturum, ut accolæ infirma valetudine, & mali sint coloris (*t*), neque stirpes præter empetrum aerem cupro plenum fahlunensium fodinarum ferant. Olim God. THOMASIIUS, vir acuti ingenii, epilepsias pueriles a lacte deduxit, in vasis cupreis male stannatis adservato (*u*).

§. XI. *Sal marinus.*

Ex fossili regno salem possis repetere: etsi enim falsi fontes eo imprægnati sunt, manifestas tamen videmus in rupibus nostris saliferæ inter Grandeau & Avançon fl. regionis nidos salis veri in durissimi lapidis rimis coacti, nulla figura, qua nota a sale distinguimus, qui in aqua solutus fuit, is enim aut cubi figura est, aut pyramidis quadratæ concavæ.

Sal

(*i*) De catarrh. L. III. p. 106. SPERLING *physic. instit.* p. 973.

(*k*) CONRING *hermet. ag. sap.* p. 248.

(*l*) FRICK. *venen.* p. 267.

(*m*) TRONCHIN. p. 66.

(*n*) Inde collectæ in contracta intestina fæces, in minimos rotundos globulos factæ, obductos lithargyro IJSEMAN *colic. saturn.*

(*o*) TRONCHIN. p. 64.

(*o**) Ex saccharo saturni HILLEFELD p. 54.

(*p*) ZELLER *docimasia* ann. 1707.

(*q*) *Journ. oecon.* 1753. Jul.

(*r*) Cum de assere caruleo & albo colore picto decerpissent. KRUGER *von der Erziehung der Kinder* p. 161.

(*s*) Ibid. *Obs. a Societ. Lond.* II p. 148. VANDERMONDE *Journ. de Med.* T. II.

(*t*) Du Bois *non ergo colica pictonum vera* sect.

(*u*) SCHULZE *mors in olla* n. 17.

Sal ergo aut informis, & vere fossilis, est in Polonia, Catalonia, Transylvania: aut purus & cubicus ex falsis maris aquis solis tepore coctus in rupibus (a) maritimis Lusitaniæ, insularum capitis Viridis, insularum calidiorum Americæ, demum in stagnis argillosis Britanniæ minoris, Santonum & Languedociæ: aut pyramidalis artificio humano ex muria, exve fontibus falsis, coctus in Anglia, Gallia, Germania, Helvetia; aut ex plantis demum eductus (a*). Hæ falsis species non omnibus quidem dotibus, sed plerisque conveniunt.

Terra falsis marini est lixiviosæ indolis (b) & imprægnatur acore universali (c), a quo solo vis est & ad condendum efficacia. Eo acore per ignem destructo, in fale decrepitato (d), quod reliquum est, jam syrupum violarum viridi colore tingit; & repetita demum dissolutione sal optimus porro iners fit, & destillatus spiritum acidum negat nunc reddere (e). Quare optimus sal est, qui a sole ipso paratur, cujus calor multo quam ebullientis aquæ calor, & in ea ratione minor est, quæ est 100. [in mediocri calore] ad 214. aut 150. ad 214. in ardore solis maximo, quem fumus experti a 1762.

Optimus ergo sal marinus est, certe regionum mediocriter calidarum. Nam in fervidissimis insulis (f), sal etiam a sole coctus nimis acris est, & partem acoris amisit. Similis est marini, quem ego ex fonte falso *aux fondemens* ab aliquot annis paro, perinde cubicus, perinde violam redolens, durus, solidus, cujus spiritus plus saturat alcalini deliquescentis falsis, quam sal vulgaris, fere in ratione 4. ad 3. Belgæ falem meracissimum, solum hæcibus bene condiendis idoneum, parant ex fale marino in

(a) Majo & Tortuga DAMPIER T. III. p. 12.

(a*) GREW *hist. plant.* WALLERIUS *de nitro.* Ex omnibus vegetabilium salibus marinus potest educi HILL. *mat. med.* p. 122

(b) LEWIS *mat. med.* p. 388. Add. HILL *mater. med.* p. 326. Nolo hic eam litem subire, num sal potius natrosus, num terra lixiviosa eam basin constituat. Si falem malis, tamen & ipsi terræ præstat fundamentum.

(c) L. VIII. p. 219.

(d) *Mém. des Sav. étrang.* T. II. p. 166.

(e) HIAERNE *æst. laborat.* p. 65.

(f) Carnes consumere LEMERY *tr. des alim.* T. I. p. 533. Etiam de Lusitanici falsis acrimonia queruntur.

(g) BROWNRIDGE.

in marina aqua soluto, cui dum ebullit, acidum serum lactis adfundunt, ut acor restituatur, quem ignis abegit.

Deterior sal est, & parte sui acoris mutilus, qui coquitur in lebetibus, deque aqua ad ebullitionem calefacta ad fundum amplissimi vasis decedit. Eo deterior autem est, quo vehementiori igne rapidius excoquitur, ut denique amissa natura acida ad lixiviosam redeat, & in aere humido colliquescat, carnesque neget conservare. Acorem enim muriæ exhilare certis experimentis cognovimus.

Nunc hoc sale homines tanquam præcipuo condimento utuntur: quo & carnes suas a putredine servant: & recentes etiam, alioquin fatuas, cum valetudinis compendio reddunt sapidiores. Necessitas carnis salientis est in ejus natura putredini obnoxia, maxime in regionibus calidis, ubi carnes pene subito contabescunt (g). Non perfecte utrovis fungitur officio sal marinus: nam putredinem, etsi inhibet, tamen non totam impedit (h): & bubula (k) falsa in aquam dimissa etiam citius, quam pura, putrescit.

Quare adeo malignus usus falsarum carnum est, de quibus putredo naturam acidam vegetabilem abegerit, neque satis acoris sal adjectus restituerit. Quare febribus, & dysenteriiis, & potissimum scorbutu generando sunt aptissimæ (l). Hinc frequens adeo inter nautas longinqua itinere prosequentes scorbutus. Salsa enim carne fere vivunt.

Cæterum si copia sufficienti in intima fuerit adactus, inque carnum profundas incisiones, diu plenæ putredini resistit, neque plus plerique homines petunt (m), quam aliquam putredinis mediocritatem.

Dictum est, cum exercitus in Hibernia sale careret, in dysenteriam incidisse, procul dubio per ciborum putredinem (n). Dictum est etiam acore suo ossa emollivisse, & eo retulerunt celebrem feminæ Soupioti morbum, quam ajunt per biennium salis usui indulgisse. Sed ea si omnino vera sunt, de sale per intinctum adhibito interpretamur.

Quam

(g) Intra quartam horam in Jamaica SEOANE. *introd.* p. XV.

(h) LEWIS *mat. med.* p. 494. Omnium salium minima vis conservans est in marina sale PRINGLE *diseas. of the army* p. 330.

(k) HALES *ventilat.* II. p. 81.

(l) PRINGLE p. 354. REINIUS in *Itin. Chin.* PIRARD de LAVAL. *Voy.* III. p. 35. Caro suilla fumo indurata duobus mensibus in ventriculo hæsit RIEDLIN *miller* p. 829.

(m) COLBATCH *Essay on acid. and. alesti* p. 153.

(n) SUE ad MONRO *of the bones* p. 24.

Quam insuperabilis sit ejus natura alias ostendetur, quæ in urina superfit, & demum in ipso post tantam putredinis & ignis torturam phosphoro.

Videtur omnino aliquid in sale esse, quod naturæ animali conveniat. Nam pene omnes gentes sale utuntur; & etiam bruta animalia pleraque, certe quæ ruminant (o), sale delectantur, & ab ejus usu bene habent.

Neque tamen desunt gentes, vagæ potissimum & parum industriæ, quæ sale abstinent in America (p), Brasilia (q); Caraibes (r), Lapones (s), Islandi (t), Ostiaki & Swetlobi (u), Africani Numidæ circa Thalam (w). Salis etiam usum ignorabat robusta illa puella ex gente Esquimantfic.

Alii populi adeo anxie falsum saporem quærunt, ut etiam ex cineribus fuci (x) salem coquant, aut ex igne lignis immisso, quem falsa aqua extinguiebant, aut denique ex vulgari de ligno exusto cinere (y).

Nitrum, adfinis sali marino sal alius, phlogisto uberius prægnans, & amarus, ad intinctum ob saporem ingratiorem inutilis. carnes potius melius conservat (z), cum potentiolem acidum spiritum generet. Nitrum Ægyptium alterius erat indolis, verusque sal lixiviosus fossilis (a). Aqua calcis pisces conservat, non carnes (b).

§. XII. *Alia condimenta vegetabilia.*

Cum ab acore vis condimenti expectetur, acida puriora ea laude valere credas, acetum (a) ergo dudum adhibuerunt, tanquam purius aci-

E c 2 dum

(o) Etiam cervi REICHART *Gartenbau* p. 67.

(p) LAFITEAU *mœurs des sauvag.* T. II. p. 368.

(q) THEVET *France antarctiq.* p. 55.

(r) Saml. der Reis. T. XVII. p. 482.

(s) *Galer. di Min.* T. V. p. 131. MARTIN *de medicina lapon Luleus* p. 10. LINN *For. lapon.* p. 70.

(t) HORREBOW p. 327. *Melanges I.* p. 199.

(u) *Relat. des Voy. au Nord* T. VIII. p. 397. 400.

(w) SALUSTIUS *Jugurth.* p. 216.

(x) MARTIN *West Isl.* p. 64. BORRICH *hermet. ægypt. sapient.* p. 343.

(y) Umbri apud PLIN. ex cinere juncorum; Ægyptii apud BORRICH *ibid.*

(z) Quater PRINGLE p. 310. Alumen etiam trigesies *ibid.*

(a) Eo utebantur Ægyptii BALLON *funus med.*

(b) *Phil. iranf* T. XLVIII. p. 163.

(a) *Elem. Chem.* T. II. *proc.* 50. & 127.

dum succum, debiliorem equidem (*b*) fossilium salium acidis liquoribus, sed gustu gratiorem, neque meracitate sua membranas nostras crispaturum.

Salubre omnino & condimenti genus est, & denique potus. In fervidis Archipelagi insulis bubula in aceto maceratur, in quo sal marinus dissolutus est; tunc ad solem ficcatur; ita & putredinem effugit, & ligni pene duritatem acquirit (*c*). Spiritu nitri aqua misto in phthisi & temperie febrili utiliter utimur (*d*). Non alio modo bilis putredinosam corruptelam, ex cadaverum frequente incisione natant superare potui, quam oleo vitrioli plurimo totis annis sumto. Quatuor pintæ aceti utiliter in causo datæ (*d**) sunt. Oportet autem, ut recte carnes condiant, acetum in vitreo vase circumfundere. Acore enim suo & terram, & marmor ipsum, facillime erodit, tunc saturatum absorbente pulvere, & quasi enervatum, carnem putredini spontaneæ dimittit.

Sacchari in condiendo vires (*e*) insignes sunt, quas tamen fere ad vegetabilia sola adhibemus: carnem enim conservat quidem fortius & tutius (*f*), quam sal marinus, & tanti est acoris, ut cum ovilla carne (*g*) [corde] fermentaverit, abieritque in vini pene saporem. Verum cum saporem carni in fatuum mutet, eo fine non adhibetur. Paratur autem, uti notissimum est, ex succo arundinis sacchariferae; sed etiam ex culmo Mayz (*h*), ex radice dauci sativi, aliisque dulcis saporis plantis obtinetur. Mireris, ranas, columbas, alia animalcula a saccharo necari (*i*), quod Psittaci & aviculæ avide devorent.

Mel fere ad ea valet, ad quæ saccharum, & veteres eo cadavera dicuntur condidisse: id tamen experienti CLAUDERO non successit.

Solo

(*b*) Saturatio salium lixiviosorum mensuram dat roboris acidorum liquorum, ergo vires olei vitrioli sunt uti 41. Spiritus nitri ut 72. Spiritus salis ut 8. aceti ut 18. *Mém. de l'Acad.* 1699. NEUMANNUS p. 182. Oleum vitrioli promde duplum fere robur est, si cum spiritu nitri conferas.

(*c*) TOURNEFORT *Voyag. au Levant.* T. I. p. 321.

(*d*) CHEYNE *diseas.* p. 109.

(*d**) DEGNER *dysent.* p. 199.

(*e*) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1732. ubi vires diversorum salium in carnibus condiendis videas ad suas mensuras reductas

(*f*) Duplo *Journ. econ.* 1717. M. Oct. Pridem BECCHER *Physic. subterr.* p. 143. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1732. etiam PRINGLE p. 354.

(*g*) *Journ. econ.* l. c.

(*h*) LAFITRAU T. II. p. 152.

(*i*) *Journ. econ.* 1757. M. Oct.

Solo scopo putredinis avertendæ butyrum carnibus circumfusum (*k*) utique inservire potest, & quotannis ex Megalopolitano ducatu anates, aliæque grati saporis aves, in vicinas regiones abunde mittuntur, multo butyro circumfusæ. Cæterum vereor, ne saporem vel tactu corrumpat, quod ipsum rancescat, etiam sale conditum. Ejus vis est in aere arcendo, & infectis avertendis.

Aromata, quæ & ipsa infecta arceant, hic omitto.

Denique iple fumus acidus ligni carnes ipse conservat, redditque saporem non ingratum, tantum ut duriores fiant, & in ventriculo facile hæreant (*l*). Turcæ carnes in furno siccant, & in pulverem comminuunt, quem in expeditionibus bellicis pro viatico circumferunt (*m*).

§. XIII. *Præparationes ciborum.*

Prima tantum rerum elementa hic tango. Primævi homines procul dubio & carnes, & horæos fructus, & ipsas edules herbas crudas, & absque ulla miscela in cibum receperunt. Et potest quidem ita vivi.

Nam in acetariis crudæ quidem herbæ deglutiuntur, & oleum potius deteriores reddit. Horæos fructus vulgatissimum est crudos manducare, & eorum, qui sapidissimi sunt, iidem pene semper crudi ad usus humanos adhibentur, ut ananas, uva, melo. Carnes testaceorum crudas devoramus, crudisque omnibus & olim multæ gentes usæ sunt, & nuper.

Etiā nostro aevo crudis vivunt nigritæ oræ auriferæ (*a*), Hottentotti, & gens late vaga *Esquimantfic* (*b*), quæ secundum plurimos auctores non aliter carnes adhibet; secundum aliquos certe in bellicis & venatoriis expeditionibus: tum versus meridiem similium etiam morum homines, Pa-

E e 3 tagoni

(*k*) DISBY *poudre sympathique* p. 182. BOYLE *de utilit. philos. exp.* L. IV. p. 28. *Exp. phys. mech. de aere* p. 209. 210. MAYOW *nitr. aer* p. 54. BRADLEY *farm. direct.* p. 9. *ladies dir.* II. p. 87. Alimentum est divitum apud Barbaros PLIN. L. 28. n. 35. GALLENUS de eo tamquam de re rara dicit, se vidisse suis oculis conf. PLEMP *valet. togator.* p. 154.

(*l*) RIEDLIN. *millen* n. 820. Nasci in carne fumigata ex sale volatili fumo & sale marino compositum sale ammoniacum CHEYNE *sanit. infirm.* p. 49.

(*m*) BELLOWS. *obs.* p. 366

(*a*) *Hist. de Voy.* L. IX. p. 318.

(*b*) ELLIS *budjonsbay* p. 139. CHARLEVOIX T. III. p. 179. *Account of a voyag. for the discov. of the north-west passage* p. 33.

tagoni (c) & Samojädi orientales, qui crudas carnes, crudos pisces vorant, & sanguinem bibunt (c*).

Eadem fuit consuetudo passim variorum hominum: ipsius ZENONIS (d) aliorumque obscurioris nominis (e), etiam insanorum, & (f) puellæ, in Gallia nuper captæ (g).

Neque solum perinde alunt, ut eæ carnes, quæ coquorum optimorum artificia sunt expertæ, sed robustissimos faciunt homines (h), ut denique coctas carnes sociali vita redditi vix ferant (i) & ex nova ea diæta vires suas amittant (k). Peculiaris est potissimum historia puellæ, quam diximus, viribus eximiis, celeritate summa, armatæ pollice insolitæ magnitudinis. Ea privilegia omnia amisit civili vitæ reddita.

Facile vero credas, ex robore magno ferociam, ex ferocia libertatem, vitam solitariam, aversionem legum, & statum naturalem sequi, quæ sunt omnia in Patagonibus & Esquimantficis. Nihil ergo hic nimium BUFFONIUS (l). Carnes tamen crudæ utique duriores sunt, ut DIOGENES hic infra canes manserit, neque potuerit crudas superare carnes, suntque auctores, quibus ex earum usu dicatur periisse (m).

Multæ tamen rationes sunt, quæ fecisse potuerunt, ut primævis jam temporibus aliqua industria ad cibos percipiendos adhibita sit. Et fructus quidem horæi maximam aeris copiam continent, ut per experimenta Cl. viri STEPHANI HALES pomum (n) aeris tantum ex calore generet, quantum sufficit replendo spatio quadragesies octies (o) eo pomo majori, & fatis

(c) *Voy. des V. vaiss. par le detroit. de Magellan* p. 311.

(c*) *Mém. sur les Samojädes* p. 93. 94.

(d) SUIDAS p. 306.

(e) KUNDMANN *Seltenh.* p. 1065. 1066. HAMBERGER *de imbecill. ventr.* OEXMELIN *hist. des avant.* I. p. 122. BLANCARD *Jaarregister* I. n. 28. Cent. 2. RZASCYNSKI p. 450. Angli illi naufragi *Voy. a la mer du sud.* p. 278. Add. TILING l. c. MORBIUS p. 164. MARC. DON p. 205.

(f) REINES *var.* p. 74. BOEHMER *polyphag Voyage de HARMANSON* p. 429.

(g) L. c. *ibid. Algem. Magaz* T. VII. conf p. 209.

(h) DU TERTRE III. p. 146. 147. *Voy. de HARMANSEN in Voy. de DAMPIER Patagoni Voy. des cinq vaisseaux.*

(i) OEXMELIN l. c.

(k) Alexander SELKIRK, & puella illa ex gente Esquimantfic sæpe nobis dicta.

(l) T. III. p. 445.

(m) LAERT. L. VII.

(n) HALES *bambastat. Exp.* 87. p. 202.

(o) *Exp.* p. 88.

fatis tamen elastici, ut duplam atmospheræ pressionem sustineat, & aptus sit elevare libras 11776. (*p*).

Ita maxima pariter vis aeris est in farinis omnibus, leguminum, pisorum (*q*), fabarum, etiam tritici, in quo aere præterea id est incommodi, quod in viscoso glutine involutus, lentius se expediat.

Nunc iste aer utique, in calore ventriculi humido, se de suis vinculis expedit; & naturam elasticam recuperat, stomachumque cum incommodo & periculo distendit.

A farina feminis lini femina inflata habuit hypochondria, & demum faciem (*r*).

Eo incommodo ignis adhibitus medetur. Is enim subito maximam partem aeris expellit. Ita coctum pomum vix quartam partem (*s*) aeris reddit, quam crudum generaret. In pane, ad quem multo major vis nudi ignis adcessit, multo minus superest aeris, ut tamen vis nutritia tota supersit (*t*). Multum emendatur, si bis coctus fuerit, & una a mucore defenditur. Res veteribus nota fuit (*u*): & antiquior usus videtur assarum frugum, qui neque nostro tempore obsolevit (*u*^{*}).

Carnes filamentosæ, maxime ferocium animalium, quæ prima forte in usus humanos cesserunt, per initia aliqua putredinis mollescunt. Id commodum vel sola adservatio (*w*) conciliat, quæ forte ratio est, quare suos cibos pene putridos aliquæ gentes recentibus præferant.

In vivi animalis agitatione (*x*) & venatione ante mortem plurima, aliisque crudelibus artificiis, ut suffocatione (*y*) morte lentiori (*z*) demum tusione (*a*), teneritas queritur, qua ipsam sæpius bubulam ita reddidi edulem, ut vix 10. minutorum ignis sufficeret, quo redderetur gratissima.

Homo

(*p*) Ibid. p. 209.

(*q*) Conf. breviter L. VIII. p. 186.

(*r*) TRAGUS. Sed de istis vide p. 201.

(*s*) BOYLE *Exp. phys. mech. de aere* p. 32.

(*t*) Plus nutrit panis quam ptisana GALEN *de ptis.* c. 5.

(*u*) SUIDAS p. 609.

(*u*^{*}) HASSELQUIST p. 173.

(*w*) Nigritæ oræ auriferæ *Hist. des Voy.* L. IX. p. 318. conf. p. 204. 205. Gruis caro non est edulis, nisi aliquot ante dies juguletur CASTELLANUS.

(*x*) PORTA *Mag. natur.* L. 13. LABAT *Voy. d'Espagn.* I. p. 254. 255.

(*y*) In capis VALISNER. T. III. p. 170.

(*z*) In Gallis indicis.

(*a*) VERULAM *Hist. vit. mort.* p. 335.

Homo ignem excogitavit, ad quem excitandum nullius animalis industria pervenit, etsi in eo, & in lumine sibi satis placent.

Carnibus ignis gratiam addit, dum sales, multa aqua, multoque visco involutos, paulum expedit, ut & olfactum vividius adficient, & gustum. Nulla pene proportio est, nostris certe palatis, crudæ vervecinæ ad eandem, quando ad ignem affata (*b*) fuit. Heroicorum autem, adeoque antiquissimorum temporum fuit, carnes affare, ut ex HOMERI infinitis locis constat. Gratissima vero, sed minus lucrosa, affandi ratio est, quando parte carnum neglecta, extima crusta (*c*) comburitur; interiora enim tunc, nulla amissa parte nutritiarum particularum, acceptissimo sunt odore & sapore.

Carnes elixare homines casu potuerunt didicisse, cum vellent lavare. Ita quidem vis nutritia dividitur, ut in jus pars pene major transeat, pars in carne maneat. Antiquum & ipsum est artificium, ut ex mosaica lege adparet, idemque in gentes etiam simplicissimas Americæ & Grönlandiæ diffusum. Plus tamen requirit adparatus, artemque excavandi lebetis, qua affatio carere potest. In universum carnes debilitantur elixatione, &, uti minus putrescunt (*d*), ita minus dant roboris (*e*).

Reliqua, in nostra brevitate omittimus; aromatum tamen mentio non penitus potest prætermitti, quæ non nutriunt quidem, cum nimis acria sint & penetrabilia; cibi tamen amorem aliquantum augent, saporem gratum addunt, & ventriculi vires musculares, etiam exhalationem internam, augent. Ea Aromata (*f*) oleo essentiali abundant omnia, pingui nempe, in quo plurimus spiritus rector est (*f**). Sapore sunt fervido, grato tamen, & ex India orientali pleraque repetuntur, quæ inter piper veteribus notius fuit, cinnamomum rarissimum; nucem moschatam, ejusque odoratam pulpam macis, & alia fere posterior ætas addidit. Europæum cælum vix eo est calore, ut tantum olei essentialis generetur, quantum ad dignitatem aromatis requiritur.

Est

(*b*) Conf. VERULAM p. 335.

(*c*) LERY *It. Brasil* p. 152. LABAT passim in *Itin. Antill.* maxime de testudine.

(*d*) BOYLE *Exp. phys. mech. aere cont.* p. 210. Etiam lac coctum minus acefcit ANDRY *tr. des dispens. du Caire* II p. 3.

(*e*) BACO de VERULAM *hist. vit. & mort* p. 338.

(*f*) Habet catalogum BOERHAAVE *Elem. Chem.* T. II. p. 18. 916. p. 127.

Est tamen aliqua aromatum imitatio, pro australi Europa in aurantiis pomis & citriis: pro boreali in acoro, angelicæ Laponicæ (g) caule. America propria sua aromata habet, ut Amomum Anglorum, corticem Winteranum. Notatu vero dignum est, in fervidissimis regionibus maximum aromatum usum esse, & necessitatem maximam. Nempe corpora earum regionum sunt debiliora, visque fibrarum universarum & ventriculi minor. Quare etiam nostro ævo allia & cepe Hispanis (h) & Ægyptiis, Asa fætida Indis maxime familiaris est, suo cum fætore, quæ Romanis Laser erat, aut certe laseri proxima: & eo spectant garum illud falsum, nata omnia stimulando ventriculo, superando acori, qui gentibus potissimum parca carne utentibus (i), & plurimis fructibus horæis abundantibus, procul dubio molestior supervenit.

§. XV. Potus. Aqua. Ex pluvia nascitur.

Et si aliquam in potu diversitatem hominum inventa fecerunt, major est tamen, quam in cibo simplicitas. Uti enim major pars sanguinis (a), humorumque reliquorum aqua est, uti etiam solidæ, quæ vocantur, corporis humani partes, plurimum habent aquæ, ita omnis potus aqua semper est, aut simplicior, aut fucata admisto oleo saleve.

Simplicior aqua, quæ vulgo nomen retinet, natura ipsa fundit, pluviam puto (b), ex qua fontanas, fluviales, lacustres, & marinas aquas credo oriri. Legi, quæ ea de re inter VALISNERUM & BEZZIUM sunt disputata; sed certe, quantum ex plurimis per Alpes montesque itineribus didici, nulla usquam in cacumine ullius montis est scaturigo: nulla, quæ non cum hiberno frigore insignissime minuatur, & demum siccetur, quæ pariter cum æstivo calore non redeat uberior, eo-que sit copiosior, quo plus pluvie cecidit, aut plus nivium & glaciei ad solem contabuit. Eos nivis dissolutæ sudores manifesto videas in imis angulis

(g) LINN. flor Lapp. p. 69.

(h) Ob eorum usum milites hispanos a morbis minus lædi MAISERLEY.

(i) Indis, Persis, Hispanis, Ægyptiis.

(a) L. V. p. 98. BOYLE Chym. secret. P. II.

(b) Etiam a rore in regionibus calidis copiosissimo DERHAM Theol. phys. l. c. p. 5.

gulis planis convallium colligi, & milliones addi millionibus similium venarum, donec Rhodanus inde confluat: Alpesque omnes in valles excavari, in quarum medios & cavatos concurrentium planorum inclinatorum inciles humor consentiat.

Lacus dicuntur in Bructero M. & passim in summis Alpibus reperi. In illo quidem M. modicus est fons, paucorum pedum, in quem paludosum pratum, multo altius, se exonerat, ter enim quaterve ejus lacus aquam bibi: In alpibus valles sunt inter præaltas rupes, quarum pars ima aquas de collibus confluentes recipit.

Deinde ad originem fontium super telluris superficiem se efferentium speculandam; occasio mihi fuit plurima, in fodinis falsis montium super Panex, & super Fenallet. Etiam internæ aquarum venæ sunt ab aquis cælestibus, quæ per rimas rupium, supra exitum superiorem fodinarum certas & definitas, in terram subeunt, earumque rupium sequuntur venas, obliquosve ductus, & demum mille & mille guttulis in scaturiginem de pertuso monte, ex argilla cærulea indurecente facto, effluentem conveniunt, quæ porro in lucem prodit. Aliis locis, ut in montibus Juranis, qui olim ad celebrem Abbatiam Romani Monasterii pertinerunt, lacum videas, qui in montem per minimas rimas rupium se inanit: & aliis locis subterraneorum stagnorum manifesta sunt indicia, quæ ab aquis cælestibus per rupes se subducentibus repleta, magnas edunt scaturigines.

Aqua ergo pluvia, & ros, primigeniæ sunt aquæ; sunt etiam levissimæ (c), impuræ tamen, cum in utrisque, & in rore etiam magis, exhalantes de plantis & de animalibus humores, contineantur. Nam aqua pluvia putrescit (d), & fætidum limum deponit (e), ad sesquigranum in pinta, in quo fere ea sunt (f), quæ in sedimento, per exhalationem ad iguem facto. In eo enim amarus sapor, & lixiviosa fætida natura est (g), cum syrupo violarum virescens, inque ea terra calcaria,

&

(c) Sub tropico toto aqua in pinta semunce est levior, quam nostra *Journal d'un voyage aux terres australes* T. I. p. 350. Id nimium. Pluvialis ad putealem se habet ut 740. ad 733. DETHARDING vom Stoppelscher.

(d) LUCAS of water T. I. p. 27.

(e) RUTTY p. 23.

(f) Terra absorbens & sal cum acidis fervens p. 33. 34.

(g) RUTTY p. 34.

& sal marinus, & alter acidus (*b*). Destillata pluvia, quando computruit, inflammabilem spiritum dat (*i*). Sed etiam infectis scattet. Negant etiam sitim solari (*k*); aut saponem cogere, quæ est injusta querela, cum ad lotionem linteorum omnibus præferatur, & supra omnes tinctoria sit, theæque infundendæ aptissima, quare ad potum ipsum a summis viris laudatur (*l*). Sed ad eos usus vitreos nostros fontes laudo, quorum frigus ventriculum roborat.

Ros etsi levior (*m*) est, est tamen etiam impurior, & servatus fætet (*n*), & peregrinæ materie ad $17\frac{1}{2}$. grana in libra sedecim unciarum habet (*o*), quam tamquam sedimentum deponit (*p*). Negant tamen cum acidis fervere, salem (*q*) vero marini similem habere ajunt & nitrum calcarium (*r*). Saponem ros cogit, ejusdem adeo cum duris aquis criminis reus (*s*), quod quidem vitium a rore non expectassem.

Purior est equidem cælestis aqua, quæ fit ex nive super nivem delapsa (*t*), aut ex contabescente grandine (*u*), eandemque negant etiam intra multos annos putrescere (*w*), & tamen fatentur non esse salubrem: in eo quidem erraturi (*x*). Nihil enim gratius, quam sapor aquæ ex soluta in Alpihus nive per nudas rupes, puramque terram defluentis, quam sæpe cum summa voluptate, nullo cum incommodo, maxima dosi, per Alpium culmina anhelans gratus bibi, & tota armenta bibunt.

E f 2

Nullam

(*b*) RUTTY *Synopsis* p. 35. 36. 37. 40.

(*i*) LUCAS p. 27.

(*k*) WALLER *hydrol* p. 34.

(*l*) Optimam esse HIPPOCRATES *περι υδατ. αερ. τοκ.* n. 20. J. Bapt. de MALMEDY *de natura aq. Leodii.* 1735. HOFMAN *aq. med. univ.* n. 10.

(*m*) LUCAS p. 26.

(*n*) RUTTY p. 45. In vasis male clausis HENSHAW *Phil. transf.* n. 3.

(*o*) RUTTY *ibid.* & p. 46. ELLER *Mém. de Berlin.* 1748.

(*q*) Salis $\frac{1}{8780}$. MUSCHENBR. *Essays de phys.* p. 782.

(*r*) RUTTY p. 47. 48. Nitrum verum se inde produxisse HENSHAW. Calcem BERGIUS l. c.

(*s*) RUTTY p. 45.

(*t*) WALLERIUS *hydrolog.* p. 11. 21. RUTTY *Synops.* p. 39. BOERHAAVE *Elem. Chem.* I. p. 601.

(*u*) Levissimam esse MARSIGLI in Danubio. HIPPOCRATES *περι υδατ.* n. 20. VALISNERI *Oper.* T. II. p. 468.

(*w*) WALLER *ibid.* Recte defendit LUCAS T. I. p. 29.

(*x*) RUTTY, WALLER.

Nullam ergo aquam ad usus humanos aptiorem novi, nisi eam, quæ de pluvia per terram arenosam (z), quarzofam, in aqua certe non solubilem, purasve rupes, tamquam per colum, destillans, profluit crystallina, levissima, etsi aliquanto tamen, quam pluvia, gravior; frigida, sed hieme difficulter congelabilis, & etiam per rigidam brumam fluere pertinax: a pluvia non mutabilis, cum sapone facile spumam largitura, legumina coquens ad mollitiem, non putrescens facile, neque colligans virorem, aut conservans: sitim facillime sedans, & spiritu (a) quasi aliquo linguæ placitura.

Ejusmodi aquæ hic Rupe ex leni clivo, sed altis marmoris rupibus subjecto, longa serie, ipso in prædio nostro profluunt, centum scaturiginibus, immutabilis bonitatis, neque in rigidissimo frigore, quale nostrum cælum admittit (a*), unquam congelatæ. Eam dotem videntur aliæ gentes adeo ignorare, ut etiam inter bonas notas ponant, facile congelari (b). Neque in Helvetia ejusmodi fontes rari sunt, quos Aquileienses populari nomine vocant *des Eaux douces*, iique suum a congelatione privilegium etiam aliis aquis admitti impertiunt.

Levissimæ etiam sunt thermæ aliquæ, ut Fabarienses (c), non cessuræ pluvialibus, & spadanus *sa venire* (d). Laudant etiam veteres æthiopicarum (e) aquarum levitatem, indeque earum salubritatem demonstrant, tum recentiores aliqui aquarum africanarum (f) exploratores, quæ etiam cum nostris perinde sint incorruptibiles (g): uti etiam CLAVIANA illa aqua (b), in vitro equidem hermetice clauso, jam dudum per 50. annos inmutata & putredinis expers, mansit. Cæterum pondus aquæ G. J. GRA-

VEZAN-

(z) WALLER p. 23. Naturam imitatur AMY *hist. de l'Acad.* 1748. p. 121. etsi postea, spongiæ arenæ substituit.

(a) Eiusmodi spiritum serio in aquis admittunt CRESSENZO p. 153. VALISNER. II. p. 468. HOFMAN *meth. exam. aq. sulf.* n. 3.

(a*) Gr. 19. REAUMURI infra o

(b) Non bene optimam facile congelari LUCAS p. 28.

(c) Ad aquam pluviam ut 1138 ad 1142. RAHN *de fabar.* p. 16. & ut 1138. ad 1140. ad alias aquas. Omnium aquarum levissimæ & purissimæ sunt LUCAS p. 38.

(d) HOFMAN *meth. exam.* n. 4.

(e) HEROD. III. p. 191.

(f) Quarta parte leviores esse BOYLE *util. phil. exp.* p. 35. Sed negat alias aquas aliis quarta parte leviores esse NOLLATUS *leçons* T. IV. p. 34. Negat etiam ipse BOYLE aquas aliis adeo multo esse leviores *med. hydrol.* I. p. 107. A calore vero potest levitas fuisse aliqua.

(g) KOEBE apud KUNDMANN p. 614. &c.

(b) L. a CAPOA *dell' incert.* &c. II. p. 25. BONANN. *recreat.* p. 170. Negat aquam Jordani putrescere RADZIVIL p. 96.

VEZANDE (*i*) in pede rhen. cubico posuit 63. libr. unc. 7. drachm. ij. scrupul. 2. & in pede anglico libr. 62. 4996. ponderis a verdupois f. civilis J. DESAGULIERS (*k*). Parisino demum in pede aquæ invenit libras 70. CL. PAIOT D'ONSEMBRAI (*l*); & libras 69. unc. 9. P. de la HIRE (*m*).

§. XV. *Aquæ duræ, molles.*

Cæterum & istæ omnium aquarum optimæ hætenus impuræ (*a*) sunt, sed modice, ut in sedecim unciis unicum granum elementi peregrini adpareat, sive $\frac{1}{160}$ totius molis, vel etiam minus (*b*). Spatum in iis adgnoscat HILLIUS (*c*).

Fluviatiles aquæ deteriores his scaturiginibus, cæterum non graves, sed admodum putrescibiles (*c**) sunt. Bonæ rhenanæ, in quarum 160. libris sola grana 210. atque in libra non supra $\frac{4}{5}$. grani (*d*) solidi est elementi. Leves aquæ Thamesis (*e*), & Tiberis (*f*), & Vistulæ (*g*), & in universum fluviorum aquæ. Non malæ Londinenses rivales, in quibus infra granum in libra (*b*).

Sed longe major est terræ elementive peregrini copia in puteali aqua, quæ mihi semper omnium deterrima (*k*) est visâ, imprimis in regionibus planioribus. Viennenses puteales ad bonas numeros, quæ 14. tantum 15. & 16. grana sedimenti habeant in libris quatuor (*l*).

F f 3

Neque

(*i*) n. 1557.

(*k*) H p. 128.

(*l*) *Mém. de l'Acad.* 1739. p. 68. Conf. MUSCHEMBR. *Inst.* n. 913.

(*m*) *Mém. de* 1701. p. 170.

(*a*) Sensit jam SANCTORIUS in *I Fen. avic.* p. 139.

(*b*) RUTTY *synops.* p. 8. Eam mensuram communem facit C. de la GARAYE, *ed. Salib &c* Abundantem vocat CRESSSENZO p. 160.

(*c*) *Mat. med.* p. 318.

(*c**) Thamesis BOYLE of *mens ignorance. in the use of natur. things.* PRINGLE *diseases* p. 411.

(*d*) HOLZBERGER l. c. p. 16.

(*e*) LUCAS p. 135.

(*f*) B. CARYOPHYLLI *Therm. herculan.* p. 9. LANCIS. l. c. p. 46.

(*g*) ERNDL. *varsav. phys. illustr.* n. 3. Unici grani in tribus libris.

(*b*) LUCAS p. 137.

(*k*) Etiam HENKEL *rediv.* p. 134. Male ergo Lugdunenses medici putealem aquam Rhodani præferunt.

(*l*) BESENECKER *cerevis. austr.*

Neque malæ Erpacenses (*n*), quibus 21. grana in libris decem, aut Buxovillanæ, quibus grana 120. in libris 64. nempe in libra fere grana duo (*n**). Neque deteriores argentinenses, quæ in 56. libr. non supra drachmas duas aut tres, atque adeo in una libra non supra 2. ad summum grana (*o*) habent. Non nimis bonæ fontanæ Warsavienses, in quarum libris tribus grana sint solida quadraginta (*o**).

Ejusmodi aquas *molles* vocant, in quibus in 128, unciis non sint supra grana 5. ad 40. (*o***), atque adeo in 16. unciis grana ad summum 5. Ex aquæ cum sapone spumam agunt: pisa coquunt, tincturam Theæ benignius excipiunt.

Duræ vero sunt, quæ a 40. gr. ad 120. & ultra sedimenti ponunt, atque adeo in 16. unc. a 5. gr. ad 15. (*p*) 17. Huc Londinenses illæ pertinent, in quibus gr. $11\frac{1}{4}$ (*q*), gr. $12\frac{1}{2}$. (*r*), in ea mensura reperit Cl. Lucas. Malæ illæ Rostochienses, quibus in libra grana sunt 88. supra pondus pluvialis aquæ. Ut omnino fontanæ ipsis aquis mineralibus ponderosiores sint, in quibus tamen ex manifesto sapore plus peregrinæ materiæ expectares (*u*).

Ædem tamen duræ aquæ continuo putrescunt, fætentque paucas inter horas, & nonnunquam ita plenæ sunt aspera terra, ut sitim potius augeant, quod ipse sum expertus, cum lingua sabuli minutissimi sensum sibi impressum servaret.

§. XVI. *Aquæ in universum dotes.*

Fecit autem nuperiorum (*a*) potissimum scriptorum industria, ut propius ad naturam aquæ liceat accedere. Prima vero elementa sola nos adtingimus.

Tota

(*n*) KLEIN *Hist. Natur. com. Erpac.* p. 31.

(*n**) BINNINGER *oryct. agr. buxovill.*

(*o*) HOLZBERGER *aer. aq. loc. argent.* p. 15. 16.

(*o**) ERNDL. l. c.

(*o***) RUTTY p. 9.

(*p*) IDEM *ibid.*

(*q*) LUCAS p. 140.

(*r*) p. 42.

(*s*) DETHARDING: comparatæ nempe cum aqua pluvia.

(*u*) BOYLE *of miner waters*

(*a*) BOERHAAVE in *Elem. Chem.* ELLER in *Mém. de Berlin.* 1748. WALLERIUS in *hydrolog.* aliisque scriptis, LUCAS.

Tota quidem aqua in frigore genus est vitri (*b*), quod vocatur glacies, tantum ut calor non superet 32. gradum Fahr. Infra eum gradum porro congelatur, & similiter fere in majori frigore, neque frigoris diuturnitas ejus status naturam mutat fusilem, etsi id dictum est. Sempiterna glacies Alpium perinde ad tepidum aerem contabescit, etsi id aliter narratur.

Inde supra gr. 32. porro aqua fluida est, & fluiditate omnes alios humores superat; eadem hactenus incompressibilis (*c*), ut dicta sit per sphæras aureas sub specie sudoris (*d*) penetrasse; etsi per rimas potius exstillasse Cl. HARTMANNUS (*e*) expertus est. Minimae ergo particulae præduras esse adparet (*f*), & creditum est, esse minutissimas, ob naturam earum penetrabilem, esseque globosas (*g*). Levissimas certe esse probabile fit, cum vulneratam cutem, nudumque nervum, nullo dolore adficient.

Sponte se aqua trahit, & in guttulas colligit satis valide, & ob eam vim in glaciem coit, diminuto igne, qui fluidam fervabat. Ad pleraque corpora adhæret, & in minimos tubulos adscendit & in spongiosos ductus, & sales suspensos tenet, calida etiam facilius. Eadem multis corporibus est pro glutine, aliquando sola, plerumque cum olei aliquo momento conjuncta. Argillam aqua sola unit. Ab igne expanditur, eo magis quo intensior ignis est, ut tertia (*h*) fere parte sui rarior sit, quando ebullit, gradu nempe Fahrenh 212. ad 214. Summo frigore octava parte fere sui densatur (*i*).

Apta valde est ad edendos vapores, ut etiam glacies exhalet; experimenta tamen mea & cum valido borea exhalationem minimam esse ostendunt, & manifesto cum calore augeri.

Si vapores mutata natura elastici (*k*) sunt, quam diu calent, summæque vires exercent, etiam pulvere pyrio majores, ut sub atmosphæræ prelo
in

(*b*) BOERHAAVE p. 614.

(*c*) MUSCHENBROEK in *Ciment*. II. p. 63. 65. *Instit.* n. 911.

(*d*) CIMENTINI & NOLLET T. I p. 119 MUSCHENBROEK ibid.

(*e*) Et fere BOERHAAVE *Elem. Chem* T. I. p. 560.

(*f*) Tamen sed majori vi compressibilis NOLLET *Mém.* 1743. p. 225.

(*g*) MUSCHENBR. *Inst.* n. 916.

(*h*) IDEM n. 919

(*i*) HAWKSBEER *Exp.*

(*k*) MUSSCHENB. n. 923. BOERHAAVE n. 622.

in 14000plo majorem molem (*l*) dilatentur. Exhalat autem aqua & in spatio ab aere vacuo (*m*), & in aere quocunque. Celeritas tanta est, ut experimenta nostra multis annis repetita aqua salsa ad tres lineas (*n*) suæ profunditatis in die æstivo amittat, nam unam lineam in permodico calore amittit.

§. XVII. *Admista peregrina. Ignis. Aer.*

Hæ aquæ sunt dotes, tamquam liquoris homogenei, sed ab ea natura longe remota est, utcunque pura fuerit.

Continet primo ignem, tum ea quæ fluit, tum ipsa glacies. Illa, quod determinato gradu caleat: ii enim omnes gradus in thermometro, qui sunt supra calorem congelationis, ii omnes sunt ab admisto igne, & eo, per sales adtrahentes, educto fluor aquæ ita evanescit, ut media æstate aqua vi nitri aut ammoniaci salis, aut circumfusæ glaciei, & ipsa congeletur.

Sed etiam in glacie ignis est, exhalat enim (*a*), & continuo pondere minuitur, usquedum sponte evanescat; ejusque frigus adusto spiritu nitri vehementer augeri potest, nempe ignis de glacie extrahi. Calorem autem non paulo minorem recipit, sibi relicta, quam & in sanguine animalium; in quibusdam aquis etiam minorem. Quæ in specubus latet, aut de aquæductu aliquo naturali profundo (*b*), neque aeris mutationibus obnoxio erumpit, ea 53. fere gradu calet, qui medius est inque subterraneis cavernis perpetuus. Hinc hieme calida videtur, quando aer friget ad gradum 32. frigida æstate, quando calor atmosphæræ est 70.

Dantur autem aquæ aliquot gradibus aere frigidiores, in Alpibus passim (*c*) conspicuæ, qualem ad medicos fines haud longe a Lucerna urbe nunc novimus quam maxime ab accolis adhiberi. Referas ad glaciale frigus, quod in ea superest, quando ex soluta glacie nascitur, perque ejusmodi canales descendit, in quibus primævum frigus a solis radiis, tepidove aere, non frangitur.

Sed

(*l*) MUSSCHENB. n. 924.

(*m*) WALLER K. *Swensk vetensk. handl.* 1738 p. 379.

(*n*) Ad $\frac{2}{5}$. pollicis HALLEY *Phil. trans* n. 166. Sed in minoribus alveis expertus.

(*a*) MUSCHENB. n. 941.

(*b*) HIPPOCRATES *περ υδατων* n. 1.

(*c*) Talem in *Weyssu M.* describit SIMLER *de Alp.* p. 316.

Sed etiam aer in aqua plurimus est, *fixus* (*d*) & elateris sui quasi oblitus, donec calor ebullientis aquæ accesserit; aut gelu; aut aliæ conditiones, alias a nobis recensæ: tunc enim expedit se, qui latebat aer, viresque elasticas exserit. Aer est, quem Cl. CRESCENTIUS (*e*) pro spiritu habuit, qui a calore agitated vasa dirumpat, idemque sudorem moveat. Sed aer verus & elasticus in aquis mineralibus magis vividis manifestissimus est, etiam sponte bullulis, & strepitu conspicuus, vasaque nimis clausa idem disjicit (*f*).

§. XVIII. Terra. Sales.

Proximum elementum aquæ inmixtum terra est (*a*), quæ ejus sedimenti partem constituit maximam, de quo egimus.

Varii generis est, potissimum tamen calcaria (*b*) cumque acidis fervens, tingensque violaceum succum viridi colore; quo *absorbentem* (*c*) aliorum Cl. virorum terram referas.

Argillacea (*d*), aut bolaris, terra in fluminibus passim continetur, ut in Rhodano nostro: ob eam inundationes vicini mihi fluminis pratis fertilitatem impertiunt. Etiam tepidæ nostræ, Thermæque, ejusmodi terram continent, mollem & subpinguem (*e*).

Spatacea (*f*) terra in aquis circa Bex adeo abundat, ut bibi nequeant, & late per fodinas crustas fistulasque pulchri stalactitis forment. In plurimis aquis adeo multa est, ut etiam vasa, in quibus residet, tubosque ligneos,

(*d*) L. VIII. p. 181. seqq.

(*e*) p. 153.

(*f*) HOFMAN *meth. exam. aquar. sal.* n. 6.

(*a*) MARGGAR *Mém. de Berlin.* T. XII. LUCAS p. 57. Etiam ex oleo terra BOYLE *paradox.* Chem. p. 29. HOFMANN *peregr. ob sanit.*

(*b*) HENKEL *redw.* p. 134. KLEIN *Erpach.* p. 31. 32. LUCAS p. 134. BERGIUS p. 111. 112. RELHAN *Brighthelmstöne* p. 47. K. Sw. *Wetensk. bandl.* 1762. Trim. 2. in stagnis Landskronæ. Sedimenti efficiebat tertiam partem DETHARDING l. c.

(*c*) RUTTY p. 11. HOLZBERGER ad $\frac{4}{5}$. sedimenti, & in aqua Rhenana ad $\frac{5}{7}$. sed cum pinguedine aliqua. LUCAS p. 125. 126. 134. hæc ad $\frac{3}{5}$. sedimenti: add. p. 114. 115. 117. 118. 121. 122. 123. 125. 126. 127. In Buxovillana aqua sedimentum fervet cum spiritu vitrioli BINNINGER.

(*d*) BERGIUS p. 128. In stagnis Landskronæ l. c.

(*e*) Valde eas aquas argillofas laudat HOFMAN *peregrin. propter sanit.*

(*f*) HILL. *mat. med.* p. 318. CRESSENZO p. 159. eo enim foliola talcosa refero.

neos, quos perfluit crassissima crusta (g) obducit, quales in nostris aquis Panetenfibus nati lapidei cortices in speciem fusci cujusdam achatis se patiuntur poliri (h).

Inde in aqua sales solent habitare, varii generis, maxime *marinus* (i) qui a paucis abest. Cum in ejus salis copiam per aquileiense gubernium sollicitè inquireretur, & omnes scaturigines, rivi, torrentes, & fluvii ad examen revocarentur, nulla pene scaturigo fuit, neque rivus ullus, neque ipse Pater Rhodanus, qui absque admisto sale cubico essent.

Nitrum (k) olim in aquis Scultenfibus a C. GESNERO detectum, deinde ab anglis, & in plerisque aquis Holmiefibus (l) repertum est; longis nempe suis prismatibus, & vi detonante conspicuum.

Nitrum calcarium angli vocant, si rectè eos intelligo, salem glau-beriano analogum, fusilem, frigidum, minime detonantem. Is in aquis anglicis (m) plerisque reperitur: ejusmodi salem sponte in exhalante muria nasci videmus, incommodum certe, & exosum, etsi in salem purgantem anglicanum mutari potest. Sponte etiam in fissuris subterraneorum fontium nostrorum, debilitèr sale marino imprægnatorum, generari vidi in rupibus cuniculorum sub Chamoseire.

Lixiviosi sales, de natri genere, frequentius (o) fixi, aliqui etiam volatiles (p), in nonnullis aquis reperiuntur.

Acidum

(g) STAHL von Salz. p. 350. HOFMAN meth. exam. n. 73.

(h) Ita etiam Carolinæ aquæ. Etiam aquarum Arcueil parisiæ ductæ tubi terra inferiuntur LISTER Journ. to Paris. 169.

(i) BORRICH herm Aegypt. sapient. p. 400. RUTTY p. 9. BERGIUS K. Sw. acad. handling. 1759. Trim. III. In stagnis Lanskrone l. c. LUCAS p. 116. & alibi DETHARDING. HOLZBERGER in Illa fl. invenit minimum quidem momentum, grani in 16. libris, in aquis vero argentinensibus multo uberiores, fere ad 2. grana in libram, In Erpacentibus ad $\frac{2}{3}$. sedimenti KLEIN l. c. Grana tria in puteali dura. Id. p. 32.

(k) L. VIII. p. 220.

(l) BERGIUS utique, & in argentinensibus HOLZBERGERUS. Prismata etiam passim habet LANCISIUS.

(m) RUTTY p. 9. LUCAS p. 149.

(o) In aqua Rheni HOLZBERGER & in aqua Illæ ad viginti, & triginta grana in materie salinæ granis 210. & 240. In putealibus aliquantum id. p. 15. 16. In Tiberi, ut videtur, LANCISIUS Exp. 8. in alia aqua Exp. 3. 4. In Brunnensibus aquis R. PAROLINUS Europ. Med. p. 158.

(p) LUCAS p. 142. 150.

Acidum aliquid in aquis ferreis conspectum SEIPIO potissimum debemus. Ejus aliqua vestigia in Londinensibus aquis latent apud *Johannem RUTTY* (q).

Vitriolum (r) ipsum in nonnullis fontibus reperitur, quod lac cogat.

Etiam Cupro (s), in acore dissoluto, & demum arsenico credit funestum in cornwallia fontem imprægnari Cl. BORLASE (t). Late vocem sumere oportet, nam arsenicum artis fere opus est. Sed hæc rara sunt.

Bituminosi quid in plurimis aquis reperitur, quod cum terra (u) aquæ immista cohæret; aut sponte in multis & mollibus aquis in pavoninæ caudæ speciem per aquæ superficiem exit. Ex spissamento aquæ ad centesimam partem exhalantis oleum jam obtinuit BORRICHUS. Id oleum, etsi in aqua recente difficulter ostenditur, facillime tamen & ubertim adparet in aqua putrescente: Neque enim sola aqua Thamesis (w), per longam navigationem naturam induit inflammabilem, aut aqua fl. Vecht. (x). Sed præque omnino aquæ (y), sub tropico eam naturam induunt: & depurata (z) demum aqua, quantum ejus fieri potest, & spuma obducitur ad solem, & oleum sulfureum suppeditat. Eodem redierit, si id phlogiston repetieris ex infectis (a) putridam aquam replentibus, etiam repetito (b) cum nova putredine renascentibus. Oportet enim ea infecta, quorum sola ova in aquam inciderint, incrementa sua, copiamque olei ab aqua sumisse. Ex rore etiam sedimentum habetur, de quo oleum & spiritus acidus destillant (c).

G g 2

Verum

(q) p. 11. 210. Id acidum saponem cogit. Habet etiam BORRICH l. c.

(r) RUTTY p. 268. In aquis *Hartfell* scoticis crytalli vitriolicæ nascuntur. In stagnis *Landskronæ* est vitriolum martis l. c.

(s) Aquæ Cronebaum RUTTY p. 291. Neosolienses aquæ. *Wiklovensis Com.* In aquis *Riotinto* Andalusiæ

(t) *Natur. hist. of Cornwall* p. 133.

(u) HOLZBERGER in aqua puteali p. 15. 16. in *Rhenana Id.* in aqua *Illæ* p. 16. In aqua ad ripam *Tiberis* LANCIS. *natio aer rom. qualit. Exp.* 1. 7.

(w) *Phil. transf.* n. 27. KALM *resa* T II. p. 116 BIRCH T. I. p. 165.

(x) Vapor ex dolio erumpens inflammatur TITSING l. c.

(y) HELMONT *paradox. disc.* p. 5. LISTER *de calcul.* p. 50. 51. DES LANDES.

(z) ELLER *Mém. de Berlin* 1748. p. 8.

(a) *Journ. d'un voy. aux ind. orient.* p. 355. 356. LISTER l. c. *Hist. de l'Acad.* 1722 p. 9.

(b) Nam etiam bis aqua eadem putrescit LISTER l. c. & *hist. de l'Acad.* 1722. p. 9. *Journ. d'un Voyage*, & septies EPIGENES apud FLIN. L. 31. n. 21.

(c) ELLER p. 6.

Verum sulfur in multis aquis reperitur, nusquam uberius, quam in fontibus cuniculorum subterraneorum *aux fondemens*, adeo gravibus sulphure, ut ægre fluant.

Denique ferrum (d) ut in universum in omni argilla abundat, ita in plerisque aquis aliqua tamen ejus vestigia reperiuntur.

Possis addere ad aquas potissimum palustres & pluviatiles, tenuissima effluvia putrilaginosa plantarum, & cadaverum. Ex utrisque dysenteriam aquæ de sequana (e) haustæ deducunt; ex istis dysenterias Pannonicas subitasque nonnunquam mortes (f).

§. XIX. *An omnia ex aqua.*

Etsi multiplex elementum in aqua latet, multo plura tamen ei & olim Cl. viri tribuerunt, & nunc tribuunt. Ex aqua nempe omnia nasci, & formari, animalia certe & vegetabilia; aquam in terram transformari, in oleum, in salem, in omnia adeo, quibus fabrica humana constat.

Salicem citant HELMONTII (a) jam experimento sola in aqua educatam, & quadragesies tamen se ipsa ponderosiores, cum nihil præter aquam ad vas accessisset; rapa ad triplum (b), sui ponderis aucta. Materiem adeo oleosam, falsam, terream, quæ super primævam illam accessit, a sola aqua accessisse monent viri Cl.

Quercum (c) octennio integro in aqua vixisse, & novam quotannis frondium comam produxisse: Vites in arena marmorea (d) & in fossis cuneo in rupe dura excavatis crescere. Et in universum arbores in mera aqua utique vivere & vegetare (e).

In musco humido, spongiave aqua ebria, sola adeo ex aqua, omne genus arborum & plantarum adolescere & incrementa capere, etiam fido Caroli BONNETI experimento.

Sic

(d) Holmienstibus pene omnibus BERGIUS.

(e) LISTER Journ. p. 169 Hist. morb. Uratislav. 1699. p. 79.

(f) LIGON. Barbados. p. 25.

(a) Complex. atque mist. Elem. fig. mut. p. 88. n. 30. Habet etiam salicis ex mera aqua nutritæ historiam KUNDMAN p. 491. 492. & BORELL anim. mot. P. II. Prop. 193.

(b) KUNDMAN l. c.

(c) Gentlemans magaz. 1749. June.

(d) BORELL.

(e) Du HAMEL phys. II. p. 202. 207.

Sic alias plantas, ranunculum, mentham ex sola aqua nutritas vixisse, floruisse, suum aroma, suum characterem servasse, BOYLEUS auctor est (f).

Cucurbitam sola (g) aqua irroratam increvisse, & in cinerem reductam, habuisse solitum suum pondus. Et in aqua terraque sicca nihil diminuta pepo increvit (h). Sponte etiam confervas & algas in aqua generari, nimis sane invitus vidi (i).

Neque differre valde addunt, si aqua destillata usus fueris, in qua terram paucissimam possis suspicari (k).

Sed etiam pisces (l) in sola aqua nutriri, & crescere, & patellas. (m).

Neque a terra plantas ali, sed omnibus sollicitè perpenfis sola ab aqua (n).

Inque aqua invisibilia minutissimorum animalculorum (o) ova per putredinem evolvi, & generationes succedere generationibus, donec aqua superest, quorum omnium materies, præter primævum illud perexiguum feminale principium, ex aqua est, sal nempe lixivus, & terra, & oleum.

Sed porro aquam solo repetito tritu (p), & coctione (q), variisque aliis modis (r) in terram mutari vitrescentem, diversam adeo a terra adventitia, aquæ hospite, calcaria.

Etiam dum corporibus adhæret, indurescere, cumque spiritu acido mistam incallescere, atque facile cum inflammabili elemento, vel cum terra coagulari (s). In spumam, in gluten (t), in membranam, in oleum, sola putredine (u) mutari

G g 3 in

(f) Orig. form. & qual p. 194. Chym. scept. P. II. PLOT. Natur. hist. of Oxfordshire p. 259. Du HAMEL elem. d'agricult. p. 62.

(g) ELLER Mém. de Berlin 1746. p. 46. 47.

(h) BOYLE Chym. scept. l. c.

(i) NEUMANN I. p. 2.

(k) ELLER ibid. & 1748. p. 6.

(l) BOYLE Chym. scept. P. VI. GUMILLA Oren. II. p. 37. BATHURST prælect. p. 199. 200.

(m) BORELL. l. c.

(n) WALLER fundam. agric. chem. p. 118. SHAW Suppl. p. 49.

(o) In HILLII Essays. JOBIOTI experimentis, & apud LEBRUWENHOECKIUM contin. arcan. nat. Ep. 16. Phil. trans. n. 13. 203. 220. 221.

(p) WALLER K. Svensk Vetensk. Handling. 1760. Trim. I. Geocosm. senesc. p. 12. ELLER Mém. de Berlin. 1746. p. 47. Non casu nasci MARGGKAE Mém. de Berlin T. XII.

(q) BOYLE ibid. p. 259. BORRICH hermet. ag. sap. p. 197. & NEWTON Queries post optiks n. 22.

(r) Add. WALLER de indole aqua mutabili; BOYLE de orig. form. p. 270. seqq.

(s) WALLER aq. ind. mutab. p. 26.

(t) Id. ibid. p. 30.

(u) p. 235.

in falem cum acido universali aereo (ω) abire. Nam in aqua marina manifesto superiora strata acere, & syrupum violarum tingere colore rubro, in profundis minus.

Vicissim in aquam omnia resolvi. Pinguedinem repetito a sale tartari abstractam in aquam elementarem redire (α): Sales alcalinos in aquam & terram iterata dissolutione (γ) reduci.

Omitto, quod dicatur, liquores dari (z), qui omnia in aquam solvant.

Itaque olim THALES (a) omnium rerum aquam elementum esse, docuit; & ante THALETEM ÆGYPTII (b); deinde R. BOYLE (c); & J. B. HELMONTIUS. Inter nuperos ILL. viri J. Theodorus ELLER (d), J. GODESCHALK. WALLERIUS, aliique (e)

Nunc quidem video, quæ reponunt viri ILLUST. BOERHAAVIUS (f), C. Gottl. LUDWIGIUS (g), HILLIUS (h), HENKELIUS (i), J. H. POTT (k), BRADLEY (l), WOODWARD (m), MONGIN (n).

Valida tamen videntur argumenta, quæ de plantarum in aqua pura destillata nutritione habemus. Incrementa ponderis multum superant ejus terræ

(ω) WALLER ad HÆRNE p. 64.

(α) David van der BECKE *exper. natur.* p. 83. TACHEN *hipp. chem.* c. 10.

(γ) TACHEN *ibid.* c. 12. van der BECK. p. 203.

(z) HELMONT *alcakest.* van der BECKE. BOYLE *Chem. scept.*

(a) Apud LAERTIUM I. p. 26. CICERO *nat. Deor.* I. n. 25. Conf. REGNAULT. *physf. anc. med.* III. p. 5.

(b) LAERTIUS *ibid.*

(c) *Chem. scept.* P. II.

(d) *Mém. de Berlin.* 1748.

(e) MULLER *de Thalete* MUSITANUS in *pyrotechn.* Neapol. 1683.

(f) *Elem Chem.* p. 594. seq. tamen ut det, aquam cum partibus solidis animalium con-
crescere p. 595.

(g) Ex tabescentibus squamis in aqua ali eas stirpes, quæ creduntur aqua nutriri *Inst. regn. veget.* p. 175.

(h) Aquam in terram converti negat, etsi exhalatione terra latens manifesta sit *mat. med.* p. 318.

(i) Salicem pene totam aquam esse, & 62. libr. carbonis querni dare cineris libras duas *Flor. saturniv.* p. 118. Sed HELMONTIUS quinque libras dedit salici, quarum perinde pars maxima, & major quam adultæ, aqua erat

(k) Respondet WALLERIUS in *diff. dubia quadam* &c.

(l) Pisciculos non vivere posse in aqua, nisi terram admiscueris *husbandry* p. 7.

(m) *Phil. trans.* 253. Aquam nullam puram esse, & ex ea terra, quæ in aqua sit, plantas ali.

(n) *Chymiste physicien* Paris 1704. 12.

terræ portionem, quam possis credere in aqua latuisse (o), & cujus nuper mensuras dedimus, grani in libra unius, etiam decem. Aquæ sibi relictæ & putrescentis phænomena (p) nimis manifesto ostendunt, posse ex ea sola, vitreis in vasis inclusa, magnam vim viscidæ, inflammabilis, & terræ naturæ nasci. Sed id omne est, quod ab aqua expectamus, quando dicimus, ea stirpes, aut animalia ali posse. De metallis non adfirmavero.

§. XX. *Aqua est potus naturalis.*

Hæc, quam descripsimus, aqua, omnibus plantis & animalibus terrestribus a NATURA pro potu destinata est: Novem decimæ partes hominum etiam nunc ea sola contenti vivunt, per Americam universam, vastamque Africam, Asiamque Mahometanam, aut Benjanicam, perque ipsam meridionalem Europam, cujus & plebs, numerum in quaque gente pene sola affectura, & in universum feminæ alium potum ignorant.

Vel a sola ratione vincitur, esse saluberrimam (a), quæ sit a natura data. Accedit, quod omni alicujus momenti sale pura, æqua vi omnis generis corpora dissolvat, neque ut acida faciunt, cogat pingua, sanguinemve, & lympham; aut ad terrea imbellis sit, ut sunt sales lixiviosi. Sola sales omnes debilitat diluendo (b), ut etiam sublimati mercurii horridas vires mitiget. Sola viscorem resolvit, & sanguinem fluidum servat. Sola etiam elementum sanguini, corporique toti adfert, ex quo præcipue, aut unice struimur: cum potus illi medicati, a populis borealibus, aut a ditioribus, in usum recepti, particulis acidis, & inflammabilibus abundant, quas necesse sit separari & deponi, nisi continuo sanguinis miscellam corrumpi, & fibrarum naturam irritabilem velis obtundi. Quare abstemii melius appetunt (c), gustu, olfactu, oculis valent, etiam memoria

(o) Vi deo quam parva sit. p. 229. 230.

(p) Apud ELLERUM descriptæ l. c.

(a) VIEILLARD *Thes. Par.* 1739. Ergo aqua potus saluberrimus. HJARNE *förste bok* a principio: HANCOCK: CHEYNE *infirm. sanit. tuend* p. 62. Recte SMITH & FOYER & HOFMANN *aqu. med. univ.* n. 19. ubi vires, quæ medicatis aquis tribuuntur, potissimum ad aquæ elementum pertinere monent.

(b) In sanguine sanguinis utiliter potæ BRUNNER *gland. duod. fin.*

(c) Duplo CHEYNE *infirm. valet.* p. 74. Aqua edax HIPF.

moria (d). Aquæ puræ, quæ ab anno ætatis 18. sola utor, tribuo; quod post tot in fulgido sole susceptos microscopicos labores omnibus sensibus, & oculis potissimum, non minus valeam, quam puer valui.

Eam vero ipsam aquam bibere oportet, si bona est, quam natura dedit, perinde crudam, & frigentem. Ea enim & gratior est linguæ, & sitim magis levat, & denique fibras ventriculi minus debilitat (e). Merito ergo in regionibus calidis (f) præfertur, & Hispani (g). Siculi (h). Melitenses, Neapolitani (i), suæ aquæ etiam artificiale nivis frigus salubriter addunt; & aquæ frigidaæ usu nupero febrium malignarum vehementiam remisisse (k), testimonia existant. Sed etiam in febribus acutis (l) causo (m), synocho (n), febre erysipelacea (o), in cholera (p), mania (q), utiliter propinatur: tum in hæmoptysi (r), phthisi (s) & olim & nuper utiliter data est. Mihi quidem, toties febrienti, aquæ puræ nunquam fuit desiderium. Poscit natura adjecti ad aquam acidi quid, quod resistat putredini.

Non ignoro mîla, quæ facit subito suo frigore (t), quando in æstuans corpus ingurgitatur, etiam in bestiis (u). Supervenerunt inde pleu-

(d) Qui triginta annis abstemius fuerat, is cum ad vini usum rediret, multum de memoriæ excellentia amisit SCHULZE de gran kerm. p. 23.

(e) ROBINSON *Ess. anim. æcon* II. p. 356.

(f) ZOD. GALL. T. IV. April.

(g) Le CAAN de medic. milit. hisp. p. 7. VALISNER. Oper. T. II. p. 468.

(h) PISANELLI p. 156.

(i) ADDISON *Journy to Italy* p. 145.

(k) PISANELLI p. 156. NONNUS p. 344. MAPPUS de potu calido.

(l) VALISNER. T. II. p. 509. HARRIS *diff.* p. 80. CYRILL *Phil. transf.* n. 410.

(m) Casu summa sanatus aeger ZACUF *prax. med. mirab.* L. III. obs. 7. VALISNER. T. II. p. 515.

(n) RHazes *divis.* c. 149.

(o) TRALLIAN L. XII. p. 691.

(p) In ea maxima spes erat Johannis VIRIDET bon chyle p. 524.

(q) GHISI *lettere* p. 27. seqq. Ipse cum summa utilitate, sed uberrimam, cum aliquo laxante medicamine admisto, dedi maniacis. Hystericis nuper Cl. POMME.

(r) GHISI *lettere* p. 22. seqq. & in morbo a P. Anton. MICHELOTTO descripto.

(s) CHEYNE *diseas. of body and mind.* p. 109. adde ad aquæ laudes COGROSSI *saggi della med. ital.* KLOSKHOF p. 18. GHISI *lettere* p. 30. & olim GALEN. *method. med.* L. VII. AVICENN. p. 3.

(t) WOLF *diet. liter.* p. 46. VALISNERI II. p. 46. 47.

(u) VALISN. l. c. in cane MORGAN. *princip.* p. 243.

pleuritis (w), phthisis (x), febres malignæ (y), mortes subitæ (z), ex ruptis vasis (a), & gangræna mesenterii (b).

Ipse sum expertus, semel in Alpibus a frigidissima aqua punctorium in pectore dolorem, & pleuritidis primordia mihi subnasci: Semel singularem quemdam stuporem, alpicolis non ignotum, cum aliqua animi dejectione, & ad omnes sensus motusque tarditate.

Sed ea frigoris sunt flagitia, non aquæ, & perinde accidunt, quando absque potu ullo in frigidas cellas (c) nos recipimus; perinde etiam a cerevisiæ (d) & ab aceti frigore (e). Neque nocet unquam ingurgitata etiam, glacialis aqua, dum a potu corpus exercueris; solam enim per quietem sanguinem in pulmone coagulare apta fit.

Absurdum ergo est, bonam aquam coctione (f), reddere deteriore, etsi ea veterum (g) luxuria fuit: Neque unquam, etiam post coctionem, nive refrigerata gratiam suam recuperat, etsi ea NERONIS (h) fuit decocta. Videntur levissimæ, & penetrabilis maxime, atque linguæ placituræ partes continuo avolare, quando ignem senserunt.

§. XXI. *Aquæ impuræ.*

In regionibus planis in universum, & in palustribus, quales nunc ab industriis & celebribus populis habitantur, & olim, aquæ adeo malæ

(w) PETSCHEN n. 99. 100. a frigido potu explicat arteriam venamque pulmonalem faccumque venæ cavæ per latus dextrum tangente, dum per gulam descendit.

(x) In Laponibus WALLER.

(y) In CORDO FORESTUS L. I. præf. qui morienti adstitit.

(z) *As. Mar. Balth.* 1700 p. 118. L. BOURGEOIS apud BARTHOL. *de nive* p. 204. AMAT. LUSIT. L. II. cur. 62. TITSING *Cypria* p. 40. De *Delphino Gallia* FRANCISCI I. filio & de HENRICO filio JACOBI I. M. B. Regis similia leguntur.

(a) In abdomine L. BOURGEOIS.

(b) In cane MORGAN.

(c) AMAT. I. c. L. XII. p. 82.

(d) HILDAN. *Cent. III. obs.* 149.

(e) Post equitationem ADOLPHI *de equitat. usu med.* p. 424.

(f) TRALLIES *Vorsorge redlicher Mütter* p. 108. 109. HERCQUET *digest.* p. 392. PORTIUS *med. milit. valet.* p. 80.

(g) Ex Philemone POLLUX p. 1040.

(h) PLIN L. XXXI. n. 23. add. SUTTONIUM in Nerone. LANZONI *Giera de Lett.* T. XXXII. art. 13.

læ (a) sunt, adeo plenæ calce, putrilagine, & admista nonnunquam vicini maris falsugine, ut bibi omnino non possint. Nunquam potui Göttingensium aquarum potum ferre. Sed etiam valetudo ab ejusmodi aquis læditur, & dysenterias inde nasci, jam monuimus alibi, & phthisin (b), & in calidis regionibus morbos malignos (c). Ex aqua fl. *Ussolka*, quando humi pars a gelu adstricta est, reliqua quæ fluit, armenta occidit (c*).

Ea prima causa fuit decoquendæ aquæ apud Chineses (d), etiam apud Laponas (e) belgasque, & ipse decocta sum usus, atque aromatibus condita. Ita pars aliqua impurioris sedimenti subsidet, & fluida potest sola ad usum servari. Neque tamen vel eo modo putrilaginosa miscela separatur. Leidæ neque Theæ infusio ex putealibus aquis palato placet.

Ab ea tamen decoctione calidus potus ortum (f) traxisse videtur: pronum enim erat, siquidem coquebatur aqua, bibere calidam. Ita olim veteres (g) solebant, eratque ea pars deliciarum romanarum.

Potest aliquid in eo more esse gratiæ, & sitim certe æstumque non alia ratione consolamur suavius. Sed periculosæ sunt deliciæ. Aqua calida insigniter fibras debilitat, & ad decimam roboris sui partem (h) reducit; & cum etiam frigida nimio usu pene suffocet (i), & respirationem inhibeat, multo magis calida ventriculi vires & appetitum frangit (k). Frustra a BOERHAAVIO (l) mōitus, cum nocturna juventutis meæ studia Theæ usu lenirem, ita stomachi robur debilitavi, ut ejurata ea sirene, anno abinde pene quadragesimo, nondum vires ventriculi recuperaverim.

Alio

(a) HOFMAN *meth. exam. aq. salubr.* HENKEL *rediviv.* p. 134. HIPPOC. *περὶ αἰσθημάτων τοῦ ν. κ.* Jam tum vidit, facere scorbutum.

(b) K. *Svensk. Acad. Handl.* 1750. n. 3. & Belforti *Act. Helvet.* T. III. p. 209.

(c) Negapatani. Eos morbos aqua per naves advecta sustulit H. v. RHÉDEE apud HAMILTON *East Ind. Voy.* I. p. 346.

(c*) GMELIN *Reise* T. III. p. 396.

(d) HAMILTON T. II. p. 222. 223.

(e) SCHEFFER *Lapon.* p. 225. MASINI *de gelid. potus abusu* I. c. 17.

(f) Theæ apud Chineses HAMILTON I. c. Laudat VALISNERI Tom. II. p. 468.

(g) NONNUS. *Ego mihi thermopotabo gutturem* PLAUTUS: conf. ROBERG *de caldae potu*; & GEBAUERI viri summi lib. *de potu calido* & REDI T. V. p. 158.

(h) BOERHAAVE *Aphor.* n. 75. ROBINSON *Oecon.* p. 297. de capillo cujus robur a 100000. partibus redit ad 6250. conf. ARBUTHNOT *on air.* p. 61.

(i) LORRY *alim.* T. II. p. 290.

(k) ZWINGER *de thea belv.* p. 5. Ex theæ abusu tres virgines, cum siccaissent mensuram sextam, in debilitatem summam cum pallore incidunt FABER *thée histor.*

(l) Et olim HIPPOCRATE *aphor.* 16. *Sect. V. de usu liquidor.* n. 3.

Alio modo aquæ fluviales & turbidæ per lapidem porosum (*m*) mexicanum, arenam (*n*), aut spongiam (*o*), longa cum quiete (*p*) defæcantur; a terra quidem, non a putrido miasmate. Putredo ipsa dicebatur (*q*) aquas purificare, sed adparet (*r*) eam, quæ computruerat, fætidam manere, etsi limpida est, & denuo verminare conservatam.

Montanam ergo, puram frigidamque ut gustus, ita valetudo jubet bibere. Fluvialis in ejus defectu ferri potest. Nilum (*s*) bibunt Ægyptii (*s*^{*}), Sequanam Parisini (*t*), cujus aquas ajunt etiam pro medicamento a celebri medico rusticano venditas fuisse (*u*). Tiberim Romani laudant (*w*). Choaspem Persæ.

Putealem ultrino loco pono, etsi passim frigore blanditur. Dura fere semper est, inepta saponi solvendo, & coquendis leguminibus.

Lacuum, etiam ex purissimis aquis natorum aquæ, etsi pellucidæ videntur, tamen ab insolatione tepescunt, & fatuæ sunt vapidæque.

Marinas omitto, etsi bibi possunt (*x*). & a piscatoribus sæpe bibuntur, & etiam nunc in anglia ad scrophulosos tumores, ut puto, merito laudantur. Certe enim vidi, & sæpe, strumosos homines Massilia sanatos rediisse, ut etiam aeris marini adflatus thyreoideam glandulam resolvat.

Mineralibus particulis graves pariter omitto, etsi locum aquæ naturalis tenere possunt. Etiam rupicapræ Thermas Valderianas bibunt (*y*).

H h 2

§. XXII.

(*m*) VALENTINI in diff. propr. PORTIUS.

(*n*) PORT. ibid.

(*o*) AMY in propriis colis.

(*p*) HOFMAN meth. exam. aq. n. 14. aliquot dierum frigore.

(*q*) BOYLE of man's great ignorance of the usu of natural things. Philos. exp. p. 367. HALEs exper. p. 58. Philos. transf. n. 27. de aqua Thamefis; & de aqua septies putrefacta PLIN. L. XXXI. n. 21.

(*r*) Journal d'un Vaiss. aux Ind. Orient. p. 355. 356. Post quartam putredinem incorruptam esse Phil. transf. n. 27.

(*s*) MAILLET p. 19. Ex ejus usu pinguescunt.

(*s*^{*}) ALPIN. Med. Ægypt. L. IV. p. 146. Eam in nocturno aere refrigerant GALEN. Epid. VI. 4.

(*t*) Salubritatem ejus laudat CHEVALIER Thes. an. 1743. etsi insuetos vehementer purgat. Calculosas esse fluviales jam HIPPOCR. l. c. 21.

(*u*) Le Medecin de Chaudrai le FRANÇOIS reflex. T. II. p. 160.

(*w*) BRUYERINUS, magnates eam adservare.

(*x*) K. Svensk Wetensk. Acad. 1757. p. 185.

(*y*) VALISNER. T. II, p. 517.

§. XXII. *Vinum.*

Sive voluptas fuit, sive necessitas, per universum fere terrarum orbem homines potum aliquem quæsierunt, qui spiritus, ut vocant, excitaret, homini fatigato, aut dejecto, alacritatem redderet, denique inebriaret, delirium nempe breve lætumque produceret. Perantiqua est, & universo orbi communis cupido. Nam etiam in ultimo orbis angulo Kamtschatka, Russi (a) in farina membranulisque caulis sphondylii maximi, materiem detexerunt, qua exoptatum delirium sibi conciliarent.

Cæterum etiam aves (b) vinum amant, & quadrupeda ei adhiæscunt.

Græci vinum Baccho inventum tribuerunt, non valde multo Trojano bello antiquiori homini, si Semeles filius fuit; Jovisque, cujus filii & nepotes Trojam aut obsederint, aut sint tuiti (c).

Sed antiquior res est, ex sacræ scripturæ testimonio, neque nuperior diluvio (d) Noachico, nisi etiam eo est antiquior.

Succus nempe recentium & dulcium fere baccarum exprimitur, nondum inebrians, quamdiu mustum est, Idem in vasis clausis, cum aere quo totus turget, sibi permissus, sponte in motum intestinum cietur, fervet (e), calet, spirat halitum inebriantem, in quo vis dementans latere videtur (f): deinde sedimentum ponit, & limpidus idem atque acidior, potui nunc aptus, vini nomine venit. A vapore (g) vini solo vim inebriantem pendere experimenta ostendunt, in quibus cellæ halitu ex doliis male clausis repletæ, suffocant ingressos; ipsum vero vinum halitu eo amisso viribus nunc cassum & vappa est (h).

In

(a) Gmelin *flor. sibir.* T. II.

(b) Malouin *Chym. Medic.* T. I. p. 382.

(c) Add. I. ab Almeloveen *nov. antiq.* p. 83.

(d) *Genes.* c. IX. v. 20.

(e) Conf. Boerhaave *Elem. Chem.* T. II. p. 166. seq. Stahl *Fund. Chem.* T. II. p. 124. seq. Becher *Phys. subt.* L. I. Sect. V. c. 2. Hales *vegetable stat.* c. 6. Tannenberg *de ferment.* p. 20. 21.

(f) Conf. Becher *Phys. subt.* 164. Etiam aquæ minerales aliquæ suo vapore inebriant. De aquis *Altwasser Primit.* Polon. T. II. p. 253.

(g) De eo vapore L. VIII. p. 212.

(h) Stahl *Fund. Chem.* T. III. p. 91. Non sulfur esse, sed Gas Becher *Phys. subt.* p. 161.

In eo vino plurima aqua est, & acidus sal, cujus specimen est in tartaro, & oleum, in nonnullis vinis ita expeditum, ut flammam (*i*) concipiant, & dulce magma viscidumque, & demum odoratæ volatilesque particulæ, quæ sanguinem receptæ exagitant, cerebrique quietem turbant.

Vini princeps materies est in uvis vitis viniferæ: paratur tamen etiam ex aliis baccis, ex ribe acido (*k*), & olente; ex rubo idæo (*l*), & fructu ejus simili (*m*); ex pomis, celebre in Normannia, & Anglia (*n*), inque Turgovia nobilissimum (*o*); ex saccharo cum addita aqua (*p*); ex melle (*q*); ex palmarum quarundam succo (*r*), quod in tanto cæli calore celerrime perficitur; ex baccis Juniperi, in Suecia celebratum.

Sed vites tamen superant in regionibus, quæ inter 50. gradum sunt & 20: calidissimæ (*s*) enim, quæ nullas hiemis vices norunt, uvas imperfectas producant, cum baccæ baccis perpetuo aliæ succedant, neque ullum commune tempus habeant maturitatis. Ultra 50. gradum ægre maturescunt, suntque tenuia & similia aceti. Cæterum & in America California bona vina suppeditare didicit, & in Africa Caput bonæ spei. In Asia occidentali tamen primum vites videntur cultæ fuisse: indeque sensim per Europam se extendisse, trans Indum fl. nullæ.

§. XXIII. *Vini dotes.*

Omni vino commune est calefacere, vires ingenii & corporis augere, incitare pulsum, deinde adfectus animi præcipitare, inebriare, sopire, ut nimia ejus copia sumtu fuerit.

H h 3

Fibram

(*i*) Vina ad Cedram vicum PLIN. L. XIV. c. 6. De Thuringiacis vinis, alioquin parum spirituosus, STAHL *Fund. Chem.* T. II. p. 165. Add. S. PETERI *de condim. corp.* p. 20. Ad viride aeris parandum præfertur, quod melius flammam alit MALOVIN *chymie medic.* T. II. p. 29. & *Mem. de l'Acad.* 1750. p. 392.

(*k*) *Phil. transf.* n. 124. PAPIN. *digest.* p. 80.

(*l*) MAGNUS NORDENBERG in proprio libello.

(*m*) *Voy. a la Mer du Sud.* p. 297. 298.

(*n*) Gracilibus salubrius POISSONNIER *Tbes. Par.* 1743.

(*o*) EVERLYN *Pomona* p. 61.

(*p*) BECCHER *Physic. subterr.* p. 168.

(*q*) Poloniae familiare. Mire placebat JOHANNI MESUE p. 135. b.

(*r*) ADANSON *relat.* p. 110.

(*s*) In Mexico non maturescit uva J. a COSTA *hist. natur.* L. III. c. 22. neque in insulis antillis, sed in mitiori Peruvia.

Fibram animalemodico usu confirmat (a), majori hebetat & debilitat. Quo plus continuerit effervescentis vaporis, eo inebriat celerius, ut vina a 45. gradu ad 35. nascentia. Eadem minus dant spiritus vinosi (b). Quo plus habet acidi humoris, eo minus calefacit, minus inebriat, & majori copia bibi potest, & per urinam facilius transit. Ita vina circa 50. acidissima nascuntur, mosellana, rhenana, quorum acorem sola ætas frangit.

Quo plus olei dulcisque magmatis vinum habet, eo minus per urinas sudoremve excernitur, & diuturniorem edit effectum, cæterum minus inebriat. Vina hispanica & malvatica helveticis minus in eo effecta valent, cum, cocta, multum sui vaporis amiserint (c). Num aliud vinum minori dosi rationem vincat, pedesque debilitet vino octodurensi, ego quidem ignoro, cujus sapor non multum sit infra spiritum vini igneus: & cujus dimidium nemo ferat ejus, quod in reliqua Helvetia etiam generosum crescit.

Omne vinum medicamentum est, non potus. Acidum cum sit, in vappam in ventriculo degenerat. Carnes, adipem, fructus horæos, non solvit, ut pene cogat & conservet. Sitim multo minus solatur, nocetque febrientibus, ut non alia ratione funerum major numerus nascatur, quam ex infano more, quo ægris febrientibus, tamquam optima quæque optaturi, rustici vinum rubrum propinant. Ad calculum generandum dicitur plurimum conferre: ut CYPRIANUS adfirmet, inter 1400. homines, quibus calculum extraxerit, Oenopotas se multos, cerevisia potos nullos vidisse (d). Et ego in urbe non divite, cum cadaveribus pauperum cerevisia utentium abunde theatrum anatomicum instrueretur, vix bis in trecentis & quinquaginta cadaveribus calculos renales aut vesicales vidi. Accusatur etiam ob arthritidem podagramque (e). Ei Julius PALMARIUS, & RONDELETIUS, tot alii, ob valetudinis curam coacti fuerunt renuntiare (f). Falsum tamen videtur (g) parcere podagram

(a) ROBINSON *Ess.* p. 314.

(b) LEMERY *cours de Chym.* P. II. c. 20.

(c) STAHL *Fund. Chem.* III. p. 51. In Campania LABAT *voy. d'Ital.* IV. p. 32. in Sicilia ibid. T. V. p. 151.

(d) SLARE *of Sugar.* p. 13.

(e) Ideo Burdigalæ podagrici abundant SAPORTA *de tumore* p. 474.

(f) PATIN *valet tuend.* p. 404.

(g) Sanati podagrici, qui vino renunciarunt Alex. BENEDICT L. XXIX. *proten.* aut ad paupertatem redacti necessarie eo abstinuerunt.

dagram abstemiis, & convalescere, qui vini usui renuntiant. Ego quidem a quadraginta pene annis abstemius, tamen quatuor, aut quinque longos podagræ paroxysmos non effugi.

Magis nocet in regionibus calidis (*b*), in juvenibus robustis, & æstate, minus hieme, in regionibus frigidis, in senio. Modica copia sumtum cardiaci medicamenti loco est.

Acida & immatura vina fibras intestinorum callosas reddunt, motum peristalticum ita destruunt, ut inde colica pictonum sequatur (*i*).

§. XXIV. *Cerevisia.*

Cum homines se per novum orbem diffunderent, in regiones delati, viti generandæ parum idoneas, aliquid quæsierunt, quod desiderium ejus humoris leniret. In Ægypto adeo, bonis aquis præter Nilum pene destituta (*a*), primum inventum est, farinosis seminibus, cum aqua decoctis, & simili fere fermentationi expositis, qualis vinum gignit, *cerevisiam* (*b*) parare. Id artificium in ultimum orientem (*c*), pariter ad vitem alendam ineptum, penetravit, adque Sinas & Japonenses.

Sed etiam in America ex granis Mayz (*d*) manducatis (*e*), & fermentationi permissis, vel ex cassavæ farinosa radice (*f*), aut ex patatas (*g*), *cerevisiæ* genus paratur, & Hottentotti radice suæ regioni propria ad potum fermentantem faciendum utuntur, perinde inebriantem (*g**).

Celtæ

(*b*) Non bibi potest in Brasilia vinum ZUCCHELLI p. 80. Equus Barbaricus periit, cum vino ad cursum incitaretur, TOZZI *sex reb. non natur.* p. 235.

(*i*) ASTRUC *tract. pathol.* p. 100. HUXHAM.

(*a*) Quod aqua marcotici lacus falsa uti non possent.

(*b*) Zythum ibi vocari THEOPHRAST *caus. plant.* L. VI. c. 15. Habet PLIN. L. XIV. fin & L. XXII. n. 82. conf. DALECH. ad L. XXII. *cap ult.* Bouzah modernis dicitur SHAW *travels. through Egypt.* p. 407. Osiridis inventum est DIODOR L. I. p. 17. aut BACCHI Id. L. III. c. 73.

(*c*) Tarasu Sinarum ISB. IDES p. 141. *Lettr. cur.* L. XI. p. 251. Mentionem ejus facit RHazes ad manfor L. III. c. 6. Ex oryza manducata Formosani vinum faciunt Voy. de Rechteren p. 214. Datum olim elephantis bellatoribus ÆLIAN L. XIII. c. 8.

(*d*) DAVIS *exped.* p. 468. BENZO *Amer* IV. p. 135. WAFER *of the isthmus* p. 154. a COSTA *Hist. Nat Ind.* IV. c. 16 Brasilienses STADE in T. de BRY *Amer. P.* II. c. 15.

(*e*) A vetulis DAVIS. WARREN, WAFER, LIGON. Aipi MONTANI *Amer.* p. 365. A puellis THEVET *Antart.* p. 46. in Brasilia.

(*f*) Circa Surinam WARREN *of surinam* p. c. 3. In Barbados LIGON p. 32. In insulis Caribanis, *Relat. des Caraib.* p. 23.

(*g*) Mabey. LAFITEAU *mœurs des Sauvages* II. p. 117.

(*g**) La CAILLE *Journ. hist.* p. 133.

Celtæ (*b*) frumentis & hordeo potissimum eo fine usi sunt, ipsique Thraces (*i*), deinde Illyrici (*k*), inde Galli (*l*), ante vites; fatas, quas ad PROBI Imp usque tempora ignoraverint, & Hispani (*m*), denique Germani (*n*), Belgæ, Angli, Sueci, Dani, quibus omnibus vites nullæ succrescunt.

Longo vero usu simplicitatem veteris Zythi varie emendare didicerunt.

Hordeum in cumulos conjectum permittunt leni fermentationi, ut vehementer incalescat, & germinet. Tunc divulsis acervis in loco aeri perflabili, aut in craticula ficcant. Eam *Maltham* aquæ infundunt, deinde cum ea coquunt; addito amaro aliquo medicamento, quoties volunt eum potum ætatem ferre, ut lupulo, dauco cretico, gale, L. pulmonario (*n*^{*}). Etiam bilem, puto minus bene, admiscent. Ejus amaroris virtus est, nimiam acedinem inhibere.

Coctam cum frumento aquam nunc exponunt (*o*) fermentationi. Ita vaporem emittit, similem ut vinum (*p*); & facem ponit & demum depuratur liquor, inque subacidam naturam mutatur.

Minus quidem, quam vinum, calefacit, æstivo potui aptior; cæterum pariter in acetum abire paratus, & spiritum (*q*) daturus, parciolem (*r*) tamen, ut omnino a gelu sapor cerevisiæ prius destruat, quam in vino; etsi neque vinum fortiori frigori resistit (*s*). Inebriat suo vapore (*t*), tum pota, sed lentiori & durabili delirio: Vino generoso æquiparabat (*u*) BOERHAAVIUS, ita

(*b*) CURMI ATHENÆUS ex POSSIDONIO.

(*i*) ATHENÆUS.

(*k*) Ex milio Pæones; ex hordeo vel tritico Illyrici REINES var. p. 484.

(*l*) Ex fruge madida. PLIN. & L. 18. 22. DIODOR L. V. c. 26. In eum spurium Bacchum exstat JULIANI Cæs. epigramma Conf. MEIBOM. c. 12.

(*m*) PLINIUS.

(*n*) Jam Taciti ævo de morib. German.

(*n*^{*}) GMELIN Reisen T. III. p. 427.

(*o*) G. V. SWIETEN Comm. T. I. p. 105. Leipz. Saml. T. I. BOERHAAVE Elem. Chem. T. II. proc. 42. p. 174. seq. proc. 43. p. 192 seqq. BEHRENS diat. p. 321. Paulo aliter mumma paratur, quæ secundo calefit BRUKMAN Ep. 52. Chineses oryzam immaturam in aqua per 20. & 30 dies infundunt, tum coquunt & fermentationi permittunt.

(*p*) Ex Gofa tamen fl. parata flammam alit BRUKMANN Epist. 38. Negat NEUMANN p. 755. 756.

(*q*) BOERHAAVE. T. II. prae. 45.

(*r*) Cerevisia ad $\frac{1}{80}$. per frigus coacta in spiritum abit BAYNARD p. 332. Destillando ad $\frac{1}{11}$. reduxit BESENECKER cerevis. austr.

(*s*) Voyag au Nord. p. 123. 131. ubi de canariensi quidem vino sermo est.

(*t*) NEUMAN.

(*u*) p. 192.

ita adfuetus, quem etiam vidi vina illa fatua dulcia, quæ Gallica vocant, & bibere & amicis propinare. In vitifera regione nati aliter sentiunt.

Habet id commodum cerevisia, quod diminuta sola copia hordei, & aquæ momento aucto, debilissima fieri possit; qualis ex pane Quasf, Russorum potus, & Bouillon (w) Picardorum est, ex furfure cum aqua fermentato, & posca Bellonii (x), & debilis cerevisia Cofent, quæ in morbis acutis ob vim farinosam levem, & acidam indolem, potest pro potu admitti, celebris ex SYDENHAMII laudibus.

Quæ ex lupulo amarorem concepit (y), creditur calculo & podagræ resistere, certe nonnullis in urbibus cocta (z): & si meraca fuerit, habetur pro cibo pene potuque vehementer, & constantius, analeptico, quam quidem vinum, a BOERHAAVIO, aque TRONCHINO eo fine commendata. Eadem adeo stabiliter est mista, ut absque jactura aut virium, aut gratiæ, iter in utramvis Indiam perferat (a).

Accusant, qui non adfueti sunt, aeris in viscore inclusi copiam; in nonnullis *albis* belgarum cerevisiis manifestissimam; hinc ortos dolores collicos (b), diarrhoeas, dysenterias (c), choleras.

Etiam bona cerevisia potius artificiosis quam naturalibus potus generibus accenseri debet (d). Nam in ventriculo acescit, & vappescit, ut vinum.

XXV. Acetum.

Et ex vino, & ex cerevisia (a), iterato per fermentum acidum (b) excitato fervore, dissoluto, & remisto in ipsum liquorem tartaro, sive acida crusta doliis

(w) PATIN. *valet. tuend.* p. 403.

(x) Ex farina in aquam coniecta, cum qua absque igne ebullit *obs.* p. 347.

(y) Catalogus cerevisiarum Germaniæ exstat apud BEHRENS p. 331.

(z) Königsliutteræ nulli ex eo genere morbi sunt BRUKMAN.

(a) *Phil. transf.* n. 27. BEHRENS *diatet.* p. 333

(b) Mors a cerevisia fermentante, colo per diaphragmatis foramen vitio natum in pectus protruso S. ANDRÉ *Phil. transf.* n. 351.

(c) BOERHAAV. *Præl.* T. I. p. 138.

(d) HOFMANN *med. syst.* I. p. 549.

(a) LEMERY *Cours de Chym.* P. II. c. 21.

(b) Uvarum petiolis *Phil. transf.* n. 61.

(c) LEMERY. Etiam in cerevisia LISTER *de brun.* p. 127.

doliis vino plenis adhærente (c) generatur acetum, liquor manifestius acidus, neque inebrians, non absque omni tamen oleo, sanguinem refrigerans, non cogens, sed nigro tristisque colore foedaturus, sæpe vivis anguillulis plenus. Etiam ex palmarum (d) succo, & ex melle & saccharo acetum fit, & ex cerevisia, sed ex ista quidem debilius, & in univ-
sum ex generoso vino (e) acetum nascitur nobilius.

Olim frequentius quam nuper inter potulenta recipiebatur, aquæ mistum, *poscæ* nomine, qui militaris Romanorum (f) potus fuit, & siti fallendæ aptus certe, & vitandis in calidis regionibus morbis acutis, qui mihi Romanis in remotissimis & fervidissimis regionibus militantibus minus, quam nostris, videntur funesti incubuisse.

Putredini adversum, carnes conservat; ad scorbutum utile nautarum præsidium (g). In acutis equidem morbis (h) & olim (i), & nunc, sæpe etiam enormi copia (k) feliciter adhibitum est, neque alteri remedio plus tribuebat in dysenteria HARTMANNUS v. der HEYDE.

Ego aliquoties expertus, nescio quare non perinde utile reperi, ut limonum succus in leviori malo est, & in graviori spiritus sulfuris. Nescio an latens in aceto putredo fraudi fuerit. Cardiaci tamen quid habet & stimulantis. Servi ad remos damnati propinata posca refocillantur (l).

Meracus acor aceti a ventriculo male fertur. Vidi, cum ad obesitatem solvendam sumeretur, ventriculum in uncialem crassitiem intumuisse, in numerosas laminas fictam. Vidit ab ejus usu morbum hecticum J VIRIDET (m), & C. J. LANGIUS ab aceti usu ob varia mala coactus est, desistere (n). Ex atramento, cujus non remota ab aceto natura

(d) ADANSON p. 110.

(e) *Phil. transf.* l. c.

(f) ROLLIN *hist. ancienne* T. XI. P. I. apud SPARTIANUM PESCENNII NIGRI editum exstat, quo milites jubentur, sua posca contenti esse.

(g) HUXHAM *fev.* p. 261.

(h) DEGENER *Bresl. Samlung. Supplem.* III. p. 238. In petechiis KRAMER *Comm. nov.* 1733. n. 32.

(i) MESUR multis syrupis admiscet de syrup. L. I.

(k) Lagenæ BORRHAAVE *Bresl. Saml. Supplem.* III. p. 240. Quatuor pintarum in ardente febre DEGENER *dysent.* Edit. nov. p. 310.

(l) Van der GRÖBEN *Orient. Reisebeschreib.* p. 39.

(m) *Des Vapeurs* II. c. 5.

(n) *Oper.* T. II. p. 68.

tura est, tumores cutanei in orificio oesophagi nati, & caseosa in glandulis mesenterii materies coacta est (o).

Adfine aceti est serum lactis acidum, princeps Islandorum (p) potus, in tanta pūtrilagine reliqui victus perutilis. Diximus alios (q) solo lacte, ejusve fero utiliter vitam traxisse, etiam per quinquaginta annos (r).

§. XXVI. *Spiritus vini.*

Dubites num hoc, sive medicamentum, sive venenum, inter potus species oporteat referre. Neque tamen penitus id silentio præterire jubet frequentior, quam unquam fuerat, ejus ardentis aquæ usus: qui in septentrione, Russia, Suecia, Dania, Germania septentrionali, Belgio & Anglia apud plebem fere in familiarem & quotidianum potum evasit, & ab Europæis in universum orbem circumlatus, & Nigritarum, & Americanorum septentrionalium furor est. Sed etiam Sinenfes suum Arak per Indiam ultra Gangem vendunt. Neque Helvetia increbescentem aquæ cerasorum potestatem effugit, neque gallicus miles absque spiritu vini ad pugnas dimittitur. Septentrionem tamen hæc cupido magis occupavit, in regionibus vini feracibus rarior.

Est autem spiritus vini, meracior pars vini, & ad volatilem naturam paratior, quæ subiecto igne per longos, & refrigeratos tubos stillat. Paratur ex vino, ex cerevisia, ex frumento fermentante, ex omni materia, quæ vinum dat, & cerevisiam, dum ab interno motu ferveat, ex ipso demum lacte, certe equino (a). Alcohol est minera plumbi (b), qua oculos pingunt. Nescio an a vi vocis perfectionem sonante ad hoc Arabum inventum nomen translatum sit.

Aqua (c) est, occulto acore (d), & plurimo phlogisto ebria, quod oleo vitrioli admisto de aqua secedit (d*). Adeo plena est natura inflammabili, ut ignem admissum tota cum flamma capiat, & abs-

I i 2

que

(o) BECK palpit. cord.

(p) HÖRREBOW p. 156.

(q) p. 198. Tartari Recueil. d'obs. curieuses. p. 141.

(r) Edimb. Ess. T. V. P. 2. n. 44.

(a) GMELIN Comm. Lit. Nov. 1732. hebdom. 21. &c.

(b) SHAW trav. p. 294.

(c) BOYLE Chym. scept. P. II.

(d) Nam cum cinere clavellato non fervet, HENKEL Bergsucht p. 49.

(d*) HOFMAN de acido vitrioli vincto.

que residuo deflagret, quoties meracius alcohol paratum est. In ea aqua vapor inebrians plurimus est, ut & minori quam vinum dosi temulentiam faciat, & vehementiorem, & facilius funestam. Ipse tristem casum vidi vigilis, cui studiosi funestissimæ voluptatis copiam fecerant ad arbitrium: is inter bibendum, & dum gratias agebat tantæ liberalitati, miserrime expiravit (e). Ostendetur alias, in ipso ventriculo sponte in flammam erupisse.

Vehementissime calefacit; & sanguinem in cerebrum congregat. Brevem adeo alacritatem excitat, quam sopor & miserrimus corporis animique status sequitur.

Fibras animales ventriculi, intestinorum, demum omnes, ad contractionem incitat; & arctat, etiam experimento teste, ventriculum (f), & pylorum (g). Sed una fibras callosas reddit, & fragiles (h), & ad omnem porro stimulum surdas (i), etiam ad famem (k). Vasa omnia angustat. Bronchi inde ad tertiam partem angustiores (l) facti. Humores omnes (m) cogit præter aqueos, & injectus in venas animal enecat (n). Quare ab ejus usu tendines (o) osseos, & arterias osseas (p), & osseas crustas in pleuræ cellulosa tela (q) natas legimus. Ventriculus ab ejus abusu in crassitiem carnosam vertitur (r), ut perangustus (s) tubus liber supersit. Fæces alvinæ pene lapideæ in coli cellulis colliguntur

(e) Supra duo cochlearia potus Usquebaugh Baul, ex hordeo in insula Lewis parati, bibere mors est MARTIN *Western Island*. p. 3. Mors intra duas horas, post singultum: a potu quarta aquæ vitæ vulgaris in Anglicis novis. Mors a nimio spiritu vini OLEAR. *It. Pers.* p. 426. Mors subita in catella a frumenti spiritu SCHLICHTING l. c.

(f) In PESQUETO, celebri anatomico.

(g) SCHLICHTING ad VERBRUGGE p. 47. 48.

(h) In capillis experimentum fecit HALE *Ventilat.* II. p. 196. Add. ROBINSON *Ess.* p. 311.

(i) BOERHAAV. *Chem.* II. p. 200.

(k) BEHBENS *dietet.* p. 394.

(l) *Medic. Exper.* p. 336.

(m) L. V. p. 82.

(n) L. III. p. 129.

(o) KULMUS *tend. achill rupt.*

(p) Ibid. PICOT. *Ergo aq. vit. aq. mort.* Paris. 1729.

(q) ETMULLER *progr. ad diss.* SCHUSTER DAUBENTON *bist. gener. & particul.* III. p. 163.

(r) HOFMAN ad POTERIUM p. 46. LOESKE *obs.* p. 36.

(s) SCHACHER *mater. offis.*

guntur (*t*), & scirrhi per universa viscera glandulasque regnant (*u*). Gangraenam alias in duodeno fecit (*w*). Conjuncta vi coagulante humores & fibras constringente inflammatur idem ventriculus (*x*), intestina (*y*), etiam in mesenterio abscessus facit (*z*).

Sed demum in genus nervosum malum transit, & tremores, paralyfes convulsiones ex eo abusu sequuntur (*a*).

Etiam bruta animalia partim in rabiem agit (*b*), pariori vero & diuturno usu in cane asthma fecit (*c*): in alio rachitidem staturamque infra legem sui generis depressit (*d*) quo scopo vulgo Bononiæ ajunt adhiberi, ut catellos nanos vendere possint. Sed etiam subito feles enecat (*e*).

Sæpe Göttingæ effectum perniciosæ consuetudinis observavi. Rauci fiunt homines, & peculiari asthma, plerumque funesto, laborant. Manus tremunt, corpusque languet, quamprimum vis præsentis veneni nervos non suscitatur. Ad omnia monita surdi coguntur novo igne se de stupore suo (*f*) excitare.

In anglia viri boni publici amantes a multo spiritus frumenti vulgaris usu ipsam illam maximam orbis Metropolin quasi lento morbo tabescere, & baptismos annuos a 20000. ad 14000. reduci non sine dolore moment. Quare salutari consilio, legibus saluberrimis, pretium veneni auctum est, jubente GEORGIO II. qui & Hanoveræ ejus usum frenare paterno animo tentavit. In Anglia certe, postquam paulum de suo furore plebs remisit, ipsi mores, & valetudo civium in melius revertuntur.

I i 3

Volunt

(*t*) *Hist. de l'Acad.* 1706. n. 5. BEHRENS l. c. p. 394. l. c.

(*u*) *Hist. de l'Acad.* 1704 p. 23. 24. BEHRENS.

(*w*) ALBERTI *Jurisprud. Med. Leg.* T. VI. p. 715.

(*x*) HENRICI *absces. mesent.*

(*y*) *Ibid.*

(*z*) *Ibid.*

(*a*) BOERHAAV. *morb. nervor.* p. 195.

(*b*) De fele PICOTE l. c.

(*c*) BIRCH T. III. p. 17.

(*d*) BIRCH.

(*e*) HOFMAN *Med. system.* T. II. p. 184.

(*f*) Hinc qui vel vini spiritum, vel cerasorum destillatum liquorem, quo erant abusi, subito obstinato animo deferunt, sæpe pereunt PLEMP. *valet. togator* p. 76. de BAUDIO. Vidi tamen post diuturnum vitium subitam reformationem nulli fraupi fuisse præfecto, bene mihi noto.

Volunt equidem, in calidis regionibus, intus hominem frigere, & potus requirere calidissimos (g). Sed absque ejusmodi potabili igne aborigines insularum antillarum vixerunt, suosque coxerunt cibos.

Misera ergo fuit PÆCQUETI (h) fors, qui solo spiritu vini, tamquam quodam virium vegetabilium compendio, vitam alere adgressus est.

Cibos ipsos spiritus vini hætenus potest credi coquere, quod aliquamdiu, in sano homine, ventriculi motum incitat, ejusque caveam arctat, ita aeris expansionem coercet, quam dicimus *flatus*. Cæterum omnes cibos indurat, cogitve, carnes & fructus contra omnem mutationem munit, lympham, jus carniū, lac coagulat, nullumque cibum resolvit, magnum incisorum in conservandis a putredine visceribus adminiculum. Merito adeo *Johannes Locke* (i) hominem male ad spirituosos potus adfuetum ad aquæ usum reduxit, & sapienti consilio sanavit.

Potus diæteticos, theam, virium ventriculi inimicam (k), canveam, amaram oleoque (l) prægnantem minus hostili, chocolatam, plenam expresso oleo & nonnunquam ab adjectis aromatibus calidam; *limonatam aquam*, refrigerantem & acidam: emulsiones per æstivos calores gratas, ventriculo ob oleum suum noxias: *punch Anglorum* (m) in quo vis spiritus ardentis ab acidis & ab aqua frangitur: tot alia ingeniosæ voluptatis inventa brevitatis in longo opere necessaria vetat persequi.

§. XXVII. *Mensura cibi & potus.*

Multa lego de ciborum salubritate, aut vicissim de eorum ad lædendam valetudinem potentia. Videor tamen dudum adnotasse, & in me ipso potissimum, & in aliis, plus justam mensuram ad integritatem vitæ, & ad cibi salubrem coctionem facere, quam ipsum selectum: & etiam deteriores cibos facile subigi, dum exigua eorum copia sit. Ita interpretor miram

(g) *LISON. barbad.* p. 102.

(h) *BOERHAAV. prax. med.* I. p. 54. Etiam *DIPPELI* delirium fuit, hominem intra paucas septimanas calido spiritu saginare *Nov. Act. Erud. Suppl.* T. IV.

(i) In *HARTSOEKER suite des conject.*

(k) p. 242.

(l) *WAINWRIGHT of drink* p. 215. Duplum olei habet si cum tritico comparaveris.

(m) Ex ejus abusu colica pictonum insulis sacchariferis endemia *CHEYNE inf. sanit. præd.* p. 83.

miram illam, alias a nobis enarratam corii, aliorumque durissimorum coctu alimentorum, in conservanda vita demonstratam potestatem (a).

Omitto nunc vastos nescio quorum hominum ventriculos, qui ad P R O C U L I & M A X I M I N I modum viginti (b) & ultra cibi libros uno prandio in ventriculum infererunt.

Sano homini cibi potusque summa mensura, & ad quam plerique periculose se dimitterent, ad sanctorianas illas octo libras adfurgit (c).

Proxima portio fuit G. R Y E, qui septem libras unciasque quatuor (d): aut septem (e); & alias septem libras (f), aut quinque libras cum uncis octo (g) in diem absumsit. Deinde æstiva die libras 6. cum dimidia (h) hiberna quatuor (i) L. & quatuor cum semisse.

Cl. H O M E quatuor libras cum uncis tribus (k) numerat: quod fere C A R O L I II. prandium fuit, cujus corpus post pastum quatuor librarum cum semisse pondere augebatur (l). Eædem quatuor L. cum dimidia a G. C H E Y N E admittuntur (m).

Potest autem multo parciori victu vita tolerari: Lactis in diem libra, tres (n) feminæ, a nivis ruina obrutæ, per 37. dies vitam sustentarunt, additque egregius medicus regius, duodecim in diem uncis lactis, cum aquæ hordei tribus libris, se certos homines aliquot mensibus aluisse (o).

Celebris ille A L O Y S I U S C O R N A R O (p) viginti & sex uncis panis, ovorum, & farinosi cibi [minestra] vitam per plurimos annos produxit, neque absque labore, qui & in republica gerenda versaretur, & subinde ad agros metiendos, & designandas fossas se pateretur adhiberi.

Video

(a) p. 182.

(b) Acadenses Sylvicolæ DIERREVILLE p. 155. conf. p. 123.

(c) *De alim.* L. II. p. 35.

(d) p. 254.

(e) p. 260.

(f) p. 256.

(g) p. 204.

(h) p. 285.

(i) Ibid.

(k) *Med. facts.* p. 343.

(l) BIRCH T. I. p. 393.

(m) *Sanit. infirm.* p. 95. 96.

(n) SOMIS *raggionament* p. 123.

(o) p. 124.

(p) *Della vita sobria* p. 13.



Video equidem a multis strictius vitæ genus rejici (*q*). Certus sum tamen, propria per experimenta, hominem cum parco cibo, parce omnino carnoso, recte dormire, ad labores ingenii valere, bene appetere, vitæque muniis sufficere. Is idem CORNARUS, cum quadragesimo anno jam decrepitus sibi videretur, hac ipsa severissima diæta sanitatem integerrimam & seculare senium adquisivit: idemque, cum semel duas uncias suo cibo addidisset, suæ licentiæ graves poenas dedit, inque gravissimum morbum incidit. B. ROBINSON (*r*) paralylin superavit, & ad rectam valetudinem rediit, potu tertia, cibo sexta parte diminuto. Salubritatem stipendiariorum Egranorum, quos Austriaci obsidebant, parcitati alimentorum castrensis medicus de MEISERY acceptam retulit.

Id intelligo, qui magnos corporis labores tolerare voluerit, aut pinguescere, ei plus deberi cibi. Avibus, quæ saginantur, quarta parte annonam augere (*s*) oportet. Video etiam, juventuti plus deberi alimoniam, senio minus. Animalia pleraque homine voraciora sunt. Eruçæ dantur & insecta, quæ intra unicum diem duplum sui ponderis devorant (*t*). Vacca (*u*) vorat in diem L. 45. sextam vel octavam partem sui ponderis: Homo quadragesimam. Nempe herbæ minus alunt.

§. XXVIII. Potus mensura seorsim considerata.

Magis in cibo, minus in potu peccatur, cujus major portio possit quasi infundi, quia ventriculo non retinetur.

Omitto helluones illos veteris ævi (*a*), aut 17. mensuras vini rhemani bibentem hominem (*b*), aut cerevisiæ bibacem feminam (*c*) quæ 20. L. in dies, jam 95. annos nata siccaverit. Sed certe absque ullo malo 200. (*d*) & 350, (*e*) uncias, & L. 25. [puto quadringentas uncias

(*q*) PRIMIOS *vulg. error.* L. III. c. 3. CRESUS.

(*r*) *Food and discharg* p. 61.

(*s*) REAUMUR *art. de faire eclorre &c.* T. II. p. 415.

(*t*) *Hist. Nat. des Anim.* T. I. p. 304.

(*u*) BOERHAAV *Prax.* I. p. 171.

(*a*) Mensurarum 4. f. pintarum 18 f. unciarum 288. vini in una coena potarum meminit PLUTARCHUS de ALEXANDRO.

(*b*) FISCHER *morbi senil.* p. 66.

(*c*) LOTICH *obs.* L. IV. C. c. obs. 2.

(*d*) Thermalium QUADRIO *acque di trascorio* p. 68.

(*e*) Spadanarum HENR. ab HEERS. p. 115.

uncias] aquarum mineralium aliqui bibunt (f). Alii, intra bihorium decem menfuras, librasve 20. (g) cerevisiæ *Duckstein* sicccarunt.

Et in universum varia quidem in variis potus ad cibum ratio est, ut tamen potus constanter superet. Plurimum bibebat SANCTORIUS (h), ut ratio ad cibum esset 10. ad 3. Plurimum bibit C. LININGS, ut ratio sit ad cibum quæ 11. ad 3. Multo parcus B. ROBINSON & in ratione 5. ad 2. In ratione dupla G. CHEYNE (i), Parcius RYE (k), in ratione 4 - 3: parcissime CORNARIUS, cui potus erat unciarum 14. ad cibi uncias duodecim, quæ ratio est 7. 6.

Non ideo nimius potus, etiam saluberrimus, non nocet. Ventriculum distendendo, & diluendo relaxat, appetitum destruit (l), aliquando etiam subito in cellulosas telas transiit, fecitque cachexias & (m) hydropes. Intemperans ille Babylonius Helluo tertia ab illa cœna die periit (n).

§. XXIX. Cibi modus.

Laxissimus in eo fuit D. SALA, qui alibi quidem triginta sex uncis cibum diurnum definivit, cujus tertia pars esset carni (a): Alibi ad 50. & 60. uncias panis & similium victuum plenum extendit (b).

Triginta uncis aluntur, qui ad triremes damnati remum agitant, uncis nempe panis 26. fabarum vero 4. (c).

Georgius CHEYNE, sed in infirmis, non superat sesquilibram (d) CORNARIUS duodecim uncis sibi satis fecit (e).

Tempora

(f) SCACCHI *Bahn.* p. 390.

(g) LIEBERKUHN *vill. int.* n. 24.

(h) Conf. ROBINSON *l. c.* p. 35.

(i) *l. c.*

(k) ROBINSON.

(l) ZWINGER *de Thea Helvet.* p. 5.

(m) ZWINGER *ibid.*

(n) *Add. Journ. des Savans* 1679. n. 12. post tridui abstinensiam.

(a) *De alim.* L. II. p. 36.

(b) p. 35.

(c) *Hamburg. Magaz.* T. XXI. p. 553.

(d) *Savit. infirm.* p. 95. 96.

(e) *l. c.*

Tempora procul dubio præstat partiri, neque unico prandio vitam sustentare, ut in Anglia, inque septentrione ob negotiosam vitam solent. Præstat, inquam, partiri cibum, ut ad quemque pastum exigua sit ventriculi distentio, vires constringentes fortiores, major copia humorum humanorum (f).

Ante cibum recte jubet laborare BOERHAAVIUS (g), ut ventriculus evacuetur. Natura omnia animalia a pastu quiescere docuit.

Largius prandium esse convenit, coenam (h) parcam & excarnem: cum per somnum intestinorum & ventriculi motus peristalticus minor sit, neque ad excernenda excrementa stimulemur, & tardius appetitus redeat, viresque adeo coquentes labascant. Hujus legis necessitatem in me ipso experiendo didici, & ad amicos transtuli, quorum neminem reperi, cui non utilitati summæ fuerit.

S E C T I O LV.

P H Æ N O M E N A V I V I V E N T R I C U L I.

§. I.

ET si difficile hic est legitimum ordinem sermoni præscribere, videtur tamen incipi debere a causis, quæ ad mutandum cibum potumque in vivo homine consentiunt; deinde enarrare mutationes, quæ in cibo in ventriculum recepto vera fide accidunt: denique dispiciendum, quid ad eum effectum producendum quæque earum causarum conferat, quas descripserimus.

§. II. *Pressio diaphragmatis.*

Peritonæum, cujus historiam quidem nolumus (a) a mesenterio & ab omento separare, sacculum efficit, in quo ventriculus, cum hepate, liene & intestinis plerisque concluditur. Is saccus ita plenus est, ita compressus, ut in vivo animale, quamprimum vulnus inflixisti, intestina, he-
par

(f) ROBINSON p. 94.

(g) & PANTINUS in CELS.

(h) MACKENZIE art. of health. p. 94.

(a) L. XX.

par, ventriculus, lien, & ipsi demum renes prorumpant, summa cum vi & celeritate. Cum vulnus esset in ulceroso pyloro, in id foramen hepar tanta vi est intrusum, ut totum obturaret (*b*).

Sed etiam absque vulnere, peritonæum totum (*c*) per inspirationem extrorsum antrorsum premitur. Quando ad instrumenta ejus compressio- nis accuratius animus adtendit, adparet continuo, ea, quæ dixi viscera, erumpere per inspirationem (*d*). Magis autem hepatis pars anterior & ventriculus per vulnus urgetur, minus viscera, quæ tendineæ diaphra- gmatidis parti posteriора subjacent (*e*).

Deinde accuratius considerata in ipsum ventriculum urgente septi transversi actione, in animale, cui lobi hepatis ventriculum minus ope- riunt, vidi ipsum a septo transverso ventriculum deorsum urgeri, & una antrorsum (*f*), atque una concuti (*g*). Ea vero vis est prævalida (*h*) & cum in homine sedente, aut stante, e directo in ventriculum urgeat, tota utiliter insumitur, & una oesophagum urget & comprimit (*i*).

Ventriculum etiam a vi septi transversi urgeri adparuit, cum de læso ventriculo bovis materia pultacea ad aliquot passuum distantiam projice- retur (*k*). Cum enim ea puls subinde & per intervalla profilierit, non fuit ventriculi contractio, quæ continua sit, & absque requiete. In hu- mano vomitu potentem ejus septi vim alias dicemus (*k*^{*}).

§. III. Pressio muscutorum abdominis.

Non repeto eorum muscutorum historiam (*a*), Possis habere pro amplo cingulo, ex vertebriis orto, & anterieus peritonæo circumposito. Id cin-
K k 2 gulum

(*b*) Nov. lit. mar. balth. 1704. p. 181.

(*c*) Oper. min. T. I. p. 294. Exp. 34. ubi lege inspirationis loco expirationis.

(*d*) Oper. min. T. I. p. 293. Exp. 32. p. 294. Exp. 33. 34. p. 295. Exp. 37. p. 296. Exp. 41. 44. p. 297. Exp. 50. 51. 52. Add. obs. 15. & Elem. Physiol. L. VIII. p. 84. BRUNNER de pancr. DRELLINCOURT canicid. VII SCHWARTZ de vomitu n. 89.

(*e*) L. VIII. p. 85.

(*f*) Oper. min. p. 294. Exp. 34. Elem. Physiol. L. VIII. p. 84. 85. DRELLINCOURT canic. VII.

(*g*) Oper. min. p. 298. Exp. 54. 55. 56. Elem. Phys. L. VIII p. 85.

(*h*) HAGUENOT mém de 1713. p. 354.

(*i*) Oper. min. Exp. 56. 57. 58. 59 Elem. Phys. L. VIII. p. 87. SPROEGEL. de venen. p. 26, 28.

(*k*) WRPPER ad PRYER merycolog. p. 275. 276. & FEUILLE'S Suite du Journal. T. II. p. 30. in animale Huanaco

(*k*^{*}) SCHULZ de emes. Exp. 2.

(*a*) Elem. Phys. L. VIII. Sect. I.

gulum (*b*), dum agit, & brevius fit, omnia utique viscera abdomine contenta ad dorsum urget. Belgæ etiam artificiale cingulum ad juvandam digestionem abdomini circumponunt (*c*).

Nemo hic quidem dubitat, in vomitu tamen hæc actio etiam evidentior est. Tunc enim abdominis muscoli totum ventrem versus dorsum repellunt (*d*); hætenus septo transverso contrarii, quod eadem viscera antrorsum exprimit. Vis eadem perinsignis est, & potest hemisphæricum, quando ventriculus distentus est, abdomen in planitiem redigere, ut ejus capacitas ab 11. reducatur ad 6: potest etiam ultra ad planitiem arctare, ut excavetur.

In nixu vis septi transversi & musculorum abdominis unitur. Eo in statu abdomen secundum omnes diametros minus fit: brevius quidem a descendente diaphragmate: angustius a dextris ad sinistra, & ab anterioribus ad posteriora, ab his ipsis abdominis musculis.

Ita presso abdomine, necesse est omnia viscera eo contenta vehementissime comprimi, ut sanguinem in caput congregari videas: & quæ cava sunt in eo ventre receptacula, ea evacuari, ut de vesica, de intestinis ultimis, et de utero est notissimum. Quare & ventriculus urgetur quam vehementissime, &, pleni stomachi arcus anterior ad posteriorem adigitur: ut necesse sit, si aliquod ostium apertum fuerit, inaniri ventriculum: Clauso utroque, contenta quæcunque vehementer premi adparet. Nam vel in fetus capite in longitudinem educto, inque exitu calculorum per angustas urethræ femininæ vias, summum robur contractionis abdominalis percipimus.

§. IV. *Ventriculi vires contractiles.*

Primum ostendemus, ventriculum vi irritabili esse instructum.

Nempe ventriculus animalium calidorum, hominisque similium, canium, felium, porcorum, extas penetrabili veneno tactus, ut spiritu vini (*a*), aut nitri, aut vitrioli oleo, aut antimonii butyro, in ea sede, quæ tangitur, contrahitur (*b*), sulcusque profundus nascitur, &
rugæ

(*b*) Ibid. p. 70.

(*c*) ADOLPHI *vincul. Chirurg.* p. 25.

(*d*) SCHWARZE n. II. SCHULZE *de emesi* Exp. 2.

(*a*) SPROEGEL Exp. 26. p. 44. Exp. nostr. *de part. irrit.* n. 320.

(*b*) Exp. 327. BRUNING *de singultu* Exp. 7.

rugæ (c), cibusque aliquando propellitur, ut a fede contracta fugiat (d). Minus tamen quam intestina ventriculus irritabilis est (e), hinc emetica fortiora necesse est purgantibus. A morte etiam majores ejus motus sunt (f), ut de intestinis novimus.

Deinde, cum quiesceret, nam plerumque in vivo animale quiescit, irritatus scalpello, aut radente acu, constringitur idem (g), inque motum ciatur, qualem modo describemus, ut cibum propellat (h). Etiam a morte similia fiunt (i), ut aliis etiam ab irritatione locis constringatur (k).

Demum in vivis animalibus minime rarum est, ita arctari aut œsophagum (l), aut pylorum (m), ut nihil omnino de ventriculo effluere queat. Ea contractio etiam a morte superest. Etiam resectus ventriculus nihil dimisit, cum se accurate constringeret, tum in pyloro (n), tum in œsophago (o). Idem in alio stomachi vulnere visum (p).

Ostendimus, ventriculum per totam longitudinem contractum fuisse (q), & in vivo (r) animale, & in nuper extincto (s), & in cadavere (t), & a venenis etiam vulgo (u) ita contractum reperiri.

K k 3

Ad

(c) Exp. 330.

(d) Exp. 307. FOELIX de motu peristalt. Exp. 6. ZIMMERMAN de irritabil. p. 47.

48. CALDAN. p. 329.

(e) SPROEGEL p. 44. Exp. 323.

(f) CALDAN. p. 329. 335.

(g) Exp. 302. CALDAN. p. 329. WEPFER de cicut. p. 154.

(h) Exp. 297, 300.

(i) G. v SWIETEN T. II. p. 235. Add. CALDAN. p. 329.

(k) In femina PEYER apud WEPFER l. c. p. 287.

(l) Oper. min. Exp. 304. FOELIX Exp. 10.

(m) In cane SCHLICHTING ad VERBRUGGE p. 47. 48. in urso SCHRADER p. 16. in lepore Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs. 85. In Phoca HARTMAN de eo anim. p. 8. In cane etiam WEPFER p. 222. 250. 195. in lupo p. 162. In puero MAUCHART humbr. in duct. pancr. In ascitico homine RICHARD Epid. II. p. 149. In femina PEYER apud WEPFER p. 287.

(n) Oper. min. Exp. 297. Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs. 85. A cobaldo HILDEFIELD p. 63. a pulvere AILHAUD SCHAFONSKY convuls. partur. ad fin.

(o) In mele ARNAULD de NOBLEVILLE P. III. 243. in cane WEPFER p. 195. 177. 250. In homine ab hydrophobia enecto Journ. de med. Tom. III. n. 3.

(p) WENKER vuln. ventr.

(q) p. 122. 123.

(r) FANTON. anat. p. 162.

(s) WEPFER p. 179.

(t) In vituli ventriculo primo, & tertio CHARLETON Enquir. p. 43. In homine SCHRADER. SCHMIDT ad CÖTHEN. VALENTIN. Chir. med. p. 142. a vulnere œsophagi & astitia.

(u) HILDAN. Cent. IV. obs. 51. 79.

Ad eam vim irritabilem nervea natura aliquid confert. Nam opii usu (w) destruitur, & motus peristalticus nullus superest, plerumque certe, nam aliquando non totus deletur (x): & fatidis cibus plenus est ventriculus (x*). Operatur autem opium, dum in ventriculo continetur (y).

Sed etiam a nimia vi veneni, ut a mercurio sublimato, ut aliis in musculis ita in ventriculo, motus peristalticus deletur (z).

A ligatis nervis, ut in aliis musculis, videtur vis contractilis primo irritari, deinde destrui. Nam octavo pare ligato vomitus ex convulsione excitatus (a) est. Deinde a morte stomachus cibus plenus reperitur, & fatidissimis, ut in crasso intestino, fecibus plenus (b). Et etiam absque vomitu ab opii usu ventriculus immobilis fecibusque plenus visus (c) est.

Quare a plena morte, destructa nunc vi irritabili, aqua ventriculo injecta non expellitur, & ventriculum pressione sua dirumpit (d).

§. V. Mensura hujus contractionis.

Multum de ventriculi vi contractili disputatum est: & primum negatum a PITCARNII adversariis (a), omnino ita propria sua vi stomachum contrahi posse, ut inaniatur. Fibram enim circularem non posse ita contrahi, ut ad centrum accedat; sed ventriculi fibras omnes circulares esse.

Additum est, ex universali motus muscularis theoria, fibram non posse (b) plus tertia parte suæ longitudinis breviorē reddi, aut per $\frac{2}{11} = \frac{a}{b}$ ex

(w) Oper. min. Exp. 321. 325. 326. SPROEGEL Exp. 21. 24. etiam a plumbi veneno HILLEFELD p. 57.

(x) Oper. min. Exp. 322. 329. SPROEGEL Exp. 16.

(x*) A plumbo HILLEFELD.

(y) G. V. SWIETEN T. I. p. 371.

(z) SPROEGEL p. 46.

(a) A BRUNN. lig. nerv. p. 39. 40. Comm. Acad. Bonon. T. III. p. 285. 286. 287. 289.

(b) BRUNN. p. 39.

(c) IDEM p. 43. add. MORGAGN. Ep. X. n. 37. VIEUSSENS tr. des liqueurs p. 271.

(d) LORRY Journ. de med. 1757. Janv. HALES bemaostatiks. p. 178.

(a) Vide ASTRUC. Epist. de causa concoct. cibor. p. 33. &c. de la digest. p. 63 &c. & responsiones PITCARNII in præs. & BOERI in literis ad PITC. p. 256 ASTRUCIUS fibras habebat pro polygono infiniti latero, cujus vi es constringentes sunt, ut sinus versi angulorum eusdem polygoni, adeoque in finite parvi Respondet Ill. SENAC Ess. de Phys. ed. nov. p. 121 fibram circularem, ut chordam tympano circumdatam, tamen aqua injecta breviorē fieri.

(b) L. XI. p. 472. 473.

ex qua mensura haberetur ratio areæ circuli cujusque ventriculi axin secantis, cujus diameter est b , ante contractionem $= [bb]$ & 121 si b est 11: post contractionem vero $bb - aa = 81$. si a est iter contractionis, ut adeo in minima sua latitudine ventriculus retineat $\frac{2}{3}$ latitudinis suæ, a qua primum se contraxit (c). Ita, addit Cl. ASTRUC, potest integra libra cibi in ventriculo manere neque comprimi.

Sed hæc omnia nimia sunt, & ex hypothefi sumta. Certum est enim, etiam ostia ventriculi posse ita arctari (e) ut nulla via, etiam vaporibus patula, superfit.

Porro in medio ventriculo contractionem evidentissimam, & in homine, & in animale, ventriculum bipertientem sæpissime vidi (f), & alii (g) Clar. viri ante me viderunt, adeo constantem in nonnullis, ut in castore altera ventriculi cella fluidiorem cibum contineret, altera solidiorem (h), & in homine strictura ea plerumque post mortem immutata superfit (i). Ejusmodi summa ex contractione angustia ubique & in ventriculo vivi animalis (k), & a morte (l) visa est. Recte adeo dictum est, ventriculum ad omnem cibi parci copiam posse se adaptare (m), cum se ipse (n) inaniat.

Denique certum est, ventriculum integre evacuari, & sæpe inanem
reperitum

(c) L. c. p. 68. SENRZ *Mém. de l'Acad.* 1715. p. 270. Ita fere *Elem. de physiologie* p. 219.

(e) De œsophago p. 261. de pyloro ibid.

(f) Ab irritatione veneni *Exp. nostr.* in *oper. min.* p. 303. tum in cadaveribus humanis ibid. a spiritu vini DAUBENTON.

(g) SCHRADER *Dec. I. obs.* 8. WEPFER *de cicut.* p. 117. Prope pylorum LUDWIG *fem. cui ossa moll.* Conf p. 122.

(h) *Act. Erud.* 1684. p. 261. Add. *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 52.

(i) Non crassior tenui intestino G. V. SWIETEN T. I. p. 37. Ventriculus valde contractus VATER *chordaps.* SALMUTH l. 43. Versus pylorum in duos quasi divisus MORG. *sed. & caus. morb.* P. II. p. 30.

(k) WEPFER p. 162. 177. 179. 221. 250. 253. &c. *Oper. min. Exp. nostr.* 298. 302. 305. Ad duos digitos SCHURIG p. 377. WALÆUS l. c. WEPFER p. 199.

(l) WEPFER p. 185.

(m) WALÆUS apud BARTH. *Ep.* II. p. 763.

(n) *Exp. nostr.* in *oper. min.* p. 307. 330. Proprio motu se evacuare jam LANG. *Physiol.* p. 77.

reperitum esse, & in homine (o), & in animalibus (p) quadrupedibus piscibus (q), avibus (r).

Video reponi, posse a septo transverso inaniri, & a musculis abdominis: neque repugno de fluidis ventriculi contentis, de massa, qua ventriculus valde plenus sit, de vomitu. Sed confusæ & nullam vel ad pylorum, vel ad œsophagum, directionem habenti pressioni eam inanitationem non credo tribui posse, cum etiam minima & gracilissima corpora certa lege, & ad solum intestinum converso itinere, de ventriculo exeant, & per pylorum amendantur.

Aciculas (s) volo, acus, spinas piscium, quas adeo frequenter & legimus & vidimus, in cæco intestino, inque recto, collectas, aut per vias vi factas in vesicam urinariam, inve adipem ano (s*) circumpositum expultas esse.

Uti adeo muscoli in universum miris modis breviores redduntur, & super omnes mathematicorum calculos, ita ventriculus, & intestina, & vesica urinaria, & fellea, adeo fortis contractionis insitæ participes sunt, ut presente stimulo non desinant arctari, donec eum stimulum expulerint. Ita in calculis fit, & in ventriculo se inaniente: aut certe circa causam stimulantem, ut circa calculum vesica urinaria, ita circa pilam ventriculus se continuo contrahat, quoad eam undique amplectatur.

Vidi sæpiuscule ex vaccis excisas pilas (t), rotundissimas, vix triuncialis diametri, quas vix credas a tam vasto ventriculo potuisse tam exiguum

(o) In homine WEPFER p. 173. & apud PEYER *Merycol.* p. 273. In Bironio Marschallo bihorio a pastu occiso RIOLAN. *oper.* p. 609. In Cardinale BORROMÆO CARCANUS: & ipse vidi in homine fame enecto, inque cane, & fele, a coboldo, a fame, aliisque causis enectis. In testudine CALDESI p. 29. in glire FANTON. p. 162.

(p) In fele: in vitulo CHARLETON p. 43.

(q) In piscibus plerumque inanis est WEPFER apud PEYER *merycol.* p. 271.

(r) Nullæ in iis cibi reliquæ. FLOYER *præternat. state of humours* p. 28.

(s) Duæ aciculæ de ano egestæ WIER *opera* p. 106. Acus major crinalis a bodkin. BIRCH T. II. p. 372. In vacca, vasti animalis, ventriculo aciculæ pene detritæ PEYER *merycol.* p. 95.

(s*) Spina piscis Giorn. *med.* P. ORTESCHI p. 174. 175.

(t) ALDROVAND *quadrup. bisulc.* p. 39. 40. LESSER p. 265. JACOBI *Mus* p. 7. 8. THOMESBY *topog. of Leeds.* p. 433. BLANC. *Jearregist.* l. C. V. n. 64. BUFFON T. IV. p. 537. VALISNER *oper.* T. II. ANDERSON *Beschreibung von Grönland.* p. 37. SEMMEDO *Fascie.* CHARLETON *litbias.* p. 29. MORTON *Northamptonshir.* p. 450. SETTALA *Museo* p. 147. *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 2. obs. 110. Dec. II. ann. 1. n. 17. PEYER *Merycol.* p. 103. DEUSING *bezoar.* p. 334. LEIGH. *natur. hist. of Lancash.* p. 47. 48. PLOT. *nat. hist. of Staff.* p. 263. t. 22. f. 14. FABER ad HERNANDEZ p. 615. *Bresl. Saml.* 1719. p. 740.

guum modulum (*u*) recipere, factas fere ex pilis lambendo deterfis, quibus mucus ventriculi crustam circumdederat (*w*). Res vulgo nota est, etiam in equo (*x*), asino (*y*), ove (*z*), cervo (*a*), porco (*b*), felle (*c*), cane (*c**), marsupiali (*d*); denique in homine (*e*).

Possunt etiam fibræ (*f*) ligneæ cum pilis (*g*) misceri. In rupicapris stirpes fere & radiculae (*h*) plantarum capillacearum (*i*) sunt, quibus hieme aluntur, cum pilis. Etiam hæ pilæ exiguae sunt, nucis mole, ut eum ad modulum ventriculum se contraxisse necesse sit. Stramen (*i**), foliola muscus (*i***), cuspis teli (*i*†), fibula (*i*††), ligna, fructus, lapilli in ventriculi calculo nucleum efficiunt.

Sed

p. 740. *Act. Suecicae* 1725. p. 100. GREW. *mus.* p. 33. LANCIS. *de peste bovill.* TYSON l. c. CARDAN. *subtil.* L. VII. p. 210. KERKRING *obs.* 84. BARTH. *Cent. II. hist.* 21. *Eff. of Societ. at Edimb.* Ed. nov. T. II. p. 352. PIS. *Hist. Nat. Ind.* p. 327. KUNDMAN *Seltenb.* p. 475. PLANQUE *Bibl.* T. III p. 553. 554. Ex pilis bubulis, in manu convolutis, similis facta pila BIRCH T. III p. 436.

(*u*) In ove nucis mole HORREBOW *Descr. Island.* p. 136. Avellanæ in vacca CAMELLE *Phil. transf.* n. 305. in ventriculo secundo

(*w*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. App.*

(*x*) *Phil. transf.* n. 282. JORDAN. *de peste* p. 588. BARTH. Ex sparto anglico PLOT *nat. hist. of Staffordshire* p. 264.

(*y*) PAULIN. *de asin.* p. 50.

(*z*) KLETT *de trichiassi.* ANDERSON. *Grönl.* HASTFER p. 129. GREW *Hist. gener. & partic.* T. V. p. 55. BERTHOL.

(*a*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs.* 159. *Dec. I. ann. 9. 10. obs.* 169. CAMELLE *Phil. transf.* p. 305.

(*b*) *Bresl. Saml.* 1722. M. Octobr.

(*c*) PEYER *Merycot.* l. c.

(*c**) WEPFER *cicut. aquat.* p. 143. PEYER *merycol.* l. c.

(*d*) TYSON p. 28. oblongam figuram ventriculi imitatus.

(*e*) BLANC *Jararegister.* C. I. n. 22. Ex filo devorato STALP. van der WIEL *Cent. I. obs.* 20.

(*f*) DUVERN. *posth.* T. II. p. 444. 445. VALISNER.

(*g*) ALTMAN *Eisgebürg.* p. 193. *Mém. de l'Acad.* 1710. p. 242. BUFFON T. IV. p. 469. SLARE *bezoar* p. 40. SEBA *Thes.* T. II. p. 147. VALISN. III. p. 569.

(*h*) PEYER *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. App.* HARDER *apiar. obs.* 14. PARIS. in rupicapra C. B. *bezoar.* p. 67. 68. qui Doronicum non bene nominat.

(*i*) SCHEUCHZ. *It. alp.* IV. p. 186. *It.* VI. p. 448. Radiculæ VALISNER. III. p. 569.

(*i**) In bezoar occidentali SEBA *Thes.* II. p. 132. In orientali Cl. a COSTA. In Simio SEBA p. 131.

(*i***) In bezoar occidentali SEBA p. 132.

(*i*†) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 1. obs.* 115.

(*i*††) *Giorn. de Letter.* T. 32. p. 140. 141.

Sed etiam in homine (*k*) omnibusque fere animalibus, calculi in ventriculo gignuntur, mole quidem varii, & in grandibus animalibus majore, ut in equo (*l*), tamen semper exigui, & quos ventriculus nunquam figurare potuerit, nisi vehementer contractus. Viginti in uno equo fuerunt (*m*); & anserini ovi mole in tanto animale (*n*). Reperiuntur etiam similes in bove (*o*), etiam avellana non majores (*p*); in agno (*q*), in ove peruviana (*r*); in cervo golcondano (*s*); in ipso ibice, cujus calculi peculiariter bezoar vocantur (*t*), perexigui iidem (*u*), etiam ramulis circumnati (*w*); in simia (*x*), aliisque.

Calculos veros autem hic intelligo, non biliosa concrementa. Rotunda vero omnia sunt, quæ in ventriculo reperiuntur (*y*).

§. VI. *Vis contractionis ventriculi in avibus.*

In avibus ventriculus ex musculis potentissimis fit, & dubito, num ipsum cor, tanto in eodem animale mollius & tenuius, ejusmodi effectum edere aptum sit.

Vix merentur recenseri experimenta, in quibus vitri anguli detriti (*a*), & arenæ de vitro abstersæ (*b*), & nummorum æneorum facies convexa
folia

(*k*) Vomitu egesti lapilli GREW *anat. plant.* p. 253. CONTULI *de lapid. podagr.* p. 59. SCHURIG *libol.* p. 151. Prope pylorum repertus CONTULI.

(*l*) Librarum 20. PLANQUE. Ambitu 19. pollicum *Ess. of a Societ. at Edimb.* T. II. p. 351. Librarum 28. *Lond. Magaz.* 1737. p. 396. Capitis mole MÖCK. p. 136.

(*m*) PLANQUE T. II. p. 531.

(*n*) JORDAN. *de pestil.* p. 588.

(*o*) THORESBY p. 433. trium pollicum ambitu *Id.*

(*p*) In vacca *Phil. transf.* n. 305.

(*q*) BARTHOLIN. *Danz. Med. Dom.* p. 54

(*r*) WATER p. 200. nisi ii a bile virides fuerunt.

(*s*) Cum fibrillæ sint pro nucleo CAMELL. *Phtr.* n. 305.

(*t*) KÆMPFER *amœn.* p. 400. & olim GARC. ab ORTA. L. I. c. 45. CARDAN. *varietat.* p. 675.

(*u*) KÆMPFER *ibid.*

(*w*) Gal. *de Minerv.* I. p. 18.

(*x*) LABAT *Æthiop. Occid.* p. 178. CAMELLI *Phil. transf.* l. c. BONTIUS ad GARC ab ORTA c. 45. FRYER *travels* p. 212.

(*y*) HECQUET *de la tritær.* p. 115.

(*a*) In gallo calecutico STALPAART *obs.* 48. *Cent.* II. REAUMUR *Mém. de 1752.* p. 294. WALDSCHMIDT *de ferment. ventr.* p. 16. HELMONT *calor effc. non digerit* n. 22. p. 163.

(*b*) REAUMUR *Mém. de 1752.* p. 275.

sola terendo levigata (c) ad papiri fere tenuitatem (d) extenuata, & expoliti calculi (e) leguntur.

Sed omnino anseres tubos vitreos (f) devoratos fregerunt, ut in incilia verterentur, & devorati ex avium more calculi in eos tubos subirent: similisque vis est aut major gallorum indicorum de pavonum genere, in quorum ventriculo tam validi tubi rupti fuerunt, ut ab insistentis Academici pondere rumpi negerent (g). Idem animal nuces facillime in ventriculo frangit & digerit (h). Avellanas nuces gallus in fragmenta variæ magnitudinis comminuit (h*). Officula olivarum (i), avellanas, & pistacias a gallis indicis confringi olim BORELLUS viderat (k).

Guttas quidem, quæ vocantur, Batavicas (k*) caporum ventriculus non fregit, neque columbæ vitreas pilas (l), ut majorum avium vires majores sint.

Porro cum vitreas sphaerulas calecutici galli, & vulgares, & anates devorassent, omnino eæ de ventriculo evanuerunt, ut neque fragmenta in intestinis adparerent, indicio, minora fuisse quam arenæ granula (m): neque tamen stomachus læsus erat (n), cum vulgari gallo tanti tamen roboris sphaerulæ intrusæ fuissent, ut a duodecim libris elidi non possent (o). In minutissimum etiam pollinem detritas, lacteumque (p) humorem, cava quidem sphaeras intra paucas horas, denique tamen etiam solidas (q), magnum est roboris documentum.

L 1 2

Denique

(c) DUVERNEY *postb.* II. p. 451. In tardis PARISINI: in struthione ID. & WARREN *Phil. transf.* n. 394. In gallo pavone TEICHMEYER *Anthrop.* p. 141. Ad tritum etiam refert DUVERNEY T. II. p. 451.

(d) GEUDER, *de ferment.* p. 73.

(e) *Hist. de l'Acad.* 1754. p. 75.

(f) REAUMUR p. 277.

(g) ID. p. 275.

(h) p. 292.

(h*) Vide avem corvi similem PLUMIER in *Journ. de Trev.* quod non est ad manus.

(i) REAUMUR p. 293.

(k) *Mot. anim.* L. II. c. 16. *prop.* 191.

(k*) REDI *int. alle gozze &c.* p. 79.

(l) POZZI *Comment. Ep.* p. 76.

(m) *Mém. de 1752.* p. 272. 273. 274.

(n) ID. *ibid.*

(o) *Ibid.* p. 273.

(p) CIMENTINI p. CCLXVIII. CCLXIX. BORELL. *Prop.* 189. p. 355. *Prop.* 192. p. 398.

(q) REDI *Esperienze* p. 49. intra tres septimanas.

Denique tubos ferreos stanno obductos IDEM ILL. olim noster Collega & amicus paravit, & calecuticis gallis dedit devorandos (s): reperit compressos, mutataque figura, & curvatos, flexos in spiræ modum (t), disruptos denique tubos. Sic plumbeos globulos vacuos, & ligneas pyramides, contusa omnia, & erosa (u) Vir ILL. memorat.

Cum ponderibus experiretur vim, quæ ad eos tubos elidendos & rumpendos requirebatur, alias $80\frac{2}{3}$ libras, alias 286. aut 360. alias $437\frac{1}{2}$. & denique $535\frac{1}{2}$. libras requiri comperit (w).

Quare proxime ad verum accessit BORELLUS, quando potentiam ventriculi in gallo indico libris 534. (x) æstimavit, quod perinde avelanas frangat, ut homo quidem dentibus molaribus eas dirumpit: musculorum vero maxillas adducentium vires 534. lib. æstimaverat (y) Vir ILL. etsi ex errore operis posthumi in edito codice non 534. sed 1350. libr. scribantur, quæ in priori opere non sunt humanorum, sed caninorum aut leporinorum musculorum vires, quibus animalibus maxilla longior est (z).

Nescio an industriæ alicui aut NATURÆ providentiæ adscribi oportet, quod pleræque aves lapillos eligant devorandos; neque ausim pronunciare, ejusmodi lapillos ad ciborum meliorem digestionem requiri (a). Crederes, si vere solæ aves ejusmodi lapillos deglutirent, quæ carnosio musculo (b) ventriculi duros cibos adterunt, ut gallinaceus pullus (c), urogallus (d) avis Dronte (e), cygnus (f), anser (g), struthio (h), cognatum

(s) p. 279. 280.

(t) p. 281. 282. 283.

(u) BORELLUS p. 395.

(w) REAUMUR p. 284. 285. Hæc eadem experimenta excerpta habentur in *Journal des Savans* 1753. M. Jun.

(x) L. II. Prop. 191. p. 398.

(y) L. I. Prop. 88. p. 172.

(z) L. II. l. c.

(a) REAUMUR l. c. & IDEM *Art de faire éclore* II. p. 114. BORELL. l. c. Prop. 195. DUVERN. II. p. 450. HARVEY *de gener. anim. exerc.* VI. Asperos seligit RAI *Wisdom of God*. p. 130. LUDDEEN. *libogr.* p. 139.

(b) DUVERNEY l. c.

(c) Capo HIGHMOR p. 24. gallina HARDEE *apiar. obs.* 16.

(d) Ad $3\frac{3}{4}$. loth five dr. 15. HANOW *Seltenb.* p. 272. BRUKMAN *Ep.* LVIII.

(e) BONTIUS L. IV. c. 17. p. 20.

(f) BARTHOLIN. *anat. cygni* p. 35. BORELL. Prop. 194.

(g) REAUMUR l. c.

(h) ÆLIAN. L. XIV. c. 6. *Hist. de l'Acad.* 1754. p. 75.

cognatum anseri animal, *Nhandu Guacu* (*i*), psittacus (*k*). Eas aves adeo sollicitas esse legimus, ne sibi in ventriculo non sint dura corporacula, ut conchulas deglutiant, quando lapillorum raritas est (*l*).

Sed videtur repugnare, quod non aviculæ solæ insectivoræ & carnivoræ perinde lapillos deglutiant, ut hirundines (*n*), corvi (*o*) falcones, aquilæ (*p*), accipitres (*q*), ardeæ (*r*), onocrotali (*s*), & aves carnivoræ universæ (*t*), etsi id ab aliis negatur (*u*): sed etiam manifesto carnivora animalia, *Crocodylus* (*w*), *Lupus* (*x*), *Phoca* (*y*), *Phoca maximus* qui *Leo Marinus* (*z*). Manis (*a*), nisi in ejus alimento fallor, calculos devorent; tum animalia tenui & humani simili ventriculo prædita, cujus tritus non potest cum tritu ventriculi avium comparari, ut *elephas* (*b*), *rupicapra* (*c*), nam & ista lapillos habent in ventriculo: cum præterea *struthio*, *casuarius*, stulta animalia, ipsæque gallinæ carbones, ferramenta, globulos plumbeos (*e*), certæ sibi noxæ futuros, pari aviditate devorent. Sed neque lapides aut metalla coqui credam, aut alere, ut de *struthione* (*f*), de *Nhanduguacu*, americana *struthiocameli* specie (*g*),

L 1 3 de

- (*i*) PISO *Hist. nat. utr. Ind.* p. 84.
- (*k*) *Phil. transf.* n. 211.
- (*l*) MARSIGLI *Danub.* VI. *misc. obs.* p. 11.
- (*n*) PLIN. L. XI. p. 630. PEYER *Exerc.* p. 157. BARTHOL. *Epist.* XI. Cent. II. p. 439.
- (*o*) PEYER *exerc.* p. 188.
- (*p*) HARVEY *gener. exerc.* VII. p. 21.
- (*q*) HIGHMOR *disquis.* p. 29.
- (*r*) PARIS. in scope Numidica.
- (*s*) ALDROV *Omith.* L. III. p. 50.
- (*t*) LISTER *hum.* p. 141.
- (*u*) Nullos aut minimos insectivoræ DIERHAM p. 200. 201. nullos DUVERN. l. c.
- (*w*) *Journ de Trevoux* 1705. Febr. p. 129. OEXMEREIN *hist. des avant.* p. 102. [ad 50. l.] GUMILLA *hist. natur. de l'orenoq.* T. III. p. 142. [ut corbes iis repleres]. BOERICH *herm. aegypt. sapient.* p. 276.
- (*x*) *J. de Trev.* l. c.
- (*y*) *Phil. transf.* n. 469.
- (*z*) *Voy. des terr. Austr.* II. p. 114.
- (*a*) K. SW. *Wetensk. handling* T. X. p. 267.
- (*b*) MOULINS p. 18.
- (*c*) ALTMAN *von Eisgebürgen* p. 190.
- (*e*) Casuarius SAAR *Ostind. Reis.* p. 87. Calentes & nuper fusos *struthio* SHAW *travels* p. 453.
- (*f*) ÆLIAN l. c.
- (*g*) PISO l. c.

de cygno (*b*), & de crocodilo (*i*) referunt, qui in hac bestia etiam progressus gradusque destructionis lapidum dicunt se vidisse.

Contra ista certe observatum est capos, cum lapillos deglutirent, tamen fame enectos fuisse, & struthiocamelos adeo lapidibus non ali (*k*), ut ab eorum usu (*l*) etiam pereant (*m*), & a custodibus caveatur, ne quis hujusmodi scruta pretiosæ avi porrigat (*n*).

Quid ergo boni hi lapilli faciant? an vere melius digerant, quæ iis utuntur gallinæ (*o*), meliusque appetant (*p*): an non possint absque iis lapillis recte vivere (*q*), ego quidem nondum definio.

Ut ut autem de fine res se habeat, certe hi calculi cum cibis in ventriculo conteruntur, ut etiam in viva ave strepitum (*r*) exaudias, uti in misero puero exaudiebatur, quem dixi Bernæ ab ea servitute fuisse liberatum (*s*).

§. VII. In animalibus carnivoris & omnivoris.

Omnino negari nequit, insectis (*a*) quidem etiam polypis (*b*), alacrem satis in ventriculo motum peristalticum esse. In piscibus (*c*) frigidis obscurum video, a nemine, qui nunc mihi redeat in animum, observatum. Vivi in eorum ventriculo pisciculi supersunt, vivæque ranæ (*d*).

Frigidis

- (*b*) BORELL. p. 194.
 (*i*) *Journal. de Trev.* l. c.
 (*k*) Non digerunt KOLBE III. p. 149.
 (*l*) SCHOOK *ferment.* p. 380.
 (*m*) A ferro & cupro PERRAULT. *Ess. de Phys.* ab æneo anulo *Mém. de l'Acad.* 1740.
 a nummis & lapidibus PARIS. & RANBY *Phil. transf.* l. c. PECHLIN *de purg.* p. 71.
 (*n*) PIELARIN. *medic. difes.* JORDAN. *pest. phanom.*
 (*o*) CIMENTINI p. CCLXVIII.
 (*p*) BRADL. *farmers. direct.* p. 8.
 (*q*) HIGHMOR.
 (*r*) In falcone & aquila HARVEY *Exerc.* VII. in corvo BAYLE *corp. anim.* p. 347.
 (*s*) p. 214.
 (*a*) In hydrocantharo *Journ. des Sav.* 1696. p. 477. 478. in culice BAKER *microscope made easy* p. 138. in pediculo Id. *ibid.* in Musca Id. *ibid.* in ape REAUMUR. *Mém. pour servir à l'Hist. des insect.* T. V. p. 447.
 (*b*) TREMBLEY p. 121. 122. 123. 124. 213.
 (*c*) Ventriculus piscibus membranaceus est LISTER *conchyl. bivalo* p. 150. seq. neque ullus in eo tritus Id. *de hum.* p. 144.
 (*d*) PLOT. *natur. hist. of Staffordsb.* p. 246. In blennio GISLER K. *Svensk. Wetensk. handling* 1748. Trim. I.

Frigidis in quadrupedibus alias nullum vidi (*f*), alias tamen, certe ex stimulo, aliquem.

In animalibus quadrupedibus sæpe vix ullus adparet, ut etiam in vomitu pene quiescat in cane (*g*), cuniculo (*h*), ipso equo (*i*).

Ego non adeo infrequenter etiam perdebilem vidi in cane (*k*), fele (*l*), erinaceo (*m*), cuniculo (*n*); aliquando omnino nullum, in cane iterum (*o*), & in fele (*p*). Ita intelligitur, cur devorata in cane tessera levior quidem prodierit, absque tritu tamen, cum figuram cubicam conservaverit (*q*). Etiam in sano porco ventriculus crusta lapidea obductus visus est, in qua unice canalis digitum latus ab oesophago ad duodenum ducens liber superesset (*s*). Quare quadrupeda homine validiora, tum equi (*t*) foenum pene integrum per anum egerunt, neque vis germinandi aboletur (*u*); & canes vel immutata ossa excernunt (*w*); vel emollita, non fracta, neque adtrita (*x*). Sed etiam in homine plurimis exemplis constitit, neque uvæ (*y*) quidem, etiam corinthiæ, aut ribis (*z*), aut vaccinii (*a*), aut belladonnæ (*b*), mollium baccarum, membranam a ventriculo frangi,

(*f*) In rana *Exper. nostr. de nat. irrit.* n. 318. 323. CALDAN. p. 329.

(*g*) SCHULZE *Exp.* 2. BAYLE apud SENAC *Ess. de phys.* p. 116. AINSLIE de vomitu idiopath. p. 15. SCHWARZ de vomitu n. 23. *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. ann. 4. observ. 125.

(*h*) SCHWARZ n. 27.

(*i*) BERTIN. *Mém. de l'Acad.* 1746. p. 29.

(*k*) *Exp.* 302.

(*l*) Fele n. 319.

(*m*) Erinaceo n. 309. Cuniculo n. 327.

(*n*) Cane n. 328.

(*o*) Fele n. 296. 306.

(*p*) BIRCH T. IV. p. 304. *Hist. de l'Acad.* 1732. n. 3. *Comm. Noric.* 1731. p. 323.

(*q*) CHESELDEN p. 154. QUERNAI *Essays* T. III. p. 15. ARBUTHNOT T. I. p. 61. 189. & de boum ventriculo PEYER *rumin.* p. 120. 184.

(*t*) Etiam in elephanto KOLB T. III. p. 13. Equi Chrysanthemum segetum ferunt, oves viscum.

(*u*) POZZI l. c. p. 75. 76. Semen nasturtii illæsa vi germinandi de ano exivit REGIUS *app. ad scult. obs.* n. 1.

(*w*) WALÆUS apud BARTHOL. p. 764.

(*x*) MUFFET *health. improv.* c. 13. HARTSOEKER *extr. crit.* p. 11. KERKRING *obs.* 6. ASTRUC. p. 23. CHESELDEN *Ed.* VI. p. 159. *Add. Bresl. Saml.* 1719. May. *Comm. Noric.* 1733. h. 25. GLISSON p. 272. De fructibus horæis ALBIN. *adnot.* L. II. c. 8.

(*z*) LINN. *ibid.* *Eph. Dec. II. ann. 1. obs.* 73.

(*a*) Ex vulpe LINN. *increment. tellur. habit.*

(*b*) *Journ. de Med.* 1759. Aug.

frangi, aut cerasi, quæ quinto die integra alvo exierint (c). Ita demum grana avenæ (d) & pisa (e), in ventriculo germinasse dicuntur, ut vomitu rejectæ sint radiculæ, culmi & folia, quæ in ventriculo sint nata, in quo per menses ea grana hæserant.

Corium credas exfugiri posse, cæterum non coqui. Nam post sex menses demum egestum (f) est, & lardi corium (g) per duos annos in ventriculo servatum; & intestina (h) per 14. annos circumgesta demum vomitu excreta: aliquando & caro (i) diutissime servata de ventriculo non subtracta prodiit. Sed ne ipsi quidem canes corium digerunt (k).

Visus est etiam homo, cui ventriculus pene consumptus, & pene sola ostia & fundi pars integra superesset (l), in quo certe homine parum potuit a motu peristaltico sperari. De struthione etiam legimus, ventriculo ferramento transfixo supervixisse.

Ex his causis fieri potuerit, ut alii scriptores ventriculi in animalibus dentatis debilem motum peristalticum fecerint (m), neque supra tres uncias valentem (n). Alii omnino (o) ventriculi motum peristalticum rejecerunt.

Nimii tamen etiam in eo fuerunt. Nam is idem motus peristalticus, qui in animalibus iisdem aliquando adeo obscurus se quasi occultat, is alias manifestissimus est, ut in ranis (p) etiam a morte (q), potius major (r), adparuerit: tum in avibus (s) de quibus GLISSONIUS eum motum

(c) BINNINGER *Cent. IV. obs. 65.*

(d) *Journ. de Med. 1761. Juill.*

(e) BEHRENS *diastet. post multos annos.*

(f) HILD. *Cent. I. obs. 3.*

(g) ID. *Cent. IV. obs. 33.*

(h) BEHRENS *dietet. p. 189.*

(i) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 9. obs. 82.*

(k) VERCELL. *Sect. 2. WEPFER.*

(l) *Journ. de Med. 1758. Mars.*

(m) LE FRANÇOIS *reflex. crit. p. 307.* LIMUTAUD *Physiol. p. 135.* HELVET. *Mém. de 1719. p. 341.* ASTRUC. *Epist. cit. p. 3. seqq.*

(n) ASTRUC. *l. c. p. 30. &c. p. 262.*

(o) LANGGUTH *in propria diff.*

(p) CALDAN. *p. 329.* RÖRSEL *p. 52. Exper. nostr. 314.*

(q) CALDAN. *ibid.*

(r) ID. *p. 335.*

(s) CAPONE REAUMUR *l. c. p. 295. pullis ovo exclusis Exper. nostr. 337.* Ciconia *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 2. obs. 97.*

motum negabat (*s**), in illis certe avibus, in quibus strepitum volutorum lapillorum HARVEJUS (*t*) exaudivit. Sed etiam tubos ferri stannati aliquos in milvi ventriculo RAUMURIUS comprimere vidit (*u*).

In quadrupedibus sæpe manifestissimum vidi, in cane (*w*), fele (*x*), mure (*y*), capella (*z*); cuniculo (*a*). Sed numerosa a GALENI tempore (*b*) sunt testimonia (*c*). Vidit eximius WEPFERUS motum ventriculi peristalticum in ruminantibus animalibus (*d*), & in carnivoris, ut in cane (*e*), fele (*f*), lupo (*g*). Ferramenta in boum ventriculo expoliri PEYERUS (*g**).

Neque huc quidquam aeris ad ventriculum admissi stimulus facit, cum per pectus & diaphragma in abdomine integro ventriculum moveri viderim (*h*): & vicissim ventriculus de corpore eductus perinde pergat contrahi (*i*) vomitumque vel solus faciat (*k*).

Denique etiam in homine idem in ventriculo motus non est absque suis indiciis. Expoliri lapillos a stultis devoratos legimus (*l*). Demum in feminæ vivæ ventriculo, qui per ulcus patebat, contractionem & concussionem Cl. Vir oculis suis usurpavit, unico exemplo (*m*).

Quare

- (*s**) In vivis avibus *ventric. & intest.* p. 129.
 (*t*) *De gener.* p. 21.
 (*u*) l. c. p. 466.
 (*w*) *Exper.* 298. 299. 300. 301. 302. 307. 308. 330. 331. 332. SPROEGEL p. 44. etiam SCHULZ *Exp.* I. FOELIX *Exp.* 6.
 (*x*) *Exp.* 310. 315. 322. SPROEGEL p. 44.
 (*y*) *Exper.* 313.
 (*z*) *Exper.* 316. 317.
 (*a*) *Exper.* 312. FOELIX *Exp.* 3.
 (*b*) *Facult. natur.* L. III. c. 4.
 (*c*) ELFWING *de motu peristalt. vit.* p. 36.
 (*d*) p. 89. *Meryc.* p. 270.
 (*e*) p. 199. 221. 250. 251. 297. 203.
 (*f*) p. 185.
 (*g*) p. 162.
 (*g**) *Meryc.* p. 95.
 (*h*) ZIMMERMAN *Exp.* 47. 48.
 (*i*) WEPFER p. 177. 179. 253. 297.
 (*k*) p. 221.
 (*l*) *Physiol. bat.* p. 80. puto ex ALBINO.
 (*m*) WENKER *propr. diff. de vuln. ventric.*

Quare ut in edacibus & robustis hominibus crassus est ventriculus (*n*), & angustus (*o*), ita in iis, quibus debilis est & tener, etiam digestio ciborum pari est debilitate (*p*): tum quibus peramplus est (*q*). In magnatibus sæpe papiri tenuitate (*r*) repertus est. A venenis alias distentus (*r**), ob aerem in clauso sacco expansum; alias angustus & corrugatus (*r***) adparuit.

§. VIII. *Nimii ne fiat.*

Quæ ita dicta velim, ut suas motui peristaltico partes servem, non ut faciam æqualem 12951 (*s*), aut 117088. libris (*t*) elevandis; neque ut conjunctas ejus cum diaphragmate & musculis abdominis vires æstimem lib. 461. 219. (*u*) aut demum 260000. librarum (*w*). Qua certe potentia non uvæ, aut avellanæ, sed solidæ crysalli in pollinem contererentur.

Nempe PITTCARNIUS comparabat ventriculi pondus cum pondere musculi pollicem flectentis, cumque vires musculorum poneret esse in ratione ponderum, effecit illas suas 12951. l. Sumsit autem ventriculi pondus octo unciarum (*x*); neque memor fuit, minimam partem ventriculi musculosam esse, & nerveam tunicam, atque villosam, adipem, glandulas, vasa, nihil ad vires contractiles facere (*y*).

In cane, cui inmissis aquæ libris 104. (*z*) ventriculus crepuit, vires
aquæ

(*n*) VIRIDET p. 226. 562. Non latior intestino a tenui diætâ COLLINS p. 364.

(*o*) ETMULLER progr. in urso SCHRADER p. 11. in coati mundi K. Svenska Vetensk. bandl 1747. p. 286.

(*p*) Eph. Nat. Cur. Vol. IX. obs. 103. PLATER anat. p. 150. In morbo chronico BECKER obs. 11. earum quæ cum l. de submors. morte sine aqua prodierunt. In calculoso homine valde distentus & absque tono fuit, cum vomitu & lenteria Phil. transf. n. 207. tum in hydropico PETERMAN I. obs. 4.

(*q*) Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs. 150.

(*r*) SCHURIG.

(*r**) MORGAGNUS Sed. caus. II. p. 14. Lett. al S. CURZIO p. 23. HILLEFELD p. 43. 44.

(*r***) A viridi æris HILLEFELD p. 43 A cocculis p. 34. 37. a radice Scillæ p. 13. a turpetho minerali p. 61. conf. p. 123.

(*s*) PITCARNE de vi qua ventr. cib conf. p. 85. Ed. Bat.

(*t*) Etiam FRACASSINI de hypoch. p. 63.

(*u*) PITCARNE, FRACASSINI.

(*w*) WAINWRIGHT p. 35.

(*x*) Sicus est drachmar. octodecim BARTHOLO. anat. p. 73.

(*y*) Vide epicrisim ASTRUCII p. 141. & de Lue Vener. p. 1042.

(*z*) HALES biomastat. p. 178.

aquæ ventriculum prementis facias librarum 39. quibus ejus animalis ventriculus ægre resistit. Bobus a vapore elastico trifolii sæpe crepat (a), etiam ab aqua (b).

Homini, quam cani debiliior est ventriculus, & vis minor, facileque ligatus & inflatus diffilit: & fibra ventriculi rumpitur, quando una septima parte elongatur, a morte certe, nam in vivo homine magis obsequitur (c). Carnosos vero avium ventriculos ne nominare quidem licet, in tanta diversitate fabricæ (d). Nihil durius iis fibris, neque crassius.

§. IX. *Motus peristalticus ventriculi in universum.*

Non facile est, in re instabili, neque in naturali statu conspicua, plenum quid & bono ordine tradere.

Et primum sæpe quiescit ventriculus, neque videtur motu peristaltico agitari, nisi quando a causa aliqua irritatur, cibo, veneno, aere.

Deinde in universum ventriculi contractio cum laxatione alterna est, ita ut in suo motu, modo hic constringatur (b), modo alibi: deinde ea pars quæ constricta fuit, laxetur (c) & intumescat. Et eæ alternæ vires sæpe repetuntur (d). Hinc etiam in rana (e), cui ventriculus longus est, figuram mutat perpetuo, & quasi articulis dividitur.

Adparuit porro in sede irritata constringi, & videtur laxari, quando stimulo se liberavit. Hinc præsentē stimulo diutissime & pertinaciter, etiam post mortem constrictus manet (f).

Laxatus ventriculus intumescit, puto ob aerem (g), & aliam materiam ventriculo contentam, quæ contrahenti se musculosæ tunicæ cedit, & paulo post, liberata a pressione, se ex suo ingenio expandit.

M m 2

Hinc

(a) PETER Meryc. p. 114. LENTIL Jatrómniem p. 422. 423. CHESLEB. p. 160. de agnis add. p. 101.

(b) BERTIN. Mem. de 1746. p. 36.

(c) SAUVAGES Physiol. n. 60. Puto de homine loqui.

(d) LISTER c. 17. & ASTRUC.

(b) WEPFER p. 87. 221. 199. 250. 154. 177. 162. 185. 297. Journ. des Sav. 1696. p. 477. FOBLIX Exp. 10. 3. Exper. nostr. 298. 300. 305. 314. 315.

(c) WEPFER cicut. aquat. p. 199. 221. 87. 185. 162. 177. REAUMUR Mém. de 1752. p. 395. Journ. l. c. Exper. nostr. 298. 300. 314. 315.

(d) WEPFER p. 199. 177. 87. Exper. nostr. 314. 315.

(e) ROESSEL de ranis p. 52.

(f) WEPFER p. 155. 162. a veneno. Exper. nostr. 303. 304.

(g) Exper. n. 298.

Hinc a morte, irritabili natura destructa, ventriculus, qui angustus fuerat, nunc intumescit (*b*).

Qua sede ventriculus contrahitur, ea sulci (*i*), inter fibras nascuntur, ut ex manifestius se efferant: fiuntque ob fibras longitudinem (*k*) sequentes etiam similes rugæ, & circulares aliæ, ob ejus ductus fibras (*l*).

Sic ventriculus modo angustior fit (*m*), modo brevior, adductis ostiis (*n*).

Constrictus, una crassiori fit carne (*n*^{*}), & tenuis, quando distenditur (*o*), eoque in statu sanguis de vasis expellitur (*p*). Durus (*q*) etiam fit, dum contrahitur.

A morte similia fiunt (*r*). Etiam particulæ ventriculi dissecti constringuntur (*s*).

§. X. *Directio motus peristaltici.* I. *Deorsum s. ad duodenum.*

Dandum est equidem, in ventriculo aliquamdiu nullum certum esse finem, ad quem contractus ventriculus cibum pellat, eumque & deorsum agitari, & sursum (*a*), & peristaltico motu, & antiperistaltico, quem non bene aliqui scriptores rejecerunt (*b*). Necesse enim est, quoties utrumque ventriculi ostium clausum est (*c*), toties etiam vel inertem ventriculum quiescere, vel motu alterno cibum agi & retroagi. Ea autem alterna volutatio durat, quamdiu oesophagus clausus resistit, vel pylorus con-

nivens

(*b*) WEPFER p. 142.

(*i*) WEPFER p. 198. 154. 185. 162. 297. FOELIX *Exper.* 3. *Exp. nostr.* 330. Funiculos carneos undarum modo per superficiem ventriculi reptasse REAUMUR *Mémoire. de* 1752. p. 295.

(*k*) p. 198. 297. *Exp. nostr.* 330.

(*l*) p. 199.

(*m*) WEPFER p. 199. 154. 87. 303. &c.

(*n*) SCHULZE *Exp.* I. WEPFER p. 87.

(*n*^{*}) WEPFER p. 250. 162. 154.

(*o*) IDEM p. 250.

(*p*) HALES *hæmorrh.* p. 181.

(*q*) WEPFER p. 162.

(*r*) WEPFER p. 185. &c.

(*s*) SCHULZE *Exp.* I.

(*a*) WEPFER p. 251. 87. CALDAN. p. 329.

(*b*) HAGUENOT *de ileo* p. 14.

(*c*) Semper, ut credit, inter digerendum clausus est DUVERNÉY T. II. p. 184. non bene; sed conf. p. 136.

nivens cibum repellit: solvitur idem, quando vel œsophagus cedit, vel pylorus cibum nunc laxus dimittit.

Organa motus peristaltici sunt tum transversæ fibræ pro ordine diverso, quo constringuntur: tum fibræ obliquæ, quæ ab œsophago descendunt, & in ventriculi utrumque planum se dimittunt, utrumque ad œsophagum adducturæ. Ostia etiam adducunt, & claudunt, irritatæ fibræ sensiles, quæ sunt inter duo ostia ventriculi.

Nam & oculus in ipsis insectis eum motum confirmat, inque omnibus animalium clâsibus (*d*): & aqua intra ventriculum in spumam vertitur (*e*); & manifestum est, si unicus esset ductus, secundum quem ventriculus constringeretur, fore ut intra perexiguum tempus inaniretur, cum ejus in homine permodica sit longitudo, & longum illud intestinorum syrma a cibis intra 24. horas percurratur.

Verum non perpetua est hæc *delectatio*; nam post aliquod tempus cibus de ventriculo totus exit, ut inanis reperiatur (*f*): ductus ergo ejus motus videtur esse ejusmodi, ut reciprocatio aliqua locum habeat, quamdiu aliqua in ostio pylori est difficultas, quæ cibum per pylorum prohibeat exire.

Ea difficultas non eadem est. Etiam in sano statu locum habet potentissimum ea, quæ oritur a pylori anulo intus tumido (*g*), quem diximus, & hætenus angustato, ut crassi solidique cibi, quos adsumimus, eam angustiam superare non possint, absque adlifu: quales cibi sunt crustæ panis, fibrarum carnearum fasciculi, folia vegetabilium, buccæ fructuum horæorum admorforum, & alia id genus. Massam lactis coactam a pyloro vidi in cane refutari.

Altera causa sæpe cum priori conjungitur. Ea est ab irritatione, quæ fibras carneas anuli pylorici constringi cogit, ut omnino via ad duodenum intercipiatur. Constringitur vero, ut ostendimus (*h*), potentissime, ut ventriculus tumidissimus (*i*) se inanire nequeat: Oritur eadem irritatio a priori causa quam modo diximus, quando duriores & grandiores ciborum globi transitori pylori, sensiles tunicas tangunt: potest & ab acrimonia oriri. Morbosas causas hic prætermittimus.

M m 3

Pylo-

(*d*) TREMBLEY p. 121. 122. 123. 213. in polypo.

(*e*) FOLLIX *Exp.* 9. 10. 11.

(*f*) p. 264.

(*g*) p. 135. 136.

(*h*) p. 261. 235.

Pylorum non a ventriculi distentione claudi, sed ob pylori clausio-
nem ventriculum distendi credam. Certe a morte inflatus, nisi liges
utrumque ostium, aerem etiam integer & irritabilis dimittit. Hinc ven-
triculi a veneno sumto irritati, & clausa habent accurate ostia, & sunt
distentissimi (*k*). Ea venena aerem non generarunt, sed irritarunt ven-
triculum (*l*). Cum steatoma duodenum comprimeret duabus horis a pastu
magna ventriculi inflammatio (*m*) successit.

In sano homine pylorus non clausus est & modice connivet (*n*).
In certis hominibus per ulcus abdominis, continuo chylus cibique de-
cesserunt (*o*), etiam semicrudi. Ergo ventriculus contractione ab oeso-
phago orta cibum deorsum, versus pylorum urget (*p*): vel etiam alio
loco & circa medium contractus (*q*), per liberum nunc pylorum cibum in
duodenum expellit, quoad totus inanis sit (*r*).

Solet in eo naturali motu gula clausa esse (*s*), quod ibi contrahens
vis major sit, & ab oesophagi ostio incipiat.

Erigi quidem duodenum in animale, dum cibus exiit, vidit WEPFERUS:
id fit in omni curvo canali, qui a perfluente humore dilatatur. Cæterum
in homine exitus ciborum, per pylori in pleno ventriculo erectionem mu-
tatur. Circa id ostium enim, tamquam circa immobilem sedem, mobi-
lis curvatura major ventriculi arcum circuli describit, & antrosum erigi-
tur (*t*). Ita angulus; quem cum ventriculo vacuo pylorus adductus ef-
ficat, is nunc evanescit (*u*), & cibus absque plica, recto ductu, etiam
descendente, per pylorum expellitur. In homine in dorsum decumbente,
is exitus etiam pondere adjuvatur. Lego facilius inaniri, si in dextra de-
cubueris, neque satis causam intelligo (*w*).

§. XI.

(*i*) p. 123. 274.

(*k*) WEPFER *cit.* p. 195. 250. 335. conf. p. 274.

(*m*) SCHENK *Exerc.* p. 590.

(*n*) WALÆUS p. 763. conf. p. nostr. 136.

(*o*) MORBIUS *inst.* p. 198. *Phil. trans.* n. 175.

(*p*) *Exper. nostr.* n. 297. 300. 330. WEPFER p. 87. 177. GREW *of guts.* p. 25.
CALDAN. p. 329.

(*q*) WEPFER p. 87. 177. PITT *Phil. trans.* n. 243. CALDAN. p. 329. GREW
of guts p. 25. FORLIX *Exper.* 3. *Exper. nostr.* 300. 307. In ape REAUMUR
Mém. sur l'hist. des insectes T. V. p. 447.

(*r*) FORLIX l. c.

(*s*) WEPFER p. 177. SCHWARZ l. c. n. 13.

(*t*) p. 120.

(*u*) *ibid*

(*w*) DUVERNEY T. II. p. 183. ROSEN *anat.* p. 309.

§. XI. *Tempus quo ventriculus evacuatur.*

Non facile videtur, in tanta varietate ciborum, id tempus definire. Paucum fluidumque cibum celeriter per duodenum inaniri adparet: lente, si figuræ sœ tenax, si coctioni ineptus, si acris fuerit, ut pylorum iritet, sibi que ostium præcludat. Nummi aurei a VAILLANTIO deglutiti, post plusculos demum dies per ovum decesserunt (a). Denarius cupreus multo tempore vaporem venenatum in os remisit (b). De globules plumbeis devoratis aliquis tertio die vomitu rejectus est (b*). In capone intrusæ pilulæ post 12. & post 24. horas in ventriculo aliquæ superfuerunt (c). Mensibus integris & annis, caro male manducata (d), membranæ, intestina (e), coria (f), adeps (g), ostrea (h), piscium (i) incoctæ lactes (k), caseus (l), prunum (m), nuclei, pisa (m*) in ventriculo hæserunt; aliquando & uvæ (n), cerasa (o), & aliæ baccæ (p).

Iterum intelligitur, recte WALÆUM (q) olim docuisse, esse cibis suum, quo de ventriculo exeant, ordinem: neque coctum cibum eum expectare, qui crudus in ventriculo superest. Visa est panis particula in ventri-

(a) *N. de la rep. des Lettr.* 1707. Mars. SPON. *voyag. de Dalm.* L. I. p. 20. alius nummus post mensem producit KERKING *obs.* I. alius die 8. MURALT *Chirurg. Geschichte.* n. 94. alius post annum AMAT. L. II. c. 69.

(b) *Phil. transf.* n. 246.

(b*) DIETHEY *obs.* 5.

(c) REED *esper. intern. cos. natur.* p. 51.

(d) ALBRECHT *Eph. Dec. II, ann. 9. obs.* 82. Duobus mensibus RIEDLIN *mil-lenar.* n. 829. Aliquot annis *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs.* 18.

(e) BEHRENS *dietet.* p. 189.

(f) Sex mensibus HILD. I. *obs.* 31.

(g) Omenti frustum post 40 dies ALEX. BENED. L. XIX. c. 5. Tanto tardius cibus per anum exit, quo plus habet adipis. AZEIN. *adnot.* L. II. c. 8. *Eph. Vol. XI obs.* 4. Decimo quarto mense egestus adeps TULP. L. III. c. 18. Post duos annos lardi corium HILDAN. *Cent. IV. obs.* 33.

(h) Dies 14. BEHRENS *ibid.* [p. 251.

(i) Pisces die septimo VIRIDET *bon Chyle* p. 601.

(k) Post 4. menses STORCH *schwangere Frau. Krankh.* p. 241.

(l) Duobus annis SCHOK *ferment.* p. 382. 383.

(m) *Phil. transf.* n. 349.

(m*) BEHRENS *dietet.*

(n) Novem septimanis Bresl. *Saml* 1719. May.

(o) Cerasa biennio retenta Comm. Nor. 1733. *Hebd.* 25.

(p) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs.* 73.

(q) Conf. p. 763.

ventriculo retenta fuisse, cum reliquus cibus ad lactea vasa exivisset (r). Addit Vir Cl. primam aquam, etiam mineralem, & mites humores exire, quas tanta copia post horam de vesica reddamus; tum lac (s). Inde sensim olera sequi. Panem quarta demum hora (t). Tunc pisces, demum carnes hora 5. 6. 7. (u); bubulam octava: aliquando caro ad se-decimam horam in ventriculo morata est (w). Hæc fere in canibus adnotata.

Etiam *Johannes VIRIDET* aquosis semihoram, horæis fructibus, car-nibus & pani, horas a tertia ad quintam, durioribus ad septimam & octavam suum tempus fixit (x), puto in homine. In ulcere abdominis & in-testini primum a semihora lac, tum coagulum exiit (y), & in simili malo, semihora elapsa serosi quid, tunc crassus Chylus; inde cibus, vix manducatus (z) per ulcus exiit. In alio exemplo, cum intestinum per latus ulcere pateret, cerevisia hora altera, horæi fructus & legumina binis horis, caro & pa-nis non nimia copia sumtus ad nonam horam, butyrum tardissime, etiam tertio die (a) exiit; quæ eadem ad idem exemplum summus vir ALBINUS adnotavit (b).

Altera hora in cane vasa lactea conspici solent (c), quando canis lacte nutritus inciditur (d), tertia si lacti panis accesserit (e); sexta demum, si panis fuerit secalinus (f).

Nunc hæc omnia, per morbum nata, veram naturæ consuetudinem repræsentare non adfirmo, sunt tamen certe ad ordinem utilia, quo cibi de ventriculo exeunt.

Experimenta in me ipso hætenus cepi, cum essem *κακόςμαχος*, & a ci-bis, vel paulo tenacioribus, ructus sapore sui cibi inquinati subinde mihi adscen-

(r) IDEM 764.

(s) Cerevisia hora altera *Eph. Nat. Cur. Vol. X. l. c.* In ventriculo erat caseus, se-rum in duodeno *VIRIDET de bon chyle p. 232.*

(t) p. 764.

(u) Ibid.

(w) Ibid.

(x) *Prim. cost. p. 253.*

(y) *Phil. transf. n. 176.*

(z) MORBIUS l. c.

(a) *Eph. Nat. Cur. Vol. X. obs. 4.*

(b) *Adnot. L. II. c. 8*

(c) BALS apud ZAS. *van den daerw der dieren p. 89.*

(d) Ibid.

(e) Ibid.

(f) Ibid.

adscenderent. Hora fere quarta a prandio, carniū, quas maligne coquebam, fremitum & tumultum percipiebam; is paulatim conquiescebat, ut post frugale prandium sexta hora ventriculus inanis esset, purusque aer regurgitaret.

Celerius aliis hominibus ventriculum evacuari credas, ut BIRONIO (g), cui post bihorium inanis fuerit; ut mexicanis, quibus tertia a pastu hora animus fere delinquat (h). Credas enim, non incerta conjectura, tunc appetitum redire, quando ventriculus inanis est. Ex eadem lege interdum septima fere hora ventriculus inanis foret; per noctem tardius.

Fuit, sed vitiose, cui intra dimidiam horam de ano cibi exirent (i).

Equis, quibus parvus & robustus ventriculus est, cibi pene continuo ad intestina transeunt (k).

§. XII. *Motus antiperistalticus. Vomitus.*

Contraria directio, & a pyloro orsa atque versus oesophagum retro-gradā, quando is laxus est & apertus, erumpit in ructum, qui meri est aeris, vapore cibi inquinati; aut in regurgitationem aquæ gastricæ, aut cibi nonnunquam, acidi rancidive; in ruminationem porro, quæ cibi est iterata manducatio, & denique in vomitum, in quo ventriculus contenta sua omnia per gulam & os expellit. In sano homine, & temperante, horum omnium nihil fit: ructus tamen est frequentior (a), potissimum a cibis nonnullis aere plenioribus, etiam in bestiis (b).

Regurgitatio parciore, & unius alteriusve buccæ, satis frequens est: & in debilis, ventriculi homine vix digestio absolvitur, quin aliquoties, etiam sæpe, sapor ciborum in ventriculo hærentium in os redeat. Sapo- res maligni, a cibis male coctis, ab ulceribus internis sæpissime in os redeunt (c).

Ruminationem dicemus. Vomitus totus morbosus est.

In

(g) RIOLAN. p. 609. add. 264.

(h) GAGE in *Itiner.*

(i) PECHLIN *Lib. I. obs.* 53.

(k) BERTIN. *Mém. de l'Acad.* 1746 p. 28.

(a) Solum hominem ructare, non bene HÆMILIANUS de *ruminantib.* p. 50.

(b) In cervo ruminante WEPFER *Merycol.* p. 273.

(c) Vid. *Nov. Eph. Nat. Cur. Vol. I. obs.* 31. de sapore casei.

In eo malo vel ab ipso duodeno (*d*) motus ventriculi contractilis oritur: sequitur pylori constructio (*e*), inde medii ventriculi, demum supremi, donec ad ipsam gulam bolus progrediatur, & a ventriculo se contrahente, inque rugas plicato, sursum per os expellatur (*f*).

Alias principium contractionis in pyloro (*g*) est, quem in vomitu clausum esse ponimus: inde motus peristalticus versus oesophagum per totum ventriculum retroagitur, usque dum materia ventriculo contenta per gulam erumpat (*h*).

Etiam in medio ventriculo aut integro (*i*), aut de corpore exempto, nata est contractio, quæ ventriculum per oesophagum deplevit (*k*).

Hæc a fibris circularibus (*l*) fiunt, tantum mutato ordine: uti stimulus inferiori loco, quam superno, potentior fuit. Sed etiam alium motum in ventriculo vomentis animalis vidi, in quo pars anterior ad posteriorem accessit, succussu quodam, & cum quadam crepitatione (*m*). Eundem motum Cl. WENKER in homine vidit (*n*), ut pars anterior ventriculi elevaretur, superior descenderet, et cibus cum impetu ejacularetur. Hoc genus motus tribuas fibris obliquis, ab oesophago in planum utrumque oblique descendentibus, quæ antè planum & postè ad oesophagum adducunt (*o*).

Adeo vero ventriculo proprius est vomitus, ut a voluntate neque produci queat, neque inhiberi: & dissecto diaphragmate (*p*) aut abdomine (*q*), aut quiescente septo (*r*) aut in ventriculo exempto pariter continetur.

Singul-

(*d*) WEPFER p. 250. 251.

(*e*) Nulla animalia vomunt, nisi quibus ventriculus inferne angustus est PLINIUS L. XI. p. 619.

(*f*) WEPFER p. 154. 250. 251.

(*g*) GREW of guts p. 25. SCHWARZ n. 12. 23. RUDBEK.

(*h*) RUDBEK obs. post tr. *de vas. seros.* n. 20.

(*i*) PITT Phil. trans. n. 343.

(*k*) WEPFER p. 253.

(*l*) Etiam in apibus REAUMUR Mém. pour servir. à l'hist. des Insectes T. V. p. 447. HARDER apiar. p. 254. VIEUSSENS traité des liqueurs p. 263. LUTAUD Mém. de l'Acad. 1752. p. 226. seq. Add. CALDAN. p. 319. WEPFER p. 87.

(*m*) Exper. nostr. 330. 331.

(*n*) Subita concussione.

(*o*) p. 127. 128.

(*p*) WEPFER p. 225. PERRAULT nouv. perist. p. 154. WEPFER p. 250.

(*q*) PERRAULT ibid. etiam de singultu.

(*r*) WEPFER p. 253.

Singultus, qui non longe a vomitu distat, fit a ventriculi potissimum irritatione (*t*): & sequi visus est, cum extus in parte superiori vexaretur (*u*), aut inter labia vulneris abdominis contineretur (*w*).

§. XIII. *Causa vomendi.*

Nunc quidem huic idiopathico vomitui maxime cum natura convenit. Causa enim ejus pene semper est in ventriculo, & simplicissima quidem in ventriculo nimis pleno, atque irritato: ex quo vel ructus, si flatu plenus fuerit, vel cibum expelli necesse est. Is vomitus est infantum, quibus minimus, & brevissimus, atque rotundus ventriculus pultibus & lacte obruitur. Est idem vomitus helluonum, quibus ventriculus vino onustus invertitur, quando id vinum in vappam ingrati saporis abiit. Eum vomitum Romani imitabantur, qui *emetica* agebant, tepida absorbta, quoties lautius se invitaverant, adque novas dapes stomachum volebant præparare.

Proxima causa, & pene eadem est, ventriculi in pyloro clausi: eaque causa fere perpetua est in iis hominibus, qui multis vel diebus vel annis cibum revomunt; his enim ventriculus scirrhusus (*a**) cis pylorum contractus (*a***), ulcere apertus (*a†*), pylorus arctus, cartilagineus (*a*), obstructus (*b*); fungus obstruens pylorum, laminatus, callosus (*c*); cartilagineus idem (*c**); scirrhus obsidens angustissimum pylorum (*d*)

N n 2 aut

(*t*) BRUNING *de singult.* Exp. 7.

(*u*) *Exper.* 6.

(*a**) Pugni mole RUYSCH *obs.* 39. Similia habent SIMSON p. 149. BLAS *obs.* 9. P. IV. GLISSON *ventr. intest.* LEMERY 1702. *hist.* I. & in casuario PARISINI.

(*a***) MORGAGN. *Sed. & caus.* II. *Epist.* 30.

(*a†*) ID. *ibid.* p. 16. Oræ callosæ foramen claudebant.

(*a*) BARRERE *nouv. obs.* p. 153. 157. Callosus DIONIS *mort. sub.* p. 125. BARTHOE. *Cent.* IV. *hist.* 77.

(*b*) BARRERE p. 147. *nov. Ed.* Sebacea materie infarctus SCHENK *exerc.* p. 321. gypsea ZOD. *hist.* I. m. Febr.

(*c*) RENAUME *quæst. med.* p. XV. *Journ. de Med.* 1756. Dec. Callosus pylorus MORGAGN. *Sed. caus.* II. p. 23.

(*c**) Ventriculus inflatus, pylorus cartilagineus, in eo glans plumbea BARRERE *nouv. obs.* p. 153. seqq. Pylorus crassissimus, cartilagineus, osseus, cum angusto aditu PETIT apud LATTERMAN *de vomitu.*

(*d*) FANTON. *Ep. ad MANGER* II. & *obs.* 14. add. HAEN *rat. med.* VI. p. 13. 14. DIONIS. p. 125.

aut similis clausio pylori a tumore ulceroso (*e*); aut glandulosum concrementum in principio duodeni (*f*): Scirrhus pylori (*g*) & membranæ ventriculi crassiores (*h*): & cavitas minima (*i*): aut pylorus, & duodeni & ventriculi pars crassa indurata (*k*): aut tumidum pancreas (*l*): aut steatoma comprimens (*m*): aut omentum (*n*) scirrhusum: aut tumores in cæco intestino bini, in quorum altero portio costæ ovillæ (*o*): colive scirrhus (*p*): aut volvulus intestini jejuni (*q*) aut cæci (*r*), aut coli (*r*^{*}): aut ilei futura (*r*^{**}) aut injectum vinculum (*s*): aut causæ mechanicæ intestinum obstruentes, ut glomer membranofus duorum pugnorum mole (*t*), globuli aurei deglutiti, alicubi per intestina latentes (*u*).

Ab

(*e*) LANGGUTH de tabe sicca lethali ex callosa pylori angustia. STÖRK ann. med. I. p. 155. HASSENÖHRL p. 60. Journ. des Sav 1695. n. 30. Add. ARNAULD des bern. p. 352. BARTHOL. Cent. IV. h. 47. Pylorus parvus cum ulcusculo MORGAGN. sed. caus. II. p. 426. Pylorus durus, crassus, parce apertus cum hepate steatomatoso STÖRK II. p. 360. Pylorus plenus tuberculis duris & congestis Giorn. Med. P. ORTESCHI I. p. 213. aut tuberculis sensilibus WILLIS Pharmac. Sect. II. c. 1. Tumor ad pylorum circularis cum foramine rotundo, in hepatis ulcus communicante ORTESCHI p. 160. Ventriculus durus versus pylorum arctatus & putridus MORGAGN. Sed. II. p. 13. A pylori scirrhus vomitus tertia quartave die PERRAULT de la sève p. 227.

(*f*) Comm. Acad. Bonon. T. II. P. I. p. 157.

(*g*) HARDER apiar. obs. 62. SALMUTH L. I. obs. 20.

(*h*) Journ. de med. 1759. M. Nov. Eff. of a Societ. at Edimb. T. II. n. 25. Add. RORDERER in progr. Phil. transf. n. 491. SCHMIEDEL pericard. &c. p. 21. 28.

(*i*) RORDERER, FANTON ad MANGET p. 200. vix fabæ capax. Phil. transf. n. 491.

(*k*) Journ. de med. 1757. m. Mars.

(*l*) DRIDIER physiol. p. 72. de hum. p. 60. MILITIA in morbi historia p. 74. BARRERE p. 51. 52. BORDEU recherc. sur les glandes p. 310. PANAROL. Pentec. n. 44. PETERMAN Dec. II. obs. 6. HAEN VI. p. 204.

(*m*) Eff. of a Societ. at Edimb. T. III. n. 26. RONCALL. PAROLIN. p. 171. cum glandulis pylorum & œsophagum comprimantibus.

(*n*) HAEN mir. morb. hist. RONCALLI PAROL. Europ. med. p. 171.

(*o*) Edimb. Eff. T. I. p. 244. Ed. 4.

(*p*) HILD. II. n. 86.

(*q*) STÖRK ann. Med. I. p. 264. Volvulus cæci in colon suscepti JENTY II. p. 63.

(*r*) JENTY cours. of anat II. p. 63.

(*r*^{*}) Ejus tumor, & contractio. Vomebat post triduum BOERHAAVE Præf. med. T. II. p. 224.

(*r*^{**}) Phil. transf. Vol. XLIX. P. I. p. 36. 37.

(*s*) SENAC. eff. de phys. p. 159.

(*t*) PUJATI obs. 1. eo egesto sanatus.

(*u*) LOSS. obs. 12. L. 3.

Ab his omnibus causis, quoties cibi in ventriculum aliqua copia descendit, ructus fœtidi (w), flatusve (x), & vomitus succedunt, etiam secunda hora (y) & quarta (y*); alias demum die secundo (z), tertio (z*), & quarto (a). In fele, ligato intestino vomitus superveniebat, quando spatium inter ventriculum & vinculum (b) nunc fœcum plenum erat.

Alias in pyloro quidem & in toto itinere nullus perpetuus obex est, & ventriculus tamen invertitur a nimia irritatione, quam vehementissima constrictio sequitur, ut a venenis variis, & a medicamentis emeticis, ab inflammatione ventriculi (c*), ab ejus ulcere (c), aut carcinomate (d), aut simili malo pylori (d*); aut herpete (e); a calculis biliaris (f); aliisve (g); aut materia tartarescente (h); a bile, qua ventriculus repleatur (i); a cibo inconcocto (k), ut ab adipe coacto (l); a cibo quocunque vehementer displicente, fœtido, fordido, putrido (m), ab absurdis deglutitis, ut a clavo (n); aut a globulo plumbeo, quo percussus homini ventriculus (o); ab avena in a ventriculo germinante (p); a vermi-

N n 3 bus

- (w) COLLINS p. 1151.
 (x) Qui ranam se in ventriculo putabat habere, ei erat scirrhus in pyloro PORTIUS.
 (y) DEIDIER *physiol.* p. 72. MORG. *sed. caus.* II. Ep. 30. (y*) MORG. l. c. II. p. 23.
 (z) BARRERE p. 160. (z*) p. 284. not (r*).
 (a) ID. p. 147. seq. PERRAULT *de la seve.* p. 227.
 (b) SENAC l. c.
 (c*) MORGAGN. *sed. caus.* II. Epist. 30.
 (c) HILD. *Cent.* III. obs. 20. COLLINS p. 338. SALMUTH l. obs. 43. DE-
 LIUS *amoen.* T. V. Pref. GHERET obs. C. II. n. 37. BARRERE p. 160. *Nov. Litt.*
Mar. Balth. 1704. p. 181.
 (d) *Phil. transf.* n. 472.
 (d*) MORGAGN. l. c.
 (e) PANAROL. *Pentec.* I. obs. 43.
 (f) HAHN p. 32. BIRCH T. III. p. 315. HOFMAN *medic. conf.* T. II. Dec. II.
 c. 10. TACCON *adfect. hep.* CHEYNE *diseas.* p. 189.
 (g) *Journ. des Sav.* 1690. GREW *anat. of plants* p. 253. ALEX. BENED. *Journ.*
de Trev. KOENIG in *lithogenes* p. 4. 5. 7.
 (h) PANAROL *Pentec.* I. obs. 23.
 (i) *Eff. of a Societ. at Edimb.* Ed. nov II. p. 384.
 (k) BERNER *de agro ruminante.* BENIVEN *abd. caus.* c. 36. Ab intestinis de-
 glutitis BERNERS *diet.* p. 189. ab ostreis ID. p. 251. ut die 14. revomerentur. A pi-
 scium copia nimia vomitus die septimo. VIRIDET *bon chyle* p. 601. A pedibus vitu-
 linis die nono BINNINGER l. obs. 77. A corio porcino post 2. annos Eph. Nat.
Cur. Dec. II. ann. 2. p. 179.
 (l) Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. obs. 154. HOFMAN *de remed. magn. abus.*
 (m) Solorum piscium MAZIN. *Med. mechan.* p. 65. Ab ovo putrido BERLIN, p. 28.
 (n) N. de la rep. des lettr. 1688. p. 852.
 (o) LOSS. L. III. obs. 13.
 (p) N. de la rep. des lettr. 1685. p. 995. A pisces retentis BERNERS.

bus (*q*): ab ossiculis fructuum horæorum (*r*): a pilis retentis (*r*^{*}): a putrida materie hepatis (*r*^{**}), aut mesenterii (*r*[†]), a materia nigra in ventriculum effluente (*s*): a nimio ventriculi sensu, post volvulum (*t*), & dysenteriam (*u*), post sumtum vitrum antimonii (*w*): ab eodem croso (*x*): quo refero vomitus a vinculo nervi octavi pari injecto (*y*): a nephritide (*y*^{*}): & quo possis vomitum a tepida (*z*) referre, sensile ostium sinistrum, & gulam titillante.

Denique ab irritatione ventriculi mechanica, a trahente hernia (*a*): a capite fetus ventriculum urgente (*a*^{*}): a cartilagine xiphoide introrsum curvata (*b*): a costa octava fracta (*c*): a devoratis squamis percae (*d*): a pluma devorata & in pyloro hærente (*e*): ab inmissa excutia ventriculi (*f*), aut pilis equinis (*g*): filove aspero (*h*): chordave musica ænea (*i*): aut spica fecalis (*i*^{*}).

Sed etiam subtiliores stimuli vomitum faciant, ut irritatio sympathica a vulnere

- (*q*) Journ. de med. 1758. Nov.
 (*r*) Phil. trans. n. 349.
 (*r*^{*}) BEHRENS dietet.
 (*r*^{**}) VIEUSSENS Obs. de med. pract. p. 416. 412. ORTESCHI giorn. I. p. 160.
 (*r*[†]) COITER p. 121.
 (*s*) SAND. absces. ventric.
 (*t*) MERRY Mém. de l'Acad. 1701. p. 286.
 (*u*) LOESEKE obs. p. 37.
 (*w*) BLANC. Jaarregist. I. Cent. I. n. 71. Eo refero vomitum perpetuum jure pullo-
 rum sanatum MARCELLI DONATI hist. p. 312.
 (*x*) VALISNER. T. III. p. 133.
 (*y*) BRUNN disp. p. 39. 40. Comm. Bonon. T. III. p. 285. 286. 287. 289.
 (*y*^{*}) BRAKEN ad HARTLEY p. 5. STORK ann. II. p. 256. 257. POUTEAU
 p. 470. Phil. trans. n. 207. Singultus a crusta gypsea vesicæ urinariæ perpetuus RAV-
 LIN. obs. de med. p. 210.
 (*z*) Etiam in experimento WEPFERI p. 250. 297.
 (*a*) HOFMAN de vomitu n. 38. VESAL. p. 603.
 (*a*^{*}) BURTON nov. system. p. 150.
 (*b*) Ea restituta sanatus vomitus la MOTTE obs. 375.
 (*c*) SCHMIEDEL de peric. p. 21.
 (*d*) RICHTER ichtbyol. p. 113.
 (*e*) PLANQUE bibl. T. III. p. 567.
 (*f*) BARTH. Cent. V. Hist. 26. PECHLIN. Cent. I. obs. 56. TRICHMEYER de
 excut. ventr. Est lamina spiralis, qua in ventriculum penicillus lanæ caprinæ introducitur.
 (*g*) BRUNING Exper. 1.
 (*h*) Id. Exper. 4.
 (*i*) Exper. 2.
 (*i*^{*}) K. Svenska Acad. Handl. 1759. p. 266.

nere cerebri; aut a spermate masculo in sanguinem recepto (*k*): veneno gangrænofo (*l*): & maligno miasmate, a quo miliares febres fiunt, & in quo vomitus fere mortem præcedit. Huc vapor putridus ventilatoris (*m*): huc etiam venenum viperæ (*n*): Oleum vitrioli in venas injectum (*o*): Aer ille subtilis montium altiorum (*p*); demum imaginatio rei indecoræ devorata. Hinc in tenero ventriculo ea sola retinebantur, quæ placebant (*q*). Hinc cornix cornicis carnem ingestam revomit (*r*), & polypus polypum (*r**) aut plantas.

§. XIV. *Consensus diaphragmatis. Et musculorum abdominis.*

Qui Cl. Viri priori potissimum seculo in vivis animalibus incidendis diligentissimi fuerunt, ii, cum vomitum specularerent, sæpe viderunt, ventriculum in ea violentissima actione (*a*) vix omnino moveri.

Porro *Franciscus* BAYLE (*b*) post propinatum emeticum digitum in ventriculum vivi animalis dedit, vixque motum percepit, & alibi adnotavit, aperto abdomine tolli vomitum, reddi confuto (*c*). Inde *Petrus* CHIRAC (*d*) exhibito emetico, vidit ventriculum vix, nisi debiliter, moveri, ut nullo modo ab imbecilli motu vomitus vehentissima symptomate expectares. Coram G. COLE (*e*) idem experimentum BACIACCUS, Genuensis, repetiit, ut ventriculus pressioni externæ unice obediret. Eamdem adnotationem nuperi Cl. Viri iteraverunt, ut in cane vivo irritatus ventriculus vomitum non faceret (*f*): inque vomente animale motus antiperistalticus
lenis

(*k*) MAURICEAU p. 129. &c.

(*l*) De FIEU *physiol.* p. 476.

(*m*) HALES *ventil.* II. p. 53.

(*n*) POUTEAU p. 155.

(*o*) BRUNNING *Exper.* 9.

(*p*) CAMPBELL *Voyag. a la mer. du sud.* p. 410.

(*q*) Haleces MERY *Mém.* 1701. p. 286.

(*r*) CHRYNE *infirm. valet. tuend.* p. 34.

(*r**) TREMBLEY p. 129.

(*a*) In cane WEPFER *de cicut.* p. 297.

(*b*) SENAC *Ess. de phys.* p. 116.

(*c*) *Corp. anim.* p. 348.

(*d*) *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. ann. 4. obs. 125. inde apud *TOURNEFORT Hist. des plant. aut. de Paris* Ed. 1700. in *præf.* & in *Hist. Acad. Scient.* p. 116. atque apud H. HAGUENOT de Ileo PURCELL. *of vapours* p. 47. fq.

(*e*) *De febr. intermitt.* p. 88.

(*f*) G. V. SWIFTEN *Comment.* T. II. p. 153.

lenis adpareret (*g*), aut fero certe superveniret (*b*): neque mea experimenta recedunt (*i*).

Proximum fuit, ut aliam causam vomitus viderent, siquidem ad eam violentiam ventriculus non sufficebat. In lupa ergo (*k*) ILL. WEPFERUS abdomen vehementer vidit contrahi, & tunc potissimum vomitum sequi, quando ea vis accedebat (*l*). Etiam diaphragmatis tensiones & relaxationes celerrime se insequi (*m*); & in cane concussiones septi non quidem inertem ventriculum alternis succussionibus adjuvasse (*n*): denum diserte, quiescente fere ventriculo, diaphragma & musculos abdominis vomitus esse causas (*o*): quæ eadem P. CHIRACI fuit opinio & sequacium (*p*). Etiam in homine ex vomitu vehementissimo, cum convulsione nervorum mortuo, abdominis muscoli violenter contracti (*q*) visi sunt. Ita in nuperis exemplis Cl. SCHWARZIUS discissis quidem musculis abdominis, premente ventriculum manu, vomitum cieri (*s*): cæteram in ea actione ventriculum a septo transverso costisque comprimi (*t*), tum nudum ventriculum, tum per insidens hepar (*u*); laxari vero septi transversi appendices, quæ solebant oesophagum adstringere; & id ostium aperiri (*w*), idque fieri ab adductis costis, dum una descendens septum (*x*) ventriculum comprimit, & mire durefcit; atque brevi

(*g*) AINSLIE de vomitu idiopath. p. 15. SCHULZE de Emesi Exp. 2.

(*b*) SCHWARZ n. 23.

(*i*) Exper. 304. 227. a sublimato argento vivo: Exp. 319. ab arsenico.

(*k*) p. 160. 161. 178. SCHWARZ n. 11. Stringitur inmissus in vulnus abdominis digitus de MAN de natur. human. p. 21-22.

(*l*) p. 161.

(*m*) p. 178. 250.

(*n*) p. 250.

(*o*) p. 297.

(*p*) Ad musculos abdominis vomitum refert PETIT Mém. de Chir. T. II. p. 100. DUVERNEY Hist. de l'Acad. 1700. p. 28. Ad diaphragma descendens solum PURCEL. Ad utrumque CHIRAC du HAMEL p. 338.

(*q*) S ANDRE phil. transf. n. 351.

(*s*) SCHWARTZ n. 11. SCHULZE l. c. Exper. 3. 2. Adde de equo LAMORIERE Mém. de 1733. p. 515.

(*t*) n. 11. & c.

(*u*) p. 118. & PURCEL. l. c.

(*w*) SCHWARZ n. 10. Laxari certe in vomitu & apertum esse SCHULZ. Exp. 2. Sed laxatur etiam in vomentis ventriculo exciso WEPFER p. 221.

(*x*) SCHWARZ n. 9. 10. SCHULZE Exp. 2.

brevius [*y*], & concutitur, donec succedat vomitus [*z*]. Etiam contractis cruribus diaphragmatis, in ventriculo vomitus successit [*a*]. Una musculi abdominis ad interiora accedunt, & ventriculum comprimunt [*b*]. Quare in remissione ab inspiratione vomitus fit, non proprie in expiratione [*c*].

Difficiliter sæpe vomitus sequitur, ob gulæ ostium vehementer clausum [*d*].

Nunc si vomenti homini adstiteris, facile videbis, partitas ventriculi & instrumenti respirationis vices esse. In ventriculo enim fomes mali est, inde nausea, anxietas, sensus tristis, ad deliquium accedens animi, vires resolvens, cum pallore faciei pulsuque parvo & debili [*e*], omnino in ventriculo, & in nervis a ventriculo in consensum actis suam sedem habent.

Deinde, insurgente nunc organo respiratorio, nixum videas cum omnibus suis signis, inspiratione [*f*] vehemente : sanguine in caput congesto [*g*], dolore capitis [*h*], livida facie, calore frontis, ruptisque non raro vasis, vinculisque venarum [*i*], sudore tamquam in maximo labore fluente. Ut non alio remedio Angli frequentius ad omne languoris genus, & ad solvendas abdominis obstructions utantur [*k*]. Sed etiam effectus vomitus majores sunt, quam quos ventriculo tribuas. Ruptus est inde oesophagus [*l*] : ventriculus per foramen septi transversu in thoracem adactus.

Sed

[*y*] SCHWARZ n. 9.

[*z*] SCHULZ *Exp.* 2. SCHWARZ n. 9. 10.

[*a*] *Id.* *Exp.* 3.

[*b*] SCHULZE *Exp.* 2.

[*c*] VIEUSSENS *tr. des liqueurs* p. 263. ut DEIDIER *anat. rais.* p. 344. LIEUTAUD l. c. p. 230.

[*d*] SCHWARZE n. 11. SCHULZE *Exp.* 1. add. WEPFER p. 177. 195. 250.

[*e*] ROBINSON *food and discharg.* & in effect of medicines.

[*f*] Venam cavam stringi, & sanguinem stagnare SCHWARZ n. 15.

[*g*] G. V SWIETEN T. III. p. 266. Rubri oculi *Id.* l. p. 185.

[*h*] SYLVA p. 146. 147.

[*i*] WOODWARD *cases* p. 22.

[*k*] ROBINSON *of food and discharg* p. 115.

[*l*] BOERHAAVE *morb. atrox.* l.

Sed etiam inter argumenta causæ potest referri, quod animalia robustis organis respirationis destituta, eadem vomere nequeant [*m*].

Evidentissimum ergo videtur, vomitus quidem causam esse in ventriculo, eumque in contractionem niti propriis viribus, atque aliquando vomitum perficere [*m*^{*}]. Plerumque tamen [*n*] irritationem in ventriculo natam, & sensum summæ anxietatis [*o*], quæ vomitum præcedunt, facere ut ad levandam ægrimoniam vires diaphragmatis & musculorum abdominis excitatæ, atque molestiam de homine amolituræ, vomitum perficiant. Unde neque a sola voluntate in plerisque certe mortalibus vomitus cieri potest, neque a sola absque voluntate natura.

Quare recte conjunctas vires ventriculi & organorum respirationis Cl. Viri fecerunt [*p*]. Et videtur diaphragma & abdomen plus virium habere, quando ventriculus aut cibis repletus est, aut clausis ostiis distentus: Tunc enim magis ad perpendiculum proximum ventriculum comprimunt, & tota contingunt.

Qui has vires a vomitu faciendo removent [*q*], atque negant earum actionem in vomendo percipi [*r*] non videntur symptomata vomitus omnia esse contemplati.

Qui ventriculi negarunt [*s*] aliquas esse in vomendo partes, eos oportebat memores [*t*] esse experimentorum WEPFERI, & simplicissimi argumenti, vomitum nempe omnem voluntarium futurum, si a solis viribus respirationis cieretur.

Nunc quidem in avibus & piscibus utique vomitus a voluntate pendet.

Aves cibo de ingluvie regurgitante [*u*] pullos suos alunt, & ex imprimis, quæ sunt carnivoræ, & tenui atque membranaceo ventriculo, vomunt facillime [*w*]. Aluco [*x*] major mures deglutit, & semicoctos re-

vomit

[*m*] p. 291.

[*m*^{*}] Cum ventriculus totus peritonæo adnatus esset, ut contrahi non posset, nullus vomitus de HAEN *rat. med.* VI. p. 15.

[*n*] p. 289. & de cane SCHWARZ n. 14.

[*o*] BARRERE p. 157. &c.

[*p*] SCHWARZ n. 12. De MAN *de natur.* n. 21. 22.

[*q*] LIEUTAUD n. 226. VIEUSSENS l. c. SCHELHAMMER *analect.*

[*r*] p. 229.

[*s*] BAYLE, CHIRACUS, PURCEL. *of vap.* p. 47.

[*t*] Conf. MORGENBESSER *de vomitu* p. 50.

[*u*] HARVEI *gener. anim.* p. 21. DUVERNEY II. p. 449. CHARLTON *of nutrit.* p. 36. Columbae pisa emollita pullis reddunt VIRIDET *bon Chyle* p. 75.

[*w*] MORTON *Natur. Hist. of Northamptonsh.* p. 355. REAUMUR *Mém. de 1752.* p. 463.

[*x*] RSASCZYNSKI II. p. 355.

vomit, & aves rapaces vulgo pilulas [y] rejiciunt, ex ossibus & sordibus deglutitis factis. Demum ex granivoris, anseres bassani cibos pro luitu revomunt [z]. Sed & Psittacus utcunque ruminat, & regurgitantem cibum secundo deglutit [a]. Urogallus betulæ fructibus ingluviem replet, iisque per hiemen eructatis famem solatur [b]; eosque lente & commode digerit.

Piscium idem est privilegium: nam aselli [c] [Morue] revoluto ventriculo, quæ displicent, possunt revomere, ut etiam hamo deglutito se liberent [d]. Sic etiam lucius [e] piscis deglutitos bufones revomit. Qui pisces testaceis vivunt, ii, quando nunc apertæ hospes animal dimiserunt, testas inutiles evomunt [f]. Demum etiam vespæ cibo de ore reddito pullos alunt [g]. Neque polypo alia via est, qua ventriculum inaniat [h].

Inter quadrupeda canes & feles facillime vomunt [i], ut etiam ideo venenis melius resistent: & canem catulum suum de suo ex ventriculo regesto cibo aluisse HARVEIUS auctor exstat [k].

Alia animalia, & potissimum boves & equi [l], non vomunt; illi, qui facillime ruminant, non vomunt ob musculos obliquos abdominis latissime discedentes [m], hinc minorem ventriculi compressionem: hi, ut creditur, & ob oesophagi angustiam [n] & gulæ obliquam inflectionem, quæ ureteris ingressui sit similis, & per quam pressa etiam ventriculo aqua non exeat [o]: & ob musculorum abdominis atque diaphragmatis debili-

O O 2

tatem

[y] *Hist. des anim.* T. III. p. 351.

[z] GREW *mus.* p. 11.

[a] PERRAULT *Ess.* T. III. p. 213.

[b] OLAUS M.

[c] DENIS. *Amer. septentr.* T. I. p. 32. ZORGDRAGER p. 452.

[d] ANDERSON *Grönland* p. 90.

[e] *Hist. natur. des poiss.* T. II. P. I. p. 279.

[f] *Nouv. obs. sur l'osteol.* p. 23.

[g] REAUMUR *Mém. de l'Acad.* 1715. p. 257.

[h] *Phil. transf.* n. 469. BAKER p. 107. 108. TREMBLEY p. 116.

[i] SEVERIN. *vip. pyth.* p. 466.

[k] L. C.

[l] SOLEYSEL. *Mém. des savans étrang.* T. III. p. 416. 417. LAMORIERE l. c. BERTIN: *Mém. de 1746.* p. 44. seqq.

[m] SAUVAG. *malad. des boeufs* p. 20.

[n] BERTIN. *Mém. de 1746.* p. 48.

[o] BERTIN. l. c.

tatem [p]. Ne vino quidem emetico [q] equi ad vomitum cogi queunt, etsi alii Cl. viri volunt, cum tussi tamen equos vomere [r]. Verum experimenta nuper Lugduni in schola hippiatrica facta utique Ber- tiniana illa placita confirmant.

Homo non potest voluntate sua vomitum ciere, sed irritatione eget. Legimus equidem exempla aliqua [s], etiam bibonis melitenfis, qui varie co- lorato vino, ad imperium adstantium, scyphos de ore suo repleret: sed id forte fuit fraudis genus [t].

Id facilius dederim, homines esse, quibus facile cibi regurgitent [u], ut sapore integro, & incorrupto in os redeant, & non absque ali- qua voluptate ruminari [w] possint. Sunt etiam, qui cum cibos non manducarent, altera die in os regurgitantes coguntur [x] ruminare. Et sunt alioquin, qui omnia facillime revomunt. [y].

§. XV. Ruminatio.

Possis urogallorum morem huc referre, qui receptos in ingluviem be- tulæ fructus hieme eructant, iisdemque aluntur; ut nuper diximus. Vera tamen ruminatio est in animalibus cornigeris, quibus quatuor sunt ventri- culi. His oesophagus quidem in primum [a] ventriculum aperitur, ci- bumque in eum & in secundum [b] dimittit, qui prioris est quædam quasi appendix [c].

Sed

[p] LAMORIERE *Mém. de l'Acad.* 1733. p. 515.

[q] DEM *ibid*

[r] DELIUS *Fränk Anmerk.* I. p. 472. 473. II. p. 14. V. p. 64. 65. 66.

[s] BORELL *Cent II obs* 8

[t] BARTHOL. *Hist.* 39 *Cent I.* BINNINGER. SANDRIS *de ventr.* p. 299. *Munit. fund. plemp.* p. 202 & TOWER p. 75. seqq.

[u] SALMUTH I. n. 00. H. V. HEERS *obs.* p. 250. WELSCH *episagm. obs.* 37 FABRIC *de gula* p. 136 RHOD *Cent II obs* 59 *Phil. transf.* n. 193 BARTHOL. *Cent V. Hist* 16. KYPER in BEANC. *Jaarreg. Cent. V* n. 38. PEYER *Merycol.* p. 70. 71. & 122

[w] *Phil. transf* n. 193. KYPER & priores, ut WEPFER in *merycol.* PEYER p. 274.

[x] BENNER *de agro ruminante* ob densiorem defectum.

[y] HEERS p. 250. *Journ. de Med.* 1756. Decemb. CARDAN. *variet.* p. 295.

[a] DUVERNEY *posthum.* p. 439. PEYER *merycol.* p. 129. 130.

[b] PEYER p. 124

[c] FABRIC. *variet. ventr.* p. 122. BUFFON T. IV. p. 461. 485.

Sed ab eo altero ventriculo perangustum est iter ad tertium [d], & eminentia quadam alterius ventriculi obstruitur [e]. Quare ex iisdem causis [f], fluida pars quidem iter suum urget. Cum vero id, quod siccam est, exitum reperiatur difficilem, cibis forti vi ventriculi primi, insigniter musculosi [g], aque secundi simulibus viribus [h], per oesophagum expellitur, inque os redit, quasi naturali vomitu [i]. In ore secundo manducatur, & iterum deglutitur, inque primum & secundum ventriculum redit, in utroque macerandus. Et secundo eructatur, atque iterum tertia vice deglutitur quantaque: & quantum sufficit, in humore multo [k] maceratur, quoad totus nunc mollis fit, inque pastam abierit, cum plurimo succo gastrico subactus, possitque per angustum iter in tertium ventriculum venire [l]; in quo, succi sui parte aut per reformationem orbatus, aut per transitum in quartum ventriculum exhaustus, multo magis nunc exsuccus reperitur [m], crassior certe pasta & cataplasmati pene sicco similior. In eo vero tertio ventriculo folia, proprio motu [n] agitata, conterunt porro cibum & triturant, & in quartum mandant, amplum, humani similem, etiam intus eminentibus laminis interruptum. In eo quarto ventriculo porro ob angustum [o] pylorum retentus, glanduloso [p] succo mistus, perfectius fervet [q], mollisque redditur, & pultaceus, mollior quam in primo, viridis tamen [r]. Inde per pylorum angustiore tunc demum exit, quando optime coctus est: adjuvant enim ciborum coctionem in his ani-

O o 3 mali-

- [d] DUVERNEY l.c. II. p. 441. BUFFON ibid.
 [e] PEYER p. 123.
 [f] D. 279 280
 [g] DUVERNEY T. II. p. 434. 440. PEYER p. 112. 116. 185. ic. 2. 3.
 [h] Id. p. 124. ic. 5.
 [i] DUVERNEY II. p. 439.
 [k] PEYER p. 126. 182.
 [l] DUVERNEY II. p. 441.
 [m] PEYER p. 183.
 [n] DUVERNEY II. p. 437. PEYER *merycol.* p. 139.
 [o] VIEUSSENS *des liq.* p. 274. 275. sphinctere munitum PEYER p. 145.
 [p] PEYER p. 146.
 [q] Id. ibid.
 [r] PEYER p. 184. HELVET. *Mém.* 1719 p. 345
 [s] VIEUSSENS p. 272. 274. In primo ventriculo quatuor facos habet, munitos sphincteribus p. 272. Etiam inter secundum & tertium curvionis ventriculum valvula anularis & iter angustum. TYSON p. 21.

malibus sphincteres, qui ubique ventriculorum ostia ambeunt, & arctant irritati [s].

Miram interim pro potu fabricam natura paravit: Sulcus nempe [u], ab oesophago in tertium ventriculum ducit, qui aut apertus, aquam in primum & secundum ventriculum dimittere potest [w], aut vicissim clausus & adstrictus in tertium [x] defert. Ne ergo ficcus in tertio ventriculo cibus [y], ad iter in quartum ineptus sit, potus [z], quoties primus ventriculus, & secundus plenus est, per id nunc perfectum incile in ventriculum tertium defertur. Lac etiam [a] & quicquid fluidius est, ea breviori via pergit ad quartum ventriculum. Hinc lactentibus agnis priores ventriculi pene vacui, quartus plenissimus [b]; ad eum enim lac properat. Hæc singularis fabrica videtur solis deberi iis animalibus, quæ ficcis stipitibus herbarum aluntur, duris, longisque; neque eas tamen ob dentium incisorum superiorum defectum satis diligenter possunt manducare: præterea multivoris, homo enim, uti ostendimus [b*], parte sui ponderis quadragesima in diem alitur, vacca parte sexta. Ut adeo ii ficci, duri, multique cibi solvi queant hætenus, multa vis tritus & repetitæ manducationis, & agitantia cibum folia & muci, atque salivæ, humorisque gastrici multiplex admistio, videntur esse subsidio. Equo perangustus ventriculus minus ruminatione indiget [c], qui celerissime se in duodenum depleat [d].

Si vere lepus ruminat [e], simplici, unico sulco diviso ventriculo [f]: si mus ponticus [g]: si pisces [h] aliqui, solusve scarus [i]: si inter insecta

[u] DUVERNEY II. p. 438. 443. PERRAULT *Ess. de Phys.* T. III. p. 211. 213. t. 13. f. 2. PEYER p. 127. Etiam in huanaco FEUILLET *suite du Journal de son voyage au Pérou.*

[w] DUVERNEY II. p. 443.

[x] Ibid. p. 443. PERRAULT, PEYER.

[y] PEYER p. 83.

[z] PERRAULT p. 214. PEYER p. 12. &c.

[a] FABER ad HERNANDEZ p. 623.

[b] CHARLETON *Inquir.* p. 43.

[b*] p. 200. 201.

[c] BUFFON T. IV. p. 315. DERHAM *Phys. Theol.* p. 200. BERTIN. *Mém. de l'Acad.* 1746. p. 27.

[d] Equus eadem bibit 12., & est ventriculo 8. vel 10. pintarum capaci. Necessè est ergo partem potus continuo effluere BERTIN. l. c. p. 27.

[e] PEYER *Merycol.* HARDER *exercit.* p. 67.

[f] PEYER ic. XI.

[g] ARISTOT. *hist. anim.* L. IX. c. 50.

[h] Id. ibid.

[i] Id. L. II. c. 14. PLIN. L. IX. c. 17. ÆLIAN. *anim.* L. I. c. 53. OPPIAN. L. II.

secta locusta [*k*] & gryllotalpa [*l*], credas, ea animalia ruminare, quibus plures sint ventriculi cellulæ, distinctæ fretis [*m*], a quibus cibibus, dum durior est, repellatur; quibus præterea ventriculus robustissimis fibris [*n*], instructus sit, quæ solæ, absque diaphragmatis, aut abdominis auxilio, cibum sursum agere valeant. Qui homines ruminasse dicuntur, iis oesophagus [*o*] (& puto ventriculus), musculi modo carnosus dicitur fuisse.

Num voluntarius motus sit [*p*], quæri possit, homini certe in ventriculum nullum arbitrium est.

§. XVI. *Calor.*

Primum quod intus ventriculo se circumfundit, calor est vicinorum viscerum. Cor nempe diaphragmati insidet [*a*], idhepati, & ipsi, qua hepar nullum est, ventriculo. Hepar [*b*] ipsum sanguine plenissimum, calet pro ratione rubri cruoris. Sic lien [*c*], non grandis, totus tamen sanguineus. Sed etiam aorta [*d*] inter duo ventriculi ostia descendit, maximus nempe sanguinis alveus. Hæc omnia, ut possint in cadavere remota videri, in vivo tamen homine, dum peritonæum integrum est, omnia sunt vicinissima. Calor ergo in ventriculo idem est, qui in humano sanguine [*e*] circa 96. [*f*] gradus Fahr., etsi in vivo animale inciso, inserto thermometro, minorem, & vix 90. [*g*] grad. reperi. Aer nempe admissus, & dimotorum viscerum secessus, continuo nativum calorem temperant.

Ita, in homine, quadrupedibus, avibus, piscibus cetaceis. Nam frigidis aut piscibus, aut quadrupedibus & serpentibus non magis ventriculus

[*k*] SWAMMERDAM *bloedelooze dierties* p. 33.

[*l*] PEYER C. 7. WELSCHE *becatoft. obs.* I. n. 26. PERRAULT p. 213.

[*m*] In Gryllotalpa PERRAULT t. 13. f. 3.

[*n*] GREW *of the guts* p. 25.

[*o*] BARTHOLIN. *Cent. V. hist.* 16. *anat. reform.* p. 67. RHOD *obs.* 59. *Cent. II.*

[*p*] RAI *Wisdom.* 275.

[*a*] EUSTACH. t. 9.

[*b*] Id. *ibid.*

[*c*] p. 118.

[*d*] p. 159.

[*e*] Idem qui in corde WEPFER *cicut.* p. 199.

[*f*] L. V. p. 35.

[*g*] Ad 88. gr. in parva fele vid. *Comm.* T. I. p. .

culus calet, quam reliquus sanguis; paulum nempe supra atmosphæræ gradum [*b*].

§. XVII. *Aer.*

Diversis modis aer in ventriculum venit, non inspirando quidem, quo tempore & œsophagus adstringitur, & aspera arteria distenta gulam comprimit [*a*]. Sed omnino aere per os inter deglutiendum recepto, uti aquam, qui submerguntur, deglutiunt [*b*]; & uti fæces alvinæ metallariorum a fumo incensi plumbi, deglutito lithargyrio [*c*] obducuntur. Pestis etiam miasmata ex aere per ventriculum adveniunt [*d*]. Sed etiam dum manducamus, aerem in cibum admiscemus. Denique in cibus omnibus, inque potu, plurimus est aer [*e*]. Columbæ aerem in ingluviem ducunt, & aer ex inflata aspera arteria in eam subit [*f*]. In piscibus [*g*] vesicula aerea, natationi præfecta, in œsophagum aperitur, ut in lucio [*h*], siluro [*i*], acipensere [*k*], hufone [*l*]. Insectis aerea vasa numerosa ventriculum adeunt, in ape [*m*], papilione [*n*], aliisque omnibus.

Is nunc aer in ventriculo vi sua elastica potissimum operatur, calido enim, & pene clauso, loco atmosphæricus quidem aer rarefit [*o*], & viscidas bullas, in quibus inclusus est, diffingit [*p*], materiamque solidam, quæ cellulas circa foramina aere plena facit, dimovet, & diducit, frangitque, cellulofamque telam, ex qua maxima pars solidi cibi constat [*q*], minimis factam cavernulis, in spongiæ perpetuo latefcentis speciem

[*b*] L. V. p. 37.

[*a*] SCHREIBER *almagest.* p. 306.

[*b*] L. XVIII. p. 87. &c.

[*c*] ILSERMAN *Colic. Saturn.*

[*d*] SCHREIBER *de peste* conf. 13. seq.

[*e*] L. VIII. p. 182 183 186.

[*f*] PERRAULT *Eff.* T. III. p. 181.

[*g*] NEEDHAM *form. fet.* p. 157. tab. 7. tot.

[*h*] BLAS *anim.*

[*i*] In stomachum du HAMEL p. 67.

[*k*] GREW *mus.* p. 7.

[*l*] MARSIGLI *Danub.* T. VI. tab. II. *misc. obs.*

[*m*] SWAMMERDAM *bibl.* p. 407.

[*n*] p. 575.

[*o*] L. VIII. p. 205.

[*p*] Conf BOERHAAVE *Elem. Chem.* T. II. p. 178.

[*q*] L. I. p. 21.

ciem expandit, demumque divulsis fibris; quæ per gluten cohærebant, dissolvit omnia [r].

Idem aer in fluidis corporibus omnis fermentationis auctor est, ut absque eo nulla [s] oriri, eo subtracto nulla invalescere possit. In potu ergo vinoso, in succis acrescentibus vegetabilis originis, in lacte, aer atmosphæricus motum proprium ciet, qui in horas invalescens calorem generat [t], spumamque, & spirituosum acerrimum halitum explodit [u], & demum partes crassas, tenerasque a fluidis separatas dejicit [w].

Sed etiam putrefactio ab aere pendet [x], quo excluso, per innumeraabilia *Roberti BOYLE* [y] experimenta, uti maxime fermentescibiles liquores, ita putredinosi, per integros annos & ætates conservantur. Aer ergo, in carnibus comestis, & ventriculo mandatis, aliud genus motus excitat, surdum magis, neque perinde streperum, sed potentissimum, quod sensim invalescens [z], omnium certissime omnia vincula resolvit, quibus fibrarum elementa continentur. Sola putredo plantarum stamina, ligni durissimas fibras, carniū telas, omni sublata duritate, in pulvis speciem diluit [a]. Ipsa ossa ab ejus lenta vi in pollinem dilabuntur [a*].

Sed ea non solius aeris atmosphærici efficacia fiunt. Unitur aeris interni [b] elater, qui fixus prius & iners, nunc per putredinem restituitur [c], ex corporum cavernulis erumpit; confluit in bullas; natatilia facit quæ mergebantur; omnes suos carceres frangit; omnes cellularum parietes in tabum liquefacit [d]. Fermentatio perinde aerem internum expedit [e].

Ab

[r] VARIGNON. *anc. mem.* T. II. p. 234.

[s] BOERHAAVE T. II. p. 186.

[t] Graduum 75. BOERHAAVE T. II p. 293.

[u] BOERHAAVE p. 178. 180. seq.

[w] BOERHAAVE *ibid.* p. 179.

[x] BOERHAAVE *ibid.* p. 292.

[y] *In cont. exp. phys. mecb. de aere.*

[z] BOERHAAVE p. 289.

[a] p. 290.

[b] L. V. p. 89. KNIGHT, p. 19. Putredo ab aere interno *Mém. de l'Acad. de Chir.* T. I. p. 38.

[c] L. VIII. p. 185.

[d] p. 291. 292. L. V. p. 89. Conf. KNIGHT *vindicat.* p. 6. 7. HAMBERGER *Physic. &c.*

[e] L. VIII. l. c. HALLER *vegetabl. stat.* c. VI.

Ab utroque aere se expandente ventriculus pariter expanditur, ut etiam per cutem tumeat [*f*] magis, quam pro ciborum mole: idemque multo cum murmure luctatus, quando spatia nactus est libera, ructus specie erumpit [*g*], aut ad intestina transit.

In animalibus [*b*] non rarum est, ventriculum nimis inflatum crepuisse, nisi vel subito gramina effervescentia bubulcus [*i*] de ventriculo eripuerit, aut cultro aperuerit eundem [*k*].

In homine aer ventriculum expandens dolorem facit, & irritationem; hinc ejus ostia constringit, & magis atque magis clausum receptaculum distendit. Minus tamen periculi est, quam possit videri. Vires enim ad flectendas fibras requisitæ sunt, ut sagittarum quadrata, & a pondere quadruplo fibra tantum duplo plus flectitur, a pondere (sive vi distendente) noncuplo tantum triplo [*l*]. Et tamen ostendimus crepuisse ventriculum, & in cadavere [*m*], & in vivo [*n*]. Plerumque tamen ipsa irritatio nimia & dolor vires [*o*] socias musculorum abdominis & diaphragmatis in motum ciet, & ventriculum liberat.

Finis fit per debilitatem, quæ ostia resolvit, per dissolutionem cibi viscerum, ut per pylorum transire aptus sit: demum quod fermentatio aeris, quem generat, partem absorberi faciat [*p*]; resumtum in humorem, qui de ventriculo inhalat.

Distentus ventriculus multo majorem spatii abdominalis portionem sibi sumit, quare omnino vesiculam fellis [*q*] comprimit, & exinanit, etsi eam non absque medio contingit [*r*].

Hinc

[*f*] COWPER *Phil. transf.* n. 220.

[*g*] Etiam per vulnera *Phil. transf.* n. 176.

[*b*] In equis GISSON p. 277. Hippopotamus ex lupinis inflatus perit HASSELQUIST p. 202. Vacca ex trifolii abusu *Corps d'observ. de Rennes.* vid. p. 201.

[*i*] WEDDIE apud PEYER *Merycol.* p. 275.

[*k*] CHESLTON p. 160. 161.

[*l*] SAUVAGES *Physiol.* n. 55.

[*m*] In cane p. 275. & 201.

[*n*] Ibid.

[*o*] Ex cerevisia effervescente *Phil. transf.* n. 351. ex. pisces ANDRY *alim. du Caren.* p. 106. 107. etiam columbæ suffocantur a piscibus in ingluviem tumescentibus *Compar. anat.* p. 95.

[*p*] HALLER 1 c. p. 272.

[*q*] COWPER *introd.*

[*r*] p. 121.

Hinc in famelicis [s], hydrophobis [t], morbo maligno extinctis [u] in aliis, quibus ventriculus inanis est [w], inque animalibus morbosus [x] & cibo abstinentibus [y], vesicula fellis maxima esse solet & turgidissima.

Sed etiam pancreas, ab eodem tumente ventriculo potest comprimi [z]., ut ejus liquor acceleretur: tum hepar; ut omnino bilis copiosus adfluat, quo plenior est ventriculus [a].

Memini mihi *Κακωστροφας*, ut paulum ventriculus mihi tumebat, pressis renibus, secretionem urinæ fuisse impeditam, ut diu nihil, deinde remisso paulum flatu, tenuis tandem & limpida aqua decederet.

Lienem etiam ventriculus distentus comprimit & inanit [b]. Cum maximo ventriculo lien minimus [c].

De aortæ pressione alias diximus [d].

Hæc omnia majora fiunt ex nimia aeris copia & distentione nimia: In sano & sobrio homine aer quidem expeditur, non tamen ut ructus faciat, non ut ventriculi nimius sit tumor, non ut doleat. Semper tamen etiam per cutem ventriculus repletus tumet. Vesiculam & lienem non potest non comprimere.

P p 2

Eo

[s] p. 307.

[t] SCHURIG p. 382. DARLUE in *Journ. de Med.* T. III. n. 3.

[u] In peste SCHREIBER *obs.* 12. p. 18. *Recueil sur la peste* p. 201. 278. 264. 398. 402. 539. P. a CASTRO p. 10. In dysenteria BARTHOI. *Hist* 18. Cent. III. SPIGEL e. 238. In ventriculi inflammatione MORG. *sed. caus. morb.* II. *Epist.* 30. In febre ardente LIEUTAUD *precis* p. 30: In febre flava Americanorum *Ess. of a Societ. at Edimb.* II. p. 384: In tertiana maligna CLEGGHORNE *Minorca* p. 165. : In febre maligna *Journ. de méd.* 1755. In morbo epidemico Pisano MALPIG. *postb.* In morbo convulsivo ex clavato fe- cali nato WOLLNER *disp.* LONGOLIUS apud BERGER.

[w] A veneno HILD. Cent. IV. *obs.* 51. 79. In experimentis WEPFERT, in lupa *cicut. aquat.* p. 162. lupo p. 180. fele p. 242. cuniculo brasiliiano p. 236. a cicuta etiam data HARDER *apiar. obs.* 25. & in cane a vipera occiso *obs.* 23.

[x] In morbo armentorum Bresl. *Saml.* 1724. M. Mart. MORG. *sed. caus. morb.* II. p. 442. *Giornal. de Lettr. d'Ital.* T. X. p. 72. *Galer min.* VII. p. 120. GORLIKE *de lue contagiosa bovm.* SAUVAGES *Mém.* p. 16. HERBSTREIT *Progr. ad SILVERSTEIN, PLAN- QUE Bibl.* T. III. *Phil. transf.* n. 356. HILD. p. 26. LANGGUTH *de morbo bovm.* RAU- DOT. p. 22. BUCHWALD *script. Soc. Dan.* II. p. 393. *Fränk. Anmerk.* II. p. 115.

[y] Post inedia CARON. *Zod. Med. Gall.* T. IV. ann 4. M. Febr. RIOLANUS p. 125. GIERING. *Act. Francofort.* III. p. 379. MORG. *sed. & morb.* II. p. 15. BORREL *mot anim.* II. *Prop.* 147.

[z] COWPER I. c. conf. p. 118. 121.

[a] LIEUTAUD *Ess.* p. 314. *Physiol.* p. 146.

[b] La SONE *Mém. de l'Acad.* 1754 p. 193.

[c] LIEUTAUD *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 231.

[d] L. XVII. p. 601.

Eo magis extendi, quo minus in fibris carneis roboris est, quod refi-
flat, sponte intelligitur. Ructuosi hypochondriaci, & feminæ hystericae [e],
quibus fibræ omnes & peculiariter, in ventriculo debiles sint.

§. XVIII. Vapor.

Per poros illos inorganicos, quos a ventriculo ostendimus non ab-
esse [a], vapor & de ventriculo exhalat, & vicissim videtur in ven-
triculum recipi. Exhalare ventriculum nondubium est, vel ex odoris fide
& ex bilis exemplo. Penetrare in ventriculum eodem argumento bilis,
per coli & duodeni membranas penetrantis, credas constare. Est autem is
vapor de proximo, & per totam longitudinem ventriculo subtenso trans-
verso colo: est de universo abdomine, omnibusque intestinis, & reli-
quis visceribus, quæ omnia subfætidum, subalcalinum, sub patrem, &
penetrabilem vaporem exhalant.

§. XIX. Saliva.. Mucus.

Saliva omnis in ventriculum venit, sive solam homo deglutiat, sive
cibo suo per manducationem immiscuerit. Ejus neque dotes repetimus [a]
neque copiam [b]. Non exiguam esse manifestum est, & in omni ani-
mali constantem, etiam insectis [c].

Mucus in ventriculo multus de glandulis nascitur, deglutitur etiam ex
oesophago [d], de faucibus & de ore. Ab acris ingestis videtur
uberius generari. Ab aqua stillatitia laurocerasi [e], in canis ventriculum
intusa, ventriculus mucosus coagulato plenissimus repertus est. Sic in hydro-
phobico [f], cui ab irritatione ostium ventriculi valde contractum fuit.
In vomitu mucus perpetuo, & magna copia rejicitur. In febribus inter-
mitten-

[e] BARTHOL. Cent. III. hist. 21.

[a] p. 162. seqq.

[a] p. 50. seqq.

[b] p. 58. seqq.

[c] Cochleæ duo ductus salivales in ventriculum aperiuntur SWAMMERDAM bibl. p. 124.

[d] WEFFER Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs. 251.

[e] B. LANGRISH physical. exper. upon brutes Exp. I.

[f] DARLUE l. c.

mittentibus pro causa mali eum mucum habuit TALBORUS [g], utilissimi corticum propagator.

§. XX. *Succus gastricus.*

Naturam succi gastrici, quantum licuit, exposuimus [a]. Copiam accurate non possumus definire. Putes insignem esse, si amplitudinem organi, si arteriarum gastroepiploicarum [b] de utraque classe, & coronariorum [c] de utraque pariter classe, numerum, & lumina cum arteriis salivalibus comparaveris, quarum tanto minores arteriæ, tot uncias humoris læcernunt; si demum memor fueris, quam difficulter aqua, aut humor alius quicunque, in arterias impullus, per ductus salivales [d] redeat: quanta contra facilitate in ventriculi arterias injectus [e] liquor, & ipsa adaucta cera, in ventriculom effundatur. Quare & madet semper stomachus, & mador a morte renascitur [f].

In canis famelici [g] ventriculo magna copia gastrici liquoris reperta est, & sæpe in jejunis summa cum facilitate de ore regurgitat, ut certus sis, ventriculi non exiguam partem eo repleri. Tres libras [h] & quinque vomitu redditas legi. Maxima vis aquæ, ad libras 16. vomitu rejecta [h*].

§. XXI. *Appendices pyloricæ.*

Inter omnia animalia minimum succi in ventriculo habent, ea quæ carnibus aluntur, cum procul dubio NATURA in ipso alimento uberius latentem humorem in calculos suos retulerit. Ruminantibus plus salivæ est, plus gastricarum glandularum. Avibus ex bulbo oesophagi, sem-

P p 3

per

[g] *Of agues* p. 23.

[a] p. 143.

[b] p. 146. 151.

[c] p. 143.

[d] L VII. p. 379.

[e] p. 137.

[f] KAAUW *perspir.* n. 181.

[g] WOLF *Wurkungen der Natur* n. 411.

[h] *Quotidie per triduum* MARCELL. DONAT p. 308.

[h*] MORG. *sed. caus. morb.* II.

per glanduloso [a], multum in ventriculum succi adfunditur, quem ita sibi sumit coctionis negotium, ut tamen foccus fere in musculofo ventriculo cibus sit. Carnivoris, ut audivimus, succi plenum est alimentum, neque parciores glandulæ. Piscibus, quibus vix ullus œsophagus [b], nihilque ejus bulbo simile, & tenuis, membranaceus [c] est ventriculus, proprium organum natura dedit, quod ad alimentum, in ventriculum uberrimum, succum adfundat. *Appendices* sunt cæcæ, intestinula [d] nempe cylindrica, clauso fine, fabrica fasciculosa, plenæ albo [e], falso [f], etiam satis vehementer [g], succo, & mucoso, quem in pylori viciniam effundunt, ut eo alimentum irroretur, quod est in ventriculo, aut per intestinà descendit. Eum succum glandulosa fabrica [h] in iis appendicibus generat.

Res ipsa ARISTOTELI non ignota fuit, tantum ut cibi receptacula [i] & fasciculata [k] vocaret, qualia in nonnullis sunt, non in omnibus. Ostendit autem MORGAGNUS muco plena esse [l], non fæcibus, & ita Pancreati similia, ut nullum [m], sit in iis piscibus pancreas [n], quæ appendices habent, & nullæ appendices, quando pancreas verum adest. Non recipere cibum constat, cum plenæ sint, quando ventriculus inanis, ut in salmone [o].

Nonnull-

[a] p. 138.

[b] p. 55. 56.

[c] p. 270.

[d] PERRAULT *Ess.* T. III. PEYER *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. I. p. 202.* BLAS *anat. anim.* a tab. 49. ad 53.

[e] PEYER *ibid.*

[f] Non est acidus SWAMMERDAM in præf. *bibl.* & in lucio *Amstelodamenses* apud BLAS p. 28. Amaricat in hippoglossio BLAS p. 278. in acipensere herbaceus ingratus BLAS p. 259.

[g] In asello rancidus & seminalis p. 262. Rancidi quid sapiens SWAMMERDAM in *vita* & in *bibl.* p. 401. Ex eo tamen sapore suspiceris, aliquid cibi illapsum esse.

[h] In xiphia SCHELLHAMMER HARTMAN. Add. PERRAULT p. 438. 439. PEYER *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. I. p. 202.* HOFMAN *Eph. Nat. Cur. Cent. IX. X. p. 449.*

[i] *Part. anim.* L. III. c. 14. GREW *of the guts*, sub fin.

[k] *Hist. anim.* L. II. c. 17. Habet etiam GESNER *hist. anim.* L. III. *de pisc.* p. 364. Pro cæcis intestinis GREW; pro intestinulis LISTER *hum.* p. 364. cibum excipientibus & retinentibus *Exerc. anat.* II. p. 14. Pro penu in fame N. *Comm. Acad. Petr.* L. VI. p. 414.

[l] *Epist.* XIV. n. 23.

[m] In omnibus piscibus deesse vidit JANUS PLANCUS *Comm. Acad. Bon.* T. III. p. 333.

[n] Negant in *nov. Comm.* l. c. Torpedo tamen dicitur & appendicem habere, & pancreas LORENZINI p. 24. cum rhombus *turbot* BLAS. p. 259. & galeus. Et appendices canis & ductum pancreaticum habet CHARLETON p. 84.

[o] BIRCH T. III. p. 425.

Nonnullis paucae sunt, & quibus sunt plurimae, iis tamen fenfim in communem ductum [*p*], ita aperiuntur, ut pauca tamen in pyloro sint ostia.

Unica est appendix polypo [*q*]: rhombo *turbot* [*r*]: *sepiæ* [*s*]: *torpedini* [*t*]: *ammodyti* [*u*]: *lucio* [*w*].

Duae *xiphiæ* [*x*]: rhombo [*y*]: *cani carchariæ* [*z*]: *blenno* [*a*]: *salpæ* [*b*]: *ranæ piscatrici* [*c*]: *loligini* [*d*]: & in multis piscibus planis [*e*].

Tres in *cernua* & *perca* [*f*], inque pisce ex *aselli* genere [*g*], & in *aurat a* [*g**], *sparo* [*g***].

Quatuor *hepato* [*h*]: *turdo* [*i*]: *doro* [*k*]: *hippoglossio* [*l*]: *percae* [*m*]: *scaro* [*n*]: *trachino* [*o*]: *siluro* [*p*]: *salpæ* [*q*]: *variolo* [*r*].

Paucae

[*p*] In *asello* BLAS *anat. anim.* p. 262. LEONICEN. In *acipensere* ID. COLLINS p. 558. in *hystrice marina* REDI: in *xiphia* LISTER *Exercit.* II. p. 12. in *salmone* GLISSON; in pisce *lieu.* PERRAULT *Ess.* T. III. p. 221. t. 12. f. 4. in *fabro* MORG. l. c.

[*q*] REDI *anim. intra anim.* p. 100.

[*r*] COLLINS t. 37. f. 3.

[*s*] SWAMMERDAM p. 890.

[*t*] LORENZINI p. 24.

[*u*] HILL.

[*w*] BLAS p. 282. t. 53. f. 17.

[*x*] SCHELLHAMMER. Una HARTMAN.

[*y*] MORGAGN. *Epist.* XIV. n. 33. RONDELET p. 311. BLAS t. 50. f. 6. 7. CHARLETON p. 30.

[*z*] COLLINS *tab.* 71. Huic per ampla.

[*a*] GISLER K. Sw. *Wetensk. Acad.* 1748. Trim. I.

[*b*] BLAS *anat. anim.* p. 304.

[*c*] CHARLET. *mantiss.* p. 79.

[*d*] LISTER *conch. bivalv.* T. I. f. 2. SEVERIN. p. 352.

[*e*] HILL. *review* p. 117.

[*f*] GMELIN. SCHÆFFER *pisc. bavar.* p. 32. Duae fere COLLINS t. 35. f. 2. BLAS t. 52. f. 12.

[*g*] RONDELET p. 70.

[*g**] HASSELQUIST p. 339.

[*g***] ID. *ibid.*

[*h*] RONDELET p. 148.

[*i*] REDI *ibid.* p. 103.

[*k*] IDEM t. 6 f. 1. PEYER *Merycol.* p. 17. SEVERIN *Zoot.* p. 351. Tres HASSELQUIST p. 339.

[*l*] BLAS *ibid.* p. 278. t. 50. f. 8. vocat *vesiculares*.

[*n*] RONDELET p. 165. etiam quinque.

[*m*] GREW *of guts* p. 42. etiam tres.

[*o*] GRONOV *Act. Societ. litt. Ups.* 1742. p. 99. octonae forte.

[*p*] Etiam tres HASSELQUIST p. 375.

[*r*] MORGAGN. l. c. etiam quinque.

[*q*] SEVERIN. p. 373. etiam tres.

Paucæ mullo aspero (*s*).

Sex mustelæ fluviatili (*t*) : & sciænæ [*u*] : & antherinæ [*u**].

Luciopercæ sex & septem (*w*).

Septem spirincho (*x*) & sepia (*y*).

Octo triglæ (*z*). Aliquot in gymnoto (*a*).

Novem in gado (*b*) : & asello (*c*), qui ejusdem generis est.

Plures quam novem pelamidi (*d*). Octo & novem in umbra (*e*) : corvo (*f*).

Novem & decem in pisce *Rochet* (*g*) : Decem uranoscopo (*h*).

Duodecim in pisce *Grondin* gallorum (*i*).

Trachuro 10. ad 14. (*k*) ; sedecim boopi (*l*) : Harengo septem decim (*m*) : Totidem vel 18. mustelæ (*n*) vel, secundum alios, supra viginti (*o*) : Alofæ triginta (*o**) : Triginta quatuor in pisce *Julienne* (*p*). Troctæ triginti sex (*q*).

Quadra-

(*s*) RONDELET p. 296.

(*t*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. I. obs. 46.*

(*u*) SCHONEVELD p. 44. Addit longas esse. De perca HILL. l. c. GMELIN. KLEIN *Miss* V. p. 34.

(*u**) HASSELQUIST p. 389.

(*w*) *Id.* p. 355.

(*z*) GERING *pisc. Salm.*

(*y*) REDI p. 98. 99. SVAMMERD. unicam, forte ob ostium singulare.

(*a*) GRONOV *Ups.*

(*b*) *Idem mus.* p. 20.

(*b*) *Act. Societ. Ups.* 1742. p. 82.

(*c*) REDI p. 95.

(*d*) RONDELET p. 70.

(*e*) *Idem* *ibid.*

(*f*) *Ibid.*

(*g*) GREW p. 42.

(*h*) SEVERIN. *Zoot.* p. 358.

(*i*) PERRAULT.

(*k*) HASSELQUIST p. 366.

(*l*) SEVERIN. p. 50.

(*m*) SCHONEVELD p. 37. Etiam octodecim HILL. p. 117. *Multæ Oecon. Abbandl.* T. IX. p. 117.

(*n*) COLLINS t. 33.

(*o*) GERING ad 25. 26. Fasciculum insignem, sed ostia communia quatuor habet J. M. HOFMAN *Eph. Nat. Cur. Cent. X. app. obs. 12.*

(*o**) HASSELQUIST p. 390.

(*p*) PERRAULT.

(*q*) FANTON *Diff.* p. 161. add. REDI t. 4. f. 12. Triginta GREW. l. c. Supracentum CARDAN. *variet. L. VII. p. 222* Multa SYLV. *varior. corp. dissect.*

Quadragenta in fungi formam collectæ in hystrice marina (*r*): & in asello *whiting* idem numerus (*s*).

Numerosæ, sexaginta & ultra salmoni (*t*): in clupea vel alofa octoginta (*u*), vel 94. (*w*).

Centum sturioni (*x*), pristî *Schwerdfisch* (*y*), cani (*z*). In scombro makreel 150. (*a*). In asello trecentæ sex in fasciculis (*b*). Quadringentæ quadragenta in pisce *Lieu* (*c*). Multæ in galeo (*d*), sphyæna (*e*), cuculo (*f*), carpione lacus Benaci (*g*), fabro (*h*), mullo imberbi (*i*), cinereo (*k*), & rubro (*l*), albula cærulea; pisce *Ester* (*m*): orbe (*n*), lepore marino (*o*). In umbla innumeræ (*p*).

Videtur etiam eo referendus esse acipenser (*q*), cui vastum pancreas multis ductibus factum, sive membranosis appendicibus (*r*), plurimo succo plenum esse dicitur: ductus unicus est (*s*).

Paucæ

(*r*) REDI p. 110. *anim. viv.* t. 25. f. 3. 6. t. 5.

(*s*) GREW l. c.

(*t*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs.* 85. A 20. ad 60. HILL: Sexaginta duæ GRO. NOV. *Upsal.* p. 62. Centum viginti tres ROBERG *Disp.* Octoginta GREW p. 42. Quadringentæ ID. t. 31.

(*u*) HILL. Alofæ nomine BLAS t. 49. f. 5.

(*w*) PERRAULT p. 221. Sexaginta in duabus seriebus HASSELQUIST p. 390. Negat habere BLAS p. 260.

(*x*) HILL.

(*y*) IDEM.

(*z*) ID. Sed de eo vide not. 2. p. 203.

(*a*) CHESLD. p. 157.

(*b*) In asello plurimæ in sex fasciculos congestæ LISTER. *Exerc. anat.* II. BLAS p. 45. 49. Numerosæ SCHONEVELD p. 20. GERING. *pisc.* p. 17. Nonaginta sex BLAS p. 262. Innumeræ asello COLLINS p. 558.

(*c*) PERRAULT t. 12. f. 4.

(*d*) ROND. p. 283. IDEM cum pisce lieu, ut credo.

(*e*) p. 225.

(*f*) BLAS t. 52. f. 9.

(*g*) MORG. *Epist.* XIV. n. 33.

(*h*) IDEM.

(*i*) p. 295. & majori CHARLETON *pisc.* p. 17.

(*k*) COLLINS t. 36. f. 4.

(*l*) IDEM T. 36. p. 2.

(*m*) MARSIGLI Tom. VI. t. 20. f. 1.

(*n*) BARTHOL. *Cent.* II. *obs.* 1.

(*o*) SCHONEVELD p. 42.

(*p*) RONDELET L. H. p. 161.

(*q*) Fasciculus videtur appendicum numerosissimarum BLAS t. 49. f. 2. 3.

(*r*) LEONICEN *metamorph. apoll. & asculap.* p. 96. 97.

(*s*) DU HAMEL *hist.* p. 67. BLAS ic.

Paucæ (*t*) species sunt, quæ omnino carent appendibus, ut *Blennius GRONOVII* (*u*), acus piscis (*w*), lampetra (*x*), tinca (*y*), anguilla (*z*).

Cetis, ut verum pancreas, ita nullæ appendices (*a*).

Denique etiam insecta ejusmodi succi fontes habent. Sex habet papilio (*b*) & gryllus (*c*): appendices sex ordinum (*d*) ad ventriculum cavas scarabeus nasicornis, & eruca (*e*).

Bombyci intestinum carneum appendicibus ramosum est pro pancreate (*f*).

Duodecim sunt in locusta (*g*). In cancro innumerabiles (*h*). In locusta marina duæ sed (*i*) multilobæ. In cochlea duæ (*i**).

Quoties autem pars aliqua animalis corporis per multas species regnat, magnam ejus utilitatem esse absque metu erroris concludimus.

Hoc est pancreas, quod in ventriculum piscium aperitur (*k*), cum quo viscere & *MORGAGNUS* comparavit (*l*), & *MALPIGHIUS* (*m*). Chyli coctioni fervire *Clar. PERRAULT* (*n*). Hepata esse mavult *LISTERUS* (*o*).

§. XXII.

(*t*) *RONDELET* p. 70.

(*u*) *Upsal* p. 89.

(*w*) *HILL*. l. c.

(*x*) *IDEM*.

(*y*) *BLAS* p. 304.

(*z*) *Id.* t. 52. f. 5.

(*a*) *RONDELET* p. 71. *HILL*. l. c. Nimio forte catalogo tædiosus fui, in quo præterea scriptorum auctoritates non consentiunt. Eam culpam deprecor, quæ possit, omittis his paginis, redimi.

(*b*) *SWAMMERDAM* p. 546.

(*c*) *Giorn di* 1687 p. 64.

(*d*) *SWAMMERDAM bibl.* p. 313, t. 27. f. 8. 11. 12.

(*e*) *Id.* p. 576. 589. add. *MALPIGH.* t. 5. f. 1. & *postb.* p. 57.

(*f*) *MALPIGH.* *gland. conglob.* p. 6.

(*g*) *PEYER* p. 8. De iis *MALPIGH.* *posthum.* p. 59. Sex numerat *RATHLEF* T. II. p. 221.

(*h*) *COLLINS* t. 39. f. 1. Unum maximum, sed ex cæcorum intestinorum fasciculis factum *LISTER* *cochl.* l. p. 84.

(*i*) *LISTER Exerc. anat.* II.

(*i**) Ex ventriculo in hepar intestinale euntes ductus *LISTER* *Cochl.* p. 73.

(*k*) *GRAAF* p. 19.

(*l*) *Epist.* XIV. n. 72.

(*m*) *Gland. conglobat.* p. 6. *postb.* p. 57.

(*n*) p. 200. *Nov. Comm. Acad. Petr.* T. I.

(*o*) *Cochl.* p. 83.

§. XXII. *Bilis.*

Etiam bilis extra ventriculum in duodeni secundam lineam effunditur: sed & ipsa, minime obstante valvula pylori (a), frequenter in ventriculum redit, frequenter inquam, non semper. Nam vidi ad usque pylori valvulam venisse, ventriculum non subiisse. Sæpe tamen flavum in stomacho mucum vidi, & in homine, & in animalibus sanissimis, ut in cane (b) fele. In marasmo (c) Cl. Viri bilem in ventriculo viderunt, inque hydrope (d), peste (d*). A venenis bile plenum ventriculum vidi. A frictu abdomine bilis (e) in ventriculo fuit.

Etiam calculi fellei in ventriculum redeunt, & vomitu expurgantur (f), & icterus vomitu bilioso solvitur (g). Amarus est & biliaris calculus, qui in hystricis (h) ventriculo reperitur, & mollis, ut sapo, dum recens est; Cum amarus sit, qui in elephanti (i) ventriculo sedet, ejusdem videtur generis esse.

Demum & fitis nascitur (k) a bile reflua, & nihil frequentius est bilioso vomitu: Quotidianum legimus (l) in iis, qui vocantur *πικροχολοι* (m), etiam ad summum senium (n) familiaris. Ex morfu viperæ (o), ex hydrophobia (o*), & vulgo in omni vomitu, etiam a navium agitatione, sub finem bilis sequitur. Quindecim libræ bilis cum bonis aegri rebus egestæ (p).

Sed omnino vir summus, J. B. MORGAGNUS (r), in jejuno homine bilem constanter in ventriculum effluere docet.

Q q 2

Demum

(a) Non valde resistere, neque aqam injectam morari HAGVENOR *de Ileo* p. 21.

(c) HILD. *Cent. IV. obs. 40.*

(d) G. V. SWIETEN T. II. p. 220. cum nausea.

(d*) SOULLIER *recueil de la peste* p. 278.

(e) PAW. *obs. 31.*

(f) HEISTER *annal. Jul. 1726. M. Aug.*

(g) G. V. SWIETEN T. II. p. 192.

(h) BONTIUS ad G. ad ORTA C. 46.

(i) SEMMEDO *fascic. LABAT. ethiop. occid. p. 154.*

(k) *Febr. interm. p. 29.*

(l) RHOD *Cent. II. obs. 62.*

(m) VESAL. I. modo cit. ZACUT. & C. GALEN. *art. med. p. 89.*

(n) VALISNER. T. III. *off. var. in femina 97. annor.*

(o) POUTEAU *obs. p. 155. A veneno, in fele.*

(o*) JAMES *canine madness p. 64.*

(p) RAYMOND. *malad. danger. a guérir. II. p. 47.*

(r) *Advers. III. p. 66.*

Denum in struthiocameli avis (s) secundo quidem ventriculo amarus succus, bile tinctus reperitur, & ductus ipse vix sex lineis a pyloro aperitur, orificio ita converso, ut bilem in ventriculum mittat. In piscibus certius est, passim biliarium ductum in ventriculum aperiri (t). In xiphia (u) idem inter duos ventriculos aperitur: In cyprino (w), in altero cyprino capitone, in anguilla (x), in barbo (y), cysticus ductus in ventriculum patet, & in hufone proxime pylorum (z). Phocae vesicula fel in pylorum remittit (a). Etiam in serpentibus bilis in ventriculum venit (b).

Sed etiam gliri (c) [le Loir] cysticus ductus proxime sub ventriculo inseritur, & in hystrice (d) hepaticus in ipsum pylorum se inmittit.

Denique in homine biliarium ductum ramum in ventriculum mittere, videtur apud GALENUM (e) alicubi reperiri, etsi alibi disertius (f) negat. Mansit tamen ea quasi fama in hominum animis, & reperitur apud Arabes (g) & apud primos auctores (h), qui post instauratam anatomicam scripserunt.

Sed etiam experimenta sua, visamque eam in homine biliarii ductus in ventriculum insertionem & MASSA (i) protulit: & ad unum exemplum C. STEPHANUS (k), & ad unum VESALIUS (l): ad unum

(s) VALISNERI *notoni d'un struzzo*. In ventriculum *Mém. pour servir à l'hist. des anim.* DUVERNEY apud DU HAMEL p. 282. 315. *Anciens Mém.* T. X. p. 27. *postb.* II. p. 552. 547. 492. nempe hepaticorum ductuum alter.

(t) VALISNERI l. c. p. 241. 242.

(u) SCHELHAMMER apud VALENTIN. HARTMANN in confinia ventriculi.

(w) BLAS *anat. anim.* p. 262 *Amstelodamens.* p. 39. *Comm. Litt. Nor.* 1738. *bebd.* 47.

(x) CALDES. T. V. f. II. MORALT p. 388.

(y) ASTRUC *de la digest.* p. 255.

(z) MARSIGLI *Danub.* T. VI. f. 14.

(a) SLVERIN. *antiperipat.* p. 32.

(b) BORELL. *mot. anim.* L. II. *prop.* 147. LISTER *de humor.* p. 369.

(c) PARISINI.

(d) DU HAMEL p. 282. DUVERNEY II. p. 599. 492.

(e) *Administr. anat.* L. VI. c. 12. *Add. art. medic.* p. 89. de picrocholis.

(f) *De usu part.* L. V. c. 4.

(g) RHAZA *de divis.* c. 64. AVICENNAM L. III. *Fen.* 15. tr. 1. de parvo ductu a vesicula, qui aliquando altero major sit.

(h) AL. ACHILLINUS p. 5. de subtili ramo a cholodecho ductu in ventriculum veniente. Secundum aliquos; ait CARENISIS *Ulugog.* p. 15. add. in MUNDIN. p. 256. A meatu biliario ductum in pylorum venire, in eo visum esse calculum Alex. BENEDICTUS p. 21.

(i) Rarum esse in hominibus bilem vomentibus reperiri, sibi tamen visum p. 25 b.

(k) p. 179. qui ait, se ipsum vidisse alterum ramum choledochi ductus ventriculo inmitti.

unum pariter CABROLIUS (*m*), ad unicum Petrus PAW (*n*); ad unicum JESSENIUS ad JESSEN (*o*); ad unicum HOEFERUS (*p*); ad unicum demum MOTHUS (*q*) & ZACUTUS (*r*). Proxime & uncia a pyloro insertum (*r**) RIDLEYUS. Novos ductus hepatico bilarios ad ventriculum venire in universum PETRIOLUS (*s*). Demum permultos ductus, in homine bilem vomente, de hepate venisse creditum est (*u*), & in ventriculum aperiri.

Mihi quidem probabile videtur, in ventriculo bile extus tincto, arteriam coronariam minorem, ex hepatica proxime ductus bilarios natam, his viris imposuisse. Primus, puto LEONICENUS (*w*) hunc errorem refutavit, deinde COLUMBUS (*x*). Negat se vidisse ad ventriculum ire FALLOPIUS (*y*), & G. CUNEUS (*z*).

Breviter addo, etiam pancreaticum succum, perinde ut bilis, in ventriculum refluere posse (*a*). In tursione tertio sacco ventriculi se inmittit (*b*). Meconium visum est in ventriculum rediisse (*b**).

§, XXIII. *An spiritus.*

Conjectura fuit Cl. virorum, ipsos spiritus (*a*) de nervis ventriculi in ejus cavum effundi, & ciborum coctioni servire (*b*). Hinc ho-

Q q 3

mines

(*m*) *Alphabet anat. obs.* 6. in picrocholo & vomente, de choledochi ductu locutus tout joignant le plore.

(*n*) *Obs.* 15.

(*o*) *Anat. pragens.* p. 50. b. de perexiguo ductu.

(*p*) Ductum choledochum in Ferdinandi III. ventriculum insertum fuisse apud FANON. *anat.* p. 92.

(*q*) *Epist.* ad WORM. n. 575. de ductu cystico.

(*r*) L II. in picrocholo bilem vomente. Collectionem habet RIOLEANUS p. 128.

(*r**) RIDLEY *obs.* p. 220.

(*s*) Apud BARBIELLINUM p. 39. 40.

(*u*) VALCARENGHI *medic. ration.* 1737. p. 105.

(*w*) *Error.* PLIN.

(*x*) p. 231.

(*y*) *Obs.* p. 178. b. Duobus ramis in intestinum aperiri dedit, pro raro. Ex eo JASOLINUS c. 5.

(*z*) *Apolog.* p. 97.

(*a*) BRUNNER *duoden.* p. 54. MALPIGH. *postb.* p. 57.

(*b*) KAI *phil. transf.* n. 76.

(*b**) *Epist.* 575. ad WORMIUM.

(*a*) PRYER *de gland. intest.* p. 10. 68. *de ruminat.* p. 100. BRUNNER *de pancr.* c. V. VI. *de gland. duoden.* c. 4. VIRIDET *du bon chyle* p. 502. PASCAL p. 285. BOERHAAV. *pralect.* T. I. p. 306.

(*b*) COLLINS p. 303. 304. GREW p. 28. VERHEYEN L. II. p. 257. 258. MAYOW *oper.* p. 337. SANTANELLI *lucubrat.* p. 150.

mines affectu (c) animi tristi obrutos, apoplecticos, etiam vehementer in aliquod opus intentos, nullum percipere famis sensum.

Hæc ita dicuntur, ut refellere nequeas, stabilire vix possis. Phænomenon certum est. Sed possunt nervi in tristi adfectu ventriculi fibras male stringere; ut omnes quidem musculorum actiones a nervis augeri possunt aut minui; potest aquæ ventriculi copia augeri, aut diminui; ut certe renalis secretio a nervorum diverso statu vehementer mutatur: potest ejus visciditas intendi, potest bilis secretio a nervorum irritatione pati: potest aliis nobisque ignoratis modis ventriculus a nervis adfici.

§. XXIV. *Emollitio.*

Enarravimus causas, quæ in cibum in ventriculum sumtum operantur: sequitur ut ex vivorum animalium, exque cadaverum, incisionibus eas mutationes colligamus: quas in eodem ventriculo cibi experiuntur. Ordo difficilis est, cum earum mutationum plures eodem tempore cibo superveniant, & tamen in hoc opere altera ante alteram debeat exponi. Dilutio certe & emollitio ante acescentiam tempus suum habent. Nam in primo ventriculo capellæ herbæ unice mollescent; in secundo magis dissolvuntur, acescunt demum in tertio (a). Sic in vitulo cibus in primo ventriculo mollescit, in altero minutius mistus est, in tertio demum malvæ tincturam rubro colore tingit (b). In avibus etiam primum est, pisa in ingluvie emolliri (c), & intumescere (d).

Nempe immensa vis salivæ & gastrici succi ad cibum adfunditur potumque, & cum utroque motu peristaltico & antiperistaltico miscetur. Ita necesse est, potum quidem misceri cum nostris succis, & naturam induere ex utroque ingenio mistam: cibum vero molliri, dum aqua in loco calido in cellulas & cavernulas fibris interpositas laminisque, suo pondere, suaque vi attractili irrepit.

Nunc hujus, adeo simplicis causæ, efficacia tamen summa est. Nam in sola aqua communi (e), & in calida magis, omnes carnes, omnes membra-

(c) VIRIDET l. c. Martes ex ira cibos non coxit GEUDER *ferment.* p. 96.

(a) VIEUSSSENS *tr. des liq.* p. 279.

(b) Ibid. p. 277.

(c) DUVERNEY *posth.* T. II. p. 449.

(d) *Anat. compar.* p. 95.

(e) Conf. SCHÖBINGER *de textu cellul.*

membranæ, demum etiam durissimi lapides (*f*) contabescunt: & utile hic est experimentum ab ILLUSTR. ALBINO (*g*) alium ad finem prolatum, in quo membranæ post diuturnam macerationem evanescunt. Videas aortæ durissimam membranam sensim intumescere (*h*), magna-que spatiosa natci, quæ aqua repleat, fibrasque & laminas, quæ ea spatia claudebant, in dies laxari (*i*), ut plus aquæ, minus materiei solidæ sit, fibrarum longitudo minuatur, cohæsiō nulla sit, donec in spongiæ speciem primo solvatur, dictum VIEUSSENIO (*k*), inde in mucinaturam, in qua vix quidquam cohæreat, solidumve superfit. Hæc ego seriatim experimenta in cute, in dura matre, omnibusque corporis humani membranis repetii.

Si hæc omnia ab aqua sola furtim subeunte fiunt, non ergo mirum erit, si in ventriculo longe, quam a sola aqua citius, similia eveniunt, ubi & calor sit, & aeris vis, & putredinis initium, & tritus, cujus maxima potestas est, dum lentus, longo usu repetatur. Sales notissimi sunt, in quos corpora, etiam multo duriora, a *Comite de la GARAYE* multo tritu reducuntur.

In hominis ergo ventriculo, & in cane, & in similibus animalibus semper vidi, cum subito a pastu mors superveniret, panem cum sua crusta cellulisque ingestum, cruda olera, fructus horæos non mutatos, carniū filamenta integra in ventriculo reperiri.

In homine, aut in animale post longius a cibo tempus enecto, inque ejus ventriculo & in duodeno, cum cibus nihil præter ventriculi vires passus fuisset, reperio nullam de pane figuram superstitem, dissolutam crustam, micam tabescentem, carnem absque conspicuis fibris, olera liquefacta, omnia in similem pulvem (*m*) subcineream redacta.

In quadrupedibus similia fiunt. Ex cortice (*n*) & ligno, quo pascitur, castor merum liquamen conficit (*o*). In canis & lupi ventriculo altero tertiove die adparet, extremos ossium fines (*p*), incipere dissolvi & ossa

(*f*) Et ipsi imprimis vesicæ calculi.

(*g*) *Atmos.* L. V. p. 120, 121.

(*h*) Ut in pisce.

(*i*) Ut ea mollescant in ingluvie p. 298.

(*k*) Conf. L. II. p. 61. Cibus in ventriculo cito spongiosus fit *WALÆUS* p. 763.

(*m*) In cane panis in pulvem redactus *FORLIX* Exp. 8.

(*n*) *WEPFER* *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 2. obs. 251.

(*o*) *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 52. seq.

(*p*) *VIRIDET* *ben chyle* p. 195. 196.

ossa in cartilagineis naturam mollescere (*q*). In animale boreali *Vielfras* ossa in arenulas comminuta per intestina (*r*) reperiuntur.

In avibus carnivoris prior ventriculus [puto bulbus] integros pisciculos, alter pallidos, maceratos continet. In buteonis ventriculo, intra tubos a REAUMURIO ingestos, reticulo filorum ab omnitrutu defensos, carnis tamen pars in pastam totam mollem, abierat, pars per foramina operculi effluebat (*s*); & de ipsis demum ossibus, etiam præduris bovis ossibus, pars in gelatinam (*t*) soluta visa est. Margarita in ventriculo gallinæ emollita fuit (*u*). In ossifraga aquila pisces integri in mucum diffuunt (*w*), & ossa intra 24. horas consumuntur (*x*). Lari in ventriculo eo magis pisces coquuntur, quo fundo propiores sunt (*y*). Anguillam, in avis ventriculo, partim consumtam, & tamen vivam CORNELIUS (*z*) reperit. In oesophago corvi marini piscium pars digesta est (*a*).

In aquilæ ventriculo recepta pars avis in mucum consumta erat (*b*). Sic in noctua (*c*), ranæ ossa partim extenuata, partim consumta ventriculum repleverunt. Ranas semi digestas in ciconia (*d*) FABER.

In pisce, inque mustela fluviatili (*e*), cujus ventriculus membranaceus est, pisciculus fuit, cujus squamæ & spinæ in liquamen contabuerant. Etiam solum oculum (*f*), consumtum vidit auctor adnotationis, cum piscis reliquus viveret. In asellis (*g*) majoribus & aselli, & sepiæ, &

(*q*) WALÆUS *Epist.* II.

(*r*) SCHURIG *chylol.* p. 29.

(*s*) *Journ. des Sav.* 1753. Jul. *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 70. 71.

(*t*) ID. *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 473. seqq. 480.

(*u*) SPERLING *Inst. Phys.* p. 974.

(*w*) LEIGH. *Nat. hist. of Lancash.* p. 157. ni fallor.

(*x*) BORRICH *hermet. med. sap.* p. 629.

(*y*) COITER p. 133.

(*z*) p. 210.

(*a*) HELVETIUS *Mém. de l'Acad.* 1719. p. 349.

(*b*) WEPFER apud PEYER *Merycol.* p. 271.

(*c*) BRUNNER *pancr.* p. 86.

(*d*) *Ad bernand.* p. 69.

(*e*) BRUNNER *de gland. duoden.* p. 101.

(*f*) PLOT. *natural history of Staffordshire* p. 246.

(*g*) *Phil. trans.* n. 312. SCHNEIDER *de catarrh.* L. III. p. 44. & in asello eabeljauw ANDERSON p. 79.

& cancri, & caudarum pinnæ & ossa tota in chymum solvuntur. In solea testæ pectinum (*b*) liquefcunt ; inque raja pisces toti diffuunt, etiam testæ & cartilagines (*i*) In torpedinis ventriculo sepia, locustæ, soleæ, alii pisces consumti ventriculi humori inmerguntur (*k*). In galei ventriculo excarnatos pisces (*l*), & in aliis pisces consumtos, inque mucum tabefactos (*m*) lego : in alio feminam devorata & intra paucas horas ad ossa usque consumtam (*n*).

Etiam in xiphiæ ventriculo ossa mollia (*o*) reperiuntur. In galei œsophago piscem emarcidum (*p*) vidit vir Cl.

In ipso œsophago lucii piscis necesse est pisces contabescere, cum rapax animal ranas piscesque se ipso crassiores devoret (*p**).

In ea ciborum coctione partes externæ, quas proxime succus ventriculi tangit, primæ fere dissolvuntur (*q*). Sic in serpentis ventriculo (*r*) avicula contabuit, & bufonis pars inferior in mucum conversa fuit.

In ventriculo lucii piscis, alii pisces (*t*) devorati cum suis spinis in mucum (*u*) colliquefcunt, quo usque glandulas attingunt : pars extra ventriculum integra manet. Sic in aquila (*x*), noctua (*x*†), mustela (*y*) flaviatili, serpente (*y**) integrum fuit, quod extra ventriculum esset.

In

- (*b*) *Phil. transf.* n. 472.
- (*i*) STENON. *musc. gland.* p. 46.
- (*k*) LORENZINI *Crampfish.* p. 29.
- (*l*) STENON. *Act. Hafn.* Vol. II. p. 222.
- (*m*) FABER ad HERNAND. p. 641.
- (*n*) TOWNE in *Epist.* RAI.
- (*o*) HARTMAN in *eius piscis Anatome.*
- (*p*) CHARLETON *muntiss.* p. 84.
- (*p**) PLOT. *natur. hist. of Staffordsbire* p. 275.
- (*q*) TYSON. l. c.
- (*r*) *Act. Hafn.* T. I. n. CXI.
- (*t*) LEOPOLD *Oecon. Cur.* p. 621.
- (*u*) *Phil. transf.* n. 162. add. VIRIDET l. c.
- (*x*) Not. b. p. 212.
- (*x*†) Tibia ranæ in gula superstitis p. 312. not. c.
- (*y*) Illæsum quod non descenderat in ventriculum. Ibid. not. c.
- (*y**) GEUDER *de ferment.* p. 71. VIRIDET *bon Chyle* p. 73. Similia VALISNER. T. III. p. 167. &c.

In vipera lacertæ (z) pars ventriculo contenta consumpta fuerat, integra manserat, quæ extra ventriculum erat.

In stella marina (a), mucoso animale, cochleas semicoctas RONDELETIUS vidit.

§. XXV. *Monita.*

Duplici hic est locus adnotationi. Et primum cum cl. Viri ventriculi prærogativam (a) ornaverint, qui solus cibum dissolvere aptus sit, gula inepta, adparet, aliquod esse ejus receptaculi privilegium, cum multo plus habeat succi, in avibus potissimum, quam gula. Neque tamen nimium oportere huic dignitati tribui, cum etiam in gula (b) aliquorum piscium cibi dissolvantur.

Deinde utique non esse, certe in animalium quadrupedum ventriculis, ejusmodi dissolutionem in intima, quæ fibras penitus destruat. Nam & piscium spinas in homine, inque felibus, sæpe vidi circa coli valvulam congestas, & nimis utique integras.

Porro fibræ herbarum in equorum fimo, & boum, supersunt, & in aqua restituuntur, in qua cum fimum dilueris (c). Quæ de feminibus dixi, non repeto.

Sed etiam canis plerumque ossa integra non penitus in elementa dissolvit (d); verum in scruta utique (e) minora, pulveris similia, quæ in albo græco reperias (f).

Fibræ carneæ devorati animalis piscium fæcibus accurate quæsitæ, supererant, ut adgnosceret posses (g). Sed neque in Papini lebetes ossa solvuntur, neque eorum fibræ destruuntur, etsi gelatina educitur, ut friabilia fiant (h).

§. XXVI.

(z) CHARAS *Viper.* p. 4. 5. T. H. r. r. s.

(a) p. 83.

(a), VALISNERIUS, CHARAS, VIRIDET.

(b) p. 313.

(c) PEYER p. 120. 170.

(d) PITTCARNE *Elem.* L. I. c. 5. de modo quo cibi p. 72. 83. qui etiam in chylo fibrillas vidit superesse, tum BOERI *Epist.* p. 245. seqq. QUESNAY III. p. 16.

(e) BARRY *triplex digest.* p. 19.

(f) BRUNNER de *pancr.* p. 78. de *duoden.* p. 110. POZZI *Comm. Epist.* p. 75.

(g) LEEUWENHOECK *anat. & contempl.* p. 61.

(h) KEIL *quantit. sang.*

§. XXVI. *Succi extractio.*

Id unicum esse ventriculi officium, HECQUETUS (a) volebat, ut succum ex vegetabilibus & carnibus natum dissolvat & extrahat.

In ventriculo certe musculofo avium mirum est, quam excarnia scruta, & quam ficas granorum reliquias videas.

Sed etiam in tertio ventriculo (b) animalium ruminantium herbæ, exsuccæ sunt, & in lepore (c) cibus ad œsophagum succulentus, ad pylorum ficus est.

Ipse polypus, animalium devoratorum, quæ in pulvem (d) quidem abierunt, tamen pelliculas succo cassas (e) & tenuissimas de ore reddit: sic aranæ (f), & alia insecta solo suæ prædæ succo vivunt.

In homine copia adfusi humoris tanta est, ut nunquam ficum in ejus ventriculo cibum superfuisse viderim. Succum tamen de cibo extrahi, & resorberi, alias ostendemus (g).

§. XXVII. *Corruptio varia. I. Acescentia.*

Cibi in locum calidum, hætenus tamen clausum (a), recipiuntur, ut in fano homine neque per œsophagum, neque per anum flatus exeant. Primum est ut acescant; quæ enim vel ex vegetabili regno, vel ex animali cibi loco sumimus, iis hæc pene communis est corruptio.

Eam in animalium ruminantium ventriculo tertio (b), & in quarto potissimum (c) adeo vehementem cernas, ut lac in vitulis coactum sit, & tunicas ejus sacci pleno acore inficiat, qui post multos menses sufficiat lacti cogendo, & eo fine ad casei opificium adhibeatur.

R r 2

Sed

(a) De digest. p. 5. 83. QUESNAY Ess. T. III. p. 19.

(b) PEYER Mergcol. p. 183. 128.

(c) IDEM ibid. p. 151.

(d) TREMBLEY p. 117. 119. add. SCHÆFFER armpolyp. p. 32.

(e) BAKER du polype p. 78. 107. 108. add. p. 120. TREMBLEY p. 119. 120.

(f) TREMBLEY ibid.

(g) Sect. V.

(a) p. 278.

(b) VIEUSSENS des liq. p. 278. PEYER p. 102. & in secundo ventriculo capellarum. VIEUSSENS p. 279. 280.

(c) PEYER p. 102. 128. VIRID. bon Chyle p. 232. DUVERNEY II. p. 437. FABRIC. de ventric. var. p. 110. 120. FABER ad HERNAND. p. 624.

Sed etiam in avibus acoris tanta vis est, ut ventriculi gallinæ interna membrana (*d*) pro fermento esse possit: five nunc acidis horæis fructibus (*e*) utantur, five granis: & aquam decoctam cum variorum animalium ventriculis signa edere acoris (*f*) testem habemus.

In humano ventriculo lac pariter cogitur, ut etiam in caseum densetur (*g*).

Demum in ipsis canum ventriculis nauseosissimum acidum (*h*) a lacte fætorem sæpe percepi, & in felibus succum ejus sacci cum lacte mistum acidum Vir Cl. reperit (*i*).

Neque adeo mirum est, passeris acidum de ventriculo halare (*k*); aut acerrimum in ventriculo avium digerentium odorem esse (*l*); & in struthionis ventriculo contenta aera virefcere (*m*); & rupicaprarum pilas (*n*) odore fermenti imprægnari; aut in homine gas (*n*^{*}) acidum (*o*) de ventriculo erupisse; & ab usu chalybis vaporem adscendere (*p*), qualis prodit ex martis limatura, cum oleo vitrioli effervescente; & vomitus acidus, ructus acidus (*q*), aliaque acoris in ventriculo dominantis indicia reperiri, quæ dudum excitavimus (*r*).

Paulo minus expectatur carniū in acorem degeneratio. Et tamen etiam ea cum natura convenit. Vidi musculos cadaverum [Leidæ potissimum, ubi diutissime servabantur] virere cum odore manifesto acido; neque quisquam ignorat, jus carniū acefcere, & in succis gelatinosis acidum fermentatum ipsa in corruptione se conspicuum efferre (*s*).

Accuratius tamen per sua experimenta Cl. Vir *Johannes PRINGLE* (*t*) evicit, carniū eam esse naturam, ut acefcant, & etiam cum pane acorem

(*d*) REAUMUR *Mém. de 1752.* p. 306. *Oeconom. Abbandl.* T. I. p. 890.

(*e*) Ex rosæ gratum acidum FLOYER *pharmaco basan.* p. 53.

(*f*) VIRIDET *prim. coct.*

(*g*) *Eph Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs.* 163.

(*h*) FORBIX *Exp.* 7. 12.

(*i*) Ostendit MATTEI p. 15.

(*k*) p. 147.

(*l*) CORNEL. *Consent.* p. 210. 219.

(*m*) PERRAULT p. 203.

(*n*) HARDER *apiar. obs.* 14.

(*n*^{*}) Germana vox a *jaß*, antique fervor.

(*o*) STÖCK *ann med.* I. p. 126.

(*p*) WILLIS *de ferment.* p. 25. PECHLIN *purg. VIRIDET bon Chyle* p. 69. 266.

(*q*) ALBIN. *de apotherapeus.* p. 13. *Obs. med. Lond.* n. 6.

(*r*) p. 147.

(*s*) QUESNAY *Essay sur l'Oecon. anim.* II. p. 97.

(*t*) *Appendix ad l. de morbis militum.*

rem (u) quarta fere quintave hora (w) concipiant; odoremque vinosum & acidum saporem (x), etiam postquam putredo inceperat, se ostendere; intusa carne etiam celerius (y); neque eum acorem a saliva putrida coerceri, quin cum carne & pane eadem fermentet, & quin acor putredinem superet (z). In piscibus (a) similia obtinere. Imo cum crassamento sanguinis putrido panem tamen in fermentationem abire (b), & cum eodem sanguine corrupto lac acorem generare, qui putredinem vincat (c). Sic etiam saccharum cum corde ovillo fermentat & calet, & vini fere saporem attingit (d).

Quare etiam cum victu carneo vomitus acidi (e); & acoris in ipsis fœcibus signa supersunt, & in omnibus etiam carnivororum animalium pisciumque ventriculis vestigia acidæ naturæ inventa sunt (g). Et ex ipsa putrefacta carne spiritus subacidus distillando obtinetur (h).

Nunc si acor, etiam putredini superandæ idoneus, in ventriculo nascitur, nihil est, quod in erosionis signis nobis absolum videatur, quorum testimonia sunt in tabulis medicis; ut margaritæ in ventriculo gallinæ emollitæ (i): digitalium ferreorum & orichalceorum adrosorum (k), qua fundum ventriculi contingebant; nummorum ad medium consumtorum (l); ut denique pene integri dissoluti essent (m), non sine fulcis & aerugine (n).

In struthione vitrum minimis foraminibus pertusum, excitati certe acoris documento (o) fuit, & ligna aspera & fulcata (p); & nummi tur-

R r 3

cici

- (u) p. 396. 397. 398. 407.
- (w) p. 407.
- (x) p. 398.
- (y) p. 415.
- (z) p. 401. 396.
- (a) p. 402.
- (b) p. 398.
- (c) p. 406.
- (d) Journ. econ. 1757. M. Oct.
- (e) ILSEMANN colica saturn.
- (f) IDEM ibid. conf. p.
- (g) VIRIDET prim. coct. c. 10. 11. 12.
- (h) NAVIER sur l'amoliff. des os. p. 34. seq.
- (i) SPERLING Instit. Phys. p. 974.
- (k) P. CASTELLI Epist. medic. V. p. 146. in capone NIGRISOL. apud VALISNER. T. I. p. 242.
- (l) SCHNIZER in cista HORNUNG p. 159. in gallina.
- (m) BECKER cultrivor. in gallo calecutico.
- (n) In struthione WARREN Phil. transf. n. 394.
- (o) VALISNER. p. 243. REDI in esperienzæ.
- (p) VALISNER.

cici (q) ad minimam molem consumti (r), ut omnino metalla a ventriculi liquore erodi constaret (s).

In cane etiam tesseram dimidio leviolem (t), tamen cubicam, & erosum ebur ligneis clavis integris (u), & testas ovorum in minima dissolutas (w) legimus.

In homine denique cultri exempla sunt, deglutiti, & mire mutati (x), adrosi (y), diminutæ laminæ & manubrii (z): inque stulto homine ferri exesi, laminæ cultri perforatæ, clavorum erosorum (a): in alio corrofi aciei apicis (b). Nummi etiam cuprei post quatrimum redditu (c) deletis figuris; iidemque post longiorem moram alvo egesti pene toti consumti (d): demum bractea integra ferri stanno obducti (e) evanuit, ut consumtam fuisse appareret. Etiam in œsophago, noduli (f), qui per octo septimanas ibi hæferat, magna pars consumta fuit & viridis. Et ex denario cupreo devorato per multum tempus sapor in ore venenatus (g) adscendit.

§. XXVIII. II. Fermentatio.

Quæ acescunt, ea sibi permixta cum aere & calore fermentant, intestino nempe motu agitantur, quem & aer atmosphæricus generat, & etiam magis aer (a) internus expeditus. Saccharum, ut modo diximus, etiam cum carne

(q) Alii PERRAULT p. 203. PARISINI.

(r) Id. p. 253. In REDIANO struthione tamen octavo mense nondum erant detritæ literæ *Esper.* p. 59.

(s) VALISNER. p. 242.

(t) BIRCH T. IV. p. 304.

(u) MARTIN *Mém. de l'Acad.* 1732. n. 3.

(w) WALÆUS p. 763.

(x) CROLL apud SCHURIG *Chylolog.* p. 323.

(y) In HUBNERI *cultrivoro* tantum denigrata.

(z) In *cultriv. balens.*

(a) *Phil. transf.* n. 317.

(b) PURMANN *Chir. cur.* p. 348.

(c) STORCH *Kinderkrankh.* T. IV. p. 467. NIGER alius BLANCAARD *Jaarregister Cent. V.* n. 33.

(d) AMAT. L. II. c. 69. KERKRING n. 1.

(e) MEKERN *append.* c. 12.

(f) *Hamburg Magaz.* T. XVI.

(g) *Phil. transf.* n. 246.

(a) p. 297.

carne fermentatur, vinosumque odorem concipit (b); & cum tosta carne panis vinosum & acidum saporem & odorem post fermentationem induit (c).

In animalibus herbivoris, odorem vehementem acidum Clar. Viri perceperunt (d), etiam in rupicaprarum pilis (e) & in leporis ventriculo (f). Spuma in ventriculo (g) variorum animalium visa est, etiam in maniaci (h) hominis stomacho, ut contineri non posset.

In chamæleontis ventriculo muscarum capita (i) leve indicium fermentationis dederunt. Ita etiam intestini parte ligata, contenta materies spumescit (k).

Plena demum fermentatio in ventriculo cervi erupit, calidus nempe vapor, bullulæ, liquor graveolens (l), & similia a ruminantibus (m) non absunt. Vinosus odor & acetosus de ventriculo bovis ruminantis (n) prodit, ipsiusque hominis (o).

Aeris generatio huc pertinet, quæ in ventriculo evidentissima est, ejusdem, quam nuper diximus, spumæ indicio, & distentionis a cerevisiæ potu, a pisces, aliisque cibis multo aere turgidis (p), & ructum, & crepantis a nimia expansione ventriculi boum equorumve (q). Hinc hypochondriaci, & qui debili sunt ventriculo, hora quarta fere & quinta a prandio, flatibus potissimum vexantur, iis nempe horis, quibus panis cum carne nunc manifesto fervet (r).

Vapor qui de cibo ventriculo recepto adscendit, sæpe inflammabilis est, non unice in iis miseris, quibus a nimio potu spiritus vini

(b) p. 317.

(c) PRINGLE p. 396. 398.

(d) FLOYER *præternat. stat.* p. 30. WEDDEL *morb. inf.* p. 119.

(e) HARDER l. c.

(f) PEYER *Merycol.* p. 152.

(g) A cicuta sumta HARDER *obs.* 25. In ruminantibus PEYER p. 181. etiam in cane WALÆUS l. c. p. 763.

(h) MURHART *ferment. microcosm.* p. 14.

(i) PARIS

(k) VERHEYEN T. II. p. 83 84.

(l) HARDER *obs.* 12. p. 41.

(m) PEYER *merycol.* p. 152.

(n) C. FABER. HERNAND. p. 633.

(o) BOERHAAVE *Prælect.* T. I. p. 278.

(p) p. 201.

(q) Ex usu trifolii Ibid.

(r) PRINGLE p. 407.

vini fumus (*s*) inflammabilis (*t*), & flamma (*u*) demum de ventriculo erupit, tanta cum violentia, ut tota cadavera combusta (*w*) legas, potissimum in celebri exemplo comitissæ Cornelix Zangarini Bandi (*x*), quam, præter solam manum, flamma post epotum vini spiritum de ventriculo erumpens in cineres redegit: cum tamen, ut aliquoties in facinorosis hominibus vidimus, ægre & multo igne & tempore, corpora humana exuri queant.

Sed absque ulla de spiritu vinoso suspicione olim, consule T. GRACCHO, ad forum Decii, de bovis ore flamma exiit, & ex bovis ventriculo vaporem fætidum prodiisse, qui flammam admissam conceperit, nupera habemus testimonia (*y*); & flammam denique ex ejusdem animalis ventriculo prodiisse, cum a lano aperiretur (*z*). Olim etiam a 1597. Pisis, cum RUSCHIUS (*a*) feminæ ventriculum aperiret, ab admota candela flamma ex flavo virens erupit.

Porro *Andrea* VULFARI (*b*) experimentum narratur, non semper pari successu repetendum, in quo cani vivo ventriculo ligatur, aperitur: ita candela ad uncix distantiam admota flamma de ventriculo (*c*) exit.

Ne vero fidem deroges, faciunt & inflammabiles alvi crepitus (*d*), & flamma, quæ de tubo exiit, quem Philosophus carne plenum buteoni dederat devorandum (*e*), & sputum inflammabile hominis maniaci. (*f*).

Hæc

(*s*) ADOLPHI *de eruptat. flammæ*. p. 77.

(*t*) EDITOR OP. DEMOCRITI CHRISTIANI *de morb. & med. vit. anim.* p. 111.

(*u*) BARTHOL. *Cent. I. hist. 70. Cent. III. hist. 56. de luce anim.* p. 154. 155. ADOLPHI. S. PAULI *digress. de febr. mal.* EDITOR DEMOCRITI & ipse DEMOCRITUS p. 50. *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 4. 5. obs. 17.* GMELIN *Sibir. Reise. T. III. p. 357.* ex aliorum relatione. In femina nuper mortua BIERLING *thesaur.*

(*w*) BARTHOL. *Journ. de Trevoux.* p. 1934. *Phil. transf. n. 476.* p. 443. 463. Huc puto pertinere duas feminas dictas in SNEEBREARE *practice* T. II. p. 67. & BLANC *Jaarreg. C. VI. n. 88.*

(*x*) MAFFEI *de fulmin. Lett. X. p. 98.* *Phil. transf. n. 476.* *Gentlem. Mag. T. XVI.* BIANCHINI in proprio libello parere &c.

(*y*) *Hist. de l'Acad. 1751. obs. 4.*

(*z*) JANUS PLANCUS *Memor. di fsc. I. p. 206.*

(*a*) BIANCHINI *parere sulla Comitissa Zangarini.*

(*b*) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 1. obs. 77.* BIANCHINI *Parere* p. XLVI. *Phil. transf. n. 476.* p. 458

(*c*) RAVESTEIN p. 75. 76.

(*d*) TACHEN *morb. princip. p. 40.* LISTER *humor. p. 76.*

(*e*) REAUMUR *Mém. 1752. p. 480.*

(*f*) MAYOW *oper. p. 355.*

Hæc omnia tamen rara sunt & morbosa, & in homine sano vix principium (g) fermentationis locum invenit, quam in cibis vegetabilibus continuo multa vis adfluentis liquidi humani opprimat; & in carnivoris putredo consequatur (h), & ipsa quidem imperfecta. Certe, qui cibi ex ventriculo exeunt, neque fermentationis signa, neque omnino acoris edunt: Caseus enim in ventriculo, ex lacte coactus, nunquam in duodeno adparet: neque odor ullus acidus eo loco superest. Neque enim ex vera fermentatione salubris dulcisque chylus unquam nasceretur, neque mucilaginosæ nutritii succi natura posset conservari (i).

Si fermentatio in ventriculo non perficitur, neque plenus calor oritur, quem alioquin sat magnum ex ea causa novimus fieri, ut malæ exemplo.

§. XXIV. III. *Putredo.*

Cum omnes humores animalium ad naturam putredinosam vergant (a), & acidæ naturæ exigua vestigia (b) retineant, facile intelligitur, cibi acidam degenerationem ita debere superari, ut in putredinosam indolem vergat.

Ejus ad putredinem inclinationis plurima in ventriculo vestigia reperiuntur: Ipse fætor eorum, quæ ventriculo continentur, in carnivoris est de putredinoso genere.

Pessime olet aquilæ anima (c), & leonis, & cibus in ventriculo avium potius stercoreis (d) pædorem habet. In pisce cane ventriculus plenus fuit gelatina putridissima, in quam cibus computruerat (e). In ventriculo serpentis fætidissimus halitus est (f) absque acoris vestigio.

Hyænæ

(g) QUESNAY *Ess.* III. p. 12. 13. BOHN. p. 134. Addit, alcohol. ex contentis ventriculi non posse parari BOERHAAVE *prælect.* T. I. p. 279. Oriri de bove TEXTOR *de saliv.* p. 38.

(h) Fermentatio est primus gradus ducens ad putrefactionem MACQUEB *Chym. præc.* T. II. p. 421. LISTER *humor.*

(i) Credit in vino superesse LORRY *des alim.* p. 81. Sed quæ in animalibus alunt, blanda sunt omnia, & insipida, ab omni natura vinosa aliena.

(a) L. V. p. 84.

(b) Ibid. p. 93. seqq.

(c) WILLUGHBY *ornithol.* p. 27.

(d) MOEBIUS *instit.* p. 188. TILING *var. brev.* p. 361.

(e) DAMPIER *travels* T. III. p. 87.

(f) GEUDER *ferment.* p. 71.

Hyænx ventriculus olidissimo cibo plenus (*g*). Qui canes ob sum-
tum opium cibum non digereba; iis fætidissima fuit anima (*h*). Ex ven-
triculo canis vivi fætor stercoreus (*i*).

Sic in homine, quæ in ventriculo ob obicem aliquem manserant,
ea foetida fuerunt (*k*); & qui omnia post 24. horas revomebat, putrida
quidem reddebat (*l*).

Sed ipsa pariter vegetabilia diuturniorem per macerationem putre-
scent. Aqua, in qua fœnum infusum fuit, foetorem equini stercoris induit,
ut manifestam analogiam habeas (*m*).

In ventriculo primo, secundo, tertio vituli, inque primo & secundo
ventriculo capellæ [cujus reticulum non numeratur pro ventriculo], tin-
ctura malvæ sæpe viridescit (*n*); & destillati cibi alcalina elementa red-
dunt: odorque inest putredinosus (*o*).

Perantiqua hinc est opinio, quæ cibos in ventriculo docet putre-
scere. Eam HIPPOCRATES (*p*), EMPEDOCLES, PLISTONI-
CUS, DIONYSIUS ÆGEUS (*q*), & DIOCLES tenuerunt. Inter
nuperos *Martinus* LISTER (*r*) & Cl. KNIGHT (*s*).

Utique enim mutationes, quæ in cibis a viribus coëtricibus ventri-
culi, potissimum humani, nascuntur, propiores sunt putrefactioni, quam
fermentationi (*t*). In buteone fatuus fuit carnis in ventriculo tabe-
scentis odor, qualis putredinem præcedit (*u*): tum in cane (*w*). Quæ
ita interpretor, ut priori tempore acor in cibis nascatur, posteriori huic
acori putredinis initia superveniant: omnino ut etiam in iisdem cibis fieri
contingeret, si sibi permitterentur; cum præterea adfusi humores hu-
mani omnes plus habeant de natura putrescibili.

Sed

(*g*) VESLING *Epist.* VI.

(*h*) SPRÖGEL p. 35.

(*i*) TILING *vas. breve.* p. 362.

(*k*) DE HAEN, *de morb. nov.*

(*l*) H. V. HEERS p. 250. PLANQUE *Bibl.* T. III. p. 499.

(*m*) JOBLLOT I. p. 39.

(*n*) VIEUSSENS *trait. des liq.* p. 276.

(*o*) PEYER *meryeol.* p. 140.

(*p*) Cibus in junioribus facile putrescit [*αυροσάνες*] HIPPOC. *παι τροφ.*

(*q*) CELS *præf.* p. 6. Conf. le CLERC *Hist. de la med.* p. 38.

(*r*) *De humor.* c. 3. *aq. med. Angl.* Ed. 2. p. 86.

(*s*) *Vindicat.* p. 12. 26.

(*t*) BORRHAAVE *Elem. Chem.* T. II. p. 292.

(*u*) REAUMUR I. c. p. 471.

(*w*) FOELIX *Exper.* 7.

Sed neque plena in hominis ventriculo putredo obtinet, etsi obtinet forte in cibis diutius retentis (x); inque animalibus sincere carnivoris.

In buteone ipso non putrescebant cibi in ventriculo (y) retenti, etsi non cocti utique fætent (z): & succus ventriculi solus cum cibis in calore utique in olidam naturam transit, uti dicemus (a).

Deinde certum est, massam ciborum, qui de ventriculo exeunt (b), ut absque eminente aciditate, ita absque perfecta putredine esse: Neque enim aut alcalinas dotes ullas declarat (c); aut fervet cum acidis, aut absque magna acoris (d) portione est, etiam postquam intestinorum actio accessit; neque demum fætet, dum est in tenui intestino. Et tamen fætor ante naturam alcalinam nascitur (e). Vera enim putredo, uti nunc certe confectum est, utique naturam alcalinam producit, etiam in humoribus humanis, & in faecibus animalium (f). Uti vicissim plena & absoluta putredo salem alcalinum destruit (g), effetamque & inertem massam relinquit. Credam facile, ipsos olidos vapores esse id phlogiston per vim putredinis evolutum, quod aut cum fixo sale (h), aut cum acore (i), in alcalinam volatilem naturam abire aptum est, & nunc per ipsum fætorem disperiit, massamque salis expertem relinquit; neque plantæ ullæ salem alcalinum fixum combustæ dant, nisi quibus sal essentialis acidus inest (k), sal autem fixus ex acido generatur.

Ex putredine gastrica calor vix ullus oritur, etsi enim magnæ pilæ congestæ sceni (l) pilorumve (m), sponte incalescunt, & ignem concipiunt,

S s 2

(x) p. 322.

(y) REAUMUR *Mém. de* 1752. p. 453. 471. 473. 485.

(z) p. 485. 486. 487.

(a) Conf. p. 335.

(b) BOERHAAV. *Elem. Chem.* c. 93. 94.

(c) In L. XXIV.

(d) GABER *miscell. Taurin.* T. I. p. 84.

(e) HOME *agruult.* p. 83. DOSSIE *introd.* p. 66. p. 286. GABER *ibid.* p. 77. seqq.

(f) Sal volatilis in stercore columbarum sponte generatur HOME *ibid.*

(g) Caro putrida, cum igne subjecto ejus elementa destillarent. minus dedit salis volatilis, quam recens NAVIER l. c. p. 40.

(h) HOMBERG *Mém. de l'Acad.* 1714. p. 189. DOSSIE p. 288. 289. 290. BROUSSONNET *quest. med.* 9.

(i) Conf. WALLER *Chem.* p. 281. 389. Ex nitro cum carbone distillato sal alcalinus volatilis habetur *Mém de* 1757. p. 334.

(k) K. *Svenska Acad. handling* 1760. p. 155.

(l) HJÆRNE *Adl. labor.* p. 36.

(m) THEVENOT *voyage* T. II. L. I. c. 7.

cupiunt, & panni a propria corruptione incensi, in speciem salis vel carbonis abeunt (*n*), non tamen finit humor perpetuo adfusus quidquam in ventriculo simile prævalere. Calor ex carne & farina avenacea cum saliva putrescente natus, non superavit tres gradus (*o*).

§. XXX. IV. Rancescentia.

In adipe & in oleis acor (*a*) quidem est plurimus: non tamen accescunt corrupta, & in ventriculo diu quidem cruda manent. Quo plus butyri cibis admiscueris eo tardius exit, etiam tertio demum die (*b*). Omenti pars quadragesimo demum die per inferiora descendit (*c*); & adeps post quatuordecim menses (*d*).

Alias pinguedo per vomitum coacta rejicitur sebi (*e*) similis, acidi puti prævalentis humoris vi indurata. Fusca materies inflammabilis de chocolata corrupta vomitu rejecta (*f*) legitur.

Plerumque tamen in liquamen sensim contabescit, ingratiissimi (*g*) saporis (*h*), odorisque, & flammam concepturum (*i*); & eo pertinent sputa ardentia (*k*), & vomitus inflammabiles (*l*), quos veteres dicebant *bililosos*. Corruptos cibos esse, quæ vulgo ita vomuntur, HELMONTIUS ostendit (*m*). Quare Cl. cæterum virorum, potissimum trans alpes, large in morbis acutis data olea; aut spermatis ceti in pectoris obstructionibus usum, ego quidem nunquam aulus sum imitari, qui etiam ballama naturalia, adeo manifesto acidiora, rancescere, & asperæ arteriæ insedisse, pene strangulante cum acrimonia, nimis sum expertus. Nobiscum

(*n*) *Hist. de l'Acad.* 1725.

(*o*) PRINGLE p. 400.

(*a*) L. I. p. 31. 32.

(*b*) *Eph. Nat. Cur.* Vol. 10. obs. 4.

(*c*) *Alex* BENED. L. XIX. c. 5.

(*d*) TULP. L. III. c. 18.

(*e*) *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 3. obs. 253. HOFMAN *de remed. benign. abus.*

(*f*) HOFMAN *Med. Conf. Cent* II. Dec. II. c. 4.

(*g*) Amara est cum falsedine gelatina, in quam ossa ver vim ventriculi animalis car-nivori redacta sunt REAUMUR p. 480.

(*h*) In buteone, REAUMUR p. 480.

(*i*) BOERHAAV. T. I. p. 254. *Elem. Chem.* T. II. p. 113.

(*k*) p. 120.

(*l*) *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 3. obs. 154.

(*m*) *Pyör. rector.* n. 13. 25.

biscum Cl. & expertissimus TISSOTUS (n). Cæterum & parcior pinguedinis usus, & adfusa maxima vis aquæ humanæ, facit; ut hæc degeneratio paulo rarior sit, quam acida. Non infrequenter tamen ex vitellis ovi, nimia copia adsumtis, supervenit, quo non alius cibus difficilius coquitur (o), idem vero oleo plenissimus (p) est.

§. XXXI. *Connixtio ciborum in massam similem informem.*

Nunquam album (a) chylum in ventriculo vidi, sed a perfecta digestionem cineream, aut flavam, pultaceam (b), mucidam, uniformem massam, in qua nullam partem ciborum distinguebam, neque olera, neque panem, neque carnes, neque vinum (c). In ruminantibus viridis est (d). Perinde mucida sub pyloro ciborum massa est (e), & per intestina tenuia.

Adparet adeo vires ventriculi ex figurato, celluloso pane, fibrosa carne, pastacea farina, succosis fructibus horæis, albo lacte, vino rubro, in unam uniformem, æqualiter mollem massam pultaceam consentire, in qua figura quidem & fabrica peculiaris deleta, dotes nimix, odoris, saporis, coloris, propriæ species abolitæ, durities subacta, & uniformis mucosa, mediocriter odorata, fatua natura ex omnibus temperata sit. Etiam quadrupeda (f), aves (g), pisces (h) & serpentes (i), in similem mucum tota animalia dissolvunt.

Oportet autem ventriculum non nimis cito a sumto cibo aperire: id enim si factum fuerit, poterit cibus non mutatus, & panis cum sua laminosa fabrica, ibi reperiri, & spiritus vini odor, & olerum folia colorque superesse. In intestino quidem nihil simile unquam reperi, quod in

S s 3

ea

(n) *Febr. bilios. Lausann.* p. 54.

(o) LINN *Skonska resa.*

(p) SPIELMANN *Inst. Chem.* p. 77.

(a) Affirmat, se in canibus vidisse VERHEYEN L. II. p. 211. & in humano ventriculo, cum vulnere pertusus esset

(b) FOELIX *Exp* 8. WALÆUS p. 764. Conf. PEYER *obs.* 18.

(c) A vino rubro nigricantem PLEMPIUS vidit, *fundam. med.* p. 124. In lupo nigra massa SENAC *Ess.* p. 121.

(d) PEYER p. 184. DUVERNEY II. p. 482.

(e) WEPFER *cicut.* p. 119.

(f) p. 311. 312.

(g) p. 312. 313.

(h) p. 312. 313.

(i) p. 313.

ea cibus non veniat, nisi a perfecta coctione. In morbis tamen etiam per intestina propria ciborum figura, colorque propius superest: tum in vulnere intestini.

Nihil autem magis inopinatum in ventriculo nascitur, quam lapillus: & tamen is partus est ex frequentioribus. Non retrogradum volo calculum (*l*) biliarium, neque ex absorbentibus terreis natum cretaceum calculum (*m*), fæcesque pene petrefactas in ægrorum animalium ventriculis (*n*). Sed calculum terreum & sublixiviosum (*n*^{*}), in analysi daturum, ut calculus vesicæ, terræ multum (*o*), salis volatilis pauxillum (*p*), & multum generantem aeris.

Frequens est phænomenon in multis animalibus, equo (*r*), bove (*s*), ibice (*t*), etiam in columba (*u*) aliisque. In occidentali bezoar possis moram accusare, in marsupio peculiari (*w*), in quo bezoar reperiri scribunt. Sed in homine nihil est simile. In ventriculo lapilli reperiuntur, ubi nullus moræ locus videtur, copia etiam magna (*x*), & pondere non modico.

Videas ex sedimento quidem tartari vini simili nasci, quod ipsum vomitu redditum est (*y*).

Videtur vel ex potu, particulis terreis pleno, sedimentum decedere, ut alias ostendetur (*z*), vel eam ipsam terram officulorum, aliarumque partium animalium per vim acidam erofarum, extrahi, uti ex ossibus etiam & crystallos & terram ope aceti eduximus (*z*^{*}).

SECT.

(*l*) *Journ. de Trev.* p. 1110. HEISTER. *anal. jul.* 1726. M. Aug.

(*m*) ESCHENBACH *varior. anat. med.* n. 9.

(*n*) PLANQUE II. p. 42.

(*n*^{*}) *Phil. transf.* n. 475. n. 7. ex equo.

(*o*) In LOWERIA ad $\frac{1}{12}$. SLARE & KOENIG.

(*p*) KOENIG in Laweria historia ad $\frac{1}{24}$.

(*r*) *Mus. Closter.* p. 19. &c.

(*s*) *Act. Suec.* 1725. p. 79.

(*t*) *Galer. di Minerv.* l. d. 18. C. a COSTA.

(*u*) Strangulans animal lapillus *Gener. hist. of birds* T. II. p. 217.

(*w*) Petr. de OSMA apud MONARDEZ L. III. p. 39. quem habet a COSTA *hist. natur.* L. IV. c. 40. 41.

(*x*) Ad quatuor l. KOENIG. Duas volas replentes HOFFER: alia exempla vide in *Journ. des Savans* 1690 init. apud SCHNEIDER *catarrh* T. III. p. 240. CARDAN. *contradi.* L. II. tr. 5. p. 175. Uncialis calculus *Phil. transf.* n. 250.

(*y*) PANABOE. *Pentec.* l. obs. 3.

(*z*) L. XXVII.

(*z*^{*}) *Ferm. des os.* p. 193.

S E C T I O V.

C A U S Æ C O C T I O N I S C I B O R U M.

§. I. *Liquor macerans.*

PEne omnia, quæ certa fide scimus, in priori sectione dicta sunt. Superest, ut per singula ostendamus, inter causas, quas exposuimus, mutationis ciborum, quam quæque partem ejus mutationis producat.

Et primum utile videtur fore, ut eas causas primas contemplemur, absque quibus nulla omnino in ullo animali ciborum coctio locum habet. Earum enim in novis phænomenis cibi digesti producendis maxime erit dignitas.

Nullum ergo animal quadrupes; neque avis, neque piscis, neque insectum est, absque plurimo humore, qui ad novum cibum in ventriculo adfunditur: absque spontanea mutatione in acorem, aut in putredinem, quæ ex natura cibi pendet: neque absque aere aut atmosphærico, aut interno, qui se expandat elasticus.

Plurimi pisces, & angues; & aves aliquæ (a), sunt ventriculo membranaceo, qui etiam distentus, inque nodum tumens, deglutita animalia cum plumis & ossibus concoquit. Tritus ergo a ciborum coctione abesse potest (b), & tamen cibus coqui. Neque mora (c) in coquendo multo major est tritu carentibus, quam in animalibus musculofo stomacho instructis. Galeus intra paucas horas (d) ad cutem usque feminam consumit. Afellus (e) Cabeljauw intra sextam horam pisces devoratos concoquit. Post dimidium (f) diei caput deglutiti piscis consumtum erat. Celeriter Lucius (g) prædam digerit. Sic buteo intra 24. horas,

canem

(a) Ut famelicus ille cuculus, cujus ventriculus totum abdomen replet, & undique cellulosa tela adnectitur. HERRISANT. *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 420. 421.

(b) BERGEE p. 117.

(c) Lente lucium digerere, & per aliquot dies. RICHTER *ichthyothéol.* p. 192.

(d) TOWNE in RAI *Epist.*

(e) ANDERSON p. 79. magnos etiam canes devorat.

(f) RICHTER *Ichthyothéol.* p. 341.

(g) LEOPOLD p. 621.

carnem perfecte coxerat (*b*) : & (*i*) canis intra 24. horas os , quantum ejus fieri potest , resolvit.

Hic succus iis in animalibus fere solius ventriculi est progenies , aut certe ab appendicibus cæcis pylori suffunditur (*k*) , subsalsus uterque , ille tenuior , hic acrior (*l*).

Gastricum humorem aquæ (*m*) , quæ pauxillum salis lixiviosi dissolutum teneat , vires (*n*) habere videtur. Ejusmodi autem liquores potenter resolvunt , & per nupera LEVRETI (*o*) , experimenta etiam caseum in sua elementa diluunt , & crustam sanguinis inflammatoriam colliquant.

Videtur ejus succi copia aliqua & abundantia requiri. Hinc in oesophago lentius carnes coquantur , in ventriculo celerius , ubi major ejus ubertas (*p*). Recte inter causas coquendorum ciborum primo loco recensetur , quod solus nunquam desit , etiamsi & saliva (*q*) abest , & appendices pyloricæ nullæ sunt (*r*).

Appendicum mucus & ipse subsalsus est (*s*) , & etiam in calidis animalibus , maxime de ruminantium classe , immensa in ventriculo , potissimum quarto , mucis vis est.

Ejusmodi mucus non unice villosam tunicam tuetur , & a nervis subjectis ciborum aut potus avertit acrimoniam ; sed etiam in coctione cibi suas egregias partes ornat. Mucus enim soluto gummi (*t*) proximus est. Sed ejusmodi gummi cum oleo fluido , & cum balsamis misceri potest , ut cum aqua in albam emulsionem abeat. Diximus autem , non aliam partem coctionis difficiliorem ea esse , qua olea solvuntur (*u*) ,

Neque

(*b*) REAUMUR *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 469. 470.

(*i*) ANDRY *alim. du Carême* p. 13.

(*k*) p. 302.

(*l*) Ibid.

(*m*) p. 142. 143. Acrior quam saliva DEIDIER *humor.* p. 50.

(*n*) Vires hujus phlegmatis extollit KUNKEL *obs. chym.* p. 62. Esse verum fermentum L. a CAPOA *dell. incertit. delli medicam.* p. 56. 57. VIEUSSENS *remot. & prox.* p. 145. 146. Partem facit liquidi solventis BOHN *menstr. anim.* p. 484. KERGER *ferment.* p. 198. 199.

(*o*) In nupera *art d'accoucher* p. 319.

(*p*) p. 313.

(*q*) In piscibus.

(*r*) p. 313.

(*s*) p. 302.

(*t*) LEWIS *mat. med.* p. 297.

(*u*) p. 211. 324.

Neque oportet liquorem ventriculi contemnere, quod mitis, quod nullo pungente sapore sit conspicuus. Nam etiam viperarum venenum, adeo funeste efficax, dulce est (w), & albumen ovi difficillimam solutu myrrham liquefacit (x). Denique cum sola aqua tritum lignum in teredine perforatur (y).

In animalibus perfectioribus saliva accedit: magna quidem copia (z), in qua aquæ vis exiguo iterum salis lixiviosi (a) momento quasi acuitur. Ostendimus dudum, absque ea appetitum & cibi coctionem languere. Vires habebit gastrici liquoris.

Merito adeo salivam inter præcipuos (c) liquores digestivos Cl. Viri receperunt, ut tamen, & recte, pancreaticum succum (d), & liquorem ventriculi (e), & intestinorum (f) conjungerent.

Quomodo hæc aqua operetur, non repetimus (g), nisi quod vis illa salina in solvendo oleo, & in ipsis etiam glutinis (h) minima elementa conjungentis resolutione adjumento sit.

Neque repeto, ab his adfusus mitibus liquoribus degenerationem acidam & putredinosam nimiam inhiberi.

§. II. *Corruptionis spontaneæ vires.*

Etsi nunc multum in ventriculo ad coquendos cibos succus potest: etsi acoris signa minime rara (a) sunt, non ideo oportet fermenti nomine

(w) REDI &c.

(x) MACQUER *Chem. prat.* T. II. p. 488.

(y) ADANSON p. 266.

(z) p. 58. 59. 60.

(a) p. 55.

(c) BOERHAAVE, BOHN. *menstr. anim.* p. 474. COCKBURN *Oecon. anim.* p. 10. VERHEYEN L. II. p. 257. 258. GASTALDI *de saliva* apud TRIVULT 1715 Juill. TEXTOR l. c. p. 58. PRINGER l. c. p. 413. HOFMAN *de Saliva* & in *Physiol.* BAGLIV p. 392. etiam MATTEI p. 7. DUCCHINI p. 47. DUNCAN. *chem. natur.* iste cum spiritu animali sulphureo, & cum liquore ventriculi.

(d) BOHN.

(e) BOHN. DUNCAN. DUCCHINI.

(f) BOHN.

(g) p. 311.

(h) L. I. S. r.

(a) p. 315. seqq.

mine (b) uti, quod cibos in naturam animale salubrem convertat, & etiam minus id fermentum decet cum acido (c) succo, aut cum aqua forti comparare (d).

Nam neque in spiritu (e) nerveo, neque in saliva (f), neque in succo pancreatico (g) acor manifestus ullus est.

Frustra etiam quisquam, imitatus liquores acres chemicos, liquorem corrodentem invenerit, qui carnem in pulvem resolvat (h); eoque sine olei vitrioli (i) acrimonia uti voluerit, aut spiritu nitri cum cornu cervini spiritu, & saliva, chylum ex carne coquere (k). Non succedere reperit VERHEYENIUS, cum ab ea tamen opinione non esset remotus (l).

Ipse dudum HELMONTIUS tamen docuit, acorem fermenti ventriculi esse humanum, peculiarem, ab omni fossili, aut vegetabili acore (m) diversum; fermentationem cibi etiam aliam esse ab ea, quæ spiritum vini generat (n), neque in vasis nostris acorem ullum habitare (o). Nempe per ea adparet, quæ præmisimus, acorem degenerationem quidem esse ciborum, valde frequentem (p), sed degenerationem tamen, quæ non ducat ad naturam humanam, ut quæ sit alcalinæ prior (q). Acor etiam fibras animalium potius indurat & conservat, ut incisores solent aqua aluminosa aut aceto ad suos labores carnes conservare, quas lento opere demum rimantur; idem oleum ita non resolvit, ut vehementer cogat, & tamen multa pars nostri alimenti est pinguitudo, quam in sano homine nunquam videas cum sua conservata specie de corpore decedere.

Deni-

(b) HELMONT. *sextupl. digest.* n. 2. 3. 4. 11. 12. 13. *calor. effec. non digerit* p. 167. PASCAL p. 283. P. CASTELL. l. G. MAJOR *de ærumn. gigant. Tr. des malad. de l'estomac.* p. 194. 195. REGIUS *Phil. nat.* p. 245. TARGIRUS p. 127. SENGUARD. *Phil. transf.* n. 292. SYLV. *diff.* l. n. 12. &c. VIRIDET. CRAANEN, etiam FANTON.

(c) P. CASTELL. *ibid.* HELMONT. *sextupl. digest.* n. XI. XIV. PEYER *mergcol.* L. II. c. 5. SYLVIVS. CRAANEN: potissimum VIRIDET c. 10. 11. 12. SAVIOLUS.

(d) *Tr. des Mal. de l'estomac.* l. G. CRAANEN *de homine.* p. 31.

(e) SYLV. *diff.* II. n. 6. 24. Conf. L. X. nostr. p. 375. PASCAL.

(f) p. 16. *Præx. med.* T. V. app. p. 713.

(g) *Diff.* X. n. 37. 40. Ostendetur L. XXII.

(h) BIRCH T. I. p. 83.

(i) BOYLE *de util. philos. Exper.* p. 118. &c. *fluid. firmis.* p. 244.

(k) LEIGH. *Phil. transf.* n. 162.

(l) L. II. p. 266.

(m) *Sextupl. digest.* n. 14.

(n) *Spirit. vit.* p. 157.

(o) HELMONT. *pleur. fur.* n. 14. 15. 16. 17. 18.

(p) p. 315. seq.

(q) L. V. p. 84.

Denique acoris tempora in ventriculo brevia esse, & cito putredinem supervenire, experimento constat (r).

Vide, si placet, & alios contradicentes (s).

§. III. *Putrescentia.*

Putredinis major vis est. Ea enim utique omnia corpora animalia & vegetabilia in pulvem (a) reducit: glutine, ut videtur, elementorum dissoluto (b): sive ipse aer id gluten sit, sive ab aere se expediente destruat. Ostendimus tamen etiam eam degenerationem non plenam in ciborum coctione (c) admitti posse.

Aeris expansionem jam proposuimus. Ad eam alii coctionem reducunt (d). Multum vero usi sunt (e) PAPINIANO lebete (f), vasis nempe duobus sibi congruentibus, clausis, ut aer effugere nequeat; in quibus ossa cum aqua reposita, brevi tempore in gelatinam emolliantur (g), & friabilia fiant (h), & succus inde glutinosus exeat (i), atque cartilagine in gelatinam abeant (k). Calor autem aquæ tantus est, ut gutta intra quatuor (l), & intra tria (m), minuta secunda exhalando dissipetur, & stannum atque plumbum fundantur (n).

Quare recte repositum est, ventriculum cum machina PAPINI (o) non bene comparari, cujus fervor calorem nostri ventriculi immensum superet.

(r) p. 321.

(s) VALISNERI *Galer. di Minero*. T. VI. p. 86. GEORGI *de homine* p. 77. seq. HECQUET, *de la digest.* Le FRANÇOIS *reflex. crit.* p. 310. 311. L. a CAPOA l. c. p. 52. sq.

(a) L. V. p. 89.

(b) Conf. KNIGHT. *vindic.* p. 6. 7. 12. 26.

(c) p. 323.

(d) KNIGHT. DRAKE *Anthropol.* p. 84. & certe pro parte VARIGNON. VERBRIES. LISTER *hum.* c. 9. p. 95. MORGAN. *princ. Medic.*

(e) DRAKE p. 86.

(f) PAPIN. *l'art. d'amollir les os toto tr. & c.* 3. BOYLE *exper. phys. mechan. cont.* in art. 19. WOLF *Abfekten der Theile* p. 32. 33.

(g) Cap. II. *Exper.* 6. 8. 9. Cap. III. *Exper.* 1. 6. In piscibus Cap. II. *Exper.* 13. 14. 15. Cap. III. *Exper.* 9.

(h) Cap. III. *Exper.* 3. 5. [de ebore quod nunquam emollitum fuit p. 109.] *Contin.* *Exper.* 6. de ossibus.

(i) Cap. III. *Exper.* 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. *Contin.* *Exper.* 5. 6. 7.

(k) Cap. III. *Exper.* 3.

(l) Cap. II. *Exper.* 6. 9. 11. Cap. III. *Exper.* 7. 8. *Conten.* *Exper.* 7.

(m) Cap. III. *Exper.* 1. 3. 4.

(n) MUSCHENBROECK *Ess. de Physiq.* p. 434. NEUMAN *Oper.* T. I. p. 282.

(o) KRUGER *physiol.* 104.

superet. Cum enim metalla fundat, necesse est calorem vaporum in iis lebatibus excitatorum superare ebullientis aquæ calorem, qui tamen est ad ventriculi humani calorem ut 214. ad 96.

§. IV. *Tritus.*

Quæ animalia iis viribus solis cibum coquunt, quas nunc enarravimus, ea solas carnes pascuntur. Cum autem plurima alia animalia feminibus duro cortice tectis, etiam nucleis ossæo putamine defensis vivant, non sufficeret ejusmodi vis diluens, neque etiam longissimo tempore tutela harum nucum superaretur.

Retinuit ergo natura macerationis vim, & aeris, inque ingluvie (a) vires istas ad præparandos duros eos cibos præmisit. Sed addidit eadem potentissimam vim tritus, qui dura legumina per ingluviem, succumque bulbi glandulosi (b) emollita, in pastam farinaceam conterit. In nonnullis infectis eum tritum auxit, additis in ventriculo dentibus.

Quare cum tritu ipsa metalla resolvantur, cum solo mechanico (d) procul dubio tritu artifex in anate cibi digestionem sit imitatus, eo minus est mirum, potuisse olim ERASISTRATUM, magnum virum (e), & nuper ARCHIBALDUM PITCAIRN (f) iatromathematicum, & ejus sequaces (g), a tritu ciborum in ventriculo mutationes repetere: alios moderatiores certe tritum (b) ad chylosin tamquam adjumentum adhibere.

Neque

(a) p. 110. seq.

(b) p. 118.

(e) In cancro HANOV. *Seltenb.* l. p. 514. PEYER *merocol.* p. 12. MURALT. *Vadem.* p. 585. WILLIS *anim. brut.* tab. 3. f. 1. In cancello quinque dentes SWAMMERDAM *bibl.* p. 202. in purpura duodecim *Phil. transf.* Vol. 50. P. 2. p. 587. In locusta RONDELET p. 136.

(d) VAUCANSON apud KELLMAR *hom. machin. natur.* p. 18. NICOLAI *von der Einbildungskraft præf.* p. 20. Ad fine experimentum exstat LANGII, qui cibos madefactos. pressos, in vesica bubula in massam chyli similem resolvit VERDRIES *de ventric.* p. 87.

(e) CELSUS *præf.*

(f) In *Diff. de modo quo cibo conf.*

(g) HECQUET *de la digestion*; etiam FAGON apud le FRVRE *physiol.* p. 50.

(b) RABOURS *Theff.* ann. 1737. Ergo tritus chylosin juvat. BOERHAAVE &c.

Neque adeo difficile fuerit de hac quæstione consentire. NATURA tritum quidam nullum adhibuit in piscibus & in serpentibus (*i*) mere carnivoris. Vim maximam ventriculi in avibus adhibuit, quibus neque dentes sunt, quibus femina commolant, neque diaphragma, quod in ventriculum nitatur, & quæ tamen duro victu utantur (*k*).

Pure ergo granivoris ventriculum durum dedit (*l*). Præmisit eadem ingluviem macerationi unice destinatam, tanto majorem. quanto durior cibus est (*m*). Dedit etiam fortem ventriculum quibusdam omnivoris, ut anatino generi, insecta quidem, sed pariter grana pascenti; avibus scarabæis durisque insectis vescentibus, alaudæ (*n*), passeri (*o*), caryocactæ (*p*), arquatæ (*q*). Plerisque vero omnivoris, quibus ex granis feminibusque cibus sit, ventriculum fecit debiliorem, ut graculo (*r*), monedulæ cornubicæ (*s*), turdo (*t*), merulæ torquatæ (*u*): aliis etiam membranaceum, ut nycticoraci (*w*), picæ (*y*), pico (*z*), meropi (*a*).

Mere piscivoris & carnivoris omnino debilis est ventriculus: fabrica quidem priorum ventriculo similis, similibusque tendinibus, sed musculo-losa carne non robustiori, quam est in quadrupedibus.

Fabrica carnivororum animalium quadrupedum pene eadem est, quæ avium, & tritus mediocris cum multo humore macerante conjungitur (*b*): tamen ob dentes, ob diaphragma, & robustos abdominis musculos, plus aliquantum
habet

(*i*) p. 270.

(*k*) p. 116. 117.

(*l*) Ibid.

(*m*) p. 111.

(*n*) Ibid. p. 116.

(*o*) Ibid.

(*p*) Ibid.

(*q*) Ibid.

(*r*) p. 115.

(*s*) Ibid.

(*t*) Ibid.

(*u*) Ibid.

(*w*) p. 114.

(*y*) Ibid.

(*z*) Ibid.

(*a*) Ibid.

(*b*) Vocat ventriculos mediæ fabricæ ILL. REAUMUR *Mém. de* 1752. p. 487.

habet de tritu. Granahordei cocta buteo non digerit (c), neque panem (d): homo utrumque cibi genus coquit. Natura enim hominem magnæ varietati ciborum destinavit, viresque dedit ad omnes accommodatas. Facile vero credas, hominem Europæum ventriculo esse debiliori, quam quidem ex NATURÆ dono esse posset. Ostendimus, gentes sibi permissas, & artibus destitutas, majorem copiam ciborum ferre & coquere (e), & crudos subigere (f).

Recte fecerunt, qui tritus vires, ex hypothese in immensum auctas, ad suam mediocritatem reduxerunt (f*).

Non bene, qui omnem tritum a digestionem removerunt, quod absque eo piscium (g) ventriculus cibum coquat: quod in nonnullis exemplis, absque tritu animalia vixerint, ut in struthione, cui clavus transfixus parietes oppositas ventriculi a contactu prohibebat (h); quod homines cum devoratis cultris in ventriculo sedentibus diu supervixerint (i), & etiam integram valetudinem his excisis recuperaverint: quod hydropici absque viribus musculorum abdominis recte appetant (k); & ob alia ejus generis argumenta.

Nam si pisces absque tritu cibum coquunt, acriorem his succum ventriculi esse necesse est: qui spinas piscium & devoratorum animalium ossa etiam absque mora dissolvat (l), quale quid supra vires ventriculi humani est. Uti vicissim debiliior avium granivorarum succus est, cum caro in tubis ab his devoratis non mutata fuerit (m).

Neque homo cultrivorus, eadem, qua sanus homo, facilitate cibum coxerit, etsi a succo macerante tamen aliqua pars resoluta est, idemque fluido forte potissimum alimento vixit. Hydropicis diaphragma superest (n), & certe ob pressionem sublatam ventriculi perpendicularis prava

(c) REAUMUR *Mém. de* 1752. p. 477. 478. 479. 301. *Journ. des Savans* 1753. Juill.

(d) p. 477. 478.

(e) p. 221. 222.

(f) *Ibid*

(f*) ASTRUC. HARTSOEKER *extr. crit.* p. 11. argumento baccarum.

(g) LISTER *conchyl* p. 150. seqq.

(h) VALISNER *notom. d'un struzzo* p. 242. 243.

(i) p. 318.

(k) VIRUSSENS *tr. des liq.* p. 267.

(l) p. 312. 313.

(m) REAUMUR *Mém. de* 1752. p. 303.

(n) HESQUET. *digest.* p. 161.

prava fuit digestio (o). Denique succus ventriculi cum calore cibum non digerit (p), & suæ putrilagini permittit, ut omnino ad rectam ciborum coctionem tritum requiri constet. Uti ergo natura in ventriculo nostro vires macerantes & terentes conjunxit, ita in causarum catalogo utramque oportet conjungere.

§. V. Calor.

Sunt etiam alia quædam coctionis adjumenta, absque quibus cibi digeri queat, sed quæ addita reliquis causis, tamen coctionem ciborum adjuvent. Non dubium est, quin calor, qualis in ventriculo modicus (a) est, & incubantis gallinæ calori similis, plurimum possit in solvendo glutine, gelatina diluenda, adipe emolliendo, macerante vi aquæ augenda, initiis fermentationis & putredinis introducendis.

Certe insecta fere absque cibo diu supersunt, dum cælum friget, & polypus æstate vorax, intra duodecimam horam digerit (b), hieme aut ferius, aut omnino ne adpetit quidem. Chamæleon hieme cibos vix coquit, & per arum crudos dejicit (c): ita neque testudo hieme edit (d), & pancreata piscium hieme fere strigosa sunt (e).

Ita factum est, ex collectis & comparatis forte phænomenis ventriculi & artis coquinarie, ut dudum metaphora invaluerit, quæ ciborum salubrem mutationem per coctionem (f) interpretatur. Neque longe abfuit, quin a calore (g) utique cibos solvi docerent, quam opinionem GALENUS (h) uberius ornavit.

Nuperi

(o) MANGET *bibl.* p. 77.

(p) KRAUMUR *l. c.* p. 485. 486.

(a) p. 295.

(b) p. 169. 170.

(c) VALISNER. II. 402. 403.

(d) CALDESI p. 29.

(e) LISTER *Exerc. anat.* II. p. 28.

(f) Πέψις HIPPOCR.

(g) HIPPOCR. apud CELS. *præf.* L. I. PLATO, calore cibos liquefieri: & POSSIDONIUS apud SENECA: & CICERO *nat. deor.* L. II. p. 602.

(h) *De usu part.* L. IV. c. 8. *Facult. nat.* L. III. c. 8. Tum tota schola. Inter recentiores GALATHEAU SCHOOK *de ferment.* c. 23. &c. DUCCINI p. 69. qui viscera carbonos vocant, ventriculum tamquam lebetem calefacturos.

Nuperi calori quidem non omnia, partem tamen officii ventriculi tribuerunt, ut ejus vim vel cum putredine (*i*) combinarent, vel cum aeris actione (*k*), vel cum saliva (*l*) pancreatica & bile.

Verum prior FERNELIUS (*m*) cibos a calore negavit coqui. Deinde HELMONTIUS (*n*) memores nos esse jussit facilitatis & celeritatis, qua pisces frigidissimi (*o*), suum tamen cibum coquunt, aselli (*p*), lucii (*q*) aliique (*r*). Facile etiam foret ostensu, calorem cum cibis acorem, deinde putrefactionem (*s*) producturum, non dulcem chylum.

Nos, cum PORTIO (*t*) BOERHAAVIO, aliisque diversas causas, quas natura in coquendis cibis conjunxit, & ipsi conjungimus.

§. VI. *Causæ non veræ.*

Vermes (*a*), qui morbi sunt genus, ab hac theoria totos removemus.

Sic ciborum reliquias: adeo non coquendi causas, ut coctionem inhi-beant. Nunquam enim recte appetimus, neque digerimus, nisi quando ventriculum penitus evacuavimus. Quare ne inter auxilia (*b*) quidem coctionis eas reliquias admittimus. De spiritibus diximus.

§. VII. *Aliæ ventriculi functiones.*

Primaria est, alimenti partem de ventriculo resumere.

Ostendimus in ore (*a*) partem utilis succi de cibis in minimas venulas hauriri.

De

(*i*) LISTER.

(*k*) DRAKE MORGAN. *princ. med.*

(*l*) C. DEMOCRITUS *vit. anim. morb. & med.*

(*m*) *Abdit rer. caus.* p. 267.

(*n*) *Calor efficaciter non digerit sed excitatio &c.*

(*o*) *Ibid.* n. xi.

(*p*) FABER *de homine* p. 201.

(*q*) L. a CAPOA *Risless.* T. IV. P. 2. p. 233.

(*r*) HEEQUET *digest.* p. 253.

(*s*) p. 312. 313.

(*t*) *In Opusc.*

(*a*) VERCELLONUS ATKINS *navy surgeon.* p. 6. 7.

(*b*) VERHEYEN L. II. p. 257. 258. 259. CASTELL. I. c. p. 149.

(*a*) L. XVIII. p. 62. 63.

De ventriculo minime dubites, quin simili officio fungi aptus sit. Nam & venas in cavum suum patulas, quarum non aliud officium esse possit, & tunicam villosam similem villosæ intestinorum, & lymphaticas venas habet, bibulum vasorum genus; & succus coloratus etiam in cadavere in venulas forbetur; inque polypis succus cibi rubri (b) [in exemplo] in totum animal se diffundit.

Ostensum est, vim venenorum tunc potissimum operari, quando in ventriculo hærent, etiam belladonnæ (c), opii (d), cicutæ (e), œnanthes succo viroso (e*).

Demum multi homines, cum omnia vomerent, diu tamen vitam tolerarunt, etiam satis integra cum valetudine (a), etiam ad octo annos (b), & ad viginti (c), & ad 26. (d).

Vixit etiam melancholicus homo, cui scirrhus (e) pene integre pylorum clauserat, & mesenterium simili scirrho erat obstructum: tum alius, cui lapis (f) pylorum obturaverat, ut nihil permearet (f*).

Credas, ad moram cibo injiciendam, & augendam superficiem resorbentem, rugas & valvulas in variorum animalium ventriculis factas esse, adeo perpetuas, ut a nullius, quantum reperi, animalis ventriculo absint. In primo (g) & tertio ventriculo (h), & quarto (i) ruminantium præsto sunt.

In

(b) TREMBLEY p. 126. 127. 131. 132. BAKER p. 129.

(c) Rifus sardonius, furor. *Journ. de med.* 1759. M. Aug.

(d) L. XVIII. p. 606. 607.

(e) WEPFER p. c 8. ut desinerent symptomata, quam primum de ventriculo exierat.

(e*) *Journ. de medec.* 1763. Mars.

(a) DU HAMEL corp. anim. L. II. c. 2. Cum omnia vomeret æger, mors post multos annos PECHLIN Cent. I. obs. 48.

(b) LOESECKE obs. p. 37. post dysenteriam.

(c) PEANQUE T. III. p. 499.

(d) *Journ. de Med.* 1760. M. Aug. cum homo solum lac sumeret.

(e) HOBCHSTETTER p. 240.

(f) SCHNEIDER Catarrh. T. III. p. 240.

(f*) Conf. p. 283. 284.

(g) PEYER p. 108.

(h) Id. ic. 9. 10. PERRAULT t. 14. f. 4. VIRUSS. p. 273. 275. *Comm. Petr.* l. 6. DUVERNEY T. II. p. 437. In ove huanaco FRUILLET.

(i) PERRAULT ibid. f. 5. VIRUSS. p. 274. 275. DUVERN. T. II. p. 438.

In elephanti etiam ventriculo reticulatæ sunt valvulæ (*k*), & in urso (*l*), inque (*m*), cuniculo (*n*), sue (*o*), phoca (*p*), testudine (*q*).

Inter aves, in tarda (*r*). Inter pisces, in mugile (*s*), galeo (*t*), squadra (*u*). Inter insecta, in gryllotalpa (*w*).

Huc demum referas saccos minores quidem, tamen reticulatis quasi muris cinctos, ventriculi secundi (*x*), potissimum in camelo (*y*) amplios, qui ob eam forte fabricam sua aquæ penu contentus, deserta Arabiæ tutus oberrat, toto æstate absque potu duraturus, ut a custode Dromedarii perfici percepi (*z*). Minime negaverim, etiam cibos eo loco retineri, & inter mobiles laminas conteri (*a*).

Moram autem cibus injiciendam præcipuum faciendarum valvularum finem fuisse, satis facile ostenditur. Non esse nempe ad facilitatem extensionis, ostendunt valvulæ tertii ventriculi ruminantium, & sacci cameli, quos nulla extensio aboleat.

Neque ob augendam adeo faciem ventriculi exhalantem demonstrat duritas, ut in gryllotalpa.

Merito ergo partem aliquam tenuis humoris in ventriculo resorberi olim visum est (*b*).

Est autem tenue (*c*) & decolor, quod resorbetur, & spirituosum, & aqueum, neque major pars nutrientis in cibo materie in ventriculi venas hauritur. Sæpe enim ex atrophia perierunt, quibus pylorus obstructus erat

(*k*) PARIS.

(*l*) Ibid.

(*m*) UNICA BARTH. Cent. IV. Hist. 100.

(*n*) GREW p. 10.

(*o*) p. 14.

(*p*) RONDELET p. 261.

(*q*) PARIS.

(*r*) HARDER. exercit. p. 217.

(*s*) RONDELET p. 261.

(*t*) KLEIN pisc. miss. IV. n. 62.

(*u*) REDI anim. viv.

(*w*) PEYER ruminant. p. 8.

(*x*) PEYER Merycolog. ic. 6. p. 125. FERRAULT l. c. t. 14. f. 1.

(*y*) PARIS. anat. anim. P. I. p. 76. Comm. Acad. Petr. T. X. p. 341.

(*z*) Conf. p. 177. Arabes siti pressos inciso ventriculo camelorum sitim solari LAZAR Afr. Occid. T. I. p. 299.

(*a*) DEVERNEY T. II. p. 444.

(*b*) GUIDOT prolegom. de urin. p. 37.

(*c*) IDEM.

erat (d), aut hepar ventriculum elisit (e), aut qui omnia revomebant (f). Cum enim nulla lactea vasa in ventriculo reperiantur, chylus verus ibi non gignitur.

§. VIII. *Num alia ventriculo officia sint.*

Olim animæ sensilem sedem HELMONTIUS (a) in cardia posuit: ob dolorem forte, qui ea in sede intolerabilis est: ob deliquium animi singulare, quod ante vomitum, denique etiam a rafa tantum digitis cute ibi percipitur.

Nuper alia laude celebrior Job. WOODWARD (b), ex proprio ingenio medicus, sedem sensus, & originem animi adfectuum & cogitationum (c) in ventriculo posuit.

Omnia ex Cl. Viri opinione, & bona & mala æger in ventriculo oriri (d) percipit: inde adeo omnes animi adfectus nascuntur (e) ut prius ibi quam in capite percipiantur (f), & a terrore quasi apertionis & clausionis sensus in stomacho sequatur (g). Qui musicam amaret, & ex ea vehementer adficiebatur, sensum, tamquam purgantis medicamenti, eo loco (h) experiebatur.

Phænomena a Cl. Viro enarrata non refuto, neque non video, ventriculum a tristitia (i) pati, appetitum minui; vim coquentem a magna ira deleri, periculoso experimento: a nausea, mere morali de causa, ventriculum subverti.

Ea omnia ostendunt, tenerum sensum numerosissimorum in cardia nervorum esse. Cæterum ea non tollunt, quæ alias diximus, ut ostendamus, præcipuam animæ sedem in capite esse (k).

LIB.

(d) VIRI dialogh. IV. p. 109. Zod. Gall. I. RICHÆ epidem. II. p. 149. a scierhis. Eph. Nat. Cur. Vol. VIII. obs. 16. ab impactis nucleis.

(e) BECK. de palpit. cord. p. 34.

(f) SCHENK Exerc. p. 310.

(a) Morbor. sedes in sensib. p. 450. n. II. Jus durumvivat.

(b) Cases of physik.

(c) p. 35.

(d) p. 31.

(e) p. 288. 292.

(f) p. 34.

(g) p. 5.

(h) p. 33.

(i) HARTLEY p. 129. qui tremores a cardia ad fauces, uvulam. oculos, apicem nasi adscendere addit.

[k] L. X. [p. 392. 393.]

L I B E R XX.

V E L A M E N T A A B D O M I N I S.

S E C T I O I.

M E M B R A N Æ.

§. I.



ANTE ventriculum oportuisset hæc describi, nisi displicuisset, id cibi receptaculum ab œsophago separare.

Περιτοναϊος (a) membrana, vulgo *peritonæum*, dicitur membrana, quæ abdominis viscera, certe chylopojetica, continet. Pleuræ in universum similis, ex brevi & robusta cellulosa tela stipata, crassior ad lumbos, ad musculum transversum tenuior, alba, parum vasculosa, nisi subtilior injectio accesserit, dilatabilis insigniter a pastu, in graviditate, hydrope, hernia, viscerum situ mutato; tamen ut subito aliquo conatu, a descendente septo transverso (b), ab incurvatione qua abdomen contra pelvim (c) complicatur, non adeo raro rumpatur, & herniæ veri nominis fiant. Per morbos, ut alia corporis humani velamenta (c*), crassescit. Sensu parco est, nullove (d); nervi enim qui peritonæo incumbunt, ad musculos abdominis videntur pertinere. Adfirmat quidem sentire Cl. vanden Bos (e). Sed cum externa facies ventriculi, & intestinorum, vel ipso fatente, non doleat (f), sibi ipsi respondet Vir Cl. nam ea facies perito-

(a) POLLUX p. 260.

(b) In vehementi dolore colico, ut ventriculus in ilia elaberetur *Act. Budissin.* p. 80. 81. Vide *Histoir. de l'Acad.* 1752. n. 5.

(c) Nota est mors Reginae Daniæ, cum gravida dilapsam sibi flabellum relegeret, herniam umbilici passæ.

(c*) TULP. L. IV. c. 44. *Mém. de l'Acad.* 1757. p. 504. LEIGH. *lancashir.* II. p. 73. ad digitum *Journ. de Médec.* T. II. n. 5. ad quinque pollices *Pbil. transf.* n. 460. Cartilagineum PARE' L. XXIII. c. 36.

(d) In nostr. oper. minor. In paracentesi TOSETT *Lett.* IV. p. 18. In herniæ operatione CALDAN. *Exper.* p. 312.

(e) *Viv. corp. hum. solid.* Exp. 9.

(f) Ibid. JAUSSELAND. *Diff.*

peritonæum est. Sed ipsi RADNICKYO (g) de sensu peritonæi non satis liquebat, cui de tendinum sensu abunde liquebat. Et fatetur LORRYUS, non sentire (h). Sed neque irritabile est (i), etiam adversariis fatentibus: neque fibras habet (k).

Natura peritonæo ea est, ut pars, quæ intestina & viscera respicit, glabra levisque (k*) sit, eademque densior: inde sensim laxetur extrorsum, ut cuti sit propius, & demum in textum cellulosum degeneret (l): omnino ut & cutis, & pleura.

Non ideo duæ peritonæi membranæ sunt, quem errorem Jacobus DOUGLAS (n) vir olim candidissimus refutavit, deinde J. Benignus WINSLOW (o), olim ab omnibus scholis receptum. Laminas (p) intelligo veras, dissimiles, separabiles. Nam in magnis animalibus in laminas dividi non nego (p*).

Quæ lamina exterior dicta est peritonæi, in anulo spermatico celebrata, mera tela cellulosa est (q), exteriori faciei peritonæi circumjecta, inde varias in corporis partes continuata.

Quæ duplicatura peritonæi non bene dicitur (r), & in quam effusa aqua, saccatum hydropem facit (s), eadem est cellulosa tela, exterius perito-

(g) Sect. IV. Exp. 4. 5. Incertus etiam fluctuat JAUSSEBRAND p. 12.

(h) LORRY Journ. de med 1756. M. Novemb.

(i) Ibid.

(k) VESALIUS p. 591.

(k*) DOUGLAS p. 33. WINSLOW n. 25.

(l) Extus asperum est COLUMBUS p. 235. SPIGEL p. 214.

(n) Circa tempora qua revixit studium emendandæ sectionis calculi nempe circa an. 1719.

(o) Duas faciebat ipse WINSLOW apud DOUGLAS p. 19. Emendavit Vir ILL. in *expos. anat.* P. IV. p. 25. & prius an. 1718. cum decem ab inde annos anno 1728. numeret ad MORANDUM de calcul. Sect. p. 314. 315. Verum olim VESALIUS vidit L. V. C. II. & RUYSCH *Tbes.* VII. p. 27. & inter nuperos DIONIS p. 172. A WINSLOWO omnes, ut BOUDOU ad PALFYN p. 65. RENEAULME des hernies p. 134. &c.

(p) J. SYLVII *dissect. corp.* p. 70. b. LAURENT. p. 285. RIOLAN. p. 94. 95. adhuc DUVERNEY T. I. p. 148. 91. ibid.

(p*) Elephantio MOULINS p. 18. Tres in bove FANTON. Ed. II. p. 62. ad p. 41. In morbis abdominis C. A. a BERGEN *pia mater.* TACCONI *rar. hern.*

(q) Non membrana LIEUTAUD p. 281.

(r) Male ita dici CHESLEB. p. 68. Vidit AICHOLZ in *consil. med.* SCHULZII apud MORGAGN. *sed. caus.* II. p. 110. 111.

(s) COLLINS p. 166. PAW *obs.* 5. BARTHOLIN, *Cent.* IV. *Hist.* 25. BOGDAN, *obs.* XI. HARDEB *apiar. observ.* 93. TULP. L. IV. c. 44. *Zod. Gall. ann.* 11. Mens. Mart. JOB VAN MEKERN D. 49. *Eresh. Saml.* 1718. p. 13. 1725. M. Apr. *Mém. de l'Acad.*

1707.

peritonæo circumposita : qui morbus diutius toleratur (*t*) cum viscera non corrumpat. Pro gravida ejusmodi feminam C. DRELINCOURTUS habuit (*u*).

§. II. Humor peritonæi.

Nunquam in corpore humano siccum reperitur, & humet undique viscida, pingui, olente aquula (*a*), quæ in pelvi frequenter collecta, rubella est aut fusca & ad ignem, aut meracum acorem, coagulatur, ut experiendo comperi. Subalcalina est eadem & penetrabilis, quæ morbos artus in vivi bovis ventris dati potenter resolvat, ancylofin (*a**) paralyfinque (*b*). In ictericis flavum vidi & tingentem digitos: in aliis vaporem subtilem pro humore vero, qui percusso peritonæo erumperet. Is liquor ex arteriis generatur vaporis specie (*c*); non quidem de conspicuis peritonæi poris, quos nonnulli nimis manifestos fecerunt (*d*), Ex minimis guttulis confluit (*e*) quæ de presso peritonæo exeunt (*f*). Similis vapor exspirat ex omnium viscerum abdominis superficie, hepate (*g*), vesicula felle (*h*), liene (*i*), intestinis (*k*), pancreate (*l*), mesenterio (*m*), ventriculo (*n*), omento (*o*). Ex arteriis omnino generatur

1707. p. 514. LEIGH *Exerc.* V. p. 131. 132. *Phil. transf.* n. 207. 259. 348. RESPINGER *Act. Helv.* T. I. ann. 1751. BLAIR. *Misc* p. 36. 295. *Journ. de Méd.* 1761- Jul. 1759. May. Pintarum fere 95. MORGAGN. *Sed. cons* II. p. 112 & libr. todidem STALP. C. II. n. 28. Quadraginta mensurarum la METTRIE *obs.* 10. Steatoma in ambitu peritonæi MEKEL *Mem* T IX.

(*t*) Quadraginta quatuor annis, cum aquæ essent pintæ 51. *Ess. of a Societ. at Lond.* I. n. 2. Librum 135 diu gestatus ejusmodi hydrops BUDDÆUS I. *cas.* 29. 85. Adhuc huic est hydrops membranæ cellulosæ intestini recti CRATONIS *Consil.* L. III. n. 31.

(*u*) *Phil. transf.* n. 106. Peritonæum crassissimum erat.

(*a*) KAAUW n. 539.

(*a**) SCHWARZ *dolec.* 2. *obs.* 9. In guttur bovis artus insertus DESPORTS p. 258

(*b*) Historia CÆSARIS BORGIAE huc pertinet. Paralysis brachii sanata eo remedio BORELL L. II. n. 55.

(*c*) KAAUW n. 539. 541. 542.

(*d*) FANTON. *diff. anat.* p. 61. 62. in hepatis membrana JENNY *course of anat.* T. II. p. 2. PREYER *meth. anat.* p. 49.

(*e*) KAAUW n. 540. 541. WINSLOW n. 26.

(*f*) KAAUW n. 557. DUVERNEY *postb.* T. II. p. 149.

(*g*) KAAUW n. 540. 542.

(*h*) *Ibid.* g.

(*i*) n. 540. 542. 562.

(*k*) *Id.* *ibid.*

(*l*) *Ibid.*

(*m*) *Id.* *ibid.*

(*n*) *Id.* *ibid.*

(*o*) *Id.* *ibid.*

neratur (*p*). Nam aqua in arterias abdominis data per omnem viscerum abdominalium superficiem similiter exsudat (*q*).

Ex glandulis separari vulgo docebatur, quas varii Cl. Viri etiam se vidisse (*r*) persuasi sunt, cum hydatides (*s*) viderent, aut tubercula sebacea (*t*) adipis concreti, aut nonnullas glandulas lymphatici generis peritonæo insidentes. Dudum ostensum est, non veras esse (*u*) glandulas.

In nonnullis piscibus, ut in delphino (*w*), legimus aquam marinam per proprium foramen in abdomen venire.

Ut de arteriis exhalat, sic in venas sani corporis resumitur. Injecta enim in vivi animalis abdominis aqua (*x*) ad uncias duas (*y*), & sex (*z*), brevi tempore evanuit resumta. Sed etiam vinum in abdomen canis impulsus post horas 48. totum disparuerat (*a*) & aqua laurocerasi celeriter de abdominis cavea resorbta est (*b*).

Deinde *Abrahamus KAAUW* in venam portarum ejusve ramos aquam injecit; eam pariter de omni externa superficie hepatis (*b**), lienis (*c*), pancreatis (*d*), ventriculi (*e*), intestini (*f*), mesenterii (*g*), vesicæ (*h*), vidit effluere. Videtur ea resorbtio per vasa lymphatica fieri (*i*). Hydrops, ut

(*p*) KAAUW n. 544.

(*q*) IDEM n. 555. 556.

(*r*) MANGET *bibl.* p. 820. BLAIR *miscell.* p. 40. BECKETT *obs.* 34. COWPER ad BIDLOI *tab.* 74. f. 5 FANTON. *anat.* I. p. 41. SAVIARD p. 495. In leone COLLINS p. 164.

(*s*) LUTHER *de peritonæo* n. XI. *Phil. transf.* n. 460. LEIGH l.

(*t*) FANTON *opusc. filol.* T. III. p. 163. T. IV. p. 79. ROEDERER *disp. progr. Journ. de médec.* II. n. 5. HAEN *rat. med.* T. VI. p. 81. Globulos in peritonæo septi transversi MORGAGNUS habet *caus. & sed.* l. p. 142.

(*u*) HEISTER *Compend not.* 6. Non esse naturalia tubercula LIEUTAUD p. 261. HAN-SING. n. 10

(*w*) *Phil. transf.* n. 239.

(*x*) NUCK *Stalograph.* C. II. p. 27. J. L. PETIT *traité des malad. des os* T. I. p. 535.

(*y*) TANARON II. p. 129.

(*z*) KRAZENSTEIN *theor. diabet.* Exp. 1.

(*a*) WARREK *Phil. transf.* Vol. 49. p. 2.

(*b*) B. LANGRISH *physic. exper.* Exp. 3.

(*b**) KAAUW n. 619. GUNZ *de hepate* n. 8.

(*c*) Ibid.

(*d*) Ibid.

(*e*) n. 617.

(*f*) n. 618.

(*g*) Ibid.

(*h*) n. 621.

(*i*) n. 630. 631.

ut certissimum est, fit ab impedita resorptione hujus liquoris, cujus nonnunquam enormes moles congregantur (*k*).

Etiam alio modo via libera ex tunica intestinorum (*l*), & ventriculi (*m*), in cavum abdominis patet, sed de quo non possis adfirmare, num ad arterias pertineat, num ad venas, num ad inorganicos poros. Nempe aqua in aliquem eorum membranaceorum saccoꝝ inmissa, per tunicam externam defluit (*n*).

Cæterum facile adparet, eum humorem libertatem viscerum abdominalium & inter se & a peritonæo conservare, ut cum summa facilitate, tamen absque frictione moveri possint. Nimis auctus idem potest peritonæum laxare (*p*), & creditur ad hernias disponere; demumque in hydropem abit collectus, nec in venas refusus.

Qua copia in statu secundum naturam secernatur, dictu difficile est: ad uncias certe collecta aquula in sani hominis abdomine reperitur (*q*). In homine, cui sponte abdomen sub umbilico ruptum erat, ad quinque & sex libras de die effluebat (*r*).

Idem humor exsudans morbose inspissatur, in albuminis (*s*) glutinis (*t*), purisve speciem (*w*), & fibrosam gelatinam, quæ viscerum superficiem tegit, & verum nonnunquam pus, ut ipse vidi, & alii Cl. viri (*x*).

Ex eo vario humore nascuntur (*y*) vitiosæ adhæSIONES, quæ adeo frequenter viscera abdominis aut inter se invicem connectunt, aut ad peritonæum, ut vix in longo morbo abdomen incidatur, quin ejusmodi vincula subsint.

Ita

(*k*) Ad 130. mensuras FAVELLÆ *Journ. des Savans* 1724. M. May.

(*l*) KAAUW n. 563.

(*m*) Ibid.

(*n*) Ut facile per umbilicum exstillet. *Nov. Eph. Nat. Cur.* Vol. I. obs. 94. aut per alia loca *Journ.* 1757. M. Aug. Hydrops ascites eo modo sanatus BECKET p. 215.

(*p*) ARNAULD of hernias. p. 128. DEIDIER *Splanchnol.* I. p. 65.

(*q*) KAAUW n. 543.

(*r*) *Journ. de med.* 1757. M. Aug. ut denique 800. libr. effluxerint.

(*s*) PANAROL. *Pentec.* IV. obs. 20. In hepate & liene.

(*t*) DUVERNEY l. infra cit.

(*u*) LIBOTAUD *precis* p. 66. ORTESCHI *diar. venet.* I. p. 166.

(*w*) DUVERNEY *Mém. de* 1703. p. 157.

(*x*) HOMMEL ibid. MOEBIUS. SAND. *abscess ventric.* BEAS. obs. P. I. n. 10. ROEDERER *progr. ann.* 1758. *Nov. Eph. Nat. Cur.* T. II. obs. 93. HEUERMAN *Oper.* T. II. p. 253.

(*y*) *Act. Mar. Balb.* l. c.

Ita ventriculus ad diaphragma adhæsit (z), & ad hepar (a), ad pancreas (b), ad lienem (c), ad mesocolon (d), ad intestina (e), ad epigastrium aut peritonæum (f). Hepar ad hypochondrium (f*), & peritonæum (g), ad diaphragma (h), ad intestina (i), ad duodenum (k) ad lienem (l), ad omentum (m), ad pancreas (n), ad ventriculum (n*). Intestina ad peritonæum (o), & inter se mutuo (p), cum omento

(z) *Ess. of a Societ. at Edimb. T. II. n. 25. SENAC Mém. de 1729. p. 159.*

(a) HOMMEL apud WENKER *de vulner. ventric. Nov. Lit. Lips. T. VI. p. 81. CHIFFLET obs. 27. SPRINGFIELD part. coal. n. 13. DAMIAN. SINOP. parerg p. 28. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs. 151.*

(b) SAND. *abscess. ventriculæ.*

(c) D. SINOP. p. 28.

(d) HOMMEL.

(e) Ad colon HEUERMANN T. IV. p. 37. BLAS l. c. SINOP. p. 28. *Phil. transf. n. 142. Méd. Mus. II. n. 3.*

(f) BLAS *obs. 11. P. IV. Nov. Lit. l. c. MOEBIUS Phil. transf. n. 207. HOADLEY ob respirat. p. 72. pro re frequenti BARTOLETTI p. 246. Sæpe ad latus adnasci GLISSON rachit. p. 371.*

(f*) Id vitium Angli vocant *liver grown. WAINNEWRIGHT p. 11.*

(g) HOMMEL *ib. Act. Mar. Baltb. 1700. p. 271. ROEDERER Progr. p. 4. SPRINGFIELD. WOLF obs. 22. p. 72. undique. Eo in statu nullum adfuisse hepar de ORTELIO dicitur, & apud ZACUTUM. Tota convexa superficie MANGET bibl. p. 252. SANTORIN. *ist. d'un feto p. 34.**

(h) *Phil. transf. Vol. L. P. II. p. 550. ROEDERER. HUMMEL HORST Epist. p. 453. in hydropica. CRELL nex. insol. p. 18. CRAANEN p. 211. BARTOLETTI resp. p. 246. Pene totum ALBERTI med. leg. III. c. 39. Toti septo adnatum MORG. sed. caus. morb. II. p. 105. 145. Nexus ad diaphragma insoliti Ibid. p. 16.*

(i) BARTHOL. *Cent. III. Hist. 6. Eph. Nat. Cur. Vol. VIII. l. c. Vol. V. obs. 65. ROEDERER l. c. Ad colon HEUERMANN IV. p. 37.*

(k) SINOP.

(l) BARTHOL. l. c. *Act. Mar. Baltb. GHIGI obs. sulle lettere del GHISI p. 19. pro re non rara DIEMERBROEK p. 79.*

(m) De HAEN *rat. med. T. V. p. 11. SPRINGFIELD.*

(n) SINOP. l. c.

(n*) ORTESCHI l. c. a tumoribus purulentis.

(o) *Phil. transf. n. 333. Journal de med. T. II. n. 5. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs. 134. SCHENK exerc. p. 256. In hydrope MOEBIUS. In marasmo HILD. Cent. IV. obs. 40. & in longo morbo HEUERMANN IV. p. 37. Ad costas spurias BAGLIV, fibr. motr. p. 313. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. n. 134. MOYLE mém. Puris ope Journ. de méd MOEBIUS obs. 3. Consumto omento SAVIARD. obs. 69.*

(p) *Act. Mar. Baltb. ann. 1699. p. 16. K. Svensk. Wetensk. Acad. Handl. 1752. Trim. I. In hydropica Phil. transf. Vol. L. P. II. STORK annus I. p. 152. 153. HAEN rat. med. T. VII. p. 121. Per hydatides BONTIUS L. III. obs. 7. omento consumto. DAMIAN SINOP. p. 28. villis connatis. Sic MORG. sed. caus. II. p. 140. per externam tunicam. p. 28.*

to (*q*), cum ovario (*r*), & utero (*s*). Duodenum connexum vesiculæ (*t*) felleæ, & reni (*u*), intestinum scroto (*u*†), Appendicula cæci intestini ad musculos abdominis (*u**). Colon ad uterum (*w*): ad renem (*x*); ad vesiculam fellis (*y*). Rectum intestinum utero (*z*). Omentum ad peritonæum (*a*), ad latera pelvis (*b*), ad intestina (*c*), ad colon (*c**), ad uterum (*d*).

Vesicula fellea ad peritonæum (*e*).

Lien convexus cum peritonæo (*f*), etiam in trienni puella, cum rene (*g*), cum diaphragmate (*h*).

Demum viscera abdominis omnia inter se connata (*i*), hepar, ventriculus, jejunum, ileum, ipse in purulento vidi.

In universum a vulnere intestinum inverso & dilatato ostio (*k*), villosa

p. 28. 29. qui addit frequenter fieri. *Eph. Nat. Cur. Vol. VIII. obs. 10.* HEUERMANN l. c. CITESIUS in *col. picton.* p. 232. Cartilaginea pene substantia conjuncta MORG. l. II. p. 133. Puris ope N. A. N. C. T. II. n. 93. puto & HEUERMANN oper. II. p. 253.

(*q*) ROEDERER *progr. Eph. Nat. Cur. l. c. Vol. VI. VIII.* SANTORIN.

(*r*) SANTORIN. p. 217. COWPER *tab. 34. ad f. 4. 5.* BLAS L. l. *obs. 12. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. l. c.* DUVERNOY *Comm. Petrop. T. V. p. 271.* SCHRADER *Dec. I. obs. 1.* CHESELDEN p. 160. in hydrope.

(*s*) HAEN T. VI. p. 169.

(*t*) SCHMIEDEL *de pericardio &c.* p. 26.

(*u*) SCHRADER *Dec. I. obs. 5. de HAEN T. VI. p. 169.*

(*u*†) ARNAULD *ruptures* p. 273. 314. *Journ. de Méd. 1754. Janv.*

(*u**) DAM. SINOP. l. c.

(*w*) SENAC *ess. de physiq. p. 572.*

(*x*) SCHRADER.

(*y*) SANTORIN. *istor. d'un feto.*

(*z*) CRELL in *hydropica.*

(*a*) RUYSCH *obs. chir. 18. 63.* CRELL *nex. viscer. insol. p. 18.* CHESELD. p. 150. *Mém. de 1707. p. 40.* COLUMBUS p. 265. *Bresl. Saml. 1726. M. May. de HAEN T. VI. p. 79. 80.* LA METTRIE p. 263. LE DRAN *obs. 64. post inflammationem. Totum in tabido BARTHOLETT. respirat. p. 290.*

(*b*) CRELL *ibid.*

(*c*) ROEDERER *progr. p. 4. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs. 65. 134. le DRAN ib. Mus. Med. ib.*

(*c**) GOHL *de polyp. p. 17.* LUDWIG *de situ p. n. viscer. infr. ventr. p. VI.*

(*d*) SANTORIN *istor d'un feto.*

(*e*) PETIT *Mém. de l'Acad. de Chirurg. T. I. p. 186. 288. cum fistula.*

(*f*) ROEDERER SANTORIN. *feto p. 34.*

(*g*) DIEMERBROECK p. 79.

(*h*) IDEM. Totus septo adnatus MORG. *sed. caus. I. p. 162.*

(*i*) BUCHWALD *obs. quadrig. obs. 1.* BARTHOL. *Cent. III. Hist. 6.* BUCHNER *mise. 1729. p. 775. in subito mortuo.* JUCH a fasciatione in *Disp. ROEDERER progr. ann. 1758. etiam in purulento Phil. transf. T. L. P. II. p. 150. seq. A scabie repercussa Eph. Nat. Cur. Vol. VIII. obs. 109.*

(*k*) *Oper. minor. Exp. 372 - 378.*

losa sua membrana ad peritonæum adglutinetur & adhæret (*l*). Eodem modo etiam omentum (*m*), & hepatis lobus (*n*).

§. III. *Peritonæi ambitus.*

Ut hæc recte innotescant, necesse est peritonæum per omnes suos limites persequi.

Ut difficile videatur, & persequi peritonæum, & de omnibus partibus ambeuntibus separare, tamen non soli Jacobo DOUGLAS (*a*) solertissimo viro, sed omnino olim Nicolao MASSÆ (*b*) & GALENO (*c*) successit. In fetu & nuper nato infante non valde difficile est, in qua ætate vincula cellulosa nondum penitus invaluerunt. Etiam putredine adjuvamus, in corpore, cujus vasa quidem anatomica arte repleta fuerint, ipsum corpus per mensem sibi commissum (*d*). Mihi hæc administratio neque in pleura, neque in peritonæo nimis difficilis visa est, nisi quod in adulto homine a transversorum (*e*) musculorum abdominis tendinibus peritonæum ægrius separatur (*f*), ut tamen cum diligentia & studio ea difficultas etiam tunc superari possit. Piri formam, deorsum gracilem, exemptum habet (*g*), ut superius compressum, deinde latius, sine inferiori angusto sit.

Ergo sublinat primum septi transversi faciem cavam totam, atque in venæ cavæ foramine, & aortæ via, & oesophagi, pleuram (*h*) attingit.

Satis laxè cum septo (*i*) adhæret, laxissime sub sternō, qua multa est pinguedo. Solis fibris tendineis & carneis, ab ima costā & a processu transverso primæ vertebræ lumborum venientibus, accuratius innascitur.

(*l*) WEPFER *cicut.* p. 204. BRUNNER *de pancr.* p. 58. BOHN *lethal. vuln.* p. 26. SAVIARD *obs.* 59. FAUDACQ *des playes à feu* p. 573. *Act. Mar. Balth.* 1699. p. 16.

(*m*) BRUNNER.

(*n*) *Ibid.*

(*a*) *Description of the periton.* p. 4. seq.

(*b*) *Introd.* p. 13. b. sæpe integrum peritonæum se excoriasse.

(*c*) *Admin. anat.* L. IV. c. 4.

(*d*) HENSING. *de periton.* n. 52.

(*e*) GALEN. ORIBAS. p. 104. VESAL. p. 591.

(*f*) In hydropicis facilius.

(*g*) HENSING. *de periton.* n. 1. DOUGLAS p. 8.

(*h*) STENONIS *myolog. sp.* p. 100. Conf. HENSING. n. 6. MORAND. *de la taille* p. 316.

(*i*) Tendini vehementer adhærere DOUGLAS p. 6. Id mihi non visum.

scitur. Sedes est inter carnes anteriores sterno innexas (*k*), & alia inter fibras lumbales externas (*l*), atque costalium intimas & dorso proximas, in quibus solum cum pleura peritonæum, absque fibris carneis, interseptum pectoris & abdominis perficit (*l*^{*}).

Sub ima nunc ala diaphragmatis posterius peritonæum diaphragma deferit, & ante appendices, & psoam, vertebraeque lumborum (*m*); tum ante capsulas renales, antequam renes, & ante vasa magna ita descendit, ut ea quatuor viscera sint pone hanc membranam, & ejus interventu ab abdominalibus visceribus separentur.

Inde porro ante ossa ilium & musculos iliacos, descendit, & in pelvim venit ante intestinum rectum, cujus pars dimidia, & inferius etiam major, extra peritonæi saccum est, [nam de posteriori parte ejus sacci sermo est]. Et in feminis quidem subliniens utrinque levatores ani (*p*), & coccygeos musculos, os sacrum, obturatores musculos, & nervos magnos, & vicina ossa ilium, venit ad intestinum rectum, ad vaginæ usque partem transversam (*q*). Inde adscendit, pone vaginam iterum, cellulosa telæ ope connexum, contra se ipsum, & in medio quidem vaginæ partem descendentem, tunc uterum ita subliniit, ut penitus adhærescat, sitque ei pro extimo velamento. Dum vero ab intestino recto ad uterum tendit, circularem cum priori continuam plicam fingit, qua rectum intestinum velans peritonæum cum uterino conjungitur (*r*). Duplex alias est plica, altera corpori uteri propior, cervici altera (*s*): alias simplex.

Infra eam plicam cavea est, cujus limites descripsimus, inter rectum intestinum & vaginæ principium deorsum producta.

Sed idem peritonæum ad latera etiam uteri, inter eum & ossa pelvis lateralia, perinde elevatur.

Ubi

(*k*) *Id.* diaphr. ad U U.

(*l*) *Ibid.*

(*l*^{*}) Ad R *ibidem*.

(*m*) DOUGLAS.

(*o*) *Comm. in prælect.* BOERHAAV. T. III. p. 26.

(*p*) DOUGLAS, p. 30.

(*q*) Duas tertias vaginæ partes HENSING. n. 46.

(*r*) DOUGLAS p. 38 WINSLOW n. 206.

(*s*) Sunt cervicis ligamenta lateralia SANFORD. p. 219. *Conf.* BIDLOO *tab.* 50. 53.
WINSLOW n. 601.

Ubi ad summum uterum venit, descendit iterum contra se ipsum, ut cellulosus textus intervalla paginæ anterioris & posterioris repleat, & secundum uterum iterum deorsum it, ut tamen supra ortum vaginæ, ad pollicem sub fundo, saccum suum terminet, aliquanto altius quam in parte posteriori vesicæ,

Ita ex utero, peritonæo obducto, & ex duplici peritonæo ad marginem uteri adnexo, mobile septum pelvis efficitur, quod in partem posteriorem eam dividit (*t*), & anteriorem. Quæ pars peritonæi hic ab utero libera est, ea facit ligamentum latum (*u*).

Inde ab anteriori uteri fine peritonæum surgit ad vesicam urinariam, eamque contingit ad duos, supra ureteris insertionem, digitos (*w*), porroque pone vesicam adscendit, cui est pro membrana externa.

A summa vesica modice, si plena fuerit, tum in fetu, iterum descendit, ut ad os pubis perveniat (*x*), atque vestiat vesicæ partem, minorem quam quidem posterius. Idem, si eadem inanis fuerit, adscendit ab ea ad os pubis.

Inde porro ab osse pubis, & a continuo osse ilium, sursum producit anterior nunc pars sacci peritonæi, & rectorum musculorum vaginam posteriorem, transversorumque musculorum faciem averfam obducit, donec, cum peritonæi parte diaphragma velante, absoluto nunc sacco continuetur.

Finis ergo superior simplex, ovalis; inferior triplex, cæco sacco terminatur, postremo profundissime pone uterum producto: medio inter uterum & vesicam; anteriori brevissimo hanc inter & os pubis.

In viris eadem fere fabrica locum habet. Tantum, cum uterus eo in sexu nullus sit, & peritonæum a pariete posteriori pelvis pariter ad intestinum rectum eat, idem in viris ab eo intestino ad vesicam tendens plicas facit semilunares (*y*): idque receptaculum adit supra ureteres (*z*),
qui

(*t*) *Comm. in Præl. Boerb.* T. III. p. 261. T. V. P. II. p. 16. 17. Conf. VESAL. L. V. f. 24. HENNING n. 42.

(*x*) HENSING n. 47. J. VESAL. *ibid.* L. V. f. 24. o. o.

(*w*) Conf. HENSING n. 46.

(*α*) *Comment.* in BOERHAAV. *prælect.* T. III. p. 261.

(*y*) DOUGLAS p. 38. Ligamenta lateralia WITBRECHT *syndesm.* p. 226. Tab. X. f. 37. P.

(*z*) HENSING n. 45.

qui sunt in celluloso textu peritonæo undique circumposito : & supra ductus deferentis gyros, & feminales (a) vesiculas, quæ pariter peritonæo subjiciuntur, ejus sacco non comprehensæ. Intestinum rectum quasi per foramen ibi videtur de abdomine emitti, etsi vere non est in abdomine, & cæcus sacculus est id inter intestinum & vesicam (b).

§. IV. *Productiones peritonæi minores sive ligamenta.*

Hi in universum sunt peritonæi limites : magna tamen pars indicta superest. Nempe ex ejus sacculi circumferentia in internam ejus caveam numerosæ appendices exeunt, de quibus omnia imi ventris viscera suspenduntur. Earum, quæ minores sunt, ejusmodi est communis fabrica. Peritonæum quidem non est duplex : sed in quacunque parte, in qua ligamentum producit, secedit de ambitu & dexter, in exemplo, & sinister finis peritonæi, qui, si absque ligamento foret, in unam laminam continuarentur (a). Ii fines se super proximum viscus diffundunt, ut amplissima quasi appendice totum comprehendant, eique sint pro membrana extima; usquedum absoluto circa id viscus itinere ex adverso iterum, quæ secesserant, coeant laminæ. Ita intelligitur, intervallum nasci inter duas laminas, in quo nulla vera lamina sit peritonæi. Per id intervallum vasa solent in viscera subire. Quare viscera & vasa majora sunt extra peritonæum (b).

Una cellulosa tela, quæ exterior peritonæo circumponitur, inque ligamento duabus laminis se interjecit, ea nunc se super visceris superficiem diffundit, estque velamenti cum extima superficie visceris vinculum.

Hujus generis sunt ligamenta hepatis, ventriculi, lienis, ovarii.

§. V. *Ligamenta hepatis.*

Quando pauca, tria sunt hujus visceris ligamenta. Prægrande (a) primum, alias dexterius quam medius (b) axis corporis humani, alias in

(a) DOUGLAS p. 37.

(b) Breviter ista, nam fufius redibunt L. XXVI. XXVII. & XXVIII.

(a) DUVERNÉY *posth.* II. p. 150. Conf. KAAUW n. 571. seq. DOUGLAS p. 34. 35. NAVIER *réponse au libelle* de M. AUBERT p. 36. seq. BARTHOLIN *analect.* p. 184.

(b) C. BARTHOL. *spec.* p. 18.

(a) Vinculum magnum ORIBAS. p. 116.

(b) VESAL. p. 621. L. V. f. 2, 6.

in medio, ex peritonæo obliniente vaginam muscutorum rectorum (*b**), ab umbilico (*c*) usque, tum sursum ex sede appendiculæ ensiformis, & porro a diaphragmate ad marginem usque hepatis posteriorem & transitum venæ cavæ, a dextra carne adnascitur. Idem ea ratione, quam diximus, duplex, retrorsum oblique & dextrorsum it, atque in hepatis convexam partem se inmittit, non in medium & sæpe ad fescuncem dexterius, ab ejusdem venæ cavæ (*d*) transitu in usque sulcum transversum (*e*) & per eum vel ad sinistri rami venæ portarum finem sinistram, vel antè aliquanto definit, in ejus rami cum vena umbilicali confluentem. Prima parte & anteriori angustum (*f*), versus diaphragma latum (*f**), posterius denuo angustum (*g*) est. Lamina dextra a sinistra posterius distat, antè contiguæ sunt (*h*). Vidi sinistram laminam a dextra carne diaphragmatis accessisse ad dextram. Pars superior diaphragmatica hæcenus potest pro ligamento haberi, inferior neutiquam.

Imo margini hujus membranæ vena umbilicalis se addit, media inter duas laminas (*i*) comprehensa, cum circumfuso adipe (*k*), & in fossam transversam properat.

Hoc princeps ligamentum defuisse, idoneus est auctor (*k**).

Porro a peritonæo, velante carnem imam dextram transversæ septi, super renem, in crassissimam dextram sedem hepatis, & nonnunquam in peritonæum costas velans (*k***), posterius, ad dextra transeuntis venæ cavæ, brevius ligamentum dimittitur (*l*). Ab eo ligamento suspensorium

(*b**) WINSLOW p. 262. Non ab ipsa vagina recte WEITBRECHT l. c. p. 221.

(*c*) MORG. *Epist. anat.* l. n. 3. BERTRANDI *de hepate* p. 38. HENSING. n. 36. WEITBRECHT p. 221.

(*d*) HENSING n. 37. DOUGLAS p. 39. &c.

(*e*) DOUGLAS p. 39. n. 5. p. 8. Conf. WINSLOW n. 261. HENSING n. 38. A fovea vesiculæ felleæ LUDWIG.

(*f*) MORG. l. c. n. 3. BERTRANDI p. 38. n. 36. HENSING n. 36.

(*f**) DOUGLAS p. 40. HENSING n. 36. EUSTACH. T. 9. T. 19. f. 4. MARTINE p. 61.

(*g*) Ibid. Triangulare C. STEPH. p. 183.

(*h*) BERTR. *Tab. I.*

(*i*) MORG. *ibid.* WINSLOW n. 266. BERTRANDI.

(*k*) Consentit MORG.

(*k**) GUNZ K. *Wetensk. Acad. Handl.* 1750.

(*k***) MORGAGN. *ibid.* WINSLOW n. 260. ad tertiam & quartam costam spuriam HENSING n. 35.

(*l*) EUSTACH. *de renib.* c. 13. &c. *tab. 10. f. 4.* HABICOR. dies II. *Lect. IV.* p. 55. MORGAGNI *Epist.* l. n. 6. p. 8. BIANCHI t. 1.

rium (*m*) quod modo diximus, aliquanto breviori peritonæi propagine continuatur (*n*), neque tamen perpetuo. Aliquando cellulofum & fibrosum fuit (*o*).

In extremum finistrum (*p*) lobum, tum in gibbam partem, tum etiam in marginem acutum, a fine alæ finistræ ad ima septi transversi, similis angusta lamina dimittitur, anterior (*q*), in homine adulto & dexterior œsophago; in fetu sæpe, & in adulto nonnunquam. (*q*^{*}) finistrior, ut trans œsophagum (*r*) incedat. Vidi duo fuisse sinistra ligamenta, cum lobus sinister trans gulam se continuasset: superius breve in concavum hepar longe ad cavæ venæ transitum: aliud inferius priori, & cum eo continuatum, ab ala sinistra & a vicina carne ad marginem hepatis.

A suspensorio ligamento ad finistrum, continua non raro (*s*) appendix peritonæi descendit, ligamenti similis.

Secundum dextrum ligamentum (*t*) antè vidi, & secundum finistrum in lobo ultra ventriculum protenfo (*u*), a priori diversum.

Alterius generis est, quod *coronarium* dicitur *ligamentum*. Nempe in dextro & posteriori lobo hepatis, ad dextra lobuli ovalis, sedes (*w*) est, vertice dextra spectante & nonnunquam usque ad marginem posteriorem obtusum protensa, in qua in homine adulto, & in fene, cellulosa tela (*w*^{*}) adeo brevi hepar ad peritonæum conglutinat

(*m*) p. 350. 351.

(*n*) Conf. MORG. l. c. n. 9. p. 13. BERTRANDI si rectè intelligo. HANSSING n. 38.

(*o*) WEITBRECHT p. 223. De ejusmodi fibroso ligamento PAU obs. 16.

(*p*) Ligamentum alterum VESAL. p. 621. L. V. f. 12. O. f. 20. &c. Sed cur teres vocat? Habet etiam COLUMBUS p. 105. 11. EUSTACH. tab. 10. f. 4. PLATER p. 124. BAUHIN. p. 150. SMETIUS miscell. p. 540. HABICOT Dier. 11. Lect. IV. p. 55. RHOD mantiff. n. 21. pro re peculiari. EYSSON obs. rar. p. 14. visum anno 1658. VERHEYEN p. 90.

(*q*) MORG. l. n. 6. p. 8.

(*q*^{*}) Inter lienis apicem & ventriculum id ligamentum subire DOUGLAS p. 39.

(*r*) Trans œsophagum BERTRAND p. 39. WEITBRECHT p. 223.

(*s*) WEITBRECHT p. 222. 223.

(*t*) Habet MORGAGNUS p. 8.

(*u*) RUYSCH Thes. V. n. 38. cum vinculum suum circa cartilaginem ensiformem ponat. Secundum finistrum WINSLOW n. 261. An adhesio lobi anterioris FANTONI p. 105.

(*w*) WINSLOW n. 264. EUSTACH. t. 10. f. 4.

(*w*^{*}) Tenera DUVERNEY posth. II. p. 216.

natur (α), ut ea in ætate separari nequeant. In fetu nondum cohæserunt (γ), & facile separantur. Peritonæum ea sede nullum est, neque hepatis membrana (α); sed tamquam perforaretur ab ea nuda sede, peritonæum ab ambitu undique super hepar se diffundit.

Capfulæ etiam renali dextræ cellulosæ telæ ope conjungitur.

Plica peritonæi alia, a pancreatis sede ad sinistra venæ cavæ, pone vasa hepatica ad hepar educitur, & est portæ omenti alter posterior paries. Altera vero, quæ ad dextra venæ cavæ, a rene (a) dextro ad hepar se elevat, minus certum ligamenti nomen fert.

Omentum minus, alias dicendum, cum appendice sua sustentante (b) vasa biliaria, hætenus etiam hepar cum colo, duodeno, & pyloro & arcu ventriculi minori unit, & demum in ligamentum oesophagi finistrum terminatur, quod ex fossa ductus venosi in oesophagum pone finistrum ventriculi ligamentum abit (c).

Denique circa venæ cavæ foramen undique peritonæum a diaphragmate diffusum supra hepar se expandit, idque quasi in vaginam suam recipit (d).

Ita hepar, maximum, ponderosum, scirrhisque obnoxium viscus, tamen cum sua mobilitate, qua septo transverso obedit (e), firmiter sustentatur, ut rarius, quam alia viscera abdominis loco moveatur, etsi in omni inspiratione descendit, & adscendit in expiratione. Semper autem plenum esse abdomen, & intervallum a septo transverso ad hepar nullum, credo evictum esse.

Ab

(α) HIPPOC. *περι ολσβων* VESAL. p. 621. RIOLAN. p. 122. FALLOP. *Inst.* p. 7. ut intelligo. COLUMB. p. 163. T. BARTHOL. *anat.* p. 82. DOUGLAS *perit.* n. 38. MANGET *bibl.* p. 252. BARBAUT p. 146. BIRCH T. IV. p. 273. HENSING. n. 36. BERTRAND *Tab. I.* WINSLOW n. 263. SENAC p. 162. DISDIER *splanchnol.* p. 163. Vulgo vocant ligamentum coronarium BIANCHI p. 17.

(γ) In pueris minus HEUERMAN T. III. p. 722. Ab infante abest RAMSPERK *Spec. anat. botan.* p. 23.

(z) BERTRANDI p. 39.

(a) Habet EUSTACH. *de ren.* l. c.

(b) BERTRANDI p. 39. 40.

(c) EUSTACH. an BERTRANDI n. 37. p. 39.

(d) KAAUW n. 574.

(e) Conf. BOURDON p. 76. WAINWRIGHT *on the liver* p. 10.

Ab animalibus ligamenta humana absunt, in cane certe (*f*), forte quod iis animalibus diaphragma potius humiliter sit quam hepar, & in id septum hoc viscus pondere suo incumbat.

§. VI. *Ligamenta ventriculi, lienis, renum, ovariorum.*

Qua sede oesophagus per diaphragma transit, ea peritonæum & ad dextram sedem & ad sinistram, undique se gulæ circumjicit (*a*), in ventriculum abiturum, ut extensum possit pro ligamento haberi.

Dextrum quidem vinculum (*b*) oesophagi ad partem maxime averfam gulæ, qua primum ex diaphragmate prodit, a diaphragmate advenit, ut porro ex ductus venosi fossa continuatum, in ostiorum ventriculi intervallum transeat, & ad arcum minorem, qua fibræ ventriculi musculosæ latiuscule nudæ sunt, soloque celluloso textu tectæ, se super utrumque planum ventriculi diffundat: Natura postremi in eo ligamento finis solida est: in ductus venosi sinu in laxitatem abit, ob quam omenti (*c*), minoris nomen ei est impositum. Posterius hoc ligamentum est, quam sinistram hepatis, & ab eo diversum.

Sinistra sedes gulæ similiter a diaphragmate peritonæum ita accipit, ut pars postrema solida sit, & membranacea, & in angulo gulæ cum diaphragmate, & gulam, & lienem a cujus apice venit, & peritonæum id septum velans, conjungat; inde in omentum majus degeneret, quod porro a liene in arcum majorem ventriculi tendit. Inter hoc & sinistram ligamentum hepatis apex lienis in juniore homine reconditur.

Idem, quod diximus, ligamentum possit dici verticale (*d*) lienis: quod soli apici posteriori adhærescat (*e*).

Alia peritonæi plica (*f*), etiam sinistrior, longe a septo in faciem dimidiati

(*f*) VESAL. *rad. chin.* p. 116. MONRO *comparat. anat.* p. 23. de suspensorio.

(*a*) KAAUW n. 571.

(*b*) Habet CRISUS L. IV. c. 1. EUSTACH. *tab. 9 f. 1.*

(*c*) Conf. HENSING n. 30. Paulo aliter hæc KAAUW n. 578. 579.

(*d*) Habet CRISUS *ibid.* EUSTACH. *ibid.* ad HENSING n. 42.

(*e*) EUSTACH. *tab. 10 f. 6.*

(*f*) WINSLOW n. 333. pro re incerta. KAAUW n. 572 573. Neque tamen satis constat, eos Cl. Viros non velle verticale ligamentum. Fibras a diaphragmate ad lienem descendere VESALIUS p. 628.

mediati lienis posteriorem, posterius quam vasa magna & omentum advenit. Ad ejus latus ea faciecula lienis capsulæ renali adhæret (*g*).

Plica aliqua peritonæi a liene ad renis (*b*), & capsulæ renalis peritonæum, sub eo ligamento transit.

Cæterum lien mesocoli transversæ parti sinisterrimæ, tamquam in nidum excavatæ, insidet, superque id firmamentum movetur.

A rene ad colon transit plica peritonæi, & alia a rene ad duodenum, etiam ad diaphragma (*b**) in sinistro latere.

Ad colon passim peritonæum ita in lumbis elevatur, ut pro ligamento habeas.

Ligamentum peculiare (*i*) ovarii est appendix peritonæi, quod a vasis magnis iliatis advenit, adhæret ad ovarium, idque tamquam in capsula continet, & porro trans idem, & trans totam tubæ longitudinem, in ligamentum uteri latum continuatur, quod a nobis non dudum expositum est.

§. VII. *Mesenteria. I. Mesocolon iliacum & sinistrum.*

Quæ sequuntur de mesenterio, omento, & colo, & in cadavere ostensu difficilia sunt, & etiam verbis ægre exponuntur.

Diximus peritonæum in pelvem (*k*) ante intestinum rectum incedere, ut aliquanto plus, quam anteriorem faciem ejus intestini velet. Idem, ut idem intestinum adscendit de pelvi, ita magis atque magis inter lumbales musculos, vasaque iliaca, & inter intestinum laxius producitur, sursum & antrorsum, trans Psoam musculum, transque renem sinistrum; & amplissimas inprimis, quasi ad ligamentum efficiendum, de mediis vasis iliatis, aut etiam dexterius ante arteriæ aortæ divisionem, & de musculo Psoa sinistro, lamina suas emittit, quæ ad flexum iliacum coli perveniunt, & circa id intestinum ita se conjiciunt, ut sint ei pro tunica externa, seque medio in intestino comprehendant continuæ. MESOCOLON dixeris

(*g*) Conf. EUSTACH. f. 9.

(*b*) KAAUW n. 573.

(*b**) VESAL. p. 629.

(*i*) HENSING n. 48. *Id.* [nostr. uteri.

(*k*) p. 348.

xeris ILIACUM (k^*), In ejus pagina inferiori cæcum est, circa divisionem aortæ (k^{**}), quasi foramen.

Sed idem peritonæi processus fursum, versus sinistrum (l) renem, insigniter diminuitur, ut alias brevis omnino sit, quæ libera fuerit, mesocoli continuatio: alias omnino nulla (m), colonque lumbis hæreat. Semper tamen peritonæo comprehensum, in media denique ea longitudine, laxius intestinum quasi vinculo stringitur. Eadem pars mesocoli pauca pinguedine adspergitur. Ita ab osse ilium sinistro pergit ad lienem usque, & hætenus *mesocolon sinistrum* dicitur,

Lamina ejus mesocoli sinistra perbrevis est, dextra latior de vertebra cum trunco arteriæ mesentericæ inferioris emergit.

§. VIII. *Mesocolon transversum.*

Facilis res est, si in universum consideretur.

Quando mesocolon sinistrum lienem nunc adtigit, inflectitur ibi ad angulum pene rectum, & sub ventriculo, atque pone eundem, deinde sub hepate, etiam pone hepar, ad dextrum renem pervenit, ductu in universum transverso (a), ut tamen frequentissime devium, media parte deorsum vergat, etiam ad pelvim usque (b), & aliter aberret (b^*). Septi (c) modo abdomen bipertit, ut supra mesocolon hepar, lien, ventriculus, duodenum: infra mesocolon intestina sint reliqua, cum suo mesenterio.

Firmatur autem ad peritonæum, eminente plica (d), sub liene, quæ pro eo viscere recipiendo excavata, ad decimam undecimamve costam adhærescit.

Etiam.

(k^*) Tab. arter. mesent. in fasc. Icon. anat. III. R.

(k^{**}) HENSING n. 28.

(l) Habet EUSTACHIUS Tab. XI. f. 2. Tab. nostr. a 9. ad 13.

(m) Conf. HENSING n. 19. qui medio loco latius, supra & infra angustum, describit Sic WINSLOW n. 205.

(a) EUSTACH. l. c. SPIEGEL L. VIII. tab. 6. F. F. tab. nostr. art. mesenter. a 15. ad O.

(b) Conf. LUDWIG l. c. p. X. XI.

(b^*) Supra ventriculum IDEM p. VII.

(c) FANTON. diff. anat. p. 166. WINSLOW n. 204.

(d) Icon. nostr. art. coel. I. & in icone I. omenti, & HENRICI de omento p. XVIII. & in icone Ligament gauche du Colon, WINSLOW n. 205. HENSING n. 19.

Etiam in dextro latere longiori plica ad peritonæum rene dextro dexterius adfigitur,

Sed multo difficilior res est, quoties duas laminas figillatim oportet exponi, ex quibus id transversum peritonæum componitur, superiorem imprimis. Et oportet tamen, neque enim aliter unquam aut pancreatis situs, aut duodeni, recte intelligitur.

Ea ergo superior lamina oritur in dextro latere a renis (e) sede, & venæ cavæ, pone hepar, dexterius quam duodenum, ex peritonæo lumbari.

Saccus ejus cæcus dexter est in eo angulo, in quo membrana externa duodeni a peritonæo renali, super hoc intestinum & sub hepate nata, cum membrana exteriori coli continuatur.

Porro eadem lamina superior oritur a membrana extima duodeni per lineam oblique descendentem secundum duodenum, sex fere lineis dexterius quam pylori valvula, qua sede arteria gastroepiploica ab hepatica oritur; adhæret autem orienti duodeno in linea, ut modo dixi, obliqua, a superiori accessione, trans id intestinum, ad inferiorem usque mesocoli transversæ laminam, qua sede ea infra pancreas incipit oriri. Ab ea sede porro provenit eadem lamina superior a membrana externa pancreatis, quæ ante eam glandulam vix separabilis descendit, ex ipsa corporum vertebrarum supremarum lumbalium facie anteriori. Ea sede tenerrima est hæc mesocoli lamina, finemque sinistrum sui facit in ligamentum, quod diximus, lienis suspensorium.

Lamina inferior transversæ mesocoli (f) robustior est, & simplicior. Incipit a ligamento hepatico renali, & a renis dextri sede pone hepar & vasa hepatica, parietemque ibi facit posteriori portæ omenti. Hinc ad regionem lienis extensa facit ligamenti sustentantis lienis paginam inferiorem.

In medio mesocolo transverso duodenum exit de superiori parte abdominis, quasi per foramen mesocoli. Proprio ut loquamur, lamina mesocoli superior supra duodenum pergit, ad sinistras; & inter eam, laminamque inferiorem sub duodeno ortam, id intestinum continetur, ut totum porro pancreas, pone vasorum magnorum mesenterii transitum, ad sinistra inter eas laminas pergat. Emittit autem inferior lamina duodenum per propriam semilunarem incisuram.

Est

(e) CLAUSSEN de duodeno T. I. f. & p. 14. Ic. nostr. Orient. II. a &

(f) EUSTACHIUS solam habet, orissa superiori l. c.

Est autem hic locus pernecessariæ adnotationi. Nempe scriptores, pene ad unum omnes, ad omentum connumerant id omne membranaceum quod supra pancreas ortum ad colon venit, nosque laminam superiorem transversæ mesocoli vocamus.

Is error a GALENO (*g*) manavit, qui omentum a spina dixit oriri: neque VESALIUS (*b*) ejus contagium vitavit, qui fuscè laminam posteriorem omenti descripsit, hæsitque ea vox in tota schola anatomica (*i*), usque ad nuperrimos scriptores, qui pancreas aiunt duplicatura omenti contineri (*k*). Emendavi in iconibus arteriæ coeliacæ & mesentericæ. Verum etsi solus fere nobiscum sentit D. de MARCHETTIS (*l*), ipsam tamen naturam pro nobis pugnare persuademur. Si enim membrana trans pancreas adveniens est omenti portio, mesocolon non duplex erit ea tota sede, quæ dexterior est vasorum mesentericorum majorum transitu: neque respondebit ei, quam iidem Cl. Viri dant mesenterii ex duplici peritonæo origini (*m*).

Deinde, etsi tenera est ea membrana, de qua quærimus, multum tamen differt a teneritate omenti, ab ejus per vascula in lobos divisione, ab adipis secundum vasa sequentis distributione, quæ omento peculiaris est. Nostrum mesocolon & majora vasa sua *duplicatura* includit, & conglobatas glandulas, & renuit in lobos inflari. Demum cuique omento, ut anteriorem, ita posteriorem laminam adsignabimus, ut hac accessione non sit opus.

§. IX. Mesocolon dextrum (*a*).

Brævior hæc est mesocoli regio (*b*), quæ a costæ ultimæ apice, & ab hepatis sede, & a plica renali dextra, descendit, ante renem quadratumque muscolum, ad iliacum usque internum (*c*), secundum renem dextrum

(*g*) De usu part. L. IV. c. XI.

(*b*) p. 604. quæ bona est descriptio.

(*i*) Vide citatos oment. ic tab I.

(*k*) BORRHAAVE I. R. M. n. 100. KAUW n. 583.

(*l*) Compend. anat. p. 23.

(*m*) DOUGLAS. WINSELOW. HENSING.

(*a*) GALEN. arteriar. dissect. c. 1.

(*b*) VESAL. L. V f. 24. EUSTACH. I. c. Ic. anat. tab. art. mesent. a N. ad 12. |

(*c*) Vid. HENSING n. 22.

trum colonque ejus lateris sustinet. Brevis in medio pariter & nonnumquam nulla (*d*) & stricta. Eadem cæcum intestinum continet, cumque mesenterio sinisterius adveniente, cumque peritonæo iliacum musculum veniente in mediis vasis iliacis continuatur (*e*). Ex imo globo cæci propria & eminens plica abit ad peritonæum, in sede vasorum iliacorum (*e**). Hic finis mesocoli.

Proprium denique mesenteriolum longe triangulare, curvum, huic continuum, quod modo diximus, mesocolo appendiculam vermiformem sustentat. A mesocolo ligamentulum etiam oritur, quod arteriam mesocolicam fundat.

S. X. II. *Mesenterium.*

Unica & continua cum mesocolo membrana est, nequidem (*a*) ea nota diversa, quod crassis intestinis mesocolon, mesenterium tenuibus ferviat. Ostendimus enim, duodeno pene toti mesocolon esse pro membrana externa (*b*).

Lamina nempe dextra mesocoli sinistri secundum totam longitudinem suam cum mesenterii lamina sinistra continuatur (*b**), ad transitum usque intestini jejuni, de superiori regione abdominis descendens.

Tunc mesocolon transversum lamina sua inferiori, & mesocolon dextrum lamina sua sinistra, mesenterio pariter continuantur, a mediis vasis iliacis ad exitum usque vasorum magnorum mesentericorum, & ad originem vasorum colicorum mediorum, ad sinistra venæ portarum.

Tota ea longitudine, inter sinistram mesocolon, dextrumque, sub transverso, a sede orientis arteriæ mesentericæ (*c*), ad colicam arteriam (*c**), a prima (*c***) vertebra lumborum ad tertiam (*d*), oblique dextrorsum (*d**) descendit a lumborum vertebriis, earumque corporibus peritonæum, qua magna vasa sunt. Ab ea origine elevatur, & in processum

(*d*) Ad D. ic. nostr. HENNINGER de mesenter. n. 17. Semble s'effacer WINSLOW n. 203.

(*e*) EUSTACH. l. c. WINSLOW n. 202. HENSING ibid.

(*e**) Videtur le ligament droit du colon WINSLOW n. 204. & HENSING n. 22.

(*a*) Μεσocolον RUFUS appellat. L. I. p. 35.

(*b*) p. 357.

(*b**) EUSTACH. l. c.

(*c*) VESAL L. V. f. 10. 12. WALTHER intest. angust. n. 8.

(*c**) FALLOP. ibid.

(*c***) IDEM p. 174 b.

(*d*) KAAUW n. 593. Etiam quintam HENSING n. 20. connumerato mesocolo.

(*d**) HENSING n. 20. Sic fere WINSLOW n. 198.

cessum omnium amplissimum abit; repetito plicatum (*e*) & replicatum; cujus ultimæ plicæ intestini tenuis longissimum fyrma continent, super ejus convexitatem in se ipsas redituræ (*f*). Longitudinem mesenterii dimensus HENNINGERUS absque intestinis septem ulnarum reperit, cum iisdem ulnarum decem (*g*), mesocoli ulnas duas cum tribus quartis.

Dum & a dextra & a sinistra parte corporum vertebrarum peritonæum adsurgit, duæ laminæ nascuntur, dextra & sinistra, ut in mesocolo.

§. XI. *Mesenterii fabrica.*

Eadem est, quæ in universum peritonæo; natura nempe ex cellulosa tela stipata, absque fibris; vasculis numerosis picta sed exiguis, nullis nervis conspicuis. Hinc absque sensu est, ut omnino convulsiones ab acriori spiritu nitri superfuso in cane vivo natas, ipse experimenti auctor *Amatus* LORRY (*b*) nervis intestinalibus per tenue velamentum tactis tribuerit.

Motum mesenterio proprium, quo se versus umbilicum erigat (*c*), si ab aliquo etiam experimento ea opinio nata est, tribuas flatibus intestina replentibus, qui utique, & perinde etiam humor in vasa intestinalia injectus, ejusmodi motum cient.

Cum dextram inter sinistramque in ortu paginam, aut inter anteriorem & posteriorem laminam, ut fere in progressu est, intervallum sit, magnis vasis sanguineis intestinorum, deinde nervis, vasisque lacteis, & glandulis conglobatis recipiendis destinatum, id quidem intervallum cellulosa tela a peritonæi tela cellulosa continuata (*d*) repletur, quæ, quasi septi modo, vasorum anteriores trunculos a posterioribus distinguit. Id cellulosum macrum in aliquibus, sæpe tamen adipe (*e*) repletur, in mesenterio potissimum; nam in mesocolo sola fere vasa comitantem habent pinguedinem, & in ipso trans-

(*e*) WINSLOW n. 199. EUSTACH. *tab. cit.* FABRIC. p. 183.

(*f*) WINSLOW n. 201. KAAUW n. 595. FABRIC. p. 142.

(*g*) n. 10.

(*b*) *Journ. de Medec.* 1756. M. Novemb.

(*c*) *Idée de l'homme physique & moral* p. 206. & ante eum J. DAN. GONLIO *Act. Berol.* Dec. II. Vol. IV. p. 78.

(*d*) HENSING p. 28. KAAUW n. 603.

(*e*) WHARTON p. 27. Neque alia est substantia propria mesenterii WHARTON p. 28.

transverso illo intersepto magna spatia (f) mere membranacea & tenuia intercipiuntur.

In adipe circa vasorum intestinalium divisiones (g) plurimæ glandulæ sedent, ovatæ, compressæ, molles, tenera (h) membrana obductæ, conglobati generis, cellulosæ & ipsæ (h*); in mesenterio quidem potissimum, tamen etiam in mesocolo transverso, inque aliis mesocolis (i), etiam pone rectum intestinum. his glandulis cum thymo commune est, succo lacteolo (k) in fetu abundare, vasculisque innumerabilibus, deinde ea ætate succulentas esse; & in senibus demum diminui (l), & fere evanescere (m).

Non alibi in corpore humano frequentior scirrhus locus est (n), & steatomatibus, etiam lapideis (o) concretionibus, ut omnino dudum earum tumor, & scirrhus pro causa peculiaris atrophiciæ infantilis habiti sint (p).

In

(f) Conf. tab. art. mesocol. in Fascic. III.

(g) VESAL. p. 617.

(h) WINSLOW n. 218.

(h*) L. II. p. 182.

(i) EULER de mesenter. n. 18. EUSTACH. tab. II. f. 2.

(k) WHARTON p. 30.

(l) In pinguibus adipe obrui, ut non appareant Cornelius CONSENTINUS p. 233. BARBAUT p. 139.

(m) RUYSCH advers. L. II. n. 7. p. 23.

(n) L. II. p. 192. 193.

(o) Scirrhus enormis librærum decem, & cystides oleosæ, melleæ, sebaceæ PARE' L. XXIII. c. 36. In centro mesenterii gypsum pene durum ELLER Mém. de l'Acad. de Berlin XI p. 26. add. SYNOR p. 49. In atrophia mesenterium totum lapidosum PANAROL Pentec. V. obs. 19. & lapilli, ut credebat, in venis mesaraicis SCHNEIDER catarrh. L. III. p. 247. Glandulæ mesenterii tumidissimæ, intus tartaro feræ LOESTEN de nerv. access. p. 41. In mesenterio atrophici glandulæ lymphæ, etiam gypso, plenæ DROUIN Journ. sav. ann. 1690. n. 25. In mesenterio strumæ 70. INGRAMS. tum. p. 229. Mesenterium scirrhusum SALZMAN p. 68. Ossicula in mesenterio A. BALTH. ann. 1699.

(p) L. II. p. 192. Phthisis ex glandulis mesenterii scirrhusis HORST ad MARCELLUM p. 677. In tabido puero steatoma mesenterii pugni mole GOBLIKE affect. mesent. n. 36. In atrophia glandulæ mesentericæ tumidæ caseoso chylo plenæ DIEMERBROECK p. 70. In tabida glandulæ mesenterii maximæ KERKING obs. 18. Post febrem lentam sæpe mesenterii glandulæ argilla plenæ POMF. SACCHUS Scirrhus mesenterii in atrophia nouv. de la Répub. des Lettr. M. Julii. N. Litt. Mar. Baltb. 1705. p. 75. A cibo crudo scirrhi mesenterii morb. uratisl. bist. 1702. p. 129. Atrophia ex glandulis mesenterii tumidis COLLINS p. 396. In atrophia infantuli cum colicis doloribus scirrhus mesenterii grandis exulceratus HEBENSTREIT in diss. propr. In rachitica glandulæ mesenterii induratæ LANGGUTH pæll. rachit. Sed & ipse adeps mesenterii morbis est obnoxius PARE' L. XXII. p. 707.

In Germania inferiori id malum frequentissimum est, cum aliarum glandularum conglobati generis simili induratione commune. A scorbuto (p^*) & scrophulis etiam durescit (p^{**}).

In brutis animalibus, ut in cane (q), phoca (r), fele zibethica (s), leone (t), lynce (u), echino (w), chamæleonte (x), non quidem unica in centro mesenterii glandula est, sed agmen aliquot glandularum, quas ASELLIUS, errore satis incommodo, post GUINTERUM, J. SYLVIIUM (x^*): & COLUMBUM (y), *Pancreas* dixit (z), verumque pancreas pro corpore anonymo habuit, quod cani proprium foret (z^*).

Et si enim possunt circa arteriæ mesentericæ truncum in acervum glandulæ coire, non tamen aut unica (a) est glandula, aut ob eum acervum non perinde sparsæ illæ in homine reperiuntur, ut in simia (b) etiam, & rangifero. Ex brutis animalibus GALENUS (d), descripsit: VESALIUS (e) utramque fabricam miscuit; rectiora docuit EUSTACHIUS (f), & post ASELLIUM Johannes VESLING (g), vir multiplici laude clarus.

§. XII. Peritonai processus secundarii. Omenta.

Omenta peculiariter dicuntur eæ membranæ, quæ non ex peritonæo lumbis incumbente, sed ex membranis producuntur, ex peritonæo natis, hepatis, ventriculi, lienis, coli intestini.

Omnibus

(p^*) SAVIARD *obs. ult.* FAUDACE *reflex.* p. 54.

(p^{**}) BLAS *obs.* 12. P. I.

(q) ASELL. ubique.

(r) SCHELHAMMER *anat. phoc. Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 7. 8. append. p. 21.*
Plurimas tamen dicit SEVERINUS p. 31.

(s) DRELINCOURT apud BLAS p. 76.

(t) PARISIN. *Mémoir. pour servir à l'hist. des anim.* P. I. p. 8.

(u) Ibid. p. 133.

(w) BLAS l. c. p. 65.

(x) PARIS. *ibid.* p. 30. Ista quidem, quæ in ranis lien solet dici.

(x^*) *Isag.* L. III. c. 5.

(y) Glandulas mesenterii pancreas dici p. 270.

(z) F. 1. 2. L. L.

(z^*) F. 2. Q.

(a) Ita BOHN p. 157. Atrophicus puer ex scirrho glandulæ in centro mesenterii prægrandi GORLIEKE *observ. anat. Chir.* 2.

(b) DRELINCOURT apud BLAS p. 110.

(c) STENON. *Act. Hafn.* 1671. p. 276.

(d) *Uss. part.* L. V. c. 22.

(e) p. 617. Minores in vasorum divisionibus sitas dixit, & contra L. V. f. 11 unicam magnam in centro mesenterii pinxit.

(f) *Tab.* 10. f. 2. *tab.* 11. f. 1. 2.

(g) *Opusc. posth.* p. 65. tum J. WHARTON p. 31. GLISSON *de hepat.* p. 440. 441.

Omnibus omentis communè est, caveam, marsupio similem, cæcam, amplo plerumque aditu intercipere, dum membrana saccum efficiens in se ipsam revoluta innascitur. Præterea tenerrimas esse, ut nulla membranarum humanarum, retina oculi excepta, æque sit tenera. Et tamen suum robur habent, ut & flatum in saccos suos receptum contineant, & diu sæpe integræ supersint (*a*); & tinctum piscium gluten de vasis exsudans in marsupio omenti colicogastrici sæpe viderim, tamquam in utre, resedisse. Olei vis inter membranas omenti reperta (*a**). In hydrope aquam (*b*) non infrequenter omentum continet, & hydatides (*c*). Sed tunc ejus membranæ crassescunt (*d*).

Nunc si retinet humores immisos flatumque, non perforatur adeo poris (*f*) conspicuis, quos puto natos esse in laceratione tenerrimæ membranæ inter crassos adipis globos aeri cedentis (*g*).

Porro ut teneræ sunt membranæ omenti, tamen id habent commune, duplicem (*b*) esse membranam, quæ utrumvis folium componit, & ex duabus perteneris membranulis componi, cellulosa tela revinctis, in quam vasa recipiuntur. Incisione exigua facta & adacto flatu eas membranas separavi (*i*): etiam per inflatum mesocolon.

Omnia etiam omenta insigniter vasculosa (*k*) sunt, ramosque habent majores per valleculas collicorum incedentes, in quos ipsos inflando omentum intumescit, dum minores rami per colliculos in pulcherrima retia abeunt. Ab iis vasis in adiposas strias via est, quam hydrargyrus legere aptus est (*k**).

Ea

(*a*) Integrum eximi & instar marsupii repleti posse ORIBASIVS p. 106. Etiam RUYSCH *Thes.* II. tab. 5. add. HENRICI *de omento præf.*

(*a**) COLLINS p. 182.

(*b*) RIOLAN. p. 97. SÆUBERLICH *progr.* de HAEN *rat. med.* IV. p. 89. Videtur FABRICIUS vidisse *de omento* p. 99. qui flatuum hypochondriacorum sedem ibi posuit.

(*c*) Ad quatuor uncias *Mém. de Chir.* T. III. p. 404.

(*d*) De HAEN, l. c. Digitum crassum omentum SÆUBERLICH.

(*f*) GLISSON p. 97. Auctor italicus *Giorn. de Letter* T. XXII. p. 345.

(*g*) HEUCHER *ars magna anat.* p. 30. RUYSCH *Thes.* II. aff. 3. n. 15. *Thes.* VI. n. 33. *Proœm.* n. 5. WINSLOW *Mém. de l'Acad.* 1715. p. 37. *Expos.* n. 362.

(*h*) WINSLOW n. 355. KAAUW n. 586. 587 588. ROEDERER *thes.* dec. 1 HENSING *de oment.* not. 3. LIEUTAUD p. 262. *Id. nostr. oment.* T. I. not. n.

(*i*) Etiam HENSING.

(*k*) RUYSCH *Thes.* II. tab. 5. SPIGEL L. VIII. tab. 3. Etsi enim Cl. Viri solum omentum colicogastricum pingunt, eadem perinde vera sunt de omnibus omentis.

(*k**) VIEUSSENS *obs. d'anat. & de med. pratiq.* p. 66.

Ea vasa (1) adeps sequitur, in fetu quidem parvis glebis, & distantibus, dum spatia inter majuscula vasa intercepta macilenta sunt. Sed cum ætate, in aliis tamen magis minori copia, majori in aliis adeps in omento congeritur, totumque occupat, ut pastæ molli simile, impressiones intestinorum recipiat, adeo sæpe crassum, ut etiam digiti viderim crassitie.

Glandulas in nullo omentorum vidi, præter eas, quæ arcum majorem, ventriculi sequuntur & quæ minorem (*m*^{*}); easque quæ ad portas hepatis adsident; sed & eæ ad omenta pertinent. Quas Cl. Viri (*n*) recensent, eas puto vel morbosas fuisse, ut in peritonæo, vel ad glandulas mesocoli pertinere, quod olim omenti lamina audivit.

Lymphatica vasa, qui ipsi forte B I U M I sunt canaliculi, possunt circa glandulas conglobatas fuisse (*o*).

§. XIII. *Trium omentorum communia porta.*

Diximus a peritonæo renali dextro mesocolon oriri prope hepar (*a*): addimus nunc membranam extremam hepatis (*b*) de fissura transversa, & de vesicula fellis ad duodenum ire, vasaque hepatis fundare (*b*^{*}). Inter has duas membranas, illam posteriorem, venamque cavam, hanc anteriorem, & venam portarum cum ista conjunctam, sub hepate dexterrimo, cujus lobulus caudatus sive dexter (*c*) hic duodenum contingit, ostium (*d*) est, ab ipsa natura paratum, etsi nonnunquam vitio excæcatur, ut ipse bis vidi (*e*). In id ostium impulsus aer (*f*) marsupium omenti minoris,

(1) GLISSON *ventric. & int.* p. 101. WINSLOW *Expos.* T. IV. n. 351. 355. Striæ adiposæ SPAGNI *vigil.* p. 60. FANTON p. 81.

(*m*^{*}) p. 135.

(*n*) VERDRIES *us pingued.* p. 14. VESLING. p. 23. 24. DUVERNEY p. 172.

(*o*) MUNNIX *de re anat.* p. 26.

(*a*) p. 152.

(*b*) L. XXIII.

(*b*^{*}) Etiam L. XXIII.

(*c*) Conf. WINSLOW n. 235.

(*d*) WINSLOW *Mém. de 1715.* & *Expos.* T. IV. n. 360. LIEUTAUD p. 263. HENSING. HENRICI p. XIV. XV.

(*e*) Etiam HEISTERO *defut. compend.* n. 7. & Cl. LIEUTAUD p. 264. 289. & J. Adamo KULMUS *tab. anat.* v. 94. qui addit frequenter cæcum esse.

(*f*) WINSLOW n. 360. & *Mém. de 1715.*

ris, tunc continui pone ventriculum majoris, & continuati ante colon colici denique saccum distendit, & peramplam, postquam flatus accessit, caveam replet. Figura ei portæ lunata (g) est, a lobulo hepatis, quem circumscribit.

Inventor est J. *Benignus* WINSLOW (b), nisi DUVERNEYO ea laus debetur, qui omnino per similem descriptionem dedit (b*), si quidem, ex ILL. ARCHIATRO RUM COMITIS testimonio, nihil ejus viri posthumis codicibus accessit.

Cæterum non necesse est hanc portam quærere, ut omentum infles; sufficit omnino, si tubulum utcumque pone vasa hepatica submittas, ad anteriora hujus ostii, inter hepar ipsum & membranas hepaticoduodenales.

§. XIV. *Omentum minus hepaticogastricum.*

Membranzæ (a) lubricæ ab hepatis fissura dextra, vesicula fellis, & fissura transversa dexterrima, trans duodenum ad ipsum colon eunt, & continuantur cum alia simili membrana, quæ ex transversa fissura hepatis (b) ad sinistra nunc funiculi vasorum hepaticorum, & ex fessa ductus (b*) venosi, & denique a diaphragmate oritur; qua sede fortior est, nomineque dignior ligamenti: tenera eadem, qua ex ductus venosi fossa prodit.

Transit eadem trans duodeni partem, uti diximus, deinde trans lobulum (c) minorem hepatis, tum ante pancreas, inque colon (d), & ab arteriæ gastroepiploicæ dextræ, supra pylorum emersione, porro in totum arcum (e) minorem ventriculi, & denique in gulam, qua ligamenti nomen recipit (e*).

Maci-

- (g) WINSLOW l. c. Ic. nostr. II.
 (b) *Mém de* 1715. p. 234.
 (b*) p. 170.
 (a) p. 364. LIEUYAUD WINSLOW.
 (b) HENSING n 30.
 (b*) Etiam GUNZ *de hep.* n. 7. Nimis parvum GARENGEOT *splanchnolog.* 6. f. 2.
 (c) WINSLOW *Mém. 3^e expos.* n. 356. Adparet in bursula f. nostr. I. II.
 (d) p. 364.
 (e) WINSLOW *Mém.* p. 235. HENSING l. c. KAAUW n. 590. LIEUYAUD p. 264.
 (e*) p. 354.

Macilentius est & vasa habet minora (*f*).

Impulsus per ostium flatus subit inter membranas hepaticocolicas, nunc dictas, & inter pancreatis particulam, ad finem usque dextræ partis laminæ superioris transversæ mesocoli, glandulasque lumbales; deinde inter mesocoli laminam superiorem pancreaticam, & ventriculum, ad cæcum finem sinistram usque, in septum transversum. Ab eo flatu media quidem & tenerior pars hujus omenti in rosulam, conumque, surgit de hepatis lobulo, & tuberibusque rotundis eminet (*g*). Una flatus inter ventriculum, & colon in cæcum magni omenti colicogastrici (*h*) descendit, idque perinde elevat.

Plurimi veterum non ignorarunt omentum hepati innasci (*i*), ejusque lobulum complecti, de hoc minori omento locuti. EUSTACHIUS iconem dedit (*k*), & in catopardo PARISINI. In simia omentum adligatur hepatis lobo (*l*).

Lobulus hepatis duplici omento cingitur (*m*) RIOLAN. Lobus hepatis in omenti crumena absconditur (*n*) LOESEL. Lobus exiguus in omenti cavitate totus reconditur, & longe tenuiori membrana tegitur SPIGEL (*o*). Ala superior omenti cavo hepati adnascatur (*p*). Et inferior & superior omenti tabula innascitur hepati (*q*). Lobus SPIGELII obvolvitur omento (*r*). In cane tabula anterior omenti hepati inmittitur (*s*). Lobulus hepatis duplicatura omenti continetur HEUCHER (*t*). A J Benigno WINSLOWO rectius tamen hoc omentum declaratum fuit (*u*) nisi & hic eum visum DUVERNEYUS antevertit (*x*).

§. XV.

(*f*) WINSLOW n. 357.

(*g*) WINSLOW GARRAGEOT *tab.* 6. f. 2. cujus icon nimis parva est, Icon. nostr. I. II.

(*h*) WINSLOW *Mém.* p. 235. *Exposit.* n. 358. 359. FANTON p. 83.

(*i*) ORIBAS p. 106. VESAL. p. 604.

(*k*) *Tab.* 10. f. 1.

(*l*) J. SYLVIUS *var. corp. diff.* p. 71. b.

(*m*) RIOLAN. *enchirid.* p. 126. & *anthrop.* p. 97. Est omenti pars tertia EJUSTI hepatica.

(*n*) LOESEL *de renib.* p. 65.

(*o*) p. 24.

(*p*) LINDEN *physiol. reform.* p. 58.

(*q*) HIGHMOR p. 16.

(*r*) GLISSON C. 15. BARTHOLIN. *Specim. anat.* p. 35. MURALT p. 604. etiam MARCHETT. p. 14. FABRIC. *oment.* p. 91. nisi quod ille SPIGELIUM non nominat.

(*s*) BLAS *miscell.* p. 196.

(*t*) *Oper.* p. 755.

(*u*) *In memoir. de l'Acad.* 1715.

(*x*) *Postb.* T. II. p. 170. 171.

§. XV. *Omentum majus colicogastricum.*

Hoc solum veteribus vulgo innotuit, & absque molimine inciso abdomine se oculis offert.

Multoties amplius priori marsupium (a) efficit, quod infra ventriculum, & transversum colon, ante intestina tenuia descendit, varia longitudine, ut in pueris brevius, longius sit in adultis; & cis umbilicum viderim finire, & ad umbilicum (b), & infra eum (c), & ad pelvis (d) initium, siquidem etiam in hernias descendit (d*), & in pelvim (d**) denique, ut utero (e) adhærescere, & HIPPOCRATICO effato (f) locum dare potuerit. Plerumque sinistrorsum retrahitur, & in eo latere longius est (g). Interponit se ubique peritonæo, & intestinis, interque horum plicas se dimittit, ut etiam posteriori loco poni viderim, quam intestina (h).

Tenue in fetu, in adulto homine varie obesum, semi librari pendet (i) & ultra: sed idem congesto per vitam sedentariam adipe digitum, & pollicem crassum visum est, & pependisse libras quinque (k), multo etiam crassius, ponderosius, quando oleum (k*), & steatoma (l) in

co

(a) VESAL. L. V. f. 4. 5. WINSLOW n. 353.

(b) BIDLOO tab. 33. RUYSCH obs. n. 63.

(c) EUSTACH. tab. 9. JENTY tab. I. f. 4.

(d) HIGHMOR c. 16. COLLINS p. 180. BARTHOLIN. Cent. I. Hist. 32. RHOD mantiss. n. 16.

(d*) In scrotum descendere GALEN. admin. anat. L. VI. c. 5. Vidit VESALIUS p. 495. In bubonocèle frequenter adparet LAVATER enteroperist. n. 8. Sed hæc nimis sunt vulgaria.

(d**) SEVERIN. p. 61. BARTHOLIN. p. 61. SPIGEL. Rarum esse VESAL. rad. chir. p. III.

(e) SANTORIN. istor d'un feto n. 34. BARTHOL. p. 61. LUDWIG l. c.

(f) Aphorism V. n. 46. Se sterilitatem eo modo natam vidisse FABRICIUS, & a compressa tuba VALISNERI Oper. T. II. p. 258. & ab omento duro PANAROL III. 6. Non credit HOFMANN de oment. p. 13. Utique perobefis feminas reperisse vidi.

(g) VESAL p. 613. T. BARTHOL. in CASP. Instit. anat. p. 41. LUDWIG de situ visc. abd. p. n. p. V. BOURDON f. 43. MONTABOURG de hern. p. 742.

(h) BARTHOLIN. Cent. I. Hist. 32. In simia BLAS anat. p. 254. In elephanto PARIS

(i) DIONISI. p. 178. Unciæ duodecim cum semisse BARTHOLIN. Cent. I. Hist. 14.

(k) VESAL. p. 613. Trilibre ZOD Gall. T. II. p. 39. Librarum triginta BOERHAAV. præl. T. III. p. 100. Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. obs. 175. Multarum librarum SMETIUS miscell. L. X. p. 580.

(k*) In omento vasa habebant appendices, oleo coacto plenas, quod videbatur fluidum fuisse MANGET bibl. I. p. 62.

(l) Omentum crassum vesiculis sebaceis plenum LORSTEN de nerv. access. p. 41. Steatoma

eo nascuntur, aut carnosæ (*m*) concrementa, aut demum cancrofi & ulcerati scirrhi (*m†*), cujusmodi in casu pollicem crassum vidi. Etiam serum in omento macilentorum hominum invenitur (*m**), & hydatides (*n*), ut in aliis cellulosis telis, hic nascuntur, & denique ossæ (*o*) & lapideæ (*p*) coagula nonnumquam adparuerunt. Totum in seroto durefcit (*o**).

Vicissim in hydropicis quasi consumitur (*u*), & alias in longis morbis pene evanescit.

Hæc in universum. Peculiaris omenti hepaticogastrici fabrica est ejusmodi. Laminam habet anteriorem, eique continuam posteriorem. Anterior oritur a gula, continuata cum ligamento sinistro œsophagi (*w*); porro ex arcu magno ventriculi toto (*x*) [duplici membrana], ad pylorum usque (*y*), aut paulo sinisterius, quæ nempe primum arteria gastroepiploica ad ventriculum accedit.

Ad duodenum nunquam (*z*) pervenit, certe in meis numerosissimis exemplis (*a*).

Inde inferitur in totum quidem lienem (*b*), ejusque sinum, cum vasis magnis, ante ligamentum (*c*): ejusque visceris fit membrana extrema;

Steatoma maximum *Ess. of Edimb.* T. IV. p. 30. Tumor omenti steatomatosus 22. librarum in hydropica *STORK ann. med.* 1. p. 149. Steatomaticum omentum quinque pollices crassum *IDEM* p. 130. Tubercula adipis indurati crassa in omento utroque, & appendiculis, inque mesenterio & mesocolo de *HÆN* Tom. V. p. 40. 41. Parvum omentum erat 5. lib. $\frac{1}{2}$. *ibid.*

(*m*) Carnosum omentum *C. BARTHOLIN. anat.* p. 67. Plenum glandulis scirrhosis *BEAIR* p. 49. & *COWPER* ad *BEDLOO* t. 34. f. 5. Glandulæ omenti scirrhosæ *HORST* *Epist.* p. 454. *BURCHART* de gland. scirr. b.

(*m†*) *SCHUSTER* *obs.* p. 54.

(*m**) *MALPIGH. oment.* p. 38. *MORGAG. advers.* II. p. 16.

(*n*) *VERDRIUS* *us. ping.* p. 14. *VESLING.* p. 23. 24.

(*o*) Omenti tumor sebaceus squamis ossæis distinctus *FANTON. epist.* ad *MANGES* II.

(*o**) *POTT ruptur.* p. 80. Etiam cancrefcit *ibid.*

(*p*) In omento hydropicæ tumor mobilis calculosus *MONGIN* *sur la petrificat. de l'Epiploon.* *Analysis* dedit quæ os.

(*u*) Semper corrumpi *COLBATCH theor. of acids assert.* *BONT. obs.* 7. L. III. *Phil. trans.* n. 333. p. 457. In partu difficili fufum *SOLINGEN Embryule* p. 22.

(*w*) p. 354.

(*x*) *SPIGEL tab.* 6. f. 2. *ARISTOT. part. animal.* L. IV. c. 2. *WINSLOW* n. 353. *RUYSCH Thes.* II. tab. 5.

(*y*) *Not. k.* ad f. 1. *Oment.* & t. 2. ad E. K. Etiam *RUYSCH* l. c.

(*z*) *Not. c.* ad f. 2. omenti. *HENRICI* p. XVIII. *VESAL.* p. 604. *FABRI-CAUS* p. 91.

(*a*) Inde deducit *MONRO* l. c. T. I. G. E. *DUVERNEY* p. 169. *KAAUW* n. 583.

(*b*) *VESAL.* p. 604. *LIEUTAUD* p. 264. *KAAUW* n. 581. *WINSLOW* n. 253.

(*c*) p. 354.

ma; adhæret etiam in ligamentum sustentatorium lienis (*d*), & etiam trans id ligamentum in peritonæum (*e*).

Qua vero colon transversum adtingit, ibi ante id intestinum descendit, ad finem suum cæcum usque, qui ante intestina natat. Is ubique fuerit, redit in se ipsam hæc lamina, non tamen conata, sed spatio inani, vapore solo pleno, distincta a lamina posteriori, se ipso nempe, quando descendebat, laminamque nunc facit posteriorem & contra suam originem adscendit, atque inseritur in colon transversum (*f*), a liene ad finem cæcum sinistrum. Nempe in imo, vel anteriori, sine sinus lienis, mesocoli lamina superior a pancreatis sine ad inferiorem laminam ejusdem mesocoli accedit: omentum vero redux, & adscendens, linea propria obliqua trans laminam superiorem mesocoli, in sede ligamenti sustentantis, ad imum lienis finem accedit, porroque cum omenti in lienem insertionem continuatur. Etiam hic duæ omenti tenerrimæ laminæ a duplicato mesocolo oriuntur. Eo loco inter lienem & ligamentum suspensorium, & mesocolon, cæcus finis est omenti (*g*) sinister.

Inde trans colon, antè procedit, ibi cum colico omento continuatum, & adhæret ad laminam superiorem mesocoli in linea propria, quæ tendit ad accessionem vasorum gastroepiploicorum, in directione arteriæ colicæ mediæ (*h*).

In colon intestinum laminam ventricularem non redire Cl. Viri scripserunt (*i*), neque dubium est anteriorem laminam posteriori continuari: in mesocoli vero membranam omentum se immittere dubitari nequit. Flatus enim duplicis mesocoli intervallo inmissus cogit omentum in duo foliola discedere.

Ita fines cæci hujus epiploi sunt in parte fluctuante abdominali: in lienis cum oesophagi & cum diaphragmate conjunctione, & inter lienem atque mesocolon & ligamentum lienem sustentans: in angulo demum, quem omentum cum mesocolo (*k*) transverso intercipit.

Patet

(*d*) In tabula omenti I.

(*e*) Costæ spuriae aliquando adnasci GALEN. *admin.* L. VI. n. 5.

(*f*) SPIGEL L. VIII. tab. 6. tab. 4. f. 1.

(*g*) Cavam eo loco appendicem omenti inter lienem & colon HENRICI posuit p. XVIII. & in icone. Habet etiam LUDWIG n. 6.

(*h*) F. 1. Nostri omenti HENRICI p. XV.

(*i*) HENNING n. 32. & iisdem verbis HENRICIUS.

(*k*) In principio hujus paginae.

Patet idem secundum totum ventriculum & secundum colon transversum, in caveam illam imaginabilem, cum omento hepaticogastrico continuatam, quæ est inter mesocolon, duodeni initia, ventriculum, oesophagi latus dextrum, septum transversum, hepar, lienem, & lumborum vertebrae, qua aorta & vena cava earum corporibus incumbunt, multis cum lumbalibus glandulis (*l*).

Rarissimum fuerit, si a solo colo (*m*), absque adhæsione ad ventriculum, hoc omentum provenit, aut a solo ventriculo (*n*), neque ad omentum minus continuatum fuisse vidi (*o*).

Inflatum per portam omenti, aliove loco, in grandia tubera adsurgit (*p*).

§. XVI. Omentum colicum.

Huic grandi omento, quæ ante colon transversum dexterrimo suo limite adscendit, continuatur cava appendix (*a*), conica, variæ longitudinis, quam ad cæcum (*b*) usque intestinum productam viderim. Ea sit a sola membrana interna coli, sed duobus sibi parallelis locis de intestino adsurgente, ut inter utramque laminam aer intercipiatur, flandoque conus in tubercula extuberans formetur, qualis est in reliquis omentis fabrica. A solo ventriculo oriri, rara fabrica est, quam non oportuisset ad omnia cadavera transferri (*c*).

Cl. LIEUTAUD omnino (*d*) hoc omentum intellexit, quando epiploon ad duos digitos a vermiformi appendicula oriri, & inde ad colon transversum procedere dixit, in eo a me diversus, quod partem majorem altera lamina a colo, altera a mesenterio dixerit oriri. Eodem autem

(*l*) Not. q. ad tab. I. omenti.

(*m*) HENSING n. 911. HENRICI p. XVII.

(*n*) HENSING ibid. HENRICI ibid.

(*o*) Ut HENRICI ibid.

(*p*) Octo numerat DUVRENEY p. 171. Pinxi tab. I. Omenti : tam HENRICI & GARENGIOT.

(*a*) Tab. I. omenti R. R.

(*b*) GUNZ de hepate n. 3. In sinu ibi adhæret BLAS anat. anim. p. 110.

(*c*) HENRICI descr. oment. p. XVI. XIX. Fig. Q. Defendit nostros limites ILL. LUDWIG de situ viscer. abdom. p. VI. VII. & ad cæcum usque omentum adhæsisse GUNZIUS testis est de hepate n. 8.

(*d*) p. 263.

tem mecum tempore potuit vidisse, cum privilegia libri Viri ILL. sint anni 1741. et si liber anno 1742. prodiit; ego vero anno 1742. ineunte tabulam jam ex pluribus selectam sculptam habuerim, quam eodem anno edidi. Reperi in adversariis 12. Nov. 1740. primum a me in theatro Gottingensi demonstratum, inde in omnibus infantum cadaveribus ostensum esse.

Alias appendices omenti in parte maxima convexa ventriculi nunciat Cl. LIEUTAUD (e), dignas nomine omenti minoris, mihi ignotas.

Cæterum quadrupeda omnia omentum habent, simiæ (e*), canes (f), urfi (g), coati (h), leones (i), tigrides (k), catopardi (l), lynces (m), zibeticum animal (n), hystrices (o), marmotæ (p), talpæ (q), elephantes (r), equi (s), gazellæ (t), cervi (u), rupicaprae (w), ut vix credam hystrici americanæ deesse (x). Etiam aquatica id omentum habent, ut phocæna (y), phoca (z).

Quæ vero membranæ in avibus (a), serpentibus (b), quadrupedibus frigidis (c), tomenta dicuntur (d), eæ sunt utique adipis (e) receptacula. Piscibus etiam ea natura est (f).

A a a 2

§. XVII

- (e) P. 264.
- (e*) Subtus etiam intestina continet, tum in animalibus celeribus BLAS p. 110.
- (f) Amplum, per totum abdomen extensum MORRO compar. anat. p. 11.
- (g) Valde pingue COMM. Nor. 1734. n. 78.
- (h) Amplissimum & pinguissimum Mém. de Berlin T. XII. p. 181.
- (i) Grande ad lienem adnatum PARIS.
- (k) Magnum omnia intestina continens PARISIENSIS BLAS p. 121.
- (l) Intestina continens PARISIENSIS.
- (m) Perinde IDEM.
- (n) Amplum itidem intestina continens BARTHOL. C. IV. Hist. I.
- (o) Non liberum PARISIENSIS.
- (p) Præpingue Phil. transf. n. 395. PARISIENSIS.
- (q) Magnum HARDER ap. obs. 24.
- (r) Amplissimum & tenue STURGELEY tab. 4. f. 1.
- (s) Breve SNARE.
- (t) Etiam in hoc animale intestina continet PARISIENSIS.
- (u) PARISIENSIS.
- (w) Magnum HARDER obs. 14.
- (x) SARRAZIN Mém. de l'Acad. 1727.
- (y) TYSON p. 19. RONDELET p. 449.
- (z) SEVERIN. p. 31. absque adipe.
- (a) Omentum nullum ova gignentibus PLIN. L. XI. p. 630.
- (b) SEVERIN. zootom. p. 366.
- (c) Ranæ, lacerto.
- (d) Aquaticis avibus CORNER p. 132. Cormoran PARIS. plateæ PARIS. In anseris adeps intestina tegit FANTON. diff. anat. p. 73. Parvum omentum struthiocameli RANBY Phil. transf.
- (e) PARIS. in chamæleone. Sic in ranis & lacertis.
- (f) Conf. SCHNEFFER pisc. bavar. p. 32. Super intestina mollis alba unguinosa materies effusa PLANCUS Comm. Bonon. L. III. p. 332.

§. XVII. *Mesocoli cavea. Appendices epiploicae.*

Ut harum appendicum, totiusque mesocoli & omenti, natura melius perspiciatur, oportet & per omenti portam aerem impellere, & exiguo vulnere mesocoli laminam superiorem incidere, qua duodenum, quasi triangulari capsula, in mesocolo continetur, eo loco inter laminam superiorem & inferiorem per id vulnus perinde aerem inflare.

Ita apparebit, pulchro spectaculo, duplex circa hepar & duodenum vesica, mesocolon nempe in ampullam surgens, dimotis a suo contactu laminis, & in omenti ampliori cavea comprehensum.

Apparebit limes laminæ mesocoli superioris, ex quo omentum proderit, & utraque nunc ampulla separatur; ab omento nempe mesocolon distinguitur; neque is lobus cedit nisi violento flatui, ut tamen mihi aliquando acciderit rupta omenti adhæsione, flatum ex mesocolo in omentum transiisse.

Sequetur porro idem aer totum colum transversum, elevabit, [non quidem semper], de pancreate laminam mesocoli superiorem, ut inter duas mesocoli laminas, in ejus membranæ cavo pancreas poni adpareat. Elevabit porro ligamentum lienis suspensorium, & ostendet aliud ab omento ibi cavum esse. Sequetur denique totum colon ad rectum intestinum usque, & faciet, ut totum a continua ampulla sustineatur.

Una, non semper quidem, sæpe tamen, surgent inflata *omenta parva* (a) vel *appendices epiploicae*; capsulae (b) nempe cellulosa pingues (c), quæ de universo intestino colo, etiam de recti (d) parte, sæpissime gemellæ prodeunt, cæoque sine aerem continent inflatum: manifesto argumento, eas a membrana coli extima duplicata (e), ut a mesocolo oriri. Conicæ sunt eadem, in fine suo libero crassiores (f), etiam bifidæ, & pulchrum spectaculum præbent, quando totum colon iis undique riget (g). Inventor est VESALIUS (h); habent etiam

(a) WINSLOW.

(b) IDEM.

(c) RUYSEH *tab. 5.* BIDLOO *tab. 39. f. 5.* Im pygmæo reperiuntur TYSON p. 32.

(d) FABRIC GLISSON WINSLOW.

(e) IDEM n. 365.

(f) IDEM n. 366.

(g) p. 614. Una inflari posse HENSLING n. 25. add. WINSLOW n. 367.

(h) p. 612.

etiam FABRICIUS (*i*), SPIGELIUS (*k*), RIOLANUS (*l*), J. Antonides van der LINDEN (*m*), GLISSONIUS (*n*), BARTHOLINUS (*o*), WILLISIUS (*p*), KYPERUS (*q*); renovavit RUY-SCHIUS (*r*), inde MANGETUS (*s*), & alii.

Optime una adparet, quod diximus, a solo colo natum omentum colicum.

§. XVIII. *Cellulosa peritonæo circumposita* (*a*) &c.

Aliqua ad historiam peritonæi addenda supersunt. Processum quidem alias uberius describam, quem in fetu verissimum emittit, ut nunc ex meis observationibus (*a**), & ex consensu ILL. Virorum Petri CAMPER (*b*), & Guilielmi HUNTER (*c*) video, perpetuum. Testes enim in ea tenera hominis ætate ad lumbos (*c**) sedent, ut in avibus, estque in ipsa peritonæi cavea (*d*) inquilinus: adest una parata pro teste vagina (*e*), ex vera membrana peritonæi facta, pene cylindrica, digitalis, superne in caveam peritonæi patula (*e**), ad os pubis adnexa inferius in scrotum ducens.

In eam vaginam descendit sensim testis, plerumque circa partus tempora. Postquam eo descendit, meatus quem vaginam dixi, in proprio loco

(*i*) *De intest.* p. 152.

(*k*) p. 229.

(*l*) p. 110.

(*m*) *Physiol. reform.* p. 56.

(*n*) p. 188.

(*o*) *Centur. I. obs.* 92.

(*p*) *Excrescentiæ carneæ, ramosæ, colo & recto adnatæ convuls.* p. 129.

(*q*) p. 107.

(*r*) *Mus. rar.* p. 158.

(*s*) *Theatr.* p. 244.

(*a*) Aliqua jam dixi L. I. p. 16.

(*a**) *Opusc. patholog. obs.* 28. Primum vidi in gemellis, qui ante partum perierant. 27. Oct. 1747. Descripsi in progr. de bern. congenit. 1749.

(*b*) *Waarneem. van de hollandze maatschappy* &c. VI. p. 248. 250. 251. f. 1. 2. 3.

(*c*) HUNTER *Med. Comment.* p. 81. f. 2. 3.

(*c**) *Id.* p. 80.

(*d*) *Idem* p. 81.

(*e*) Meatus CAMPER: processus HUNTERI.

(*e**) Cellulosa, gelatinosa tela tectum HUNTER p. 79.

loco constringitur & clauditur (*f*), ejusque sola inferior pars superest, quæ *vaginalis* testis tunica audit, & sensim ad funiculum adhærescit; in peritonæo, cæterum integro, ea vaginæ occlusæ sedes quasi cicatricem (*g*) refert.

Non ita ad umbilicum peritonæum apertum est, sed omnino antè sibi imposita habet vasa fetui propria, venam umbilicalem, urachum, arterias umbilicales, & venas ejus nominis. Ea vasa cellulosis filis per totam suam longitudinem ad solidam peritonæi membranam adnæscuntur (*h*).

Neque verum foramen est, quo intestinum rectum de peritonæo enittitur. Id intestinum de breviori semper lamina mesenterii sustinetur (*i*), & demum antè peritonæum solum inpositum habet, denique ne antè quidem, ut totum intestinum peritonæo longius in celluloso spatio sit, per quod anum adit.

Vera foramina peritonæi sunt, ut quidem ejusmodi membranæ foramina admittunt (*k*), in oesophagi aditu, & venæ cavæ ad hepar adventu, ejusdemque de hepatis tubulo, exitu; tum in lamina inferiori mesocoli, jejuni intestini ex spatio, inter mesocoli membranas, in spatium peritonæi intestina comprehendens exeuntis adhæsiō.

Aorta (*l*), vena (*m*), cava sub hepate (*n*), iliaca vasa, renalia vasa, ureteres, vesica urinaria, sunt extra peritonæum: omnia etiam vasa cæliaca, mesenterica, mesocolica, & alia ejusmodi verè extra peritonæum sunt, inque circumposito celluloso textu (*o*) decurrunt.

De eo textu nuper est sollicitè magis quæsitum.

In universum pinguisissimus est locus circa renes, qua adeps imaginabiles caveas triangulares reni compositas, & ad cavum peritonæi pertinentes & antè injectus, & postèr substratus, adgestus explet, totumque sæpe renem occultat (*p*).

Multus

(*f*) CAMPER p. 254. 255. HUNTER p. 82. 88. 89.

(*g*) HUNTER p. 82.

(*h*) SCHULZE *vas. umbil.* n. 10.

(*i*) p. 350.

(*k*) p. 357.

(*l*) KAAUW n. 592.

(*m*) Vasa magna C. BARTHOLIN. *method. demonstr. anat.*

(*n*) KAAUW n. 617.

(*o*) IDEM n. 604. 605.

(*p*) Conf. KAAUW n. 570. HENSING n. 4. 16. WINSLOW n. 30.

Multus est etiam pone intestinum rectum adeps; multus circa umbilicum (*q*), & in itinere venæ umbilicalis. Parcus versus abdominalium musculorum superiores tendines, versus urinariam vesicam: versus uterum, & ovaria nullus, neque versus tendines musculorum transversorum.

Processus etiam hujus cellulositatis passim nuperi scriptores describunt. Nempe quasi farcimen ex ejusmodi tela factum venam cavam & aortam sequitur, per lumbos, perque pelvis oram, usque in femora. Sequitur alia appendix aortæ (*r*) sursum in thoracem euntis iter, cum pleuræ cellulositate & mediastini posteriori cavea continua (*s*), inque caput cum carotide, in brachia suis cum arteriis, in aortam denique ad cor usque porrecta. Sequitur oesophagum (*t*) alia stria, per thoracem, in collum, adque summum occiput continua.

Ab umbilico & ad abdomen, & ad lumbos universos, & sursum pone sternum in thoracem & mediastini anteriorem textum alia hujus cellulosæ telæ propago venit: alia in fetu funiculum subit, & vasa eo contenta sustinet.

Aliud memorabile farcimen, exit sub transitu vasorum seminalium, inque scrotum (*u*) descendit. Exit cum ligamentis teretibus (*w*) aliud in pubem, aque sede iliaca in femur, fasciæque latæ adipem. Maximum aliud cum intestino recto in spatia ano (*x*) circumfusa prodit: aliud cum magnis vasis in adipem natium & postici femoris (*y*): aliud cum arteria obturatrice (*z*) per foramen ovale, in anticum femur, & cum vasis femoralibus in semen (*a*): aliud cum uretere ad vesicam usque, circa eam & vesiculas feminales, prostatesque circumfusus; cum urethra porro penem (*b*) exterius secuturum.

Et quæ alia, nemo absque tædio enumeret.

Uno

(*q*) WALTHER *de obes. & vorac.* p. 8.

(*r*) HENSING n. 6. 15.

(*s*) MORAND *de la taille* p. 316.

(*t*) HENSING n. 6.

(*u*) IDEM n. 5. Sed alias dicetur L. XXVII.

(*w*) IDEM *ibid.* WINSLOW n. 31.

(*x*) HENSING n. 14. WINSLOW n. 32.

(*y*) IDEM n. 4. 5.

(*z*) BUTNER *de periton.* n. 7. p. 13. GUNZ *bern.* p. 20.

(*a*) BUTNER HENSING n. 5. VERDIER II p. 32. GUNZ *bern.* p. 20.

WINSLOW n. 31.

(*b*) HENSING n. 5. 14. WINSLOW n. 32.

Uno verbo, ut omnes inter se cellulosa telæ, ita quæ peritonæo circumponuntur, cum iisdem per totum corpus cavernulis communicant (c).

Hactenus non ignorasse juvabit, quod per ea cellulosa spatia, si, quando vera membrana peritonæi laxata fuerit, possint herniæ nasci; nempe contenta abdominis extrudi, ut intestina, ventriculus, vesica urinaria, uterus, potissimum quidem in scrotum, spatia scroti locum in feminis tenentia, spatia arteriarum femoralium transitui vicina, foramen ovale pubis, cellulosam totam vaginæ circumfusam, umbilici sedem.

Etiam ulcera ejusmodi itinera tenent, & mesenterii abscessus, cujus glandulæ consumptæ erant, cum obturatore interno ad genua ivit (d). In pleuritico cuniculi alti secundum peritonæum (e) descenderunt. Cum ulcere femoris pure dlenum abdomen (e*).

§. XIX. Harum partium vasa.

Obiter tantum hæc indicabo, quæ numero pene sint infinito, neque truncos magnos habeant.

In peritonæo, antè ab arteria mammaria (a), ab epigastrica (b), ab abdominali (c), ab hepatica (d), a phrenica (e); ad latera a lumbalibus, ab intercostalibus, ab abdominali, ab iliolumbali (f), a renalibus, ab iliatis. Posterius a circumpositis truncis phrenicis, appendicibus, capsularibus (g), hepaticis, splenicis, gastricis, renalibus, mesentericis, ileocolicis, colicis sinistris, mesocolici (h), spermaticis (i), lumbalibus, intercostalibus, hypogastricis, hæmorrhoidæis internis. Omnia hæc vasa inosculantur interesse, & spermatica cum mesentericis uniuntur.

Lymphatica circumposita peritonæo non recuso (k), etsi non vidi.

Mesen-

(c) L. I. p. 12. &c.

(d) HENRICI *abcess. mesent.*

(e) SCHENK *Exerc. anat.* II. L. I. p. 172.

(a) *Icon. anat. Fasc. VI. tab. 1. art. brach. n. 28, 29, 30.*

(b) n. 42. 44. 45. 48. 36. SPIGEL L. VIII. tab. 1.

(c) Annon. HENSINGIUS n. II.

(d) *Eascic. IV. n. 34. 35. Fasc. VIII. p. 32.*

(e) *Fascic. VIII. p. 35.*

(e*) MOEB. *obsf. 1.*

(f) Annon. huc HENSING n. II.

(g) *Art. mesent. p. 48.*

(h) Ibid. p. 48. 49.

(i) Ibid. p. 49.

(k) NUCK *adenogr. p. 98.*

Mesenterii & mesocoli vasa propria distinguere oportet ab intestinalibus. Illa perexigua, multa, brevia, hæc amplissima sunt. Mesenterii arteriæ venæque fere sunt ab intestinalibus; mesocoli vascula, ut peramplici, a sacris, ab iliolumbali, lumbalibus, spermaticis, mesocolicis, epiploicis sinistris (*l*), dextris (*m*), splenicis (*n*), pancreaticis (*o*), colica anteriori, quæ est mesentericæ propago, colica dextra, ileocolica, uretericis, spermaticis, capsularibus (*p*), mesocolica, hepaticis, duodenalibus, intercostalibus imis (*q*).

Recta sunt vasa mesenterii & mesocoli, neque habent illos pulchros intestinalium arcus.

§. XX. Vasa omentorum.

Majora ista, ubique truncis longis oriuntur, etsi non maximis.

In omento colicogastrico anterior lamina dextra vasa habet a gastroepiploica dextra (*a*), quorum aliquis, major, ramus, *epiploicæ dextræ* (*b*) nomine longe ad sinistra excurrit, ut cum sinistra epiploica inosculetur. Sinistra sunt a gastricis posticis (*b**), gastroepiploicis sinistris, aque ipsa etiam *epiploica sinistra* (*c*), quæ in dextræ occursum it. Lienalia etiam ramos eo remittunt & brevia.

Vasa laminæ posterioris sunt & ipsa ex utrisque gastroepiploicis, & imprimis ab epiploica dextra (*d*), a sinistra (*e*), a splenica aliqua; etiam a colicis (*f*), duodenalibus (*f**), adiposis (*f***).

Omenti

(*l*) Fasc. VIII p. 34. Fasc. II. Art. cal. II. not. g. Fasc. III. tab. art. mesent. p. 48.

(*m*) Tab. cal. I. not. r. Tab. mesent. p. 48.

(*n*) Tab. cal. II. not. b.

(*o*) Fascic. VI. p. 36. tab. art. mesent. p. 44. 48.

(*p*) Tab. art. mesent. &c. p. 48.

(*q*) Ibid.

(*a*) Tab. cal. I.

(*b*) Tab. cal. I. not. r & q. HENRICI n. 16. c.

(*b**) Not. f. art. caliac. II.

(*c*) Not. g. tab. cal. II. HENRICI n. 16. Z.

(*d*) Fascic. VIII. p. 34. HENRICI O.

(*e*) Ibid.

(*f*) DUVERNEY postb. II. p. 171.

(*f**) IDEM ibid.

(*f***) IDEM ibid.

Omenti hepaticogastrici vasa sunt a coronaria magna (*f†*), & parva (*g*), & ab hepatica.

Omenti colici, a colicis, ab epiploica dextra (*b*), duodenali (*i*).

Appendicum epiploidum vasa a colicis vicinis.

Venæ omenti, ut continuo fusius dicetur, minores quidem arterias cognomines comitantur: majores ad portarum venam conveniunt: inque truncum quidem splenicum ab omenti colicogastrici sinistra parte, & ab hepaticogastrico omento, cujus etiam venæ alias absque alio interposito trunco continuo in truncum venæ portarum abeunt. In mesentericum truncum veniunt venæ pleræque omenti colicogastrici, venæ omenti colici, venæ appendicum epiploicarum. Omnes amant inter se plurimis anastomosibus uniri (*k*): epiploicæ dextræ cum sinistris, gastroepiploicæ dextræ cum sinistris, cum utrisque gastricæ. Tota enim vasa in retia abeunt, quæ lobulos omenti ambeunt.

Sanguis omenti lente movetur, cum de resecto absque vinculo epiploo sæpe nullus manaverit (*k**).

Omentalia vasa perinde perspirant, ut vasa peritonæi. Vidi omentum gastrocolicum cæruleo glutine piscium plenum, quod per arterias injeceram, vidit similia Cl. KAAUW (*l*).

Deinde ex arteriis omentalibus, secundum totam longitudinem, injectus liquor sudat in cellulas adiposas, quæ omentum sequuntur; rem sæpe & hic vidi & alibi. Addit autem ALBINUS (*m*), id fieri per valcula minima, quæ ipse distincte viderit.

Minima quidem retia adiposa, fluida vidi, pellucida, lymphaticorum similia, sed vere tamen adiposa.

§. XXI. Vasa lymphatica & nervi omenti.

Neutra classis nota est. Nervos aliquos colicogastricum a truncis gastroepi-

(*f†*) Coronariæ HENRICI n. 7.

(*g*) Not *m. tab. caliac.* I

(*b*) Fascic. VIII. p. 34. HENRICI n. 16.

(*i*) HENRICI ib.

(*k*) RUYSCH l. c.

(*k**) Journal de méd. XII. p. 149.

(*l*) n. 562.

(*m*) Apud HENRICI n. 17. adde KAAUW n. 796. & 797.

stroepiploicis dextris (*a*) & sinistris (*b*) habet. Hepaticogastricum a plexu (*c*) posteriori octavi paris per ductum venosum ad hepar veniente, a quo perambulatur: De reliquis omentis nihil certi habetur. Parvos esse nervos vel ex sensu exiguo æstimes, qui est in omenti excisione, aut in ejusdem tractatione, quæ in herniis, inque vulneribus adeo frequens est.

Peritonæo nervi quidem grandes incumbunt, in ejus tamen naturam aut minimi subeunt, aut nulli, cum sensu destitui videatur (*d*).

Mesenterium & ipsum manifesti sensus (*e*) est expers. Si nervos aliquos habet, ab intestinalibus habet, quos per suarum laminarum interval- lum dimittit.

Vasa lymphatica in omento esse non repugnat, cum glandulæ conglo- bati generis & in omenti hepaticogastrici (*f*) ad ventriculum adhæsi- one sint: & in omenti colicogastrici (*g*) a ventriculo origine. Habentur etiam eorum aliqua indicia apud Cl. B I U M I (*h*), nonnullosque ve- terum (*i*). Denique, si sunt resorbentia vasa (*k*), & ad resorbendum abdominalem humorem de facie omentorum eo respiciente, & ad humorem cavea omenti magni contentum, eadem requirentur.

S E C T I O I I.

U T I L I T A S H A R U M P A R T I U M.

§. I. *Peritonæi.*

Late regnantia per varias animalium classes organa, magni esse usus, sæpe, neque puto abs re, repetii. Nunc peritonæum reperio, in

(*a*) L. X. p. 296.(*b*) p. 236.(*c*) Ibid.(*d*) L. XIX. p. 161(*e*) p. 340, 341.(*f*) p. 360.(*g*) Ibid.(*h*) *Canalett.* l. c.(*i*) M U N I K S *de la anat.* p. 26.(*k*) Ibid. in *addend.* ad Tom. I. quibus nunc suam auctoritatem addidit Guil. H U N-
TER. in *medicis commentariis.*

in quadrupedibus, etiam frigidis, avibus & piscibus. Facile etiam adparet vel rudi experimento violati hujus velamenti, quanta sit ejus necessitas. Extemplo enim, uti vulnus accepit, etiam ubi non vulneratum quidem, sed munimentis sibi circumjectis (*a**) incisus debilitatum fuit, continuo, vi maxima, erumpunt per vulnus proxima quæque viscera, hepar, omentum, ventriculus, intestina, renes, tanto impetu, ut vix ullo modo reponere possis, aut in situ fervare reposita. Prima ergo utilitas peritonæi est, continere suo in situ viscera plenissimi abdominis, ut pressionem circumpositarum virium muscularium patiantur quidem, neque ideo de suo situ decedant. Ipsum cor & pectus hujus pressionis beneficia percipiunt; paracenteseos ob hydropem susceptæ argumento, in qua subito subtracta abdominis aqua (*a*), a peritonæo languido & inertiale defensum diaphragma, & una thoracis viscera, funesto eventu deorsum languida relabuntur.

Porro vapore suo interjecto viscera & inter se ipsa, & cum peritonæo, alias continuo adhæsura, solum libera servat. Quare eo vapore inspissato, aut in pus converso, aut siccato, ut per inflammationem siccare credas, omnia inter se confervent (*b*). Hinc a vulnere ex fere partes ad peritonæum adhærescunt, quæ sub vulnere (*c*) sunt; eas enim inflammari necesse est. Idem ros necessariam materiam confert ad temperandum (*d*) sanguinem adipe gravem, adque imprægnandum eundem alcalino volatili elemento.

Iterum internis suis ligamentis & processibus peritonæum omnia viscera suo loco continet, ne vagari possint, & in alienas sedes de sua vicinia abeant.

Et æquum est creditu, si in solis vasis fundarentur mobilia abdominis viscera, de septo transverso suspensa (*e*), tot in saltibus, nixuque maximo, per vitæ humanæ conditiones necessario, ruptum iri nimis debilia vincu-

(*a**) A furunculo, destructis musculis abdominis, elapsa cum peritonæo intestina, omentum, & pars hepatis Cl. CRANZ *tr. de instr.* c. 2.

(*a*) LAURANCE *hydrops* p. 125.

(*b*) p. 345. Omento consumto intestina adnata *Phil. transf.* n. 333. BONTIUS *L. III. obs.* 7.

(*c*) *Mém. de l'Acad.* 1705. p. 40 seq. BRUNNER *de pancr.* passim BOHN *lethal. vuln.* p. 26. *Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs.* 134. MOYLE *memoires.* Duodenum peritonæo adnatum WEPFER p. 204. & gracilia intestina SAVIARD *obs.* 59. & hepar septo transverso WEPFER *l. c.*

(*d*) KAAUW n. 623.

(*e*) DELINCOURT *canic.* 7.

vincula, cum certa morte. Qualia natura fecit, lente quidem cedunt detracta, & permittunt, ut colon, aut lien, aut ren in pelvim descendat. Verum hæc cum sensim fiant, & absque violentia, non tantum habent periculi.

§. II. *Mesenterii utilitas.*

Solebat nobis BOERHAAVIUS (a) adfirmare, nullum dari animal, cuius intestina non sint libera. Et habent certe mesenteria sua quadrupeda utriusque generis, calida & frigida (a*), & aves (b) & pisces. Videtur enim & vasorum ad multiplex fere semper intestinorum syrma iter sustentante membrana egere, & intestinorum vis contractilis non perinde fore libera in officio suo, si intestinum altero fine firmaretur, qua ex parte adeo contrahi nequiret.

Vicissim laxato, aut destructo, mesenterio intestina absque ulla certa sede per abdomen vagarentur pendula (c).

Idem membranam externam intestinis largitur, glandulasque continet, ad iter chyli utiles.

Vasa locat, spatiumque dat, ut in circulos, puto necessarios, etiam repetito possint uniri.

§. III. *Omenti utilitas.*

Diximus, quibus in animalibus omentum reperiatur; nempe fere in quadrupedibus, avium certe crassus ventriculus tenerum & amplum velamentum vix admittit. Quæ tamen animalia omento destituuntur, iis adipis massa pro omento est; avibus nempe aquaticis (d) aliisque, & piscibus (d*). Aliqua etiam quadrupeda præter omentum gastrocolicum, alias duas strias adiposas secundum abdomen utrinque extensas habent, ut sint tria quasi omenta: gliri (e), muri montano (f) [marmotæ], cercopi-

(a) Apud HAYMAN III. p. 385.

(a*) Etiam in chamæleonte viscera omne suspenduntur de membrana a cartilagine xiphoide in abdomen demissa SPON Voyage en Grèce, en Dalmatie &c.

(b) p. 371.

(c) Exemplum habet RUYSCH advers. II. n. 4.

(d) COITER p. 132.

(d*) Secundum intestinum SCHÆFFER pisc. bav. p. 92.

(e) BUFFON T. VIII. p. 232.

(f) Ibid. Quatuor PARIS. Renalem pinguedinem dicit SCHNEUCHZEE Phil. trans. n. 395.

cercopitheco (*g*). Ita factum est, ut ad omentum a cavæ trunco venæ veniant, quod GALENO (*b*) dictum, a nuperis repetitur, de homine minus verum (*i*). Iplis demum crucis maxima copia adipis per abdomen disponitur, quam Cl. LYONNET (*k*) pulcherrime descripsit & depinxit; & cochleis adeps ventriculo adnascitur (*l*). Videtur autem ex prioribus, omentum in cane (*m*), & in animalibus raptu (*n*) viventibus, potius majus, & per totum abdomen distributum esse.

Princeps utilitas nunc, & quæ sponte se offert, est utique, mobilium perpetuo intestinorum, mobilium viscerum hepatis, lienisque & ventriculi, ad peritonæum motum frictione liberare, dum omentum se ipsum interponit (*o*) vicinis visceribus, & dum halitu pingui & ipsa obungit & peritonæum.

Validum enim motum esse transversi septi, & in omni conatu validissimum (*o*^{*}), neque debilem per intestina regnare, alias ostendimus (*o*^{**}).

Quare deleta omento, intestina (*p*) peritonæo adnascuntur, & viscera omnia inter se confervent (*q*): & intestinorum volumina sibi ipsis coalescunt (*r*).

Dum etiam intestina alterne aut tument, aut constringuntur, compressilis, & mollissimus adeps & replet minus distentum abdomen, & extensis intestinis cedit, Etiam duplicis omenti intervallum in ejusmodi casu deletum fuit, ut oppositæ laminæ coalescerent (*r*^{*}).

Verum, cum sanguis de omnibus veris in animalibus quadrupedibus omentis in venam portarum confluat, creditum est, dudumque publice propositum; omenti sanguinem venosum adipe resorbto repleri, atque ad
hepar

(*g*) Du HAMEL *Hist. Acad. Scient.* p. 253.

(*b*) *Uf. part.* L. VI. c. 14.

(*i*) PARIS. ic. & apud PERRAULT.

(*k*) *De eruca salicis* Conf. L. I. p. 44.

(*l*) LISTER *coehl.* T. I. f. 1. K. K. Vocat omentum.

(*m*) *Comparat. anat.* p. 11.

(*n*) p. 371.

(*o*) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1725.

(*o*^{*}) L. VIII. p. 361. seqq.

(*o*^{**}) L. XXIV.

(*p*) *Eph. Nat. Cur.* Vol. VI. obs. 134.

(*q*) BARTHOL. *Cent.* III. *Hist.* 6.

(*r*) COWPER ad tab. 3. BONTIUS *Hist. Med. Ind.* L. III. obs. 7. qui villos connatos vidit. *Add. Phil. transf.* n. 302.

(*r*^{*}) SINOR. *parerg.* p. 28.

hepar confluere, ut sit præcipuum futuræ bilis elementum (*s*), quod ostendemus flammam alere, quando ab aqua separatum est.

Plurima argumenta hujus causæ producta sunt. Omentum perpetuo motu respirationis concuti (*t*): adipe turgere fluido, qui in nonnullis animalibus manifesto in venas possit repelli (*u*): variabili esse mole, ut ex pingui obesitate, per hydropem, in araneosam macilentiam redeat, pinguissimique equi (*w*) vix nunc ossa tecta habeant: tenuia in laboriosis hominibus omenta in sedentariis crassescere: eum adipem videri in venas resummi: diarrhœas adiposas (*x*) longis morbis supervenire, refusi nempe in venas olei: in fetu omentum macrum esse, sed bilem una insipidam.

Olim etiam dictum est, omento resecto ciborum coctionem plurimum fuisse diminutam: successisse perpetuum ventriculi frigus (*y*), & ad mortem usque, per biennium integrum (*z*) tormina, digestionem difficilem, demum hydropem; inque alio homine prostratum appetitum & atrophiam supervenisse, cujus eventus funestus fuerit (*b*).

Addunt, & merito, mesenterii & mesocoli pinguitudinem eodem fine ad hepar convehi (*c*).

Et tamen sunt, quæ possis objicere, & quorum similia jam eo fine prolata lego. Negant, neque obscuri viri, deleta omenti, certe colicogastrici, magna parte digestionem fuisse diminutam (*d*), & si aliquid passus est ventriculus, malunt mechanice passum esse, a detracto in herniis & in vulneribus omento, unde laceratus ventriculus doluerit (*e*).

Adipem,

(*s*) *TAUVRY anat. raisonn.* WINSLOW IV. n. 388. &c. *LIEUTAUD* p. 265.

(*t*) *COLLINS* p. 190. Omentum per vulnus septi transversi in pectus actum *SAMPSON Eph Nat Cur. Dec. I. ann. 3. obs. 171.*

(*u*) *MALPIGH. de oment. p. 42.*

(*w*) *Wash horses* dici *KING Phil. transf. n. 18.*

(*x*) *RAVELLY dysent.* Habent etiam ex alvo adipem *TULP. obs. L. III. n. 18. HILN. obs. Chir. L. IV. n. 47. STALPART. Van der WIEL Cent. I. obs. 61. Conf. L. I. p. 42.*

(*y*) *GALEN. us. part. L. IV. c. 9.*

(*z*) *GENGA anat. Chir. p. 66.*

(*b*) *BIANCHI hist. hepat. II. p. 1138.*

(*c*) *MORGAGN. Advers. anat. III. anim. 2.*

(*d*) *RIOLAN. anthrop. p. 99. enchir. p. 101. FOREST obs. chir. 7. L. VI. VOGEL von Brüchen p. 194. Ed. II. BECKET obs. 41.*

(*e*) Intolerabiles inde in ventriculi fundo dolores *POTT on ruptures p. 64.*

Adipem, pergunt, circa renes plurimum esse, & in omentis spuriis avium, aut quadrupedum (*f*), unde nihil ad hepar veniat: multum infectis esse, quibus nullum fit hepar.

Equis (*g*) a concusso per magnos motus omento adipem non in venas redire, sed in abdominis caveam quasi fusum (*h*) elabi, & intestinis circumfundi.

Adipis in venas repulsi, exemplum in ranis dubium esse: mihi certe nunquam successit.

Etsi hæc videntur fiduciam nostram aliquantum frangere, certum est tamen, adipem in venas resummi (*i*), neque finis esset obesitatis, nisi resumeretur. Nunc si de omento, deque mesenterio in venas resorbetur, in hepar utique fertur. Eo si venit, & si bilis super modum adiposa est, cur non pars ejus omentalis adipis ad bilem constituendam insumatur, ego equidem non video.

Quod resectum Epiploon minus ventriculum lædat, ideo fit, quod unici omenti inter multa, & colicogastrici, particula amittatur; pars maxima & totum mesenterium supersit. Si præter hepatis satellitium in aliis animalibus adipis penus est, non dissimulavimus, alias esse adipis abdominalis, & omenti utilitates.

Omentum, perinde & mesenterium, etiam humorem abdominalem forbere, ex morbis probabile fit. His enim visceribus obstructis, enatisque in omento (*k*), vel in mesenterio (*l*), steatomatibus, hydrops frequens supervenit.

(*f*) p. 381.

(*g*) L. I. p. 42.

(*h*) RUYSCH *Thes.* II. *aff.* 3. n. 15. etiam in homine *Fränk. Anmerk.* T. III. p. 209.

(*i*) L. I. p. 41. seq.

(*k*) De HAEN *rat. medend.* L. V. p. 40. 41. *Ess. of a Societ. at Edimb.* IV. n. 30. &c. Calculus in historia MONGINI.

(*l*) Mesenterii steatoma TULP. L. II. c. 33. Ex hydatidibus mesenterii TULP. ib. c. 34.

L I B E R X X I.

S E C T I O I.

L I E N (a).

§. I. *Quibus in animalibus reperiatur.*

ULTUM a constantia ventriculi lien abest. Sola in quadru-
 M pede classe animalium calidorum veri nominis lien (b) re-
 peritur, & in ea quidem classe tota, etiam in amphibia illa tribu
 cetorum (b), tursionis exemplo (c). Exsanguia non habent (c*).

Avibus (d), quadrupedibus oviparis (e), piscibus (f) lien est, sed
 minor, aut aliquid certe simile lienis, ventriculo adnatum, in aquila (f*),
 ossifraga (f**), accipitre (g), gallopavo (g*), perdice (g**), co-
 lumba (g†), pica (g††), struthione (h), phasiano (i), anser (k),
 ardea (l).

Inter

(a) Aut Lienis Celsus IV. c. 19. V. c. 18. Σπλην & σπληνιος POLLUCI p. 259.

(b) RONDELET p. 72

(c) Globulosus BARTHOLIN C. II. hist. 25. Sed ejus loco 10. 12. in omento glan-
 dulas habet GYSON p. 19. An lienes succenturiati? Ex analogia tamen, probabile vide-
 tur, verum inesse lienem.

(c*) PLINIUS.

(d) Habent PARISINI T. II. p. 142. COLLINS p. 412. Nullum esse HARDER apiar.
 p. 61. Nullum reperiebat COITER p. 132. Quæ vesica carent, iis lien parvus ARISTOT.
 part. anim. L. VII c. 1. Oviparis exiguus, nonnullis, ut ægocephalo, nullus IDEM.

(e) Serpentibus parvus ARIST. hist. anim. L. II. c. 17. & lacertis c. 15. & quadrupedibus
 oriparis part. anim. L. III. c. 7.

(f) In universum HILL. vocat triangulum review p. 114. Habet MONRO compar. anat.
 p. 127. RICHTER ichthyolog. p. 202. RONDELET p. 72.

(f*) PARIS. III. p. 295.

(f**) Rotundus COITER apud ALDROV. T. I. p. 127.

(g) Parvus rotundus BLAS anat. anim. p. 131.

(g*) CHARLET mantiss. p. 84.

(g**) ENT. ibid. p. 7.

(g†) Minimus, ut jam ARISTOTELES docuerat, apud ENT apolog. circul.

(g††) Ibid.

(h) Aliquid spleni simile Phil. collect. 1682. Parvus lien Phil. transf. n. 386.

(i) STURKLEY.

(k) Cordiformis ALDROV. Ornithol. L. XIX. p. 107.

(l) COLLINS tab. 22.

Inter ovipara in vipera (*m*) est, & in serpente (*n*), testudine (*o*), marina (*o*^{*}), rana (*p*), lacerta (*q*), chamæleonte (*r*), crocodilo (*r*^{*}).

Inter pisces in raja (*s*), rana piscatrice (*t*), squatina (*u*), torpedine (*x*), gado (*y*), asello (*z*), farda (*a*), barbo (*a*^{*}), passere fluviatili (*a*†), anguilla (*a*††), xiphia (*c*), lucio (*c*^{*}), perca & lucio-perca (*d*), cernua (*e*), trachino (*f*), cyprino, siluro (*g*), acipensere (*h*), salmone (*i*), trocta (*k*), muræna (*l*).

In avibus equidem non undique cum liene vero consentit. Rubrum est, oblongum, in centro mesenterii positum, cis finem sinistrum, paulo crassius quidem corpusculum, sed ventriculo vix quidquam nexum, hepatis

(*m*) VESLING apud SEVERINUM p. 234. & Ep. 4. COITER p. 126. REDI *anim. viv.* p. 93.

(*n*) BLAS *anat. anim.* p. 333.

(*o*) STUKLEY p. 4 phaseoli figura. PARVUS CALDESI p. 61. Habet ENT. BLA- GIUS p. 338.

(*o*^{*}) REDI *anim. vivent.* p. 93.

(*p*) STUKLEY JACOBÆUS *Mus.* c. 3. MURALT *vademec* p. 592. RONDELET L. II. p. 219.

(*q*) PLINIUS L. XI. c. 30. VALISNER. *oper.* II. p. 432. JACOBÆUS p. 109. COITER p. 12. In Salamandra JACOB. p. 121.

(*r*) SWAMMERDAM p. 418. *Phil. transf.* n. 27. VALISNERI. COLLINS p. 412. Aliquid simile PECHLIN. *obs.* p. 386. Nullus ARIST *hist.* L. II. C. 15. PEIRESC. in *vita* p. 146.

(*r*^{*}) VESLING *Epist.* V. HAMMEN de crocodilo. BORRICHIVS p. 276. PARISINI *Mém. de Mathém. & de Physique.*

(*s*) STUKLEY. COLLINS t. 28.

(*s*) ENT. p. 261.

(*u*) COLLINS t. 29. p. 417. ENT.

(*x*) LORENZINI p. 35.

(*y*) GRONOV. *Act. lit. Upsal.* 1742. p. 95.

(*z*) SCHONEVELD p. 20.

(*a*) ENT. l. c.

(*a*^{*}) IDEM.

(*a*†) Ibid.

(*a*††) Ibid.

(*c*) SCHELIHAMMER *anat. Xiphie.* HARTMAN humano dicit sapparem.

(*c*^{*}) ENT. p. 261. ALDROVAND. *paralipomen* p. 89.

(*d*) KLEIN *miss.* V. p. 34. Triangulus.

(*e*) Rotundus ibid. ENT. In minori oblongius.

(*f*) GRONOV. l. c. p. 99.

(*g*) Viscus triangulare rubrum ex GRONOV. *mus.* p. 7.

(*h*) COLLINS p. 407.

(*i*) GRONOV. *Act. lit. Upsal.* ann. 1741. *mus. ichthyol.* p. 10. Atro etiori similis RO- BERG *piscat. Salm.* p. 11.

(*k*) Triquetrus, acinosus, infra ventriculum positus. Habet etiam aliquos piscium lienes HASSELQUIST p. 329.

(*l*) SEVERIN *Zootom.* p. 369.

hepatis inter lobum sinistrum & intestinum anterius, quod a ventriculo advenit, & posterius, quod proxime cæcis augebitur appendicibus additis, adeo parvum, ut nullam ad ventriculum aut hepar rationem habeat, granum non pendens in avicula, analogum omnino corpusculo lieniformi quadrupedum oviparorum.

In piscibus sanguineum colorem, sed totum situm habet veri lienis quadrupedum, etiam figuram (*m*) in iis quos vidi, hinc ventriculo adtensus, inde hepatis & intestino, longus, anterius planus, gracilisque. In frigidis quadrupedibus pro liene habetur ea quæ in centro mesenterii rubra glandula est (*n*), magnis vasis imposita, ut pancreas solet ASELLII (*o*).

§. II. Numerus.

Jam in castore (*a*) & in hystrice (*b*) duo lienes dicti fuerunt, ut tamen ipsi (*c*) auctores varietatem accusarent, & ab aliis in castore simplex dictus sit (*d*).

Inde in piscibus anguilla (*e*), mullo (*f*), aliisque (*g*) duo dicti sunt.

In homine etiam sæpiusculæ vidi, in omento, sub liene veriori, glandulam olivæ figura, lividam, multo minorem, cætera similem veri lieni, quæ nescio quam inter glandulas lymphatici generis, & inter lienem analogiam faceret. Vidi a vase de lienalibus decedenti suspensum viderunt plurimi ante me Viri ILL. (*h*).

Similis

(*m*) Triangularem fere esse & nigricare HILL. *review*. p. 114. puto in marinis piscibus.

(*n*) ROESSEL T. V. & XIX.

(*o*) Pancreas vocat in vipera CHARAS *tab. 1. F. tab. 22. tab. 3. F. p. 43.*

(*a*) PARIS.

(*b*) IDEM.

(*c*) De hystrice.

(*d*) SARAZIN. *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 51.

(*e*) COLLINS p. 36.

(*f*) Ibid.

(*g*) COLLINS t. 37. f. 6. In pisce plaice f. 5. turbot. 3. Kingston *tab. 27.*

(*h*) Duo lienes BLAS P. IV. *obs. 12. miscell.* p. 298. 300. C. BAUHINUS *theatr. anat.* C. HOFMAN *de liene* c. 10. CABROL. *obs. 15.* PANAROL. *Pentec. I. c. 3.* BOSCHUS p. 13. CHISELDEN POSTMIUS ad COLLIN. p. 506. GEMMA *cosmærit.* p. 205. HAE-

BER

Similis lien secundarius in cane visus est (*i*), & in aliis animalibus (*k*), inque marte ipse vidi. Sed etiam tres lienes Clar. Viri dixerunt (*l*).

Numerosi denique, quatuor (*m*), quinque, ad duodecim (*n*) in turfione visi sunt; numerosi etiam nonnunquam in homine (*o*).

Contra nullum fuisse in animalibus (*o**), & in homine, aliqua exstant testimonia (*p*). In purulenta hydropica (*q*), & in icterico homine (*r*) defuit, a morbo forte consumtus.

§. III. Figura.

Omnia in liene inconstantia sunt, figura (*a*) vel maxime, tum in diversis animalibus, tum in ipso eodem homine.

Homini quidem brevior lien (*b*) est, quam plerisque, non omnibus tamen quadrupedibus (*b**), estque segmentum de corpore ellipsoide exsectum;

DEE Exerc. p. 275. apiar. p. 206. BARTHOLIN. Epist. 62. Cent. I. hist. 80. Cent. I. DRELINCOURT apud MANGER Theatr. p. 411. Zod. Gall. II. p. 153. BOURDON p. 88. MAN ad disp. de trip. Heitersbac. n. I. VERHEYEN p. 85. LIEUTAUD Ess. p. 309. STUKELY p. 5. SCHAARSCHMIDT Berl. Relat. 1738. n. 4. 5. MORGAGNI adv. III. p. 75. Sed. & caus. II. p. 84. 105. FABRIC. progr. 1759. Pene omnes majorem dixerunt & minorem.

(*i*) FANTON. p. 117. Phil. transf. n. 122.

(*k*) ARISTOT. gener. anim. L. IV. c. 4.

(*l*) FALLOP. obs. p. 179. FABRICIUS progr. ann. 1750. CHESLDEN Phil. transf. n. 337. anat. p. 167. DRELINCOURT. PACCHION Opusc. III. p. 89. des NOUES. Unus magnus, duo parvi VERHEYEN p. 85.

(*m*) FANTON. p. 117. CHESLDEN l. 6.

(*n*) TYSON p. 19.

(*o*) Glandulas nigricantes circa lienem, spuriosve lienes habet M. HOFMAN apud TILLING anat. lien. p. 204. Duæ, tres, quatuor glandulæ, sive lienes secundarii in omento, DUVERNEY II. p. 245. Quinque lienes PATIN. Epist. 117. Numero incerto plures tamen WINSLOW IV. n. 334. Sæpe dari succenturiatos lienes BERTRANDI de hepate p. 12.

(*o**) ARISTOT. l. c. & hist. L. III. c. 7.

(*p*) HOLLER morb. intern. p. 584. C. BAUHIN in edit. ROUSSETIANÆ hysterotomociae p. 238. ubi tamen credas, connatorum viscerum confusam massam incisori imposuisse.

[*q*] POHLIUS progr.

(*r*) ZACUT prax. admir. obs. 137.

(*a*) SYLV. Disp. V. n. 7.

(*b*) VERSALIUS p. 626 negat, lienem in homine longum esse add. f. 19. L. V. Bene EUSTACH. T. XI. f. 8. 9. Vidit STUKELY p. 7. t. 4. f. 1. Neque ARISTOTELI humana fabrica nota fuit, neque RUFO, cum longum & multifidum faciant, ille hist. anim. L. III. c. 12. L. I. c. 17. Hic in medio angustiores & vestigii humani similem part. L. II. p. 59.

(*b**) Rotundum rupicaprae & cervi lienem excipimus.

tum; ut sectio axis habeat longitudinem, sitque ad eundem sensum convexa, in quo superficies ovi. Porro universus ambitus quidem pene ovalis est, cum duobus verticibus, axique longo, brevique. Solidum vero corpus, cujus pars lien est, ita est dissectum, ut lien habeat triquetrum quid: faciem nempe majorem, modice convexam (c), ut eadem secundum medium se efferat, ad latera minuatur, inque aciem terminetur. Altera facies lienis in universum excavata (d) est, sed ut in ea duæ sint semi facieculæ (e), per lineam axi parallelam divisæ, aliquantum cavæ, ut major altera sit, altera minor (f), quas linea depressa pinguis dividit (g), cum qua vasa adveniunt (h) & omentum. Apex uterque obtusus est; alter superior, vel posterior, crassior est & obtusior (i); inferior alter anterior est & tenuior.

Verum etsi hæc ita se habent, multis tamen modis etiam in homine figura variat. Rotundum lienem clari viri viderunt (k), & triangulum (l).

Frequenter inprimis ora incisa est (m), modice, ut serrata dici possit; deinde profundius etiam (n) in varios lobos (o), ut denique appendices (p) videatur educere, unam pluresve, aut bifidus esse (q), aut trilobus (q*), quadrifidus (q†), etiam quinquelobus (r), & septilobus

(c) VESAL. p. 626. WINSLOW n. 330. EUSTACH. f. 8.

(d) EUSTACH. f. 9. VESAL.

(e) Leves impressiones vocat VESALIUS l. c.

(f) WINSLOW n. 334. 331. EUSTACH. f. 9. VESAL. f. 19. n. 2.

(g) ALBA HOFMAN l. c. WINSLOW n. 331. Habet VESAL. f. 19. 20.

(h) EUSTACH. f. 9.

(i) IDEM f. 8. 9. ut inferius quasi acutum addat verticem. CASSEK tab. 9. L. VIII. Pingitur a D. JENTY t. 1. f. 3.

(k) I. B. FANTON ad obs. 15.

(l) Ibid.

(m) FANTON. l. c. WINSLOW n. 334. DUVERNEY II. p. 246. In icone CASSEK L. V. tab. 1. Lien magnus serræ-fimilis GRAND Phil. transf. n. 58.

(n) HIGHMOR disquis. p. 60.

(o) DUVERNEY posthum. II. p. 246. Duæ fissuræ LOESCKE obs. ex hom. n. 7.

(p) BARTHOLIN Cent. II. hist. 76.

(q) SCHNEIDER de liene Thes. 31. TILING de liene p. 221. HORST Epist. p. 447. LORSEL ven. p. 62. PANAROL Pentec. IV. obs. XI.

(q*) BARTHOL. Hist. 81. Cent. III. PAW obs. 13. Journ. de Médec. 1758. M. Maj.

(q†) HRUERMANN Physiol. T. IV. p. 37.

(r) BARTHOLIN. anat. p. 159. Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs. 2. HARDER apiar. p. 216.

lobus (r^*), lobisque digitatis (s). Tuberculata superficies (t) est, & nonnunquam costarum vestigiis (u) inscribitur.

Sed etiam in homine, uti magnitudinem, ita figuram mutare animadversum est (w).

In animalibus maxima est varietas; multis quidem quadrupedibus longus est & angustus, cani, lupo, feli (x), sui, tigridi (y), lynxi (z), catopardo (a), civettæ (b), etiam lutræ (c), castori (d), hystrici (e), porcello indico (f), muri montano (g), erinaceo (h), elephanto (i).

Longior humano & tamen latus est bovi, ovi (l), camelo (m), alci (n).

Vomeris forma est in equo (o); cordiformis simiæ (p); pene quadratus rupicapræ (q); ovalis dorcadi (r), cervo (s), rotundus vesperilioni (t).

In aliis classibus omitto figuras, sæpe valde singulares, ut in galeo pice, in quo prælongam habet appendicem (u).

§. IV.

- (r^*) FEHR *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs. 2.*
 (s) ELLER *de liene* p. 10.
 (t) HOFMAN *de lien. C. I. VESAL. I. c.*
 (u) LINDEN *Physiol.* p. 68.
 (w) LA SONE *Mém. de l'Acad. 1754. p. 193.* Adde DISNIER *Splanchnolog. I. p. 178.*
 (x) BESLER *gazophyl.* Cum pede comparat.
 (y) PARIS. & in iconc leonæ. Eidem maximus septem librarum lien est *Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs. 5.* Lunatum esse leoni STUKELY p. 8.
 (z) PARISINI.
 (a) IDEM.
 (b) IDEM.
 (c) IDEM.
 (d) IDEM.
 (e) IDEM.
 (f) ENT.
 (g) PARIS.
 (h) PARIS.
 (i) PARIS. GILL. *elephant. descript.* p. 505. Cur lunatum pingit STUKELY p. 8.
 (l) STUKELY t. 4. f. 4. Bisulcis rotundum esse excepto bove ARIST. *Part. anim. L. III. c. 12.*
 (m) PARIS.
 (n) IDEM.
 (o) ENT. Lunatum STUKELY p. 8.
 (p) PARIS.
 (q) STUKELY. Rotundus PARISINIS.
 (r) PARIS.
 (s) IDEM.
 (t) ENT.
 (u) CHARLETON *manif.* p. 84. PARIS.

§. IV. *Situs.*

Sed neque certior (a) situs est, neque in homine, neque in animalibus.

Et primum jam monuimus (b), homini quidem aliter & aliter lienem poni, ut ventriculus vel inanis fuerit, vel plenus. Oportet vero eam adnotationem hic repetere.

Perpetuus quidem, in sano homine & recte facto, lienis situs est, ut in laterali & in posteriori parte sinistri hypochondrii sit, caveaque abdominis superioris, & innitatur ligamento (c) suo mesocolico, in quo nidum habet impressum: deinde de omento (d), & de ligamento phrenico (e), in parte cava firmatur hactenus; ab illo ad ventriculum, etiam ad oesophagum & septum transversum; ab isto ad id ipsum septum in semifaciacula posteriori. Convexa parte costis respondet, iisque continetur (f), ut in cadavere aperto non adpareat (g), nisi productus. Respondet costæ decimæ & undecimæ.

Verum, cum lien valde mobilis sit, & unice fere ad ventriculum adnectatur, fit ut ab ejus sacci positione plurimum lienis situs pendeat. In ventriculo adeo pleno, transversus (b) pene lienis situs est, ut convexa quidem superficie sua diaphragmati costisque respondeat; concava altera & inferiori, quidem anterieus intestino colo, reni posterius (b*), superiori ventriculo & capsulæ renali adaptetur: verticem vero obtusum posteriorem, acutum anteriorem habeat, quorum ille se secundum ventriculum anterieus in abdomine paulum ostendit, iste ad capsulam renalem redit.

Ut ventriculus inanitur, ita hæc omnia mutantur. Nam magis & magis obliquus fit lien, ut anterior apex simul inferiori sit loco: semifaciacula

(a) Variabilis LINDEN *physiol.* p. 71. La SONE *Mém. de* 1754. p. 193.

(b) L. XIX. p. 121.

(c) L. XX. p. 356.

(d) p. 368. 369.

(e) p. 354. 355.

(f) CELSUS L. IV. c. 1.

(g) Conf. EUSTACH. *tab.* 9.

(b) WINSLOW *Expos.* T. IV. n. 330. seq. GARENGEOT *Splanchnolog.* T. II. p. 19. f. 2. T. I. p. 304. La SONE *Mém. de* 1754. p. 193. PETIT in PALLIY II. p. 125. HEISTER *fil. de perit* p. 122. Icon tamen GARENGEOTI non bona est.

(b*) Reni arcte adnatus T. BARTHOLO. *Hist.* 81. Cent. III. nonnihil PLATER *tab.* p. 155. WINSLOW n. 331. CHESELD. t. 22. utcumque.

(i) Conf. CHESELD t. 21. *Fasc. anat.* I. *tab. omenti* II.

faciecula inferior nunc posterior fiat, superior anterior sit, & vertex posterior sit superior, quo ad denique hunc situm perfectum occupet (*k*).

Rarum id tamen est, & etiam cum vacuo ventriculo, in pueris, etiam in juvenibus, lienem transversum vidi, ut tantum paulum obtuso vertice adscenderet (*l*).

Altera causa moti lienis est diaphragma, a quo, una cum ventriculo, totus in singulis inspirationibus deorsum (*m*) & antrorsum pellitur; aque contraria vi musculorum abdominis repulsus vicissim retrorsum sursumque redit. Tanta vis est in eo motu, ut vomitus lienem funesto conatu ruperit (*m*^{*}), & verbera lineis ad latus adlidentis adstantes exaudere potuerint, cum induratus esset (*m*[†]).

Deinde, cum lien solis de ligamentis suspendatur, & tamen sæpe crassior fiat graviorque, non rarum est ipsi, cum extensis suis vinculis descendere, sub linea alba (*m*^{††}), in hypogastrium (*n*), in inguen (*n*^{*}) ubi herniam fecit (*o*); in pelvim denique (*p*). Vidi finistram vesicæ adcubuisse in puero annotino. A diaphragmate ad pelvim produci vidit ILL. ALBINUS (*q*); quod quidem ita se habere vidi, ut oblique lien per totum abdomen ab hypochondrio ad usque ilia alterius lateris per tegumenta ventris tangeretur.

Omitto, una cum reliquis inversis visceribus in dextro latere visum esse (*r*), aut demum in thoracem commigrasse (*s*).

Hæc ad pathologiam utilia esse possunt: ad physiologiam autem memoria dignum est, lienem quidem in quadrupedibus constanter sinistro in

(*k*) Ita pingit VESALIUS L. V. f. f. 30 EUSTACH. t. 10. f. 1. CASSER L. VI. T. I. & ante WINSLOWIUM vulgo hoc modo describebatur.

(*l*) Ita fere HEUERMAN *physiol.* T. III. t. 3.

(*m*) *Oper. min.* T. I. p. 299. L. VIII. p. 361. 362. DELLINCOURT *canicid.* VII.

(*m*^{*}) ALBERTI *med. leg.* L. V. c. 45.

(*m*[†]) TULP. L. II. c. 28.

(*m*^{††}) VALSE *ingress. int.* p. 6.

(*n*) RIOLAN *enchirid. pathol.* p. 137. DUVERNEY II. p. 248.

(*n*^{*}) MATTEI p. 271. Ad os ilium MORG. *sed. & caus.* II. p. 225.

(*o*) FAUDACQ p. 473.

(*p*) SCHRADER *obs.* Dec. III. n. 4. SCHLICHTING *traumatogr.* p. 21. in VIK-
BRUGGE p. 39. ALBIN. apud MESLON *de liene* p. 1. G. V. SWIETEN p. 248.

(*q*) SCHLICHTING *ibid.*

(*r*) HEUERMAN *physiolog.* T. III. p. 455. Olim ARISTOT *hist.* L. I. c. 17. & in *isag. anat.* & PLINIUS L. XI. p. 630. lienem prodigiose situm mutare. In *caniculo* SIE-
GEL p. 217.

(*s*) BECKER *obs.* I. post L. *de morte sine aqua* DELLINCOURT *de lienesis.*

in latere reperiri (*t*), & cum ventriculo longe necti (*u*): Non ita vero in aliis animalium classibus se habere (*w*), si omnino veri nominis is lien est. In eorum nonnullis etiam dextrum latus tenet (*x*).

In lucio prope anum sedet (*y*).

§. V. Magnitudo.

Nihilo hæc quidem constantior est, quam priores lienis qualitates (*a*). Et primo quidem perpetuo molem mutat, ut ventriculus plenus erit, aut vicissim inanis (*b*). Non potest enim non comprimi a pleno stomacho, & contra costas urgeri; cumque sit mollissimus, & sanguine plenissimus (*c*), venamque habeat, quo sanguis se recipiat, peramplam, & laxissimam (*d*), non potest, non sanguis de liene versus hepar premi, atque lienis moles diminui. Vicissim, quando ventriculus inanis est, tunc quidem laxum in viscus sanguis arteriarum lienalium tanto facilius se diffundit (*e*), quanto plus de priori pleni ventriculi pressione nunc demtum fuit. Addit ILL. Incisor. & Clinicus (*f*), ideo in hominibus derepente mortuis lienem se minorem reperire, majorem vero in iis, in quibus diuturnus languor mortem præcessit, etiam experimento in canibus

(*t*) ARISTOT. l. c.

(*u*) Ei adjacere STURKLEY p. 32. In quadrupedibus: porcello indico, cuniculo, echino vespertilione, mustela, bove, ove, apud ENT.

(*w*) In avibus, ut in perdice ENT. & in cardueli & aliis minutis aviculis coram video. Neque in quadrupedibus oviparis, ut in testudine. Neque in piscibus. raja, sarda, passer, asello, rana piscatrice.

(*x*) In testudine, rana piscatrice.

(*y*) ALDROV. paralip. p. 89.

(*a*) RIOLAN. enchirid. p. 133. ACREL om friska for p. 192. SYLV. Diff. V.

(*b*) LIEUTAUD hist. de 1738. Essays p. 311. physiolog. p. 145. BORDEU sur les glandes p. 432. Cum magno ventriculo lien minimus Mém. de 1752. p. 231.

(*c*) Lien 14. uncias recens pendet, siccus drachmam unam STURKLEY p. 7.

(*d*) Cujus robur sit ad venæ iliacæ robur uti 10. 35. WINTBINGHAM enquiry Exp. 37. ad arteriæ fociæ robur ut 1000. 4812. & ut 1000. 4336. Exp. 95. Cum venæ iliacæ robur ad arteriæ sodalis robur, sit tanto majori in ratione, quam est inter vasa splenis, quanto 836. majus est quam 171.

(*e*) LIEUTAUD physiolog. p. 145. Lien recipit sanguinis exundantias DUVERNEY l. c. Facile lienem inflari la SONE l. c. Compressis venis inflatur ad penis modum Comm. Acad. Petrop. T. IV. p. 156. Brevi mire intumescit ILL. ANON. de febr. intermitt. p. 130. In bibone intumescens BARTHOL. Hist. 43. Cent. I.

(*f*) LIEUTAUD p. 311.

nibus (*b*) facto. Olim HIPPOCRATES eodem die (*i*) lienem magnum, & iterum parvum fieri adnotavit. Tumor lienis per secessum diminutus (*k*).

Sed ex variis causis magis perpetuis lienis volumen sæpe insigniter augetur, rarius vero minuitur. Homini in universum magnus (*k*^{*}) est, & duplo pro portione quam bovi major (*l*), major etiam animalibus voracibus (*m*), leoni (*m*^{*}), porco (*m*†), castori, civettæ (*m*††). Sed in fetu parvus est (*n*), cum sit ad lienem hominis adulti uti 7. 104. seu fere 1. 35. (*o*) fetus vero universum corpus sit ad corpus hominis adulti, uti 8. lib. ad 160. lib. sive uti 1. 20. Solent lienis pondus in sano homine inter sex uncias & semisse (*o*^{*}), & decem (*p*), duodecim (*q*), & quatuordecim (*r*), demum sedecim (*s*) uncias definire. Verum longe supra id pondus sæpe, neque scirrhusus, neque morbidus, intumescit.

Vidi in homine sano pedis magnitudine, uti nuper dixi, abdomine non brevior. Duplo legitimo volumine majorem vidi excitari (*s*^{*}), & triplo (*s*^{**}). In puero magnus & mollis (*s*†^{*}). Grandis ut ventriculum antè teget (*s*†), & ut intestina comprimeret, vomitumque faceret perpetuum (*s*††). In sana femina maximus (*t*). In scorbutico sanus tamen lien lib. unius cum unc. $5\frac{1}{2}$. (*u*). Hepati æqualem in

(*b*) Ibid.

(*i*) *Affect. intern.* Fors edit. p. 110.

(*k*) *Biuni scrutin.* p. 217.

(*k*^{*}) *BIRCH T. IV.* p. 537.

(*l*) *STUKELEY* p. 7.

(*m*) *Idem* p. 40.

(*m*^{*}) *Librarum septem Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs. 1.*

(*m*†) *Quinque lib. & semisse Comm. Nor. 1740. hebdom. 16. Librarum septem PATER obs. 41. Rarum utrumque.*

(*m*††) *STUKELEY l. c.*

(*n*) *WELSCHE tab. 53.*

(*o*) *SAUVAGES embryol.* p. 11.

(*o*^{*}) *SAUVAGES pathol. I. p. 496. cum hepatis esset 45. unc. & corpus universum unc. 1140.*

(*p*) *CHESELD.* p. 169.

(*q*) *BARTHOL. Hist. V. Cent. I.*

(*r*) *STUKELEY l. c.*

(*s*) *HBUERMAN III. p. 687. SPIELMANN chem. p. 171.*

(*s*^{*}) *Journ. de méd. 1758. M. Maj.*

(*s*^{**}) *Cum diarrhoea flava MORG. sed. 3. caus. II. p. 256.*

(*s*†^{*}) *Id.* p. 187.

(*s*†) *VESAL.* p. 627.

(*s*††) *BARTHOL. Hist. 47. Cent. IV.*

(*t*) *COLLADO advers.* p. 73.

(*u*) *MEAD. monit.* p. 223.

in sano homine (w) non raro Clar. Viri viderunt. Ita intumescere, ut & dextrum latus & pubem occupet *Alexandri BENEDICTI* est adnotatio (y). In puella 22. mensium atrophica pendebat 9. uncias, sanus tamen (y*). Librarum trium lien peculiari funiculo ad ventriculum annexus (y†). In bimulo puero (z) vidi semipedalem, parem adulto, sanum tamen. In puero decem annorum bilibris (a) lien fuit, & in quadrienni, subito occiso, cui lien ruptus esset, iterum bilibris (b): in puero vero decem annorum trilibris (c). Tum in homine per vomitum subito occiso (d). Librarum octo cætera sanus in milite (e). Grandis, durus & in hypogastrio (e*).

In morbis nullus incrementi modus est, scorbuto (f), morbo scrophuloso (g), hypochondriaco (h), ictero (i), cachexia (k), hydrope (l), tabe (l*). Post febres intermittentes (m), & alias maligniores

(w) HORSTIUS *Epist.* p. 477. Etiam FRANKEN. *de hep.* p. 7. 48.

(y) L. VIII. p. 482. adde *Exempla BEVERWYCK schat der ongezendh.* p. 205. RAIMOND *malad. danger. à guérir* II. p. 297. CRAUS *de l'esp. natur.*

(y*) *Nouv. de la Répub. des Lettr.* 1687. M. Jul.

(y†) MORG. *ibid* II. p. 136.

(z) KERKRING *obs.* 65.

(a) BECKET *curat. & obs.* p. 78.

(b) SCHEID *hist. lien rupt.*

(c) LANCIS *post tr. de mort. subit. obs.* 3.

(d) FRANK *Anmerk.* III. p. 530.

(e) LANZON *an'm.* X. p. 54.

(e*) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 4. 5. obs.* 30.

(f) BLAS P. I. *obs.* 14. MEAD. I. C. PYRARD T. III. p. 37. Locis palustribus lien major est SPIGEL p. 240 & in Frisia LIND. *de scorbuto* p. 68. Lienosi milites, qui sub terra cuniculos egerant MAPPUS *de liene.*

(g) Decuplo major COCCHI *bagn. di pis.* P. 238.

(h) VERSALIUS *rad. chin.* p. 149. 250. In maniaca quadruplo major WEISS *Progr.* V. p. 11. Lien & hepar grandia, cum crederet ægra se puerum gerere PORT *opuse. & fragm.* p. 185.

(i) GAL. *di MINERV.* T. VII. p. 229. 230.

(k) KUERMUS p. 101.

(l) BECKET *obs.* 34. PROSPER MARTIANUS. MOTTE *obs.* 124. ut diaphragma repelleret PETZOLD. *obs.* 65. 77. BARBEIRAC *med. form.* p. 22. 23. ACRELL. p. 192. Plurimumque hepate majorem esse *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 4. 5. obs.* 148. Add. COLADO p. 75. KALTSCHMIDT *de liene inaurato* C. B. p. 141.

(l*) VATER *de lienis prolaps.*

[m] *Febr. interm.* p. 130. A diaria febre tredecim librarum lien HALWIG *obs.* 48. A febribus multiplicibus & longis sæpe magnus est. MORG. *sed. caus.* II. Ep. 31.

(n) A tertianis malignis CLEGHORNE *minorca* p. 165. Post febres acutas FANTON. *obs.* 27. Cum ulcere funesto tibiæ lien lib. 3. & semis. Lien lib. 5. unc. 4. STUKELLY & lib. 5. unc. semis BECKET p. 276.

res (*n*) febres cum vomitu sanguinis (*o*), aut alioquin post morbum perpetuum (*p*), pariter major visus est.

Ita lego lienem repertum esse librarum duarum triumve (*p*^{*}), librarum quatuor (*q*); librarum quatuor cum semisse (*q*^{*}); librarum quatuor amplissimum pendulum, qui totum hypochondrium occupasset (*r*). Librarum quinque & durus in hydropico (*r*^{*}) fuit. Librarum quinque & unc duarum (*s*). Librarum 5. unc. quatuor in scorbutico (*s*^{*}). L. sex cum semisse (*s*[†]). Librarum septem (*t*), & octo cum novem uncis (*u*). Librarum duodecim (*w*). Librarum quindecim (*x*). Librarum 18. (*y*). Librarum viginti (*z*). Librarum 23. (*a*). Librarum 33. (*b*). Librarum 43. (*c*). Horum maguorum lienum plerique fuerunt cum scirrho (*d*) interno, steatomate (*e*), cum hydatidibus (*f*), aut cum aqua in ipsum lienem effusa conjuncti (*f*^{*}).

Frequen-

- (*o*) MUTZEL *obs.* p. 28. HORST. TILING. *digress.* p. 182. *Phil. transf.* n. 209.
 (*p*) BARTHOL. C. IV. *hist.* 47. compressis intestinis.
 (*p*^{*}) Plenus sanguine putrido, cum hæmoptoe *Phil. transf.* n. 209.
 (*q*) BLAS L. I. *obs.* 22. Nov. *Eph. Nat. Cur.* t. 1. n. 70. In ictero WOLF *obs.* 22.
 (*q*^{*}) Fränk. *Anmerk.* T. III. p. 530. BACLET *traits* p. 6. corrupto sanguine plenus.
 (*r*) BLAS. *obs.* 14.
 (*r*^{*}) STORK *ann.* 1. p. 112.
 (*s*) CHESELDEN p. 165. SCHLICHTING in VERBRUGGE p. 39.
 (*s*^{*}) MEAD *monit.* p. 223 cum hepar esset lib. 4. unc. 4.
 (*s*[†]) *Eph. Nat. Cur. Dec.* I. *ann.* 4. 5. *obs.* 30.
 (*t*) PACCHIONI *opusc.*
 (*u*) KOENIG *regn. anim.* p. 120.
 (*w*) HELWIG l. 6
 (*x*) *Eph. Nat. Cur. Dec.* I. *ann.* 4. 5. *obs.* 148.
 (*y*) DUVERNEY T. II. p. 245. cum vomitu.
 (*z*) COLUMB. p. 265. MARC. DON. p. 615.
 (*a*) COLLADO.
 (*b*) BOSCHUS p. 14.
 (*c*) FLAMERDINGH *de tum. lienis.*
 (*d*) In ictero VALISN. *oper.* T. III. p. 197. 198. In hæmorrhoidario VERSAL. in hydropse la MOTTE l. c. FABRIC. *programm.* 1759. GAL. *minerv.* l. c. KERKCRING *obs.* 23 cum difficili spiritu. Durus ad pelvim usque protensus STORK *ann.* 1. p. 113. Ambitu 13. pollicum ut ad ile sinistrum descenderet RICHERZ *ad observ.* 2. Ad pubis os descenderat HILD. l. c. n. 53. Quatuor librarum cum scirrho BLAS L. I. *obs.* 22. Durissimus WOLF *obs.* 42. Lapideus, ut etiam sensus esset lapidis ROLFINK *diff. anat.* p. 181. & in hydropse TILING. p. 409. ut ejus verbera exaudires TULP. L. II. c. 28. In asthmatico PETZOLD. *obs.* 58.
 (*e*) BARTHOL. *Hist.* 80. Cent. I. ROEDERER *programm.* p. 1. WENKER *vuln. ventric.*
 (*f*) In sacculos motatus, cum triplo & quadruplo major esset *Eph. Nat. Cur. vol.* IX. n. 68. Librarum trium cum hydatidibus in membrana comprehensis CHESELD. p. 163.
 (*f*^{*}) *Hist. de l'Acad.* 1753. p. 133. ut contineret pintas sedecim.

Frequentissimus autem scirrhus est, ex antiqua adnotatione A R E T Æ I (*f***). Vidi durissimum lienem ex albo & rubro ad marmoris modum varium. Etiam calculi ibi reperti sunt (*ft*). Et membrana externa (*g*) sæpe crassescit, ut lineæ crassitie visa sit, aut plena scirrhis, etiam cartilaginea (*h*), & ossea (*i*) & fere lapidea (*k*). Vidi utrumque; & huc refero striam cartilaginosa in dorso lienis (*l*) visam, & cicatricem (*m*). Alias in ea membrana morbosæ glandulæ nascuntur, quibus lien obducitur (*n*). Alias granis fabulosis adspergitur (*o*), vel adipe durissimo (*p*).

Est tamen ubi contrario vitio lien sanguine quasi putrido plenus fuit (*q*); quo pertinent casus lienis rupti (*r*): & una mollissimi, ut a febribus (*s*), & in hominibus atrabilariis (*t*). A febre acuta lien
putre-

(*f***) *Caus. Diuturn.* I. c. 14. GALEN. *meth. med.* L. XIII.

(*ft*) Arenarius 35. grana pendens RORDERER *progr. ann.* 1758. p. 4. Lapidibus plenus lien FONTAN. *anal.* p. 90.

(*g*) MERBOM de *obs. rar. in cadav.* C. BAUHIN. p. 141. BARTHOL. I. c. HELWIG *obs.* 98. *Hist. de l'Acad. des Scienc.* 1753. p. 133. LUDWIG de *viis bil. cystic.* sano cum viscere. Frequens esse BOSCHUS p. 13.

(*h*) MAUCHART *lumbric. in duct. pancreat.* SCHENK *Exerc.* p. 435. *Mém. de l'Acad.* 1712. p. 161. FANTON. *Obs.* XI.

(*i*) SPIGEL p. 240. QUELMALZ de *liene.* MORG. I. c. p. 145.

(*k*) PECHLIN *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 9. 10. obs.* 31. Crusta cartilaginea obductus HOFMAN *morb. lien.* n. 5.

(*l*) WEISS *Specim.* I.

(*m*) IDEM *Comm. Nor.* 1740. p. 35.

(*n*) MANGET *bibl.* p. 372. *theatr.* p. 552.

(*o*) Corpora duo cartilaginea WEAVER *apopl.* p. 321. Officulum adnatum SINOP. p. 69.

(*p*) VESAL. I. c.

(*q*) ALBERTI *Med. Leg. T. V. c. 45.* H. V. HEERS *obs.* 25. BECKET *tracts* p. 6. Lienis sphacelus SINOP. p. 69. CUENOTTE *disp.* In virgine *Phil. transf.* n. 194. Frequenter quasi gangrænosæ materie repleti DUVERNEY *posib.* T. II. p. 248. & piceum vidit SIMSON p. 154. Lien duarum librarum, plenus sanguine coacto *Fränk. Anmerk.* III. p. 427. Lien præmagnus & mollis MORGAGN. *sed. & caus.* II. p. 187. Lien 4 $\frac{1}{2}$ lib. corrupto sanguine plenus BECKET *tracts* p. 6. & similis casus cum esset 2. 3. lib. *Phil. transf.* n. 209.

(*r*) *Comm. Nor.* 1736. *hebd.* 16. SCHRID. in propria *diff.* I. c. ALBERTI I. c.

(*s*) CLEGHORNE p. 165. STORK *ann.* 1. p. 31. In iis casibus quatuor & quinque lib. pondus attigit CLEGHORN.

(*t*) WALTHER de *atra bile* CHIFFLET *obs.* 37.

(*u*) LOSS L. III. *obs.* 45.

putrefactus, absumtus, & in ejus sede materia picea nigra (u). Lienis loco materies putrida (x). In chronicis morbis id frequens est (x*).

Rarum est grandem lienem suppurari (y). Reperio tamen, qui septem pintas puris continuerit. Ulcerosus a percussa scabie (z). Non facile id malum percipi posse ARETÆUS. Rarissimum esse TILINGIUS.

Rarius est, nimis parvum reperiri; fuit tamen, duabus unciiis non major in homine, cui amplissimus erat ventriculus (a). In vetula cum hepate scirrhuso parvus (b). In scorbutico non major pomo borsdorffiano (c) [quod est inter minima]. In diuturno morbo lien parvus, durus (d): & parvus putridus, cartilagineus (e). Splen parvus cum ventriculo consumto (f), ejusve visceris longo morbo (g). Parvus cum concrementis in aorta & in bronchiis (h). Parvus in hydrope (i). In ictero (k). Uncialis (l) cum hepate vastissimo, aut scirrhuso (m), & purulento (n). In melancholico parvus (o). In morione minimus (p). Intelligitur comprimi posse & elidi, denique consumi (q).

In

(u) H. de HEERS *obs.* 15.

(x*) LORSECKE *obs.* p. 31.

(y) *Hist. de l'Acad.* 1753. l. c. SCHÖBINGER ad HILDANUM. G. V. SWIETEN T. III. p. 154. de HAEN *diffic.* p. 81. 82. De historia *Eph. Nat. Cur.* C. VIII. *obs.* 67. non pronuncio, uti neque de inflammatione lienis apud SACCUM *conf.* 91.

(z) *Bresl. Saml.* 1726. p. 228.

(a) LIEBTAUD *Mém. de* 1752. l. c.

(b) FABRIC. *progr. ann.* 1759.

(c) MANN l. c.

(d) HEUERMAN *physiol.* T. IV p. 37.

(e) TARGIONI *obs.* p. 92.

(f) RICHERZ *obs.* 3.

(g) GUARINONI *conf.* 388.

(h) ROEDERER l. c.

(i) VESAL. p. 627.

(k) *Ibid.*

(l) SALMUTH C. I. *obs.* 21. BARTHOL. *Cent. I. Hist.* 45. Cum hepate scirrhuso VESAL. *Chir.* p. 252.

(m) FABRIC. *progr. ann.* 1759.

(n) BLAS L. I. *obs.* 11. callosus In eodem casu sanus LOTICH. L. IV. c. 3. *obs.* 3.

(o) *Comm. nor.* 1740 heb. 21. CHIFFLET *obs.* 38. STORK *ann.* I. p. 115. Parvus in morbo SYLV. *Diff.* 5.

(p) K. JUNIG *obs.* 10.

(q) Ut globuli tantum superessent BLAS L. I. *obs.* 25. A febre acuta LORZ. L. III. p. 45.

§. VI. *Color. Mollities.*

In homine sano lien [a] spongiæ quamdam habet naturam, quæ plurimo sanguine ebria sit, ut cedat sub digitis, facillime vero violetur, & rumpatur, etiam ab exiguo ictu [b], aut a lapsu [c], etiam integra per tegumenta, quæ mortis subitæ non infrequens causa est. Aut denique ex interna causa [d], absque violentia aliena, lien dissiluit, pariter funesto eventu, a saltu [e], a gravidæ feminæ vomitu [f].

Color ipsi in fetu rubicundior [g] est, tum in avibus, piscibus, quadrupedibus frigidis & carnivoris calidis [h]. Adulto in homine lividus est, cæruleo quodam colore ad rubedinem sanguineam admisto, qualis est magnarum venarum in cadavere color. Est tamen, ubi & tunc floride rubet [i]. In scirrho albo & livido maculosum, quasi marmoreum vidi, uti modo dictum est. Ponderus ad aquam est ut 1. 060. ad 1000. (i*).

§. VII. *Membrana externa lienis.*

Nihil est valde, cur de hoc velamento disputetur. In homine certe unicum [a] est, firmum, simplex, filis conspicuis destitutum [b], pertinaciter lieni nexum, telæ ope cellulosæ, a peritonæo continuatum [c], eique simile.

In

[a] ORIBAS. p. 120. SYLV. l. c.

[b] BOHN offic. medic. dupl. p. 591. Comm. nor. 1735. hebdom. 16. SCHAARSCHMID Berlin. Nachricht. 1738. n. 4. GÖRTEL Cent. II. Conf. 20. VALENTIN. Chir. med. p. 902. Pand. II. p. 408. ALBERTI Med. Leg. T. II. cas. 16. & procul dubio FONTAN. ad VESAL. p. 21. LOBSTEIN de nerv. access. p. 40.

[c] SCHMID de liene rupt. p. 26. POHL de prostat. calcul. affect.

[d] VESAL. p. 628. HORMAN apud TROPANEGGER pref. K. Svensk. Wetensk. Acad. Handl. 1742. p. 261. A quartana neglecta SENAC febr. interm. p. 130.

[e] SCHAARSCHMID Berlin. Nachricht. 1740. n. 26.

[f] ALBERTI med. leg. T. V. c. 45. Comm. nor. 1740. hist. 30. ut videtur.

[g] MOTH. ad WORM Epist. p. 575. COLLINS p. 412. FIZES de liene p. 107. STUKELLY p. 8.

[h] LEONE STUKELLY p. 8. & aliis.

[i] FEHR. Eph. Nat. Cur. SPIGEL l. c.

(i*) MUSCHENBR. introd. p. 556.

[a] WINSLOW n. 336. timide tamen; firmitus la SONE p. 194. VARIER. II p. 112. GARENGEOT.

[b] Fibras radiatas musculares vocat STUKELLY p. 7. Aliquid simile nonnunquam in homine vidit la SONE Mém. de 1754. p. 194. plicas forte, non rarissimas.

[c] Recte KAAUW perspir. n. 573. Cur ab omento deducunt DISDIER TANARON Pratiq. de Chir. T. I. p. 63.

In vitulo utique duo [d] sunt involucra, quæ etiam cultro separare possis. Ab eo animale ad humanum lienem sunt translata [e].

Poros in hydropici lienali involucro vidit Vir. I. L. L. [f], & certum est perspirare, quæ conjectura BOYLEI [g] experimentis confirmatur, a KAUVIO factis [h], & a nobis iteratis. Nam & arteriosus ros & venosus de ea membrana sudat, quando ejus visceris vasa aqua, aut piscium glutine repleta fuerunt.

§. VIII. Arteriæ lienis [a].

Pleraque in descriptione arteriæ coeliacæ dicta sunt [a*]. Multa est varietas [b] truncorum, quibus numerosioribus, aut paucioribus, arteria lienalis, per rotundâ, sibi que parata foramina [c] lienis interiora subit, multo ubique omento quasi sustentata, dum ab imo liene ad summum se circumflectit. Magnus est utique truncus, etsi non tantus, ac quidem vulgo legimus. Diameter in puero trienni mihi fuit quatuordecim centesimarum, in octodecimestri 13. in trimestri 12. Hepatica tamen aliquanto in junioribus major [d], in adultis potius minor [d*] est, ut certe vidi.

Magna tamen hic lienis est prærogativa [e], cum hepar ejus visceris sit quintuplum, & arteriam habeat paulo majorem. Mesentericæ, cui splenicam æqualem fecerunt [f], lumen quadruplo [g] fere majus, ut lumina splenicæ & majus lumina coeliacæ in ratione 24^2 . ad 22^2 . 24^2 . ad 19^2 . 17^2 , ad 13^2 . Paulo minor ejus ad venam suam est portio,

[d] MALPIGH. de liene p. 102. Edit. Angl.

[e] FANTON. p. 117. FIZES p. 105. DISDIER *Splanchnolog.* STUKELEY p. 8.

[f] FANTON. *obs. ult.*

[g] Plus perspirare quam cutem de porositat. corp. p. 18.

[h] n. 562. n. 10.

[a] Ante COLUMBUM C. STEPHANUS p. 142. & VESALIUS habet p. 628.

[a*] L. XIX. p. 146. seqq.

[b] Varietates vide *Fascic. VIII* p. 34.

[c] CASSER L. VIII. t. 9. f. 1. STUKELEY t. 2.

[d] p. 149.

[d*] *Fascic. II. tab. coeliac. II.*

[e] Multas in liene arterias esse HARVEI *generat.* p. 240.

[f] BORHEL. *mot. anim.* L. II. prop. 198.

[g] Rationes in adversariis habeo 456. ad 576: 121. 361: 156. 729: 100. 400. &c.

portio, fere 156. ad 676. Serpentinam [*b*] advenire dictum est, potissimum quando arteriæ cera sunt repletæ [*b**].

Robur satis insigne est, & multo quam in aorta majus, in ratione 1312. ad 1000. [*i*], si de aorta prope ramorum emulgentium originem sermo fuerit, aut 148. ad 100 [*k*], si de aorta ad iliacas. Ad venam suam, ut ostendimus, robur habet ut 4812. ad 1000. [*l*], & ut 4336. ad 1000 [*m*].

Tulit impulsas in viro sex atmosphæras cum $\frac{2}{10}$, quam pressionem ad 41. lib. uncias octo Vir. Cl. æstimat [*n*].

Præter hunc præcipuum truncum lien vix quidquam accipit, neque enim ramuli fere nominari merentur, quos arteria phrenica sinistra [*o*], lumbalis prima [*p*], & spermatica sinistra ad ligamenta lienis & ejus proximam superficiem mittunt. Aliquando sed raro, secundus truncus minor a cæliaca ad splenem venit, prius ex coeliaca natus, quam splenica vulgaris [*p**].

Pulsatio lienis videtur ad arteriam ejus pertinere [*q*].

§. IX. Vena splenica [*a*].

Unica, grandis, in universum arteriæ socia vena [*b*]. est alter præcipuus

[*b*] ARANT. c. 35. CASSER. L. VIII. tab. 9. f. 1. BIDLOO t. 36. f. 1. STUKELEY tab. 1. COWPER *Phil. trans.* n. 280. (in adulto homine etiam magis]. WINTRINGHAM *enquir.* RUYSCH. *Ep.* IV. t. 5. f. 2.

[*b**] Absque flexu vidit MORG. *sed. caus. morb.* II. p. 200.

[*i*] WINTRINGHAM *ibid.* *Exp.* 36.

[*k*] *Id.* *Exp.* 48.

[*l*] *Id.* *Exp.* 37.

[*m*] *Id.* *Exp.* 35.

[*n*] *Id.* *Exp.* 34.

[*o*] *Fascic. l. c.* III. p. 54. Vicissim aliæ a lienalibus in septum transversum excurrunt. RUYSCH *Epist.* IX. p. 11.

[*p*] *Fascic. l. c.*

[*p**] *Tab. arter. celiac.* II. f. & not. *k*. Hæc est forte arteria lienis propria BERGERI, quam rejicit SCHELHAMMER *physiolog.* p. CCXIX.

[*q*] Dicta TULPIO L. II. c. 28. STUKELEY p. 43. LINDEN *physiol.* p. 98. Ad 30. pedes exaudiri TULP.

[*a*] EUSTACH. T. XXVII. f. 2. 4.

[*b*] *Idem l. c.*

cipuus est truncus venæ portarum, paulo quam mesenterica minor [b*], & cum ea conjungitur in ora pancreatis, paulo sinisterius quam valvula pylori.

Diametrum reperi 15. centes. in puero trimestri, 19. cent in octo-decimetro, 26. in trienni, & 33. in septenni.

Paulum ex ortu a vena portarum descendit [c], cæterum transversa est, & pone [d] pancreas, & sub arteria sodali, in sulco pancreatis [d*] posteriori, supra mesocolon, ex conjunctione sua, sinistrorsum tendit rectior, & minus serpentina [e], quam arteria ejusdem nominis.

Edit nonnunquam venam hæmorrhoidæam [f], etsi ea aliquanto frequentius ex mesenterica nascitur. Rarius eam truncus vena portarum dedit, secundum sinistram limitem lobuli. Aliquando etiam splenica duodenalem aliquam ex origine sua generat.

Dat perpetuo, non longe ab origine sua, ad ventriculum euntem venam coronariam sinistram [g], magnam, quæ pone pancreas ad oesophagum venit, cujus alter ramus, circa finem oesophagi, pene in circulum conlectitur [h]; alter per curvaturam minorem excurrit [i]; dextræ coronariæ se immissurus [k].

Porro ramos dat ex ordine numerosos pancreaticos [k*]; & gastricas posticas [l] venas, similes arteriis sodalibus, in planum ventriculi posterius, inque saccum cæcum: denique gastroepiploicas [m] numerosas; quæ ab ultimo cæco sacco ventriculi sinistrorsum per omentum, cum suis arteriis stomachum adeunt, & deorsum pariter epiploicas emittunt.

Earum

[b*] Major NICOLAI direct. vas. p. 99. Sed minor est in BERTRANDI mensuris in ratione 209. & 316. ad 327. p. 25. rectius omnino. Reperio diametros fuisse 26. & 18.

[c] EUSTACH.

[d] IDEM.

[d*] BERTRANDI p. 13.

[e] CASSER L. VIII. tab. 9. f. 1.

[f] WEPFER Phil. trans. n. 280. LOESEL ren. p. 62. EUSTACH. t. 27. f. 4. SPIGEL L. VI. tab. 1. MARCHETTI. PAREUS II. c. 21. Sæpe WINSLOW n. 253. Constant. WALTHER ven. port. p. X.

[g] EUSTACH. utrinque STUKELEY tab. 2. 7. sed nimis parvam.

[h] EUSTACH. f. 2. STUKELEY VESAL. L. V. f. 12. L. III.

[i] EUSTACH. f. 2. 4. STUKELEY tab. 2. 7. WINSLOW n. 254. VESALIUS LEONCENA.

[k] EUSTACH. f. 4.

[k*] Habet EUSTACH. STUKELEY tab. 7. WINSLOW n. 256. VESAL.

[l] Habet EUSTACH. STUKELEY tab. 2. 7. VESAL. L. III. K. L. V. f. 2. 5.

[m] Semper unam EUSTACH. STUKELEY.

Earum, quæ infima, dexterior, major, dextrorsum contra curvaturam majorem ventriculi redit, sursum ventriculo [*n*], deorsum epiplooo impensa [*o*], & plerumque circulum cum Gastroepiploica dextra absolvit [*p*].

Inter eas princeps aliqua, *Epiploica sinistra*, vel ex lienalibus etiam nata, per omentum gastrocolicum dextrorsum ducta, cum dextris vasis in retia unitur.

Supremæ vero gastricarum sinistrarum, ex lienalibus fere natarum, etiam ex ipso liene [*r*], omnino ut arteriæ, breviora [*r**] vasa audiunt, æque sunt, quarum ramos atram bilem vehere dictum est [*s*].

Truncus lienalis plesculis ramis, ut arteria fœcia, lienem adit, in foramina ejus visceris demersis [*s**].

Duas splenicæ fuisse rarum est [*t*].

Surculi exigui venosi, olim recte dicti sunt, phrenicas venas cum lienalibus connectere [*u*].

Etiam a renalibus venis surculos ad lienem venisse legitur [*w*]. Intelligo ex vicinia utrumque locum habere potuisse: aliasque ab intercostalibus, capsularibus, & renalibus, & lumbalibus adcedere potuisse.

Ut laxa [*w**] est vena lienalis, ita facillime ex arteria in venam quicumque inmissus liquor [*x*], aut hydrargyrus [*y*] transit, etiam cera, potius facilius, quam aliis in visceribus [*z*]. Magna autem & conspicua arteriæ splenicæ cum vena anastomosis [*a*] equidem fabulosa est.

E e e 2

Ligata

[*n*] CASSER L. VIII. tab. 4. f. 2. STUKELEY tab. 2. 7. WINSLOW n. 258.

[*s*] CASSER ibid. STUKELEY tab. 2. 7.

[*p*] WINSLOW n. 257. CONF. L. XIX. p. 148.

[*q*] STUKELEY tab. 2. WINSLOW n. 260. VESAL. Z. WAETHER p. X.

[*r*] RUYSCH ibid.

[*r**] EUSTACH. f. utraque STUKELEY ex rene tab. 7. WINSLOW n. 261. RUYSCH Epist. IV. tab. 4. f. 1.

[*s*] L. XIX. p. 155.

[*s**] STUKELEY tab. 7. 8. WINSLOW n. 261. add. RUYSCH f. r. T. 4.

[*t*] BLAS obs. P. IV. p. 13. ALBRECHT obs. 8.

[*u*] HABICOR d. I. Lect. II.

[*w*] SYLV. Isag. p. 70. JENNY t. 2. f. 2.

[*w**] p. 403.

[*x*] RUYSCH Thes. III. n. 13. PERRAULT Ess. T. III. p. 212.

[*y*] VIEUSSENS observac. d'anatom. & de medec. pratiq. p. 107. 109.

[*z*] Facillime transire in lienem COWPER Phil. trans. n. 280. etiam STUKELEY p. 10. 17.

[*a*] CASSER L. VIII. tab. 9. f. 1. 4. SPIGEL p. 240. DIEMERBROECK p. 81. BARTHOLINUS tab. 15.

Ligata portarum vena, lien turgescit [*b*].

Valvulis in homine destituitur, nam in animalibus dicitur habere [*b**].

Ab ejus venæ historia ergo remove oportet, valvulas primo, quas nullas habet [*c*]: deinde ramos ingentes colicos [*d*], quos vetusti aliqui anatomici, ut puto, a mesentericis vasis ad splenica traduxerunt, quorum furculi exigui sunt; porro mesocolicæ venæ ortum ex vena lienali propria vitulum [*e*]: & mirum naturæ institutum, quo dicitur vena splenica in suum cavum arteriam socalem recipere [*f*], ut in quoque ramo venoso, arteriosus parallelus contineatur: Sed denique etiam foramina [*g*] illa admitti nequeunt, quibus in vitulo, & in rupicapra ea vena sanguinem dicitur in cellulosa spatia lienis, absque medio ramorum commercio, emittere: neque enim aut in homine, aut in ipso vitulo ea fabrica vere obtinet, etsi mollissimæ venæ rami possunt foraminibus similes in truncum insertiones habere. Sed neque satis novi cellulas, prope extremam splenicam venam in homine dictas COWPERO [*h*].

§. X. Sanguis lienalis.

Cum veteres atram bilem [*a*] in liene nasci & habitare fere scripserint, non inutile fuerit, sanguinem inspexisse, qui liene continetur. Fluidum eum semper reperi (*b*), ut nunquam viderim coactum, qualis quidem frequenter in vasis vivi animalis reperitur; neque exemptus in homine

[*b*] ORTLOF *cholepojes negot.* n. 10.

[*b**] Tres SNAPE, aliquas HIGHMOR. tab. 6. p. 61. Habet etiam ENT. p. 102. TILLING *vass. brev.* 144. p. 117. Negabat jam D. de MARCHETT. p. 29.

[*c*] L. II. p. 144.

[*d*] VESAL. L. III. S. L. V. f. 4. 7. f. 5. C. STUKELEY t. 2. 7.

[*e*] STUKELEY t. 7.

[*f*] STUKELEY tab. 3. in vitulo: tab. 4. f. 1. 3. in homine.

[*g*] HIGHMOR. L. I. P. III. c. 3. tab. 7. f. 1. ENT. SALZMAN *obs.* ENT. 1. c. STUKELEY. tab. 3. f. 3. tab. 4. f. 1. 2. SBARAGLI *ment. & ocul. vigil* p. 142. Monet in vitulo solo locum habere, aut in animalibus, quibus arteria, & vena, unico trunco lienem subit La SONE l. c. p. 201. In ove & elephante DUVERNOY *Comm. nov. Acad. Petr.* T. IV. p. 158. In equo & ove ENT. p. 104. &c.

[*h*] *Phil. transf.* n. 280.

[*a*] Etiam nuper scriptum est, in liene stagnare sanguinem, & unguenti nigri similis fiat, quæ sit atra bilis. veterum *Mém. de l'Acad. de Chirurg.* I. p. 139. Dudum ostendit GRISONIUS, non esse melancholicum p. 445.

[*b*] FIZES l. c. SENAC l. c. ROLOZ *de lien:* p. 56. BOMN *circul.* p. 258.

homine facto cogitur [c], colore vero potius tristiori [e], quam alibi soleat [f].

Deinde accuratius Cl. ROLOF carus noster olim auditor, eum sanguinem analysi chemicæ [g] subiecit, cumque sanguine aliarum venarum comparavit. Reperit, & aquæ plus habere, in ratione $\frac{34}{37}$. ad $\frac{26}{31}$, & præterea, quæ mea [h] conjectura fuerat, salis volatilis aliquanto plus, olei vero empyreumatici minus, a quo credas sanguinis viscidam naturam augeri. Minus enim nigræ massæ in fundo vasis superfuit, in ratione 3. ad 6. Cl. quidem HEUERMANNUS ex vena lienali minorem copiam & aquæ & olei eduxit, quam ex cavæ sanguine [h*], sed eam credam unicam fuisse analysin. Neque unico experimento sententiam nostram confirmavit ROLOFFIUS, VIR CANDIDUS ET EGREGIUS, sed multis omnino, quæ in variis animalibus, & in eorum quoque iterato, similiter ceciderunt: ut inter *data* recipi possint, quibus porro theoriam superstruas.

Etiā ILL. MEKELIUS fluidum in liene & vena portarum sanguinem reperit, cum in tota vena cava coactus esset [h†].

De liene pendente uncias duodecim destillarunt spiritus urinosi uncia 8. olei empyreumatici tantum drachmæ duæ [i].

Lien sanguine valde plenus est, ut vel ex colore videas. Libram in sano splene contineri Cl. STUKELEY [k], sed ex conjectura. Per experimentum IDEM lienem humanum siccatum a 14. unciis ad drachmam, caprillum ad drachmam semis, porcelli guineensis lienem ad grana duo rediisse vidit [l], ut fluidæ partis magna sit portio.

§. XI.

[c] FIZES ROLOF. BOWN *circul.* p. 258.

[e] Non bene coccineum dicit FIZES p. 110. III. BOWN *duumvir hypoch* n. 7. & WALTHERUS *de lienis prolaps.* floridum spumantem.

[f] Recte ROLOF. *ibid.*

[g] *De lienis fabr.* n. 4. p. 57. 58.

[h] *Prim. lin. physiol.* n. 428.

[h*] $\frac{3}{8}$. aquæ cum paucō oleo empyreumatico, in venæ vero cavæ sanguine $\frac{7}{8}$. aquæ *Physiol.* T III. p. 736.

[h†] *Mém. de l'Acad. de Berlin* 1748. p. 40. 41.

[i] SPIEMANN *Chym.* p. 179. *compar.* cum L. V. p. 103.

[k] p. 63.

[l] p. 7.

§. XI. *Nervi.*

Nervos alias diximus, ex ganglio semilunari sinistro, plexusve potius sinisteriori parte [a], atque ex intermediis plexibus natos, & cum octavi paris plexu posteriori [b], conjunctos. Arteriæ lienalis comites [c] sunt, eadem pinguedine obvoluti, exigui utique [d], ut non possis Cl. Viros probare, qui magnos lieni nervos tribuerunt [e].

Hinc parum omnino [f] lien sentit [g], vel in vivis hominibus & animalibus. In ægris, abscessus in liene latentes ægre percipi, quod obscurus ejus visceris sensus esset, olim ARETÆUS.

Cum lien crasso pure plenus reperiretur, præcesserat obtusus [h] dolor. In vulnere lienis nulla inflammatio [i]. Ita neque irritabilis [k] est, nisi ex veneno chemico.

§. XII. *Vasa lymphatica.*

In vitulo facile est experimentum.

Inflatur sub membranam lienis aer, & continuo plurimi trunci lymphatici vasculosi & nodosi adparent, undique de tota superficie visceris nati, qui cum magnis vasorum sanguineorum truncis porro versus originem lumbalem [a] cisternæ chyli tendunt. Maceratione sola conspicuos reddebat MALPIGHIUS [a*]. Aldit Cel. HUNTERUS, adjuvari experimentum, si ita arteriæ venæque repleveris, ut crepent, sic aquam vel liquorem impulsam in lymphatica penetrare [b]. Sic olim F. RUSCHIUS [c], ligata vena lienali, & contrectato viscere, vasa lymphatica demon-

[a] L. X. p. 263.

[b] p. 236. WINSLOW III *tr. des nerfs* n. 437.

[c] STURKLEY *tab.* 8. p. 23.

[d] GALEN. *util. part* L. XIV. c. 13. VIEUSSENS *tab.* 23. n. 64.

[e] STURKLEY p. 22. 23. 24. MUKOS ENT. p. 103. BELLIN *de gustus organ.* p. 87.

[f] Sensilem esse RAULIN *vapeurs* p. 355.

[g] BOERHAAVE *prælect.* L. III p. 60. 61.

[h] G. V. SWIETEN *Comm.* T. III. p. 354.

[i] MAUCHARTE *inspect. med. leg.*

[k] Fecerunt RAULIN. LORRY *Journ. de méd.* 1756. M. Decembr. Persæpe vidi non esse contractilem.

[a] L. II. p. 173. Ad plexum hepaticum ZELLER.

[a*] *Conglob.* p. 3.

[b] *De gland.* p. 11.

[c] *De calv. lymph.* c. 3.

demonstrabat. Per arterias replebat C. BARTHOLINUS [d], & NUCKIUS [e]. Per venas inflabat COWPERUS [f], aut aqua replebat MONRO [g].

In animalibus dudum abunde innotuerunt, a primis hujus angiologiæ primordiis, atque descripta repetiuntur, apud ipsum J. VESLINGIUM [h], & apud OLAUM RUDBEKIIUM [i], tum apud alios Cl. Viros [k]. In homine rara est memoria. Subinde unum alterumve se vidisse in posthumis CASSEBOHMIUS, & pauciora esse RUYSCHIIUS faterur, & NUCKIUS [l]: & J. B. WINSLOW [m]. In sue externa sunt, & interna [m*]. Interna in homine non subeunt [n], aut parum [o], & superficiem fere sequuntur [p]. Secundum totam arteriam splenicam, ad finem usque lienis glandulæ conglobatæ abundant, quas adeunt.

§. XIII. Ductus excretorius.

Analogia lienis cum hepate, aut rene, quæ viscera per ductum excretorium generatum humorem efferunt, fecit ut ab omni tempore a liene natum similem canalem quæsierint. Primus CÆCILIIUS FOLIUS [a] parvum dixit, sodalem venæ lienalis. Eum repetiit Antonius de MARCHETTIS [b], & aquam per venam splenicam in lienem missam intestinum duode-

[d] De diaphragm. S. IV. p. 91. Etiam hydrope juvatur: in sue Eph. Nat. Cur. Dec. III ann. 2. obs. 190.

[e] p. 52.

[f] Anthropolog. ad tab. 36. f. 1. MORG. adv. II. n. 47.

[g] Epist. de vas. lymphat. p. 26. Etiam HUNTERI discipuli l. c.

[h] Tetigisse videtur Epist. posthum. n. 58.

[i] Mess. aur. f. nov. b

[k] BARTHOLIN. anat. p. 113. IDEM l. c. C. filius diaphragm l. c. LOSS. lang. lymph. n. 10 MALPIGH. de liene p. 102. de gland. cong ob. p. 3. NUCK adenograph. p. 52. 143. FANTON. p. 117. RUYSCH de valv. lymph p. 12. f. 6. MORGAGN. adv. II. n. 47. DUVERNEY posthum. II. p. 548. in membrana externa. KLAUW n. 631. 632. MONRO vas. lymph. p. 25. seq. HUNTER l. c.

[l] p. 144.

[m] n. 340 Difficillime ostendi DREW de liene n. XI. VIRUSSENS system. vas. for p. 115.

[m*] FIZES p. 104. & fere MALPIGHIUS & VIRUSSENS l. c.

[o] RUYSCH ibid.

[p] MALPIGHI l. c.

[a] Epist. ad BARTHOL. 62. Cent. I. p. 254.

[b] Journ. des sçavans ann. 1682. n. 15.

duodenum subire [c] addidit, ut is esset ejus ductus finis; sic ex pisce *Plaice* alterum lienem in cloacam tendere *Samuel COLLINS*. [d], & pariter in rectum intestinum a liene ductum deduxit *Emanuel KOENIG* [e].

Horum nihil a recentiori industria confirmatum est. Videtur jam *WIRSUNGII* tempore de ductu lienis excretorio sermones jactos fuisse, cum neget *Vir Cl.* (f) ductum suum lienem adire.

§. XIV. *Fabrica lienis interior.*

Primo loco ea dicemus, de quibus certa sensuum fide constat, deinde de iis, quæ ex conjectura, aut ex analogia adduntur.

Lien ergo humanus spongiæ similis est, adeo succulentus, ut elutis vasis & siccatis fere in nihilum abeat. Repletis autem vasis adparet, & arterias & venas [a] in lienem subire, & tenera cellulosa tela [b], ab omento continuata, & multo quam in hepate molliori, revinctas, in interna lienis de suis foraminibus progredi.

Ramos ibi edunt, nulla certa lege [c], ut tamen multo minus minorum ramorum sit, quam grandium; iique rami porro diminuti, denique in penicillos [d] abeant, ramulos nempe multos sibi vicinos.

Quo melius autem vasa replentur, eo major pars pulpæ lienalis in vascula abit [d*].

Tenerrima [e] cellulosa tela nunc hos minimos furculos [f] comitatur, neque est quod ultra videat incisor. Ipsos nervos ægre oculus persequitur [g]. Venæ [b] incredibili mollitie sunt, ut facillime aerem aut humorem

[c] *Des NOUVEAUX letr.* p. 19.

[d] *Tab.* 37. f. 5.

[e] *Regn. anim.* p. 138.

[f] *Ad RIOLANUM.* p. 812.

[a] Quæ arterias in homine non deferunt.

[b] *DISDIER Splanchnolog.* FIZES p. 107. *WINSLOW* n. 345. Similem *GEISONIANÆ* capsulæ facit *IEL. LIEUTAUD* p. 309.

[c] *La SONE* l. c. p. 206.

[d] *RUYSCH Epist.* IV. tab. 4. f. 3. *Thes.* VII. tab. I. f. I. *ALBIN.* apud *MESLON* p. 13. *ELLER* progr. 6.

[d*] *DREW de vas. lien.* n. 8. *ELLER.*

[e] *DUVERNEY* T. II. p. 246. *CASSEBOHM.* la *SONE* p. 197. *Tissa co-tomneux* *WINSLOW* n. 338. 339.

[f] *MESLON* p. 14.

[g] Habet *STURKELEY* p. 23. 24. la *SONE* p. 206.

[b] In liene interno habet *ELLER.*

humorem impulsus in cellulofam telam dimittant; neque ægrè quidem arteriæ [*b**]. Idem aer per vulnus lienis iterum exit [*i*], aut per venam, si per vulnus subiit [*k*].

Alia cellulosa tela est, mista vasis [*k**], quæ exteriorē peritonæi faciem ubique vestit, & quæ ex communi corporis humanæ fabrica introrsum conversa, lienis carnem propriam cum velamento extimo connectit. [*k*†].

Eædem in lienem demersæ fibræ cellulofam [*l*], naturam aliquantō firmiorem faciunt, quam tenniora illa fila, arteriis circumnata. Hæ sunt fibræ & cellulæ, quas possis in liene humano [*m*] admittere, nisi, crassiori errore, aliqui clari Viri abrupta vasa pro fibris [*n*] habuerunt, aut cellulas, quæ destructa lienis parte inter vasa nascuntur. Primus SWAMMERDAMIUS [*n**] ab humano liene fibras & cellulas removit; inde RUYSCHIIUS [*o*], etiam VIEUSSENIUS [*p*].

Impulsus nunc per vulnus potissimum membranæ externæ lienis [*q*], aer ea cellulosa spatiola perambulat, totumque lienem in spongiam convertit. Arteriis [*r*] etiam aut venis demum inflatis, totus lien cellulosa fit tela, spatiis distincta, quæ aer replevit, Facile vero adparet
cellulas

[*b**] CASSEB. COWPER l. c. Ægrius la SONE.

(*i*) PETSCHÉ ibid.

[*k*] La SONE p. 226.

[*k**] Quæ evulsa stigma rubrum relinquunt FANTON. *anat.* p. 117.

[*k*†] La SONE p. 195. FIZES p. 107.

[*l*] La SONE p. 195. In scirrho cellulæ VALEISNER. *Oper.* T. III. p. 197. 198.

[*m*] BARTHOL. *hist.* 63. *Cent.* I. WEPFER apud BARTHOL. *de pulmonib.* p. 28. FIZES p. 107.

[*n*] Conf. BLAS *miscell.* p. 207. VIRUSSENS *nouv. découvertes* p. 5. 6. 7. 8. sed iste vesiculas admittit. VATER *mus. propr.* p. 61. ex RUYSCHIO, & RUYSCH *Thes.* II. *aff.* II. n. 3. SCHAAE *de liene* DREW *de uss. lien.* n. 9. MESLON. n. 13.

[*n**] *Coroll. ad diss. de respir.* n. 13. Etiam SCHELHAMMER *physiol.* p. CCXXIII.

[*o*] *Epist.* IV. p. 9. *Respons. ad vindic.* & BIDL. p. 12. *Thes.* VII. n. 11. *Thes.* IX. n. 18. *Thes.* X. n. 90. *Physiolog. Batav.* p. 118.

[*p*] *Nouvelles découvertes* l. c.

[*q*] SENAC. *Ess. de phys.* p. 180. JENTY *hisor. compend.* p. CLXXIX. *Ess. of a Societ. at Edimb.* III. p. 12. la SONE p. 224. 225.

[*r*] Injecto in arteriam vel venam flatu VATER *de lienis prolaps.* p. 11. CASSEB.

cellulas, quas natura minimas fecerit, nunc ab impulso aere mole fuisse auctas.

Non male adeo Cl. Viri senserunt, qui lienem ex vasis, & membranis vasa connectentibus dixerunt constare (t).

§. XV, *Lien vitulinus.*

In hoc animale, & quantum video in plusculis aliis herbivoris (a) quadrupedibus, manifestior, & facilior lienis est fabrica.

Nempe in his bestis fibræ evidentissimæ & robustæ (b) & laminæ, ex membrana (c) lienis externa natæ, in viscis interiora penetrant, inque vasorum tunicas se inmittunt (d), & denique in pulposam naturam lienis undique se demergant (e), sensim diminuta magnitudine. Ita efficiunt (f) cellulosum textum, multo quam in homine laxiorem, ut omnino facile sit, inpulla in venam lienis aqua, & pressio viscere, atque eluta pulpa (f*), quando nunc aqua pura redit, per venam, lienem inflare, inque similitudinem evidentissimam pulmonis (f†) convertere. Liberrima etiam hic ex eo textu in venam (g) via est, ut quæ brevissimis ramis, quasi per foramina (h), in cellulosum textum pateat. Cæterum hæ fibræ neque musculosæ (i) sunt, neque vasculosæ, sed

(t) NICHOLLS p. 19. LIEUTAUD p. 310. MERSLON *de liene* p. 19. SCHAAF *de liene*.

(a) In ove LEEUWENHOECK *Phil transf* n. 307. In elephante durissimæ PARIS. Etiam in carnivoris cellulæ sunt; sed his teneriores & sericeæ, ut in urso *Comm. Lit. Nor.* 1734 *bebd.* 38. in panthera PARIS.

(b) La SONE p. 197. Cum peris celluloso textu comparat MERY *prog. de la medec.* 1697 p. 38. tum DUVERNOY *Comm. Acad. Petr. T. IV* p. 56 seq.

(c) LEEUWENHOECK l. c. ELLER p. 17. ENT. SBARAGLI *vigil.* p. 60. MALPIGHI *de liene* p. 104. STUKELEY p. 17. WHARTON *anatomogr.* p. 17. La SONE p. 197. RUYSCH *Epist.* IV. p. 8. STUKELEY l. c. p. 10. 18.

(d) STUKELEY p. 10. 8.

(e) La SONE p. 207.

(f) RUYSCH l. c. f. 3. BIDLOO *tab.* 36 f. 1.

(f*) SWAMMERDAM *bibl.* p. 431. *Ess. of a Societ. at Edimb.* T. III. p. 125. RUYSCH p. 9. ELLER p. 8.

(f†) DUVERNOY II. p. 62. STUKELEY T. III. & in ove *tab.* 4. f. 4. JENTY.

(g) QUERFALZ *de liene* n. 9 qui vult vasa foraminibus patula in liene adparere. ENT in equo PERRAULT *Ess.* III. p. 237.

(h) VESAL. STUKELEY *tab.* 3. HIGHMOR. *disquis.* L. I. p. 3. c. 3. *tab.* 7. f. 1. MONRO l. c. WINSLOW n. 337. 347. DUVERNOY.

(i) Facit musculosas MALPIGHIUS *postb.* p. 9. 58. DUVERNOY II. p. 242. STUKELEY p. 10. 18.

sed cellulosi generis, quas ligamentosas, ob firmitatem in majoribus animalibus aliqui dixerunt (*i**).

Eæ fibræ a VESALIO (*k*) in anatomicos (*l*) fastos introductæ fuerunt, & ad humanam fabricam fere ab omnibus translatae. Easdem rejecit RUYSCHIUS (*l**) ut de hominis liene diximus.

Nuperiores etiam eas fibras, quæ in vitulo, dictæ sunt, pro meris vasis (*m*) habuerunt, quæ abruptis finibus cellulas acre repletas trahant (*n*): solaque violentia cellulas parari (*o*) monuerunt.

§. XVI. *Acini lienis.*

Ut in aliis visceribus, ita in liene MALPIGHIUS glandulas reperit. Nempe in multis omnino animalibus quadrupedibus, ut in cane (*a*), fele (*b*), vitulo (*c*), ove (*d*), capra (*e*), mure (*f*), talpa (*g*), erinaceo (*h*), simio (*i*), imprimis in elephanto (*k*); porro in piscibus etiam, squalo (*l*), delphino (*m*), torpedine (*n*), acini rotundi in liene reperiuntur.

Denique

(*i**) ESSE ligamentosas la SONE p. 200.

(*k*) p. 627.

(*l*) C. BAUHIN. *theatr. anatom.* p. 143. ROLFINK p. 1152. WHARTON HIGHMOR *hyst. pass.* p. 84. 94. VERHEYEN p. 86. ENT p. 103. GLISSON *hep.* p. 430.

(*l**) *Respons. ad vindic.* BIDLOR p. 12. *Epist.* IV. *Tbes.* VII. n. 11. *Tbes.* IX. n. 28. *Tbes.* X. n. 90. tum SCHELHAMMER *physiol.* p. CCXXIII. & alii; & princeps SWAMMERDAM *cooll.* 13. ad dissert. *de respir.*

(*m*) ELZER p. 17. 18. add. MESSON. *de liene* p. 415.

(*n*) DEIDIER *anat. rais.* p. 364. FIZES p. 206. *Conf. Comm. nostr.* T. III. p. 57.

(*o*) FIZES *ibid.*

(*a*) PEYER *obs.* 12.

(*b*) IDEM *obs.* 17. & 7.

(*c*) MALPIGHIUS *de liene* p. 111. POZZI p. 67. WINSLOW n. 349. in hoc animale potissimum, etiam CASSEBOHM. *in postb.*

(*d*) MALPIGH. *ibid.*

(*e*) *Ibid.*

(*f*) GREW *cosmolog. sacr.* p. 20.

(*g*) PEYER *obs.* 19.

(*h*) MALPIGH. *postb.* p. 42.

(*i*) DUVERNEY II. p. 544.

(*k*) MULLENS p. 23.

(*l*) MALPIGH. p. 112.

(*m*) COLLINS p. 416.

(*n*) LORENZINI

Denique Vir ILL. addit, & in hominis liene (o) acinos reperiri, ovales (p), consistentes, ne RUYSCHIO quidem dissimulatos (q), neque a WINSLOWO (r), FERRENIO (s), & HEUERMANNO (t), SENACO (u), FANTONO (w), aut LEEUWENHOECKIO (x) prætermisissos.

Eos cavos esse, docuerunt Viri ILL. veros acinos simplices, racemosos (y), in morbis (z) variis præter naturam humoribus, etiam gypso (z*) plenos, & mole auctos (a).

Addebant non esse vasculosæ naturæ, cum ab arteriis in eas glandulas liquor non transeat (b), neque eos tingat, & demum ab *injectione* anatomica acini evanescant (b*); cæterum in cellularum lienalium areolis, in ipso centro federe (c), ab arteriis & venis racematim suspendi (d), & in eas glandulas secretum ab arteriis humorem (d*) deponi.

Et cum nuper RUYSCHIIUS hoc glandularum systema refutasse crederetur, ita restitutum est a Cl. la SONE (e), ut caro lienis pulposis folliculis (f), per macerationem conspicuis, constare videatur; tamen ut feteretur, subinde nullos sibi occurrissse (g) acinos, cellulasque ipsas lienis ex pulpa villosa fieri (h).

Post

(o) MALPIGH. p. III. per morbos. Microscopio conspici WINSLOW n. 349.

(p) MALPIGH. p. m. p. 413.

(q) Conf. p. 413.

(r) n. 318. seq.

(s) *Mém. de 1749.* p. 495.

(t) *Physiolog.* p. 667.

(u) *Ess. de phys.* p. 180.

(w) p. 118. in homine.

(x) *Phil. transf.* n. 307. cum ic.

(y) MALPIGH. p. III.

(z) Id. p. 112.

(z*) MERRY *Hist. de l'Acad.* 1702. DOUGLAS *Phil. transf.* n. 349. In phthisico finio *Anc Mém.* I. p. 404.

(a) Ibid.

(b) MALP. p. 110. Etiam la SONE p. 215. *Mém. de 1754.* VIRSUSSENS mercurium bullarum quidem specie in liene adparere; sed a ruptis vasis id fieri *structure des vaisf.*

(b*) La SONE p. 228.

(c) MALPIGH. p. 112. Adde la SONE p. 224. 228. WINSLOW n. 348. SENAC. l. c.

(d) MALPIGH. p. III. 112.

(d*) Idem p. 112. cum in eas *bient.*

(e) l. c. p. 207. 212. 214. 220. 221.

(f) Etiam in sanis hominibus p. 212.

(g) p. 207. 211.

(h) p. 230.

Post injectionem R U Y S C H I A N A M magnam partem pulpæ perire (*i*), monet I D E M Vir I L L. floccorum specie, & una glandulas destrui (*k*).

Additum est, ut puto ex conjectura, ex unoquoque nodulo lienalis acini exire duo vascula (*l*), alterum breve in cellulas lienis apertum, alterum quod sit arteria lymphatica.

Astipulatores numerosissimi (*m*) huic opinioni non defuerunt. Et potissimum Cl E L L E R non quidem M A L P I G H I A N A S glandulas, sed alias in bovis liene microscopio undique conspicuas, admittit, ex quibus radiorum modo vasa spergantur (*n*),

§. XVII. Quæ contra ista dicantur.

R U Y S C H I U S equidem particulas lienales figura acinorum simili adaptavit (*a*), tantum ut fabricam eorum aliam faceret (*b*). Nempe neque communi aliqua membrana (*c*) ejusmodi acinum involvi monuit, neque omnino cavum esse; sed arteriolarum [venarumque] esse glomerem, paulo magis cohærentem (*d*), qui tamen repletis ex arte arteriis colore injecti humoris tingatur, & sensim in aqua explicetur (*e*), ut in penicillum (*f*) abeat, qui acinus fuit. Per morbos veram omnino naturam non patefcere (*g*) monuit.

Eadem fere, quæ R U Y S C H I I (*b*) etiam A L B I N I (*i*) est animadversio, ut in liene præter vasa & cellulofam fabricam nihil sit.

Olim

(*i*) p. 216. 226.

(*k*) p. 221.

(*l*) W I N S L O W n. 349. S C H A A R S C H M I D T *splanchnolog.* p. 53.

(*m*) T I L I N G. *anat. lien.* C H E S E L D E N *Phil. trans.* B I A N C H I *hiflor. bep.* p. 154.

(*n*) p. 17.

(*a*) *Epist.* IV. p. 7. *Thes.* I. *aff.* 3. n. 13. *Resp. ad vind. Bidl.* p. 12. *Thes.* II. *aff.* 3. n. 17. *Thes.* IV. n. 7. *Thes.* X. n. 90. In vitulo *Thes.* I. *aff.* 1. n. 2.

(*b*) Ab anno 1696.

(*c*) *Epist.* IV. *Thes.* X. n. 90.

(*d*) Tenaciora quam in bestiis vasa *Thes.* IV. n. 7.

(*e*) *Thes.* VII. *tab.* 1. f. 1.

(*f*) In homine *Epist.* IV. *tab.* 4. f. 4. *Thes.* I. *aff.* 3. n. 10. *Thes.* III. n. 72. *Thes.* VII. *tab.* 1. f. 1. *Cur renov.* n. 65. In vitulo *Thes.* II. *aff.* 4. n. 4. *Thes.* V. n. 12. 72. *Thes.* max. n. 71.

(*g*) *Thes.* IX. n. 55. Conf. hujus nostri operis L. VII. p. 189.

(*b*) Ex R U Y S C H I O S C H E L H A M M E R *analect.* F I Z E S p. 206. V A T E R *mus.* p. 61. &c. In iis acinulis arteriæ & venæ uniuntur, & minimos ramulos edunt H E U E R M A N T. III. p. 667.

(*i*) M E S L O N. n. 13.

Olim *J. Hieronymus SPARAGLI* (*k*) contra eas glandulas scripserat & *R. VIEUSSENS* (*l*). Nervorum esse plexus *G. STUKELEY* (*m*) maluerat, & fibras abscissas in vitulino liene *Cl. ELLER* (*n*), quas *MALPIGHII* glandulas dixisset. In elephanto negat reperiri noster olim (*o*) præceptor, in equo *SNAPE* (*p*).

Quæ ego vidi, ea omnino propius ad sententiam *RUYSCHIANAM* accesserunt. Vascula pulposa vidi, nodulosque, sed uti perfectior erat injectio, ita vasorum majorem ad reliquum lienem portionem, & extremos fines in minutiora vascula exiisse reperio. Macerationem aliquando multorum mensium adhibui. Neque finit certe analogia glandulas simplices adoptare, ubi nulla fieret secretio, ubi nullus esset excretorius ductus. Neque artificia, quæ nuper ad lienis fabricam explicandam adhibita sunt, iis videntur potiora, quibus aut *RUYSCHIUS* usus sit, aut *ALBINUS*.

SECTIO II.

LIENIS UTILITAS.

§. I.

IN meras hic conjecturas demergimur: obscuriores, quam fere alio in viscere. Solus enim fere lien neque ductum excretorium habet, in quem humorem secretum deponat: neque vim muscularem, quæ sanguinem aliumve humorem urgeat. Denique extremi fines vasorum nondum satis plane innotuerunt, neque ultima fabrica lienis, & difficile est, machinæ exponere motus, cujus structuram ignoraveris. Cum tamen aliquam partem veri teneamus, eam primam proponemus. Calorem omittimus, quem lien ventriculo suffundit, alibi laudatum (*a*).

§. II.

(*k*) *Vigil.* p. 152. a cellulis non differre.

(*l*) Vascularum esse glomeres nouvelles decouvertes p. 14.

(*m*) p. 24.

(*n*) p. 18.

(*o*) *DUVERNOY* l. c. p. 160.

(*p*) *Tab.* 7. f. 2.

(*a*) *L. XIX.* p. 295.

§. II. *Sanguinis in liene pro hepate præparatio*

In omnibus, nisi plurimum fallor, animalibus, sanguis lienis in hepar venit, uti in omnibus pariter bilis in hepate nascitur. Nunc cum nullus peculiaris humor de liene exeat, nihil potest certe hepati (*a*) tribuere, nisi suum sanguinem, neque enim lymphæ de liene magis quam a pulmone, teste, aliisve visceribus redit.

Nunc si lienis utilitas est in sanguine, quem hepati submittit, superest, ut ostendatur, quid lien in eo ministerio peculiare habeat. Invenio in natura sanguinis habere, & in motu, inque motus demum temporibus.

Et primum sanguis venæ portarum multo ex omento (*b*) & ex mesenterio (*c*), reduce adipe gravidus (*c**), lentorem experturus ex divisione arteriosa in hepate, exque ramorum luminibus multum lumen trunci superantibus (*d*), obstructionum & scirrhorum periculum insuperabile faceret (*e*); nisi eum sanguinem fluidiori aliquo sanguine NATURA contemperaret, & incitato motu urgeret.

In liene adeo sanguis fluidior est (*f*), quam fere ullo in viscere: estque præterea indole lixiviosa salina (*g*), oleum dissolvente uberiori imbutus. Adparet, lienem fervire diluendo sanguini hepatico, impedientiæ concretioni, solvendo, quantum sufficit, adipi.

Quæri nunc potest, ut eam peculiarem naturam sanguis in liene induat. Si in cellulas lienales vere sanguis effunderetur, haberemus causam stagnationis certam, sanguinem nempe in lacus aliquos diffusum, in quibus tamdiu quiesceret, usquedum a causa aliqua expediretur; omnino, uti in similibus cellulis adeps quiescit.

Nondum ausim (*h*) in vivo homine sanguinis in cellulas effusionem admittere. Unicum, ad peculiare fines factum, effusi sanguinis exemplum

(*a*) BOERHAAVE prælect. T. III. p. 80. WINSLOW IV. n. 382. seqq.

(*b*) p. 384.

(*c*) Ibid.

(*c**) Sanguis tenax in vasis hypochondriacis accumulatus TRONCHIN. colic. piæ. p. 102.

(*d*) L. VI. p. 176.

(*e*) SCHMIDT de usu lienis p. 116. Eo referas in icterico hepar grande, bilem coagulata, cum liene scirrroso VALISNER. oper. T. III. p. 197. 198.

(*f*) p. 405.

(*g*) Ibid.

(*h*) MALPIGHIUS p. 112. QUELMAZ de liene n. 7. &c.

plum in pene est; neque cera per arterias (*i*) lienales adeo facile in cellulas effunditur; ut quidem facillime in venas transit, non transitura, ut videtur, si patulum iter in apertas, laxas, non resistentes cellulas haberet.

Superest, ut major inter ramos vasculosos lienis & truncum, quam aliis in visceribus sit ratio: Magna quidem est arteria lienis, cum hepaticas arterias pene æquet, viscus aditura quintuplo minus. Renales arterias cum lienalibus non comparamus, cum ex iis maxima fiat, & cellerrima secretio, & ob eandem rationem venam portarum hepatis non imputamus, quæ sit secretioni bilis destinata.

Et tamen credas, nos non absque ratione majorem hic ramorum ad truncum rationem sumere (*k*), quam ea est, quæ alibi obtinet. Lien nempe, præter teneram in homine, & ægre conspicuam cellulositatem, totus vasis fit sanguineis (*l*). Neque adipem habet admixtum, neque radices ductuum excretoriorum, neque copiam eam cellularis naturæ, quæ est in aliis visceribus, neque musculares fibras, neque acinos glandulosos.

Nunc si major hic, quam alibi, luminis ramorum arteriosorum simul sumtorum ad totum viscus est ratio, lentescet idem (*m*). Sed in venis potissimum lienis retinebitur, quæ insolita ratione arteriis laxiores (*n*), facillime sanguinem accipiant, expediant difficilior.

Sed omnes humores humani, stagnando acrimoniam concipiunt (*o*) lixiviosam; eo magis, cum in loco calente hic lienis sanguinis lentescat; cum præterea intestino colo proximus (*p*) infideat, cujus putridos habitus per poros inorganicos non recipere nequeat. Ut autem accrescit (*q*) idem sanguis, ita per similes causas, naturam coagulabilem deponit (*r*), fietque liquidior, colore vero minus intenso, cum putredinosus sanguis sponte sua in fuscedinem tristemque colorem transeat.

Aliquid

(*i*) p. 409. *b*.

(*k*) Comparat K E I L I U S lienem cylindro diametri unciarum duarum, arteriam splenicam vero facit o. 0018. *Secret. anim.* p. 45.

(*l*) p. 410.

(*m*) L. VI. l. c. &c. Retardando sanguini lienem destinatum esse K E I L I U S l. c. & *abridgm.* p. 80.

(*n*) p. 403.

(*o*) L. VII. p. 453. 454.

(*p*) *Prim. lin. phys.* n. 666. R O L O F p. 60.

(*q*) D E E W n. 36. V E L T H U Y S E N c. 3.

(*r*) L. VI. p. 310. G A V E R *Miscell. Taurin.* p. 70.

Aliquid etiam ad fluiditatem majorem facit, quod nullus sit in liene ductus excretorius, qui humorem avehat, semper & necessario sanguine tenuiorem. Horum similia plurimi scriptores (s) protulerunt, ut tamen plerique alias hujus tenuitatis causas darent.

§. III. *Motus sanguinis lienalis.*

In quadrupedibus verior & insignior (a) lien est, & in ea classe oportet ejus utilitatem quærere, quam de homine adfirmare liceat.

Bilis major est necessitas, quando cibum oportet subigi. Commodissime ergo contingeret, si eo tempore plurima generaretur, quo ejus necessitas imminet. Generabitur autem uberior, si eo tempore major copia sanguinis ad hepar veniet; veniet autem major, si lien, extra tempus coctionis, sanguinem uberiores receperit, & sub id tempus abundius ad hepar remiserit.

Nunc simplicissimo artificio hic finis obtinetur. Lien ponitur inter sacculum cæcum (b) ventriculi & diaphragma: non potest ventriculus grandescere, quin lien comprimatur, neque vicissim inaniri, quin laxetur lien. Quando ergo inanis est ventriculus, tum sanguis per grandem arrietiam in laxum viscus, mollesque venas (c) magna copia irruit, idemque distendit, manetque copiosior in liene, quod lien nunc nulla a vi valde prematur, & per laxam venam sanguis lentius ad hepar redeat. Haftenus posset lien *diversorium* (d) dici *sanguinis*. Ne penitus tamen stagnet, septi transversi facit pressio (e), & sanguis qui succedit.

Quando

(s) Adtenuari in liene sanguinem COWPER *Introduit. to the anthropolog.* DEUSING *sanguificat.* p. 112. TAUVET *anat. raisonn.* c. 9. WINSLOW IV. BOERHAAVE II. 326. BOHN p. 257. BERGER p. 217. GEORGI *de homine* n. 113. FIZES *de liene* p. 125. 130. ELLER p. 23. 24. SENAC *Ess.* ed. 1735. p. 186. DREW n. 33. MEKELLE. l. c. Calidiores sanguinem, ob arteriarum copiam ad hepar mitti HALLER.

(a) p. 386.

(b) p. 391.

(c) p. 401.

(d) SCHENHAMMER *physiol.* p. CCXXIV. STUKELLY p. 33. DUVERNEY l. c. p. 162.

(e) LEEUWENHOEK *Phil. trans.* n. 307. *Exp. natr. de respir.* 44. 50. 51. 52. 55. &c.

Quando vero ventriculus cibis, & imprimis aere, distenditur, non potest finistrorsum moles increfcere, quin lienem urgeat contra diaphragma, ita ut inter oppositas potestates medius prematur, perpetuam stomachi, alter nam diaphragmatis. Quassatur (f) adeo id viscus, & inanitur, ejusque sanguis per venas novis semper diaphragmatis pressurionibus ad hepar urgetur. Ita liberatur quidem lien suo sanguine (g): & una hepar plus sanguinis accipit, ex quo paulo post plus generatur bilis (h).

Hinc lienis scirrhi frequentes (i) in sedentariis artificibus, non in agilibus rusticis. Hinc major lien in domesticis animalibus (i*), quam in feris. Hinc recte HIPPOCRATES, in lienis morbo jubet lignare, secare, & ambulare (k). Hinc lienosis venter prædurus, ob inertem bilem (l).

In vomitu vehementer quassatur. Ab eo lien minimus (l*).

Qui eam vim conquassantem cellulis (m) tribuerunt musculosis, & lienem musculosum fecerunt, qui modo stringat vasa sanguinea, modo laxet (n) ad animæ nutum (o), & ut quadam pulmonis vice fungatur, ii plus iis cellulis tribuerunt, quam NATURA.

§. IV. *Aliæ utilitates ut inveneri possint.*

Non hanc dices totam fuisse causam faciendi lienis: cum dentur præterea animalia, in quibus lien ventriculo non adsideat (a).

Nunquam facile speravero NATURÆ sapientiam me totam perspexisse. Possem reponere, non videri satis veros avium pisciumque lienes (b), qui utique ventriculo non accumbunt. Minutissima esse ea organa, nulla ad hepar portione, nos de liene dicere quadrupedum.

Posset

(f) SCHELHAMMER. Splenem in omnibus animalibus poni in sede ad conquassationem apta MONRO compar. anat. p. 127.

(g) BORDEU *recherch.* p. 432.

(h) STURKELEY p. 33. cujus hoc, ni fallor, est inventum. LIEUTAUD *Mém. de 1735. hist. I. Physiolog.* p. 146. *Essays* p. 312.

(i) p. 397.

(i*) BUFFON T. VI. p. 27.

(k) *Aff. intern. text.* 33. LIEUTAUD l. c. QUELMALZ l. c. n. 23.

(l) ARISTOT *part. anim.* L. III. c. 7.

(l*) MORG. *Sed.* II. p. 23.

(m) COKBURNE *æcon.* apud MANGET *bibl.* p. 1139. MALPIGHI. *HIGHMOR* l. c. p. 94.

(n) WILLIS *de cerebr.* p. 196. Ed. 8.

(o) HIGHMOR *hypoch. adfect.* p. 99.

(a) Adjacere fere STURKELEY p. 32. de quadrupedibus locutus.

(b) p. 393.

Possit iterum a nobis posci, ut alias lienis utilitates expiscemur, duplici artificio, per morbos nempe, & per visceris excisionem. In morbis quidem lienis, functiones aliquas corporis humani iri vitiatum; esse adeo probabile, has ipsas functiones esse, quod lien corpori universo præstet.

Tentavi eam viam, neque perinde profeci. Inveni, lienem in universum sæpissime grandescere (c), frequenter, ut monui, scirrhus (d) tentari, neque a calculosis concretionibus alienum esse (d*), non infrequenter quasi putrido sanguine repleti (f):

Referas grandescens lienem, & scirrhum, ad diminutam corporis exercitationem, demto de motu sanguinis lienalis altero instrumento, concussione nempe incitatae respirationis. Putridos lienes ad eandem retardationem referas, a qua etiam in sano homine, aliquid in lienis sanguine nimis alcalinum (g) sit.

Neque potui aliquam perennem rationem reperire, in qua lien esset & hepar. Grande reperio cum parvo liene (h), & cum magno (i): idem & cum magno liene scirrhusum (k), & cum parvo (l); & cum morbo

(c) p. 394.

(d) p. 397.

(d*) Magnum in liene concrementum osseo calculosum, septem digitos longum MOR-
GAGN. *sed. caus. morb.* II. p. 67. 68. Alia calculorum in liene exempla II. p. 67. Vaso-
sum lienis tunica cartilaginea *verband. van de boll. maatsch.* T. III. p. 615. Arteria sple-
nica latior & ossea fere tota MORGAGN. l. c. II. p. 144. In ea diverticulum osseum
concreto sanguine plenum I. p. 16.

(f) p. 397.

(g) p. 416.

(h) BARTHOL. *Cent. I. hist. 5.* RIOLAN. p. 122. Lex erat ARISTOTELIS,
cum liene parvo aut nullo, aut magnum hepar reperiri, aut omnino duplex *hist. L. III.*
c. 7. Cum morbis jecoris magni lienes frequentes VESAL. L. V.

(i) MEAD. *monit.* p. 223. *Zod. Med. Gall.* II. p. 151. Hepar ad lienem
protensum magnum, lien maximus bifidus HORST *Epist.* p. 453. Sic fere MORG. *Sed. II.*
p. 205. In hydropica hepar & lien præmagna BARBEIRAC l. c. In hypochondriaca
immane hepar & prægrandis lien PORT. p. 185. In scorbuticis hepar & lien maximi,
etiam ulcerosi PYRARD *Voyag. P. III.* p. 37. In eo casu cum gangræna lien 5 $\frac{1}{4}$. hepar 5. lib-
4. unc. MEAD. *monit.* p. 223. In subito mortuo hepar lib. 8. lien lib. 3. *Fränk Ana-*
merk. III. p. 530. In febre acuta hepar & lien magna FANTON. *obs.* 27.

(k) SALZMANN *obs.* p. 37. Icterus cum tumore lienis WOLF *obs.* 22. Hepar
scirrhusum, bilis spissa, lien magnus PETZOLD *obs.* 77. in hydropico. PUJATI *morb.*
varon. p. 218. Cum magno liene, sed molli VESAL. p. 628.

(l) FABRIC. *progr. ann.* 1759. CHIFFLET *obs.* 38.

morboso (*m*), & cum sano (*n*), & iterum cum magno liene parvum jecur (*o*), & vicissim cum scirrhuso magnum (*p*).

Sed etiam hydropes cum sano liene (*q*), cumque parvo (*r*) conjunguntur, etsi sæpe cum vitioso (*r**) : & hypochondriacus morbus cum parvo liene (*s*), & cum sano (*t*) adeo frequens est, ut raro adfici Clar. Vir adfirmet (*u*), atque vicissim scirrhus lienis absque suspitione ejus mali (*w*) reperitur.

In universum nondum ex cadaverum morbosorum incisionibus plenum fructum decerpimus: tum quod plerumque in præcipiti tempore tota res peragatur; adeoque fabricæ viscerum vera corruptio minus innotescat: tum quod morbi possint earum corruptionum & causa esse & effectus (*x*). Ut in exemplo sub sistamus. Potest scirrhusus lien ad hydropem conferre, quod bilis minus acris ex eo vitio generetur: atque adeo ciborum coctio langueat: ut crudi & aquosi succi nascantur: Vicissim perspiratio viscerum, quæ etiam lienis est, a viscore illo gelatinoso impeditur, qui ex aquis hydropicis natus omnia abdominis viscera obungit. Ex eo vitio, ut dura cutis fit, ita potest in liene lymphaticus humor retineri, stagnare, indurari. Et tamen persuaderet, si viri veri cupidi, in opportunitate nosodochiorum hepatis degenerationes cum lienis vitiis conjunctas longo labore rimarentur, denique majorem hic nobis lucem adfulsuram.

§. V.

(*m*) Cum abcessu hepatis lien corrupto sanguine plenus & magnus BACKER *tract.* p. 6. Sic lienis similis cum amplo hepate *Pbil. transf.* n. 209. Hepar ulcerosum lien major COTTER p. 120.

(*n*) FEHR *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs. 2.* LEIGH *Exerc. V.* p. 125.

(*o*) FRANKEN *de hepate* KAELTSCHMIDT *de liene rar. magnit.* Cum crasso liene sanum jecur PETZOLD *obs.* 65. in hydropico. Sic fere MORG. I. II. p. 107. KREKELING *obs.* 65.

(*p*) VALISNER. III. p. 197. 198. CAMERAR. *exfip. hepat. def.*

(*q*) FEHR. l. c. floridus & ruber BONTKOE *ibef.* p. 207. VATER *hepat. infors.*

(*r*) TISSOT *Epist. ad HALL.* p. 16.

(*r**) Etiam a liene hydropem fieri scripsit CELSUS L. III. c. 21. Cum magno liene SCHNEIDER *de liene Thes.* 37.

(*s*) *Comm. Nor.* 1740. hebdom. 21. CHIFFLET *obs.* 38.

(*t*) BACKER l. *de morte submers.* sine aq. *obs.* 2. ALBIN. *fan. canin.* n. XI. SYLV. *diff.* V. n. 7. 8. GLISSON *ventr. int.* p. 548. ed. bas. & PRYER *merycel.* p. 248. SCHEID *de liene* n. 27.

(*u*) SCHMIEDEL *de pericard.* &c. p. 24.

(*w*) LITTE *Hist. de l'Acad.* 1700. *bist.* 7. *Journ. de Trév.* 1717. m. Janv. STORZ *ann.* I. p. 132

(*x*) Scirrhus hepatis & lienis esse hydropis non causas, sed effectus DIONIS. *Cours d'Opérat.* p. 96.

§. V. *Lienis evulsio.*

Nescio cur de hoc liene evellendo magis, quam de ullo alio viscere, antiquitas cogitaverit, inque eo uno tentamine dudum incisores (a), etiam in humano (b) corpore, audaces fuerint?

Forte dolor est in causa, quem homines, in coli flexu lieni vicino a flatu distendente passi, jam vetustis temporibus lieni imputarunt.

Credas iterum, si quæ est lienis in adjuvanda ciborum coctione potestas, eam coctionem evulso liene, iri diminutum, aut omnino periturum esse: ita quæ detrimenta animal passum sit, eorum esse summam æqualem veræ lienis utilitati.

Ne ita quidem tantum est profectum, quantum poterat sperari. Primo quidem innotuit, posse utique lienem ex homine (c), & ex quadrupede (d), eximi, ut vita, & satis salubris supersit: evelli (e) tamen melius

(a) Exemto liene animalia vivere PLEIN. L. XI. c. 30. Exsecto liene vivi posse Talmudista apud GINZBURGER medic. Talmud. p. 11.

(b) Apud Leon. FIORAVANTI tesoro della vita umana L. II c. 8. Administravit in femina audacem sectionem Adrianus ZACCARELLA: & de omento separavit.

(c) FIORAVANTI l. c. in formosa femina. Lien per vulnus emergens feliciter resectus Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 3. obs. 195. & HOME facts P. III. & Phil. transf. n. 451. In homine, cui per hiatus spontaneum lien prodierat, innoxie eductus est FANTON ad MANGET Epist. I. & VI. Feliciter hypochondriacis excisum se vidisse C. BAUHIN theatr. p. 143.

(d) Seculo XVI. VESALIUS p. 820. & ipse & omnes fere in canibus Seculo præterito testes sunt BIRCH T. I. p. 426. 315. T. II. p. 173. 175. ut auctores experimento essent KINGIUS & CLARIUS, & G. CHARLETON. Porro SCARBOROUGH Phil. transf. n. 28. Eph. Nat. Cur. Dec. I. obs. 118. ENT, apolog. nov. ed. p. 106. JOLYFF apud BARTHOLINUM Epist. 51. & 92. Cent. 4. & apud BOYLE utilit. phil. exp. p. 109. HACQUARD apud BARTH Cent. III. Ep. 50. 64. anat. p. 158 qui ter lienem excidit. BORRICH hermet. ægypt. sap. p. 429. BARTHOLIM. hepat. defunct. p. 61. AGRICOLA apud DEUSING de sanguific. p. 119. J. MICHAEL apud MAIOREM Chirurg. infus. p. 586. & apud RIVINUM. Th. KERKEING obs. XI. GEUDER de ferment. p. 190. J. C. BRUNNER de pancreate p. 8. J. BOHN circul. p. 248. duumvir hypoch. n. 21. H. MERBON, qui sexies repetit, apud SCHELHAMMER physiol. P. CCXXIV. DENIS Conference 2. DUNCAN Chym. med. spec. p. 295. 297. MALPIGHIUS de liene c. 6. p. 114. G. BAGLIVI Exerc. IX. p. 677. Henricus BALSY apud MECKERN obs. 43. BARBETTE præmed. p. 83. qui & sexies lienem eximit. DECKER in BARBETTE p. 221. ZYPÆUS compend. p. 85. R. de GRAAF apud DIEMERBRORCK p. 86. 87. & succ. pancr. p. 28. P. VERHIJEN p. 88. 89. DRELINCOURT apud SCHELHAMMER de liene. RUYSCH Centur. obs. n. 66.

Seculo nostro ZAMBECARI. Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 4 app. p. 98. & apud MORG. adv. II. p. 54. Ant. VÆISNERI Giorn de letter d'Ital. T. XXII. p. 359 Gal. di Minerva. I. VI. p. 71. Oper. III. p. 128. IDEM & MORGAGNIUS Eph. Nat. Cur. Cent. III. obs. 30. p. 55. MORGAGNIUS advers. II. p. 54. advers. III. p. 36. BONAZZUOLUS apud

melius esse, forte quod protractæ arteriæ, dum in se elatere redeunt suo, melius se claudant. Neque, si aliqua animalia non diu (*f*) vitalia superfuerunt, id oportet ipsi visceris jacturæ tribuisse, supervixerunt enim plurima. Non ideo hanc operationem in homine administrare suaderem (*g*).

In universum per hæc experimenta conficitur, animalia vulnus absque vitæ jactura passa porro vixisse absque conspicuo incommodo (*h*), per annum (*i*), & ultra (*k*); etiam homines (*l*). Catellas porro perperisse (*m*), pingues fuisse canes (*n*), lætosque (*o*), & voraces (*p*); etiam plethoricos (*q*). Addunt aliqui, falaciora fuisse animalia (*r*), & micturivisse frequentius (*s*).

Pauca omnino sunt, quæ reperimus, ad hepatis munia vitianda aut coctionis diminutionem pertinentia; borborygmos in nonnullis canibus (*t*); hepar turgidum, quod ad sanguinem referas nunc tenaciorem (*u*); etiam obstru-

apud J. POZZIUM *Comm. Epist.* p. 71. FANTON. *diff. anat.* p. 126. J. B. BIANCHI *hist. hep.* II. p. 1138. J. F. ORTLOB *hist. part.* p. 124. & *præf.* ad TAUVRY. JUSTI VESTRI *æcon. anim.* L. HEISTER *Eph. Nat. Cur. Cent. III. IV. obs.* 197. DEISCH in *diff. præfide SCHULZIO* hallæ ann. 1735. proposita. VATER apud VALENTINUM *Chirurg. med.* p. 312. *physiolog.* p. 670. MYLIUS & QUELMALZ l. c. n. 13. CHESOLDEN l. c. p. 167. GILLAN. & READ. tum GEORGIUS THOMSON apud STUKELEY p. 27. MEAD. *ibid.* p. 46. J. D. SCHLICHTING *traumatogr.* p. 76. in VERBRUGGE p. 36. FIZES *de liene* p. 137.

(*e*) VALISNERI l. c. add. BIRCH l. c. T. I. p. 426. T. II. p. 173.

(*f*) Moriebantur intra triduum MATTEI *anim.* p. 256. Post aliquot menses DIONIS. *Cours d'oper.* p. 128. Mortuus ex abscessu BIRCH T. I. p. 283. ex sanguine in abdomen effuso VERHEYEN p. 88.

(*g*) Dissuadetur in MAGAT *rediviv.* p. 175. Ita CÆLIUS-CHRON. L. II. c. 4. dici de extirpatione, sed non fieri.

(*h*) Fere omnia paginæ prioris experimenta.

(*i*) SCHLICHTING. VERHEYEN l. c.

(*k*) BIRCH. T. I. p. 315. ENT. *apolog.* Quinque annis VALISNERI.

(*l*) FANTON. *Ep.* VI. ad MANGET. HOME. BECKER.

(*m*) SCHLICHTING l. c. VALISNERI *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 1. obs.* 118. ZAMBECCARI *Phil. transf.* n. 28. GRAAF.

(*n*) VALISNERI. CLARKE apud BIRCH T. II. p. 173.

(*o*) CLARKE *ibid.* ZAMBECCARI. MORGAGN. l. c.

(*p*) BOHN. MALPIGHI. DENIS. HEISTER. BIANCHI p. 26. PARIUS.

(*q*) GEUDER l. c.

(*r*) JOLYFFE apud BOYLE. PURCELL. in BEAKMORE *essays.*

(*s*) MALPIGHI. BOHN. DENIS. BRUNNER. VALISNERI. HEISTER. DEISCH. ORTLOB.

(*t*) BOHN.

(*u*) MALPIGHI. ORTLOB. HOFMAN *med. physiol.* p. 138. & imprimis POZZI DAVIDER.

obstructum, ulceratum, decolor (*u**); bilem colore alieno, fusco aut coffeæ (*w*) simili; eandem lentiolem, obscure virentem, coactam (*x*), caseosam, parcam, immeabilem, minus flavam (*y*), aqueam & pallidam in aliis (*z*); & putrida demum in ventriculo alimenta (*a*), atque appetitum dejectum (*b*). Nondum tamen inde audeas aliquid firmioris theoriæ superstruere. Nam bilis illa VALISNERIANA fusca tamen, & amara erat (*c*), & acerrima in POZZII & BONAZZUOLI experimentis (*d*), & hepar potius aridum in JUSTI VESTI & DUNCANI (*e*) canibus. Nihil valde mutatum vidit VERHEYENIUS in cane, quem post sex ab evulso liene menses necavit (*e**). Neque salaciorem cum insomnio fuisse hominem, cui excisus lien, testis est *Franciscus HOME* (*f*), & omnino sterilis fuit alter a Cl. BECKERO citatus (*g*).

In universum tamen credas, plus alias, minus in aliis, motum sanguinis per hepar passum esse: vitiatam inde bilem: & ciborum coctionem; unde cruditas, flatus, & urinæ augmentum, male cibum coquentibus familiare. Oportet autem hæc omnia numerosis, & absque hypothese susceptis periculis, aut confirmare, aut corrigere.

§. VI. Hypotheses. Secretio lienalis.

Succum aliquem etiam illustres Viri in lienis glandulis parari (*a*) docent, qui sanguini venoso (*b*) addatur, ejusque vires utrumque intendat (*c*), aut bilem adfusus temperet (*d*).

Id

(*u**) DEIDIER.

(*w*) VALISNERI. MORGAGNI.

(*x*) BOHN *dumvir*. n. 21. Ejusmodi fuit bilis VALISNER. III. p. 197. 198.

(*y*) ORTLOB cum siti & bilis vomitu.

(*z*) VATER *physiolog.* l. c.

(*a*) MEAD. apud STURKELEY p. 46.

(*b*) DUNCAN. Tarda digestio serpentibus, quibus nullus lien STURKELEY p. 43.

(*c*) l. c.

(*d*) l. c.

(*e*) l. c.

(*e**) l. c. p. 88.

(*f*) l. c.

(*g*) l. c.

(*a*) Quod magna vasa sanguinea & lymphatica in liene sint MORGAN. *princip.* l. p. 180.

(*b*) RUYSCH apud WESTHOVEN p. 42.

(*c*) FANTON. *diff.* VI.

(*d*) Salivalem vocat POZZIUS, & ei id muneris tribuit.

Id humoris alii per vasa lymphatica in receptaculum chyli reducerunt (e), ut chylum diluat(f), aut ad hepar, ut ejus sanguinem (f*). adtenuet.

Alii omnino eum succum acidum fecerunt (g) : sive per venas in cor (h) refundatur, fermento futurus (i) sanguini, sive per vas breve(k) in ventriculum emanet, aut alio modo chylum juvet subigere (l).

Hinc etiam lienem cum pasta maceratum fermentationem excitare (m).

Alii succum atrabilarium in lienem receptum(n) coqui, & ad hepar ferri maluerunt, per venam portarum, ut coctio sanguinis in eo viscere adjuvetur (n*), & confectio ciborum (n†). Alii etiam per ipsos nervos tenuem ex liene succum sorberi, qui sit vehiculum veri succi alibilis (o), vel omnino spiritus, qui in sanguinem effusi (p) fermenti sint loco (q), aut certe aliquo modo sanguinem perficiant.

Olim etiam *Franciscus ULMUS* in liene ex succo ventriculi sanguinem perfici scripsit, qui per aortam in ventriculum cordis sinistrum rapiatur, & inde in arterias detur cum aere mistus; quem hactenus sublevat *G. STUKELEY*, quod lienem spongiosum faciat, ex qua spongia pro arbitrio sanguis in arterias, vel in venas premi possit (s).

Idem

(e) *TARGIUS* p. 236.

(f) *J. GEORG. a BERGEN.*

(f*) *DRELINCOURT* c. 4.

(g) *PERRAULT* p. 238. *TILING*; etiam *VALISNERI Conf.* p. 490. *CRAANEN* p. 659. 660. *CRESSENZO* p. 202. *FLOYER praternatural. state of humours* p. 11. 156. Subacidos viscidos vocat humores lienis.

(h) *PERRAULT Eff.* T. III. p. 239. *TILING vas. breve. CRAANEN.*

(i) *SYLV. diff.* V. n. 18.

(k) *TILING* tincturam nobilem acido falfam facit.

(l) *BIUMI canaletti* c. 18. p. 191.

(m) *TILING vas breve* p. 161. addit modestus cautusque, maxime, si acetum addideris.

(n) *GALENUS. C. BAUMIN.* p. 147. &c. Picea materie plenus lien *SIMSON diff.* p. 154.

(n*) *LINDEN phys.* p. 117. *PREMIEROSSE de usu lienis.*

(n†) *Cornel. CONSENTIN.* p. 225. *MAYOW* p. 352. *Conf.* p. 423.

(o) *GLISSON de hepate* p. 432. seq.

(p) *CRESSENZO SYLV. diff.* V. n. 18. *Prax.* l. c. 43. *MAYOW* p. 344. *MALPIGHI* c. 6. p. 117. *BOERHAAVE* n. 322.

(q) *COLLINS* p. 420.

(r) *De liene* p. 22. seq. & *C. BAUMIN. REUSNER. VAROL. PARISANUS. C. BARTHOLIN. &c. HOECHSTÄTTER* p. 476. seq. Sanguinem in liene in naturam frigidorem converti.

(s) p. 21.

Idem ait, lienem aliquem genitalibus sanguinem (*t*) dare, atque hactenus ad venerem (*u*) pertinere. In salace lien maximus (*w*).

Denique mucilaginem articulorum in liene parari, viri alioquin benemeriti fuit conjectura (*x*). Lympham per poros sudare, quæ vicina viscera obliniat & humectet (*y*) alterius Viri Cel.

Hæc omnia, partim omnino absque ulla demonstratione dicuntur, partim manifestis experimentis contraria sunt. Lien non est acidus (*z*). Vasa brevia nihil possunt a liene (*a*), in ventriculum sani hominis vehere; & longe minus aliquid in arteriam remittunt (*b*). Nervi lieni paucissimi (*c*), sunt & minimi, inter viscera nobis nota, ipseque GLISSONIUS suam conjecturam antiquavit (*c**). Succum ex arterioso sanguine in liene parari, & continuo in venosum ejusdem visceris cruorem reddi, videtur inutilis naturæ labor: cum, quæ in arteria sunt, alioquin in venam transeant. Nihil a liene ad vasa genitalia venit, & secunda sunt animalia, quibus lien ademptus (*d*). Nulla in liene mucilago, via nulla, qua possit in articulos universi corporis ferri.

§. VII. *Aliæ hypotheses.*

Sedem esse animæ sensitivæ (*a*), [qui vix omnino sentiat].

Veneris in eo sedem esse, & primordium feminis (*b*); somni deum, dum sibi, non publico, operatur (*c*); faturnia regna lienis esse (*d*).

Risus

(*t*) p. 53. 54.

(*u*) VELTHUYSEN p. 32. seq.

(*w*) FONTAN. ad VESAL. Epit. p. 23.

(*x*) CLOPTON HAVERS osteolog. p. 211.

(*y*) RIVINUS de genuino lienis usu.

(*z*) L. XIX. p. 157. Sal marini similis in lienis bubuli infusione BOURN *dumoir* hypoch. n. 30.

(*a*) L. XIX. p. 156.

(*b*) Ex lege circuitus.

(*c*) p. 406.

(*c**) Ventr. int. c. 8. n. 7. p. 163.

(*d*) p. 422.

(*a*) HELMONTIUS *Jus dæmum* n. 10.

(*b*) n. 41.

(*c*) n. 14.

(*d*) *Blus human.* n. 28.

Risus in splene quondam esse scaturiginem, ut ridere faciat, atque aucta lienis mole homines ad usque ineptiam ad risum incitari (*e*). Et sæpe eosdem homines & ridiculos esse & atrabilarios (*f*) : & risum adimi, exempto (*g*) liene.

Chylum aquosolacteum de intestinis ad lienem adtrahi, coqui, eo id viscus ali, excrementa mitti ad sudorem, ad- renes (*h*), quale quid ARISTOTELES (*i*) olim statuerat.

Demum desperabundi aliqui, & pro inutili habituri, cujus utilitatem ignorabant, esse inutilem & ignavum (*k*), esseque quoddam quasi ad æquilibrium hepatis (*l*) objectum pondus. Ea vetusta est theoria, quam hominibus a primordiis suis splene (*m*) carentibus & animalibus, absque magna noxa lienem (*n*) amittentibus, confirmare studebant (*o*).

Ut brevis sim, risus in liene sedes videtur ex effectu titillationis nata, quæ in plurimis mortalibus risum excitat, quando ilium cutis leviter sollicitatur, ut nulla tamen sinistri lateris super dextrum prærogativa fit.

Æquilibrium inter maximum avium hepar, & minutissimum lienem, nullum cogitari potest.

Inutilem aliquam partem corporis animalis esse, tam late per diversas species regnantem, indignum est dictu.

Etiam majorum, & usu quam maxime conspicuo præditorum viscerum jacturam, robusta animalia aliquando absque conspicuis symptomatibus tolerant, ut magnæ partis pulmonis, aut cerebri (*p*), non certe ideo inutilium.

(*e*) SERENUS SAMMONICUS Ed BURM. p. 275.

(*f*) BOERHAAVE *Prælect.* p. 73.

(*g*) PLIN. l. c. SERENUS.

(*h*) C. HOFMAN Vir eruditissimus, *de liene*. IDEM *apolog.* II. c. 106.

(*i*) *Part. anim.* L. III. c. 7. Vaporem ex ventriculo adtrahere & concoquere.

(*k*) ERASISTRATUS. RUFUS II. p. 59.

(*l*) ARISTOT. *part. anim.* L. III. c. 3. Aequilibre hepati ARRE. *caus. diut.* l. c. p. 135.

(*m*) ARISTOTELES. ROUSSET *de partu Casar.* L. IV. c. 5. C. GEMMA. DRELIN-
COURT *de liene*. POHL *de absentia lienis*.

(*n*) p. 421.


(*o*) Conf. multas hypotheses DRELINCOURT c. 3.

(*p*) Etiam renis VESAL. p. 820. uteri GINZBURGER l. c. &c.

L I B E R X X I I.

P A N C R E A S.

§. I.


ANTIQUIS non ignorata fuit glandula, HIPPOCRATI (a) certe & ARISTOTELI (b), EUDEMO (c), RUFO (d), GALENO (e) adprime cognita, & sequacibus (f), donec a JACOBO SYLVIO fere error incepit, quem alibi refutavimus (g).

Plerisque in animalibus pancreas reperitur: in avibus fere duplex, ut in aquila (g*), falcone (g**), noctua (g***), scope (g†), anate (g††). Tum in quadrupedibus omnibus, & cetis (h), non perinde in omnibus piscibus (i); tamen in plusculis, galeo (k), hufone (l), passere (m), raja (n), torpedine (o), inque frigidi sanguinis quadrupedibus; ut in crocodilo (p), lacerta (q),
rana

(a) *περι σπένδων* n. i. Ad glandulas intestinorum detorquet ALMELOVEEN *novant.* p. 174.

(b) *Isag. anat.* c. 13. p. 13.

(c) GALENUS *de semine* L. II. p. 171.

(d) RUFUS p. 39.

(e) *De usu part.* L. V. c. 2.

(f) ORIBAS p. 108. 110.

(g) p. 362.

(g*) WEPFER *cicut.* p. 173.

(g**) MURAL *vademec.* p. 338. 339.

(g***) Quadruplex dicitur *Eph. Nat. Enr. Dec. II. ann. 4. obs.* 34.

(g†) PARISINI.

(g††) BLAS *anat. anim.* p. 262.

(h) Delphino RONDELET p. 449. *tursone* RAI *Phil. trans.* n. 76. Phoca Nov. *Comm. Pet.* II. p. 376. *Manati* ibid.

(i) In aliis nullum, in quibusdam duo GMELIN apud KLEIN *miss.* V. p. 35. Sed ea quidem pancreata, cum non viderim, non satis certo novi, num veri sint nominis.

(k) PARISINI. CHARLETON *mantiss.* p. 84. COLLINS *tab.* 32.

(l) MARSIGLI *Danub.* T. VI. *tab.* 9. folii vitis figura.

(m) Turbot COLLINS *tab.* 37. f. 3.

(n) IDEM *tab.* 27.

(o) LORENZIN. p. 24.

(p) Maximum & multifidum HASSELQUIST *resa* p. 295. 601. tum JES. SIAMENSES. VESLING *Ep.* V.

(q) HARDEE *apiar.* p. 86. Longissimum vidi in viridi lacerto majori. In salamandra PARIS.

rana (*r*), testudine (*s*), serpente (*t*). Ister conchas in purpura (*u*) dictum est, nescio an recte. Iplis infectis aliquid pancreati simile est (*a*).

Homini aliquanto, quam quadrupedibus, rotundius, brevius, capite crassiori, minus bicornis, quam cani (*b*), leoni (*c*), feli (*d*), lynxi (*e*), marti (*f*), urso (*g*), castori (*h*), hystrici (*i*), erinaceo (*k*), muri montano (*l*), talpæ (*m*), equo (*n*), gazellæ (*o*); cæterum, ut analogiam cum pancreate animalium facile invenias, quam puto ad proprios usus maximam EUSTACHIUS fecit (*p*), forte nimiam (*q*). Sæpe se duplex, ut in bestiis, vidisse ait BLASIUS, inferiori tamen lobo non perinde longo (*q**). Appendicem versus pylorum nominat RIDLEY (*r*). Duo pancreata COLLINS (*s*). *Petit pancreas* WINSLOW (*t*), aliique Galli. Sed res vix tanta est, ut nomen mereatur proprium (*u*): & plerumque pancreas crassum potius, non lunatum, neque ferrum equinum exprimens caput habet (*u**);
cum

(*r*) SWAMMERDAM p. 827. JACOBÆUS p. 48.

(*s*) PARIS. SEVERIN. p. 372.

(*t*) BLAS *anat. anim.* p. 333.

(*u*) *Phil. transf.* Vol. L. P. 2. p. 588.

(*a*) In pediculo SWAMMERDAM *biol.* p. 76. in cruce p. 477. in bombyce MALPIGH. *postb.* p. 57.

(*b*) GRAAF p. II. BRUNNER ubique. COLLINS p. 403. add. BLAS *anat. can.* p. 203. 204. HIGHMORE *tab.* 4. f. 1.

(*c*) Cum ferro equino comparat COLLINS, cum liene BUFFON T. VIII. p. 55. adde BLAS p. 412.

(*d*) COLLINS p. 403.

(*e*) Anulum facere BUFFON T. IX. p. 247.

(*f*) IDEM T. VIII. p. 347.

(*g*) IDEM T. VIII. p. 270.

(*h*) *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 51. BUFFON T. VIII. p. 315.

(*i*) PARIS.

(*k*) BLAS p. 65. BUFFON T. VIII. p. 41.

(*l*) Ibid. p. 233. PARIS.

(*m*) BUFFON T. VIII. p. 93.

(*n*) SNAPE *tab.* 7. f. 3.

(*o*) PARIS.

(*p*) *Tab.* 10. f. 3.

(*q*) MARTINE p. 55.

(*q**) P. IV. *obs.* 14.

(*r*) *Obs.* p. 210.

(*s*) p. 399.

(*t*) WINSLOW n. 224.

(*u*) Etiam monet CAUSEN *de Anodeno* p. 18.

(*u**) Ut in tabula GRAAFII.

cum ejus glandulæ pars transversa multo crassior & longior, quam in EUSTACHII icone, majorem ad caput rationem habeat.

Nempe pars dexterrima pancreatis replet (w) totum arcum finistrum duodeni, quem suo loco dicemus, proxime a pylori valvula incipientem, & a descendente & transversa altera fede ejus intestini comprehensum, ad exitum usque jejuni. Ea fede duodeno est pro mesenterio; pariter nempe vasa sanguinea adducit (x), & pariter quidem tum anteriora alia, alia posteriora: Cæterum ultra limitem duodeni productum, & anteriùs & posteriùs, ei intestino aliquanrum incumbit, & quasi innascitur (y).

Inde pancreas finistrorsum tendit, & gracilescit eundo (z); porroque pene ad finem suum latitudinem suam tenet (a); antrorsum vero migrat, ut conscendat vertebrarum corpora, inde finistrorsum ad posteriora se recipit, & posteriori loco lienis partem sinistram attingat, ad quem finitur, qua lamina mesocoli superior ad inferiorem adjungitur (b). Ante lienem aliqua parte producit, ut lien capsulæ renali, pancreas lienis, pancreati ventriculus, huic hepar insideat. Tota ea fede pancreas cavea mesocoli continetur (c), inter laminam superiorem, & inferiorem, quas diximus convenire hinc ad dextra descendentis duodeni, inde de novo ad lienem. Id mesocolon diximus a membrana externa pancreatis oriri: nempe mesocolon volumus magnæ parti pancreatis pro membrana externa (d) esse, quam non habet, nisi anteriorem superiorem, posteriùs ad vertebra nullam, nisi cellulosam.

Quando ventriculus inanis est, pancreas retro eum ponitur, ut etiam parte sua sinistra, quasi depressa, planitie ventriculi posteriori sub œsophago pulvinum præstet (e). Plenus ventriculus a pancreate discedit, & arcum minorem ei obversum habet.

Neque penitus triquetrum est (f), neque planum cum duabus superfici-
ciebus

(w) EUSTACHIUS *tab. 10. f. 3. Fascic. II. tab. art. celiac. II.* MONRO *l. c. p. 67.*
CLAUSEN *T. I. d.*

(x) *Tab. celiac. II.*

(y) *Ibid. WINSLOW n. 320. In simio COLLINS tab. 18.*

(z) *GRAAF ic.*

(a) *IDEM & nostr. tab. celiac.*

(b) *p. 157.*

(c) *Ibid & tab. art. mesent. d. HENSING. n. 29. WINSLOW n. 320.*

(d) *Ibid.*

(e) *EUSTACHIUS ibid.*

(f) *LIEUTAUD p. 307.*

ciebus (g). Sub lobulo hepatis in dextro latere est, & pone idem in sinistra posteriori facie sua capsulæ renali sinistrae insidet, media aortæ: ad finem crassioris capitis ante vasa magna mesenterica procedit, eaque tegit, in media fere vertebrarum convexitate.

Magnitudo per limites definitur, & pene eadem est, quæ ventriculi: ut EUSTACHIUS partem transversam, justo brevior (h) pinxerit.

Pondus etiam varium est, unciarum duarum cum semisse (h*) trium (i) & quinque (k), ad sex usque (l).

Pondus ad aquam ut 1. 1029. ad 1. 000. (n).

§. II. Fabrica.

Omnino eadem ei est natura cum glandulis salivalibus. Totum nempe fit ex lobis, parum distinctis, qui & ipsi ex minoribus fiunt lobulis; iique minores lobuli & ipsi in acinos (a) discedunt, aqua inprimis injecta conspicuos, neque oculus finem invenit divisionis. Omnes acini, lobuli, & lobi, cellulosa tela macilenta, & fibrosa conjunguntur, tenaciori, ut majores lobi sunt; ut in universum pancreas duriusculum sit, tamen ut nonnunquam adipem recipiat. Ipse sapor idem qui glandularum salivalium est, ut etiam a vulgo (b) & a coquis eosdem ad usus adhibeatur. De fabrica acinorum alias (c) disquisitum est, quos ex vasculis construi (d), cum cellulosa tela suspicamus.

Si cellulæ in pancreate sunt (e), humorem credas in cellulosi textus cavernulis stagnasse.

Frequen-

(g) Superiorem, inferiorem WINSLOW n. 319.

(h) l. c.

(h*) SAUVAGES nosolog. I. p. 499.

(i) CHESELDEN p. 165.

(k) WHARTON p. 72.

(l) HEUERMAN T. III. p. 812.

(m) SAUVAGES embryol.

(n) MUSSCHENBROECK introd. p. 556.

(a) WINSLOW n. 321. GRAAF ic.

(b) Bocca saporita CARP. Isag p. 12. in MUNDINUM p. CXX. b.

(c) L. VII.

(d) RUYSCH Tbes. IV. n. 94. VIEUSSENS nov. vas. system. p. 453.

(e) In crocodilo HASSELQUIST p. 291.

Frequentes (*f*) in pancreate, ut in parotide & aliis glandulis scirrhifunt: neque rari abcessus (*f**), etiam cancrofi (*f***). Utrumque malum ipse vidi (*g*).

§. III. *Vasa. Arteria.*

In non maximo viscere numerosissimi sunt trunci arteriosi, ut fere tædio narranti sint, & magis etiam legenti. Multas nempe, sed plerasque minores arterias habet.

Caput, sive pars crassior, & anteriorem habet circulum arteriosum (*a*), & similem posteriorem (*b*), a quo ad pancreas & ad duodenum rami eunt.

Anterior fit ex ramo arteriæ duodenalis, sub valvula pylori nato; *Pancreatico*, se circa cavum arcum duodeni descendentis circumflectente (*c*); & ex contrario ramo arteriæ mesentericæ (*d*), transversim secundum duodeni imum finem circumducto; deinde in descendente duodeno cum priori in unum truncum coalescente. Etiam cum transverso pancreatis communicat (*e*).

Posterior arcus similem fere originem habet, superius ex arteria duodenali posteriori sive superiori (*f*), inferius aut ab ejusdem rami mesentericæ

(*f*) Frequentes esse eos scirrhos BARTOLETTI p. 267. & sedem morborum diuturnorum FERNEL. *pathol.* L VI c. 6. Exempla habent PAW *obs.* 14. MILITIA p. 74. BOHN *exper. fall.* n. 68. PETERMANN *Dec.* II. *obs.* 6. CHESLENDEN p. 66. RIDLEY *obs.* p. 157. 162. VATER *divert.* p. 28. KERKRING *obs.* 65. EYSEL *de gland.* p. 25. BUDDÆUS l. c. p. 35. NIETNER *de gland. natur.* p. 25. KERKRING *obs.* 65. CHARLETON *Exerc. patholog.* p. 126. DILTHEY *obs.* 8. *Journ. de Trév.* ann. 1707. Janvier BAGLIV. SALZMAN *de miro abscessu* G. V. SWIETEN T. III p. 151. Pancreas tumidum pure plenum, ut corpus converti sine dolore non posset TULP. L. IV. c. 33. Pene catilagineum pancreas: unde vomitus MORG. *Sed. caus. morb.* II. Ep. 30.

(*f**) PLANCUS *Acad. conjectur.* p. Cl. Pondere 13. librarum STORK II. p. 248.

(*f***) Ut ventriculum adroderet HASENOEHL p. 60. 61. Saniosum RIOLAN p. 110. Hepatis mole in THUANO.

(*g*) Steatomata FONTANUS ad VESAL. *Epist.* p. 21.

(*a*) *Tab. art. celiac.* II.

(*b*) Pars in *tab.* I.

(*c*) *Art. celiac.* not. s. cum ramo e. *tab. celiac.* II. Duodenale WINSLOW III. n. 186. IV. n. 325.

(*d*) *Tab. Cæl.* I. s. *Tab.* II. *art.* d. & in ic. f. *tab. mesent.* p. 44. Etiam ex colica media p. 49. *Fusc.* VIII. p. 36. WINSLOW n. 325. III. n. 197.

(*e*) *Id.* II. *Cæl.* 9.

(*f*) *Art. Celiac.* *tab.* I. ad P. & M. not. p.

mesentericæ arteriæ altero furculo (*g*), aut ab alio ramo arteriæ mesentericæ. Eadem tota nonnumquam a mesenterica prodiit, aut & a cæliaca & a mesenterica ejusmodi duodeni prima adfuit (*h*). Accedunt ad eum circulum ramuli pyloricarum superiorum, inferiorum (*i*).

Eadem pancreatica inferior dat etiam plerumque arteriam *transversam* (*k*) pancreatis, posterius sinistrorsum per duas tertias glandulæ redeuntem. Eam etiam mesenterica generat (*l*). Exiguos ad mesocolon ramos spargit; & cum coronariæ, splenicæ, mesentericæ ramis pancreaticis coit.

Ad crassam eandem pancreatis partem etiam splenica (*m*), supremum ramum mittit, etiam ante divisionem ortum (*n*), vel ex mesenterica (*o*), vel ex aorta demum (*p*). Ea & descendit ante pancreas, & cum phrenica etiam convenit (*q*). Sed etiam hepatica (*r*) eo ramum dat, aut coronaria magna (*s*) proprium ramum deorsum mittit.

Primus etiam ramus mesentericæ in pancreas absumitur (*t*), aut pluresculi pro uno sunt (*u*).

Iterum exigui ramuli eo veniunt a capsulari, a phrenica.

Pars reliqua pancreatis ramos identilem recipit ex trunco lienali (*w*), etiam ex ipso liene (*x*) & ex gastroepiploica sinistra (*y*).

Venæ ex truncis similibus nascuntur; gastrocolica (*z*), mesenterica, splenica (*a*), duodena (*b*), arteriarum in universum similes.

Non

(*g*) Tab. I. not. *p*. Tab. II. not. *d*. & in iconæ Tab. II. *E* & tab. art. mesent. p. 44. 45. Fasc. VIII. p. 36.

(*h*) Fasc. VIII. p. 33. 46.

(*i*) Tab. II. cæliac.

(*k*) Tab. Cæl. I. not. *q*. tab. 2. d. not. *b*. Fasc. VIII. p. 33. 34.

(*l*) Et colica sinistra Fasc. VIII. p. 36.

(*m*) Tab. art. cæl. I. not. *l*. tab. II. Y. c.

(*n*) Art. cæliac. tab. 2. c. not. *c*. Fasc. VIII. p. 32.

(*o*) Ibid.

(*p*) Ibid. & art. mesent. Tab. p. 44. Fascic. VIII. p. 36. Cum splenicis & duodenis primis coit.

(*q*) Fasc. VIII. l. c. p. 32.

(*r*) Conf. Fasc. VIII. not. *c*. p. 32.

(*s*) Tab. art. mesent. p. 45. Fasc. VIII. p. 32.

(*t*) Art. mesent. Tab. p. 44.

(*u*) Ibid.

(*w*) Not *e*^{*}. ic. *i*.

(*x*) Cæliac Tab. II. not. *c*.

(*y*) Tab. II. not. *g*.

(*z*) WINSLOW III. n. 245.

(*a*) RUYSCH Epist. IV. tab. 4. f. 2. E. E.

(*b*) LEONICEN p. 91.

Non valde sanguineum viscus est vel coloris argumento. Nam albet.

Divisio vasorum est, ut in salivalibus glandulis, ut trunci per cellulofam tunicam incedant, rami majores lobos pariter majores, rami minores lobulos, minimi ramuli acinos adeant.

Num pancreas lymphatica vasa habeat? ignoro, & dubito (c). Quæ adeo frequenter (d) apud seculi prioris scriptores nominantur, ea fere ad spurium illud ASELLII (e) pancreas (f) pertinent.

Nervi non magni, nondum, ut puto, plene descripti, a plexu posteriori ventriculi (g), ab hepaticis (h), a splenicis (i),

Obtusi adeo sensus esse crediderim.

§. IV. Ductus excretorius.

Sed imprimis celebre vasis nomen est, quod pancreati proprium, ad duodenum succum in ea glandula secretum defert.

Antiquissimis temporibus notum fuisse invenio. Nam ex veteribus GALENUS glandulas humorem viscidum salivæ similem adfundentes, ad intestina fitas dixit (a), de quibus lis inter Eudemum & Herophilum nata sit; & alibi, glandulas ad intestina positas ad servandam viscositatem (b) memorat. EUSTACHIO (c) nuper inventus (d) tribuitur, qui nimis est manifestus ductus choledochus (e).

Inde longo intervallo demum circa annum 1641. in animalibus ejus memoria

(c) Negat J. Mauricius Hofman *Idea* p. 44.

(d) Habet Pecquet contra Riolanum p. 116. Marchett p. 40.

(e) Vesling. Asellius, de Cruyce apud Barthol. *anat.* p. 113.

(f) De iis monet Graafius p. 88. l. c. J. v. Hørne in *diff. de ductu chylif.* p. 278. Transeunt verum pancreas, nec inseruntur Drelincourt *canicid.* p. 16.

(g) Ex intercostalibus L. X. p. 262. Ex vagis p. 237.

(h) Winslow n. 406. L. X. p. 263.

(i) Winslow n. 408.

(a) *De semine* L. II.

(b) *Ibid.* & *de utilit. part.* L. XIV. c. II.

(c) *Tab.* XI.

(d) In *apologia* Cal. Petrioli p. 29.

(e) Conf. Cl. Girardi p. 20. 21. cum ductus pancreaticus non per superficiem pancreatis integri decurrat, & in eo profunde lateat.

memoria renovata est. MAURITIUS quidem HOFMANNUS (f) Patavii cum ductum, in gallo indico visum, J. Georgio WIRSUNG, medico bavaro ostendit, adque HOFMANNUM a plurimis Germanis (g) novi inventi decus refertur; ut etiam solenni quotannis convivio ejus inventi gloria concelebretur.

Plerique tamen ad WIRSUNGUM ipsum referunt, qui paulo post, anno 1642. iconem sculptam hujus ductus ex homine dedit, quam J. B. MORGAGNI, viri summi, beneficio coram video: & quam aiat, in elogio, esse ad multa corpora humana factam, cum præterea Vir Cl. in numerosissimis animalibus novum ductum sit persecutus (h), in eo verus inventor, Nihil enim edidit HOFMANNUS. Neque tamen ex invidia (i) tanti inventi (k), neque a scoto medico (l); sed a Dalmata (m) quodam egregius juvenis paulo post glande plumbea trajectus occubuit (n). Anno 1644. Fr. SYLVIVS (o) ejus ductus iconem dedit, eumque nova hypothese ornavit (p), uti potro ab ejus discipulo REGNERO de GRAAF ejus historia imprimis exulta fuit.

Late regnat autem hic canalis, tam late, quam ipsa glandula, estque numerosissimis incisionibus confirmatus: inter quadrupeda, in simio (q), pygmæo (r), elephante (s), equo (t), vitulo (u), ove (w), cervo

(f) BARTHOLIN. *anat. reform.* p. 113. Auctor & ipse est, ante WIRSUNGUM esse ab HOFMANNO detectum. Luculentus præterea testis est SCHENKIVS *exerc. anat.* p. 343. qui diserte scribit, ansam inquirendi WIRSUNGUM dedisse curiositatem discipuli sui HOFMANNI.

(g) RIVINO: FRANK *bon nov. anat.* n. 21. WELSCHIO *tab.* p. 41. GOELICKIO *hist. anat.* p. 227. J. M. HOFMAN in *idea* p. 42. BAYERO *biograph. altorfm.* p. 98. ex BARTHOLINO: MERCLINO *de feliciore nunc medicina* p. 4.

(h) RIOLAN. p. 812.

(i) De WIRSUNGUM quidem conquestus erat præceptor ejus VESLINGIVS, quod nolisset iconem novi ductus sibi demonstrare BARTHOLIN *præf. ad LYSERI cultur.* Nihil tamen in vita VESLINGII est, tanto scelere dignum.

(k) GRAAF in *princip.* GOELICKE. BOERHAAVE *Prælect.* T. I. p. 54.

(l) LEONICENUS *metamorph. apoll. & asculap.* p. 83.

(m) MORGAGNUS *ibid.* p. 85.

(n) Anno 1643. M. August. d. 22. MORGAGNUS *Epist.* p. 83.

(o) Quæ est in Ima editione GRAAFII T. I. & apud PLEMPIVM *fundam. med.* p. 13.

(p) LINDEN *physiol.* p. 117.

(q) PARIS.

(r) TYSON p. 32.

(s) Amplius MULLINS p. 23.

(t) SNAPP *tab.* 7. f. 3. HORNE *præf.*

(u) GRAAF HIGHMOR p. 72.

(w) HIGHMOR.

cervo (x), rupicapra (y), gazella (z), cane (z^*), vulpe (a), fele (b), civetta (c), leone (d), tigride (e), catopardo (f), panthera (g), putorio (h), lutra (i), castore (k), urso (l), hystrice (m), lepore, cuniculo (n), mure (o), erinaceo (p), sciuro volante (q), porco (r), phoca (s), delphino (t), manati (u).

Inter quadrupeda frigida, in testudine (w), chamæleonte (x), crocodilo (y), salamandra (z), rana (a), serpente (b).

Inter aves in struthiocamelo (c), casuario (d), butauro (e), ardea

- (x) PARISINI.
- (y) PARIS.
- (z) IDEM.
- (z^*) AMST. p. 21.
- (a) PEYER p. 53.
- (b) SCHRADER *anim. carniv. digest.* p. 14. GRAAF WIRSUNG.
- (c) PARIS.
- (d) PARIS.
- (e) BLAS p. 121.
- (f) DUVERNOI *Comm. Acad. Petrop. Vol. I.* p. 342.
- (g) PARIS.
- (h) CALDESI *tab. 5. f. 6.*
- (i) IDEM *tab. 5. f. 8. & in Nov. Comm. Petrop. T. II.*
- (k) *Act. erud. ann. 1684. p. 363. Mém. de l'Acad. 1704. p. 51.*
- (l) *Comm. litt. nor. ann. 1734. n. 38.*
- (m) DUVERNEY II. p. 545. PARIS.
- (n) GRAAF p. 24. BLAS p. 63.
- (o) SCHRADER p. 23. WIRSUNG.
- (p) PEYER *obs.* p. 80.
- (q) *Act. petrop. T. V.* p. 233.
- (r) GRAAF WIRSUNG.
- (s) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 9. 10. obs. 93. HARTMAN in anat. phocæ.*
- (t) FANTON. p. 110.
- (u) *Comm. nov. Petrop. T. II.* p. 376.
- (w) CALDESI p. 51. PARIS.
- (x) VALISNERI T. II. p. 416.
- (y) PARIS. HASSELQUIST p. 601.
- (z) PARIS.
- (a) JACOBÆUS p. 78. WIRSUNG.
- (b) BLAS p. 333. BRUNNER *pacer.* p. 85.
- (c) *Hist. de l'Acad. 1754. n. 6. VALISNERI *notion d'un struthio* p. 245.*
- (d) PARIS.
- (e) GRAAF.



dea (*f*), grue (*g*), ave regia (*h*), scope (*i*), ibide (*k*), cicō-
nia (*l*), pelicano (*m*), phœnicoptero (*n*), aquila (*o*), vulture
nudi colli (*p*), falcone (*q*), pica (*r*), cornice (*s*), corvo (*t*), cor-
vo marino (*u*), anser (*w*), anate (*x*), tarabuso (*x*^{*}), arquata pa-
voncello (*y*), gallina (*z*), etiam ægyptia (*a*), gallo indico (*b*),
phasiano (*c*), tarda (*d*), columba (*e*).

Inter pisces eum ductum dicitur habere torpedo (*f*), raja (*g*), squa-
tina (*h*), galeus (*i*), harengus (*k*), rhombus (*l*). Eorum aliquibus,
aut omnibus forte, hic pancreaticus ductus fuerit appendix pylorica.

§. V. *Fabrica in homine.*

Cum in hos canales sæpe inquisiverim, ero paulo in dicendo fusior.

In

- (*f*) COLLINS *tab.* 23. SCHRADER.
- (*g*) CALDESI *tab.* 5. f. 3.
- (*h*) PARIS.
- (*i*) IDEM.
- (*k*) IDEM.
- (*l*) IDEM.
- (*m*) IDEM.
- (*n*) IDEM.
- (*o*) IDEM *ic.* BORRICH.
- (*p*) PARIS.
- (*q*) PEYER *p.* 108.
- (*r*) GRAAF.
- (*s*) PEYER *obs.* 44.
- (*t*) SCHRADER *p.* 27. PEYER *p.* 101. 106.
- (*u*) PARIS. GRAAF.
- (*w*) GRAAF REDI *tab.* 7.
- (*x*) GRAAF.
- (*x*^{*}) CALDESI *ibid.* f. 4.
- (*y*) REDI *anim. viv. tab.* 7.
- (*z*) GRAAF,
- (*a*) PARIS.
- (*b*) HOFMANN GRAAF.
- (*c*) GRAAF.
- (*d*) PARIS.
- (*e*) GRAAF.
- (*f*) LORENZINI *p.* 24.
- (*g*) COLLINS *p.* 400. STENO *musc. gland.* *p.* 42.
- (*h*) IDEM.
- (*i*) CHARLETON.
- (*k*) Oeconom. *Nachricht.* T. IX. *p.* 117.
- (*l*) COLLINS *tab.* 37. f. 3.

In universum, ut glandula, ita ductus, salivalium similis est, & potius aliquanto tenerior, membranaceus, compressus, albus (a), parum vasculosus; nisi injectio anatomica accesserit, diametro calami majoris, minorisve (a*). Surculi primi ex minutissimis acinis nascuntur, cumque aliis sui similibus in ramulos majores (b) venoso more confluent, quales, cum longus sit ductus, plurimi ab utroque limite pancreatis in principem ductum confluent, dum sensim a liene versus duodenum eundo diametro augetur. Eorum vero nullus memoria dignus est, nisi ille quidem (c), qui ex pancreatis parte, intestini duodeni transversam secundam partem sequente, nonnunquam grandior advenit, ad paucas cis ostium lineas: nam sæpe, ut ea portio non longa est, neque bicornem figuram pancreati impertit, ita & iste ramus minor est (d). Idem seorsim nonnunquam, & proxime ostium duodenale, in intestinum aperitur (d*).

Ductus ipse anteriora aliquanto glandulæ suæ tenet, nusquam nudus, & trans vertebrae, anterieus quam vasa mesenterica, transversus, sed cum alternis flexibus, accedit demum ad sedem descendentem duodeni, a tribus a pyloro uncis ad sex (e). Ibi mutato ductu, deflectit, ut cum choledochus confluat; cumque eo ductu conjungitur in canalem majorem (f), intus tamen levem; mucosum, similemque intestini, qui per cellulosa telam secundam (g) aliquot lineis, deinde per tertiam, pergit oblique, demumque in ima & posteriori (h) parte flexus secundi & descendentis intestini duodeni (i), in eminente (k), transversa (l), longe caudata
intestini

(a) WINSLOW n. 322.

(a*) CHESLDEN p. 166. *Digiti a morte capax Payer parerg.* p. 183.

(b) WINSLOW n. 322. GRAAF *tab. 1. Excarnatus CHESLDEN tab. 25. BIDLOO tab. 36. f. 2. KERKRING obs. 75.*

(c) PERMP *fundam.* p. 130. cum ic. WHARTON p. 72. WINSLOW n. 324. ORTIOB. p. 120.

(d) GRAAF l. c. F. HIGHMOR. *tab. 4. f. 2.*

(d*) WINSLOW n. 324

(e) Prope pylorum in pygmæo TYSON p. 20. in tertium ventriculi saccum tursioni *Phil. transf.* n. 76. Celerius coire FABRIC. *progr.* ann. 1750.

(f) CHESLDEN t. 25.

(g) ORIBAS. p. 124. J. GIERING *Scel. Francf.* T. III. p. 370. CHESL. *tab. 25.*

(h) In icone VIRSUNGI.

(i) EUSTACH. t. 10. f. 3.

(k) DUVERNEY *posth.* T. II. p. 256. RIDLEY *obs.* p. 197.

(l) WINSLOW n. 288. BACK p. 106. SANTORIN. c. 9. n. 8. MORGAN *Epist.* I. n. 37.

intestini ruga, rima (*m*) sua patet, oblonga (*n*), & altero in fine angustiori. Hæc est pelviformis dilatatio choledochi ductus, in quam aiunt pancreaticum ductum aperiri (*o*). Nam & ego vidi nucis juglandis capacem fuisse. Ductus autem pancreaticus est, superius brevior, infra longior, utique (*p*) latissimus, qua patet, absque sphinctere (*q*) & valvula (*r*), neque unquam deposito levore, qui ei propius est, cum ductus biliaris (*s*) totus reticulatus sit. Stilus etiam ex intestino rectius & facilius in pancreaticum, quam in bilarium ductum subit (*t*).

Aliquantum a regressu cibi ex intestino defenditur ipsa mobilitate mollis & eminentis colliculi, tum quod pressio, ab interioribus nata, tunicas intestini propius ad se invicem urgeat, & interceptum ductum comprimat (*u*). Inflato intestino non inflatur; neque potest fieri, quin in motu peristaltico, quando intestinum arctatur, ductus perinde claudatur (*x*). Quare laxo intestino, & neque distento, neque contracto, se evacuat. Vermes, qui in seipsis motus habeant principium, subiisse visi sunt (*y*). Adjuvat etiam motum legitimum succi pancreatici pressio incumbentis hepatis, ventriculi, subjectæ aortæ, arteriæ mesentericæ; innatæ splenicæ.

Nunc quidem ductus uterque non communicat, nisi per confluentem, in quo etiam valvulam aliqui Cl. Viri posuerunt (*z*). Neque tamen ita accurata est custodia, quin frequenter satis bilis in ductum pancreaticum

(*m*) Recte BACK & WEPFER Papillam non bene & vocant & pingunt.

(*n*) WINSLOW n. 288.

(*o*) BERTRANDI p. 23. VATER de bilis divert. WALTHER tab. celiac.

(*p*) Habet GLISSON p. 146. 147. LYSER cult. p. 49. BIDLOO tab. 36. f. 2.

(*q*) WINSLOW adde MORGAGN. l. c.

(*r*) Multi dixerunt adesse valvulam, ut VIDUS p. 265. ORIBAS. p. 125. LEONICE-
NUS p. 120. BARTHOLIN. Epist. ad WORM p. 691. 8^o anat p. 150. LORENZ singul.
ad vesicul. fell. p. 20. Duas membranulas propendentes facientes ne quid regurgitet, ha-
bet VESALIUS p. 624. & JASOLINUS p. 53. Frenulum adesse LIEUTAUD p. 273. & SAN-
TORINUS p. 108. Valvulam MORGAGN. Ep l. n. 31. Protuberantiam, non valvulam, olim
FABER ad HERNANDEZ & DIEMERBROECKIUS

(*s*) Contra hæc, facilius subire in choledochum LORENZ. BOHEMER pref. ad Fascic.
obs. p. XIII. WINSLOW n. 322. 289. & fere vulgo.

(*t*) Canaliculum communem utrique non male WEPFER cicul. p. 120. & CHESLE-
DEN tab. 25 Sic in elephante BILFINGER varia T. II. p. 196.

(*u*) ORIBAS.

(*x*) A fungis mors: ductus choledochus quasi a ligamento adstrictus. Méms. de l'Acad.
des scienc. 1749.

(*y*) MAUCHART de lumbric. in duct. pancreat.

(*z*) Primæ. Polon. l. c. Sed nulla est, quod certo vidi.

creaticum transeat (*a*). Idem ductus cum ramis suis per pancreas dispersis (*b*) aliquando bile plenus fuit, ipso rem ita declarante auctore, qui *diverticulum* (*c*) *bilis* ramosum descripserat, cavernosum, quod per cysticum ductum replevisset & per choledochum, & in quo Vir Cl. cum pancreatico succo bilem credebat misceri, multi-que ramis utrumque ductum conjungi.

Ita se plerumque in homine habet (*d*), ut & simplex ductus sit, & cum ductu choledocho communi osculo aperiatur. Simplex etiam in plurculis animalibus est, simio (*e*), bove (*f*), ove (*g*), elephante (*h*), lepore (*i*), cuniculo (*k*), sciuro volante (*l*), mure (*m*), etiam montano (*n*), hystrice (*o*), cane (*p*), fele (*p*^{*}), catopardo (*q*), leone (*a*), tigride (*b*), panthera (*c*), urso (*d*) lutra (*d*^{*}), civetta (*e*), porco (*f*), phoca (*g*).

Inter

(*a*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 2. obs. 165. MORGAGN. adv. III. p. 35. BARTHOLIN. anat. p. 114. In elephante MULLINS p. 23. Huc CRAANENII observatio, flavum esse p. 672.*

(*b*) Adgnoscat VATER *mus. propr. p. 49. add. Bresl. Saml. ann. 1721. M. April Unicam esse observationem, neque satis fidam, jam in progr. de diverticulo p. 28. fassus erat vir egregius.*

(*c*) *Progr. ann. 1720. & in hepat. insout. tum in proprio libello p. 22. 23.*

(*d*) GRAAF p. 16.

(*e*) PARIS. II. p. 59.

(*f*) GRAAF HIGHMOR. *tab. 4. f. 3.*

(*g*) HIGHMOR l. c. f. 4.

(*h*) MULLINS p. 23. PARIS. P. III. p. 131.

(*i*) GRAAF

(*k*) IDEM.

(*l*) DUVERNOY l. c.

(*m*) GRAAF SCHRADER p. 20.

(*n*) DUVERNEY *posth. II. p. 545. PARIS. P. II. p. 41. 43.*

(*o*) PARIS P. III. p. 18.

(*p*) SCHRADER p. 23. nempe aliquando.

(*p*^{*}) SCHRADER p. 23. 24. GRAAF.

(*q*) DUVERNOY l. c.

(*a*) PARIS.

(*b*) PARIS. P. III. p. 11. cum valvula.

(*c*) PARIS.

(*d*) *Comm. litt. nor. l. c.*

(*d*^{*}) CALDESI *tab. 5. f. 8.*

(*e*) IDEM III. p. 20.

(*f*) GRAAF.

(*g*) HARTMANN *anat. p. 9.*

Inter aves in grifone (*b*), pelicano (*i*), struthione (*k*), casuario (*l*), corvo marino (*m*), ciconia (*n*). Inter frigida ovipara in vipera (*o*), testudine (*p*), rana (*q*), salamandra (*r*).

In piscibus, in lucio (*s*), anguilla, cyprino (*s*^{*}), mullo barbato (*t*), raja, squatina (*t*^{*}), galeo (*u*), harengo (*w*). Sed hic iterum dubius sum, num de vero pancreate sermo sit.

§. VI. *Duplex ductus pancreaticus.*

Varietas in hoc canale multiplex est. Et in homine quidem aliquoties duplicem vidi, ea quidem ratione, ut ductus princeps ramum minorem per illud quasi caput pancreatis, emitteret, seorsim, & alio loco intestino insertum, constanter minorem.

Alias vidi, hunc ramum minorem ductus principis, superius isti inferi & pyloro propius, ad pollicis distantiam, & in alio cadavere ad fesqui pollicem, cum major ille consueto more cum choledocho ductu uniretur (*a*).

Similiter Cl. Viri viderunt, secundum ductum, a capite illo pancreatis natum, seorsim insertum; ut duo essent ductus (*b*) pancreatici.

Alterum supra vulgarem insertum vidit ILL. TARGIONUS (*d*). Bre-
vem

(*b*) PARIS III. p. 215.

(*i*) PARIS III. p. 197. Ibid.

(*k*) Hist. de l'Acad. ann. 1754. n. 6. & in diff. des anim. ic. II. p. 140.

(*l*) IDEM II. p. 164.

(*m*) IDEM I. p. 220.

(*n*) IDEM III. p. 70.

(*o*) GRAAF p. 17. Serpente BLAS p. 333.

(*p*) PARIS II. p. 185. CALDESI p. 51.

(*q*) JACOBÆUS p. 48. cum notabili ductu.

(*r*) PARIS III. p. 80.

(*s*) GRAAF p. 16.

(*s*^{*}) COLLINS tab. 37. f. 3.

(*t*) GRAAF p. 17.

(*t*^{*}) CHARLETON mantiss. p. 84.

(*u*) PARIS.

(*w*) Oeconomi. Abbandl. T. IX. p. 117.

(*a*) Ita PAULI in pref. ad J. v. HORNE microcosm. PETSCH diff. n. 81. tantum ut minor ductus inferiori loco foret.

(*b*) BLAS obs. 14. Part. IV. ORTLOF apud HEUCHER ars mag. anat. p. 61. WINSLOW n. 324. HEUERMAN T. III. p. 810. VERDIER: puto etiam BOEHMER pref. ad fasc. obs. p. XIII.

(*d*) Obs. p. 139.

vem solito loco, longiorem & paulo inferius apertum *VIRSUNGUS* [e]. Duos pancreaticos ductus sibi parallelos, & pariter tamen uno ostio apertos [f] *CL. HEUERMANN*.

Et in universum duplicis in homine ductus numerosa exempla exstant [g].

In animalibus, quibus longa sunt pancreata, res adhuc frequentior est, ut duo [h] ductus sint, qui tamen aliquando ante insertionem uniantur [i]; alias & frequenter, diversis ostiis ad intestina pateant.

Ita in cane vidi [k], & alii *CL. Viri* in erinaceo [l], equo [m], rupicapra [n], panthera [n*], catopardo [n**], lutra [o].

In avibus [p], ut prælonga pancreata, ita fere perpetuo duo ductus sunt, ut in gallo calecutico [q], ægyptio [r], phasianio [s], tarda [t], anseris [u], arquata [w], pavoncello [x], butauro [y].
ibide

[e] *Ad RIOLANUM* in ejus oper. p. 812.

[f] *HEUERMANN* l.c. Ita fere *BARTHOLIN.* Cent. I. Hist. 32. *GRAAF* p. 17.

[g] *MARCHETT.* p. 40. *RHODIUS mantiss.* obs. 30. *MOINICHEN Epist.* 70. Cent. II. *BARTHOL.* *BORRICH* ad *BARTHOL.* Epist. 51. Cent. IV. *BLAS* obs. 16. P. IV. & P. III. obs. 4. *COLLINS* p. 399. *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. ann. 3. obs. 165. de *GRAAF.* *SCHNEHAMMER* progr. anat. n. 22. *RUYSCH* in obs. post. de valvulis n. 12. *SCHRAEDER* Dec. II. n. 2. *BUCHNER* miscell. ann. 1717. p. 252. *DRAKE* anthropol. L. I. c. 15. p. 94. Frequens esse *HENSING* de periton. p. 4.

[h] De brutis universis *MURALT* p. 381.

[i] Bifurcus *PEYER* merycol. p. 54. *BLAS* anat. canis p. 203. 204. *HIGHMOR.* l. c. §. 7. In cane locus conjunctionis brevis est.

[k] *BLAS* obs. 14. p. IV. *GRAAF* p. 17. *PEYER* obs. p. 68. 76. *WEPFER* cicur. aquat. p. 201.

[l] *PEYER* obs. p. 80.

[m] *Job. V. HORN* l.c.

[n] *PARIS.* P. I. p. 210.

[n*] *PARIS.* P. III. p. 20.

[n**] *DUVERNOI.*

[o] *MOEHRING* *Eph. Nat. Cur.* Vol. V. obs. 44.

[p] In universum *STENONIUS* musc. & gland. p. 39.

[q] *GRAAF* p. 17.

[r] *PARIS.* III. p. 56.

[s] *GRAAF.*

[t] *PARIS.*

[u] *GRAAF.*

[w] *CALDESI* tab. I. f. 4. *REDI.*

[x] *REDI* tab. 7.

[y] *PARIS.* III. p. 47. *GRAAF.*

ibide [*y**], phœnicoptero [*z*], scope [*a*], ave regia [*b*], corvo aquatico [*c*], corvo terrestri [*d*].

Frequenter tamen & si duo sunt ductus, cis insertionem uniuntur [*d**]; ut in prioribus [*e*] diximus.

In crocodilo duo sunt [*f*].

Demum triplex est ductus in gallis cortinis [*g*], columbis [*h*], picis [*i*], aquila [*k*], ardea heron [*l*], pelicano onocrotalo [*m*]. Exempla sunt etiam numerosiorum, etiam in humano genere ductuum [*n*], inque cane [*o*], & castore [*p*].

§. VII. *Conjunctio cum ductibus biliaris.*

Majoris in physiologia momenti hæc est consideratio; nempe primumque equidem ductus pancreatici & biliaris conjunguntur, aut sibi sunt proximi, est tamen ubi longe distant.

In homine multo vulgatius est utrumque ductum conjungi [*a*], aliquando canale medio [*a**]: non tamen valde rarum est, alio loco biliarium se in duodenum intestinum aperuisse, alio pancreaticum [*b*].

Inter

[*y**] IDEM ibid. p. 70.

[*z*] IDEM.

[*a*] IDEM II. p. 9.

[*b*] ID. P. III. p. 204. huic pancreata distincta sunt.

[*c*] IDEM.

[*d*] SCHRADEE p. 29.

[*d**] WHARTON p. 71.

[*e*] p. 441.

[*f*] PARIS. III. p. 169. 170.

[*g*] GRAAF p. 17.

[*h*] IDEM.

[*i*] IDEM.

[*k*] PARIS. II. p. 95. Sed CALDESI tab. 5. f. 6. duos facit.

[*l*] COLLINS tab. 23.

[*m*] REDI tab. 7. cum PARISINI unicum faciant.

[*n*] VIRUSSENS l. c. p. 219. WINSLOW n. 325.

[*o*] SCHRADEE l. c. p. 19.

[*p*] Mém de l'Acad. 1704. p. 51.

[*a*] p. 440.

[*a**] BRUNNER de pancr.

[*b*] BARTHOLIN. Epist. 56. & 70. Cent. II. VESLINGE. Epist. 57. SCHRADEE Dec I. obs. 1. 7. PEYER obs. 1. 7. BRUNNER pancr. p. 117. BLAS P. III. obs. 4. SCHILHAMMER progr. valedict. n. 26. ALBINUS apud HAYMAN Comm. T. III. p. 409. RIDLEY l. c. Brest. Saml. Suppl. IV. p. 61. ibid. ann. 1720. p. 374. RIDLEY. Duobus digitis super choledochum HUMMEL in diss. de perfor. ventr. obs. 8. Duobus digitis sub biliaris BEHR de pancreate p. 20.

Inter quadrupeda, quibus unicus plerumque pancreaticus ductus est, conjunctum habet cum bilario pancreaticum elephas [c], ovis [d], cervus [d*], rupicapra [e], gazella [e*], pygmæus [f], felis [g]; etiam zibethica [h], tigris [i] (subinde), leo [i*], catopardus [k], vulpis [l], lutra [m], ursus [n], phoca [o].

Inter pisces harengus [o*], galeus [o**], torpedo [o***] alii [o†]: Si certe sunt veri ductus pancreatici.

Proximos, sed diversos tamen, habent, tigris in aliis corporibus [p], equus [p*], marmota [q].

Inter aves corvus marinus [r], gallus indicus [s], casuarius [t], pelicanus [u], butaurus [u†], falco [u*]. Inter quadrupeda frigida serpens [w] testudo [w*], salamandra [w**].

Diversum

[c] MOULINS PARIS. III. p. 31.

[d] HIGHMOR.

[d*] PARIS. III. p. 76.

[e] IDEM I. p. 210.

[e*] IDEM I. p. 106.

[f] TYSON p. 32.

[g] SCHRADER p. 14. PEYER obs. 21. GRAAF p. 18.

[h] BLAS anim. p. 260. Amstel. p. 21. PARIS. I. p. 167.

[i] BLAS p. 121 PARIS.

[i*] PARIS. I. p. 18.

[k] DUVERNOI l. c.

[l] PEYER obs. 53.

[m] CALDESI tab. 5. f. 8.

[n] Comm. Lit. Nor. l. c.

[o] HARTMANN l. c. p. 9.

[o*] Oecon. Abhandl. l. c. p. 117.

[o**] CHARLETON mantiss. p. 84.

[o***] LORENZINI.

[o†] GRAAF p. 18.

[p] PARIS. III. p. 10. 11. alias conjunctum, alias proximum.

[p*] SNARE tab. 5. f. 3.

[q] PARIS. III. p. 38.

[r] IDEM I. p. 218.

[s] IDEM ic. I.

[t] IDEM P. II. p. 164. & in ic.

[u] IDEM III. p. 197.

[u†] REDD tab. 23. f. 4.

[u*] PEYER p. 108.

[w] BRUNNER p. 85.

[w*] CALDESI p. 51.

[w**] PARIS. III. p. 80.

Diversum a principe ductu biliarium habet finia [x], porcus [x^*], canis [y] (ad duas uncias iste), erinaceus [y^*], vulpecula isatis [z], ciconia [a], corvus [a^*].

Longe demum distantes pancreatis ductus & fellis, & ad tres quartas ulnas in castore [b]: longe in hystrice [c]. In vacca spithama [c^*]; longe in cuniculo & lepore [c^{**}]. Sic in struthione [d].

Inter animalia, quæ duos habent ductus pancreaticos, ea plerumque vel alterum cum choledochō conjunctum habent [e], vel proximos etsi distinctos omnes. Ita in panthera [f] cane [g].

Inter aves in phoenicoptero [g^*], ibide [h], scope [i], grue [k], ave regia [l], gallina ægyptia [m], tarda [n], corvo [o], ardea [p], anate platyryncho [q], vanello [r], numenio [s], arquata [t].

Inter

[x] GRAAF p. 18. 21.

[x^*] IDEM ibid.

[y] CHESSELDEN p. 166. HIGHMOR. tab. 4. f. 1. p. 72. BLAS anat. canis p. 190. PEYER obs. 11. SCHRADER p. 20.

[y^*] SCHRADER n. 24.

[y^{**}] Comm. Nov. Acad. Petrop. Vol. V. p. 361.

[a] PARIS. III. ic. & p. 70. non valde longe distantem.

[a^*] PEYER obs. p. 101. 106.

[b] Act. erud. ann. 1684. p. 363.

[c] Ad 18. uncias DUVERNEY II. p. 549. PARIS. II. p. 41. 42.

[c^*] HIGHMOR p. 42.

[c^{**}] GRAAF conf. p. 18 & 19.

[d] PARIS II. in icone VALISNERII p. 245.

[e] In homine BORHMER l. c. SCHRADER Dec. I. n. 2. & bis ita vidi.

[f] PARIS. III. p. 20.

[g] In cane MURALT p. 38. PEYER obs. 76. mergol. p. 54. semper distinctos. Tum BRUNNER pancr. p. 61.

[g^*] IDEM III. p. 70.

[h] IDEM II. p. 106.

[i] PARIS II. p. 9. hi in eadem papilla.

[k] CALDESI tab. 5. f. 3.

[l] PARIS. III. ic.

[m] IDEM III. ic.

[n] IDEM II. p. 106.

[o] SCHRADER p. 29.

[p] REDI tab. 1. f. 2. vocat garza bianca. SCHRADER digest. carnivor.

[q] IDEM f. 4.

[r] Payoncello f. 3.

[s] f. 6.

[t] CALDESI f. 4. vocat Tarabuso.

Inter frigida quadrupeda in crocodilo [*t**].

Ita tres illi aquilæ [*u*], ductus pancreatici misti inter bilarios aperiuntur, cum in ardea [*w*], & pelicano [*x*].

Unus trium unitur cum bilario, in pica [*y*]. Duo in gallo calecutico [*z*], phasianio [*a*], columba [*b*], anate [*c*]; omnino tres in columba [*d*].

Denique plerisque animalibus ductus pancreaticus in viciniam pylori, inque duodenum intestinum inseritur; longius tamen distant in avibus [*e*]; longissime in cuniculis, leporibus [*f*], castore [*f**], hystrice [*g*], struthione [*h*].

§. VIII. Succus pancreaticus.

Non valde facile fuit, naturam hujus succi discere, cum & ductus pancreaticus plerumque vacuus [*a*] reperiatur, nunquam a me in homine aliter visus, & ab alieno humore alias occupetur, neque potuerit in vastis animalibus Cl. RAST, cum a me rogatus experimenta faceret, a bile separare, ut de ejus natura cognosceret. Fecit tamen utilis contentio, præterito seculo jam vergente, ut satis certa nunc de eo succo docti simus. Nam etiam eo processit sectæ servitura industria, ut in canalem difficili [*b*] loco positum calamus, vivo in cane, dare, inque appensam phialam

[*t**] PARIS. III. p. 268.

[*u*] IDEM II. ic. & p. 95. CALDESI tab. 5. f. 6. Convenire HARDEB apiar. obs. 18.

[*w*] COLLINS tab. 22. duo proximi, tertius remotus.

[*x*] REDI tab. 7. f. 1. vocat grotto.

[*y*] GRAAF p. 18.

[*z*] p. 20.

[*a*] Ibid.

[*b*] Ibid.

[*c*] Ibid.

[*d*] Ibid.

[*e*] IDEM p. 19.

[*f*] Sesquipedes IDEM.

[*f**] p. 444.

[*g*] In ileon DUVERNEY p. 549.

[*h*] Ibid.

(*a*) SYLVII diff. II. p. 14. WEPFER cicut. p. 120. DIEMERBROECK p. 43. 44.

(*b*) Difficile esse, & sæpe canes perire fatetur c. 3. & in primis historis.

phialam generatam lympham colligere didicerint, amati PRÆCEPTORIS sui defensores GRAAFIUS [c] & SCHUYLIUS [d]. Sponte nonnunquam, cum scirrho laboraret, lymphæ plenus fuit [d*].

Salivæ [e] nempe, ut glandula & canalis, ita humor pancreaticus similis est, colore subalbido [f], sapore subsalfo [g], etiam insipido [h]. Etiam in calculis nonnunquam repertis naturam salivalem prodidit [i]. Globulos in eo, ut ubique; reperit ASCHIUS [k].

Copia non exigua est, tum in GRAAFII experimentis, tum in SCHUYLI. Ille [l] drachmas duas & semuncem, in cane intra octo horas collegit, & demum integram unciam. Iste duas [m], & tres omnino intra duas horas. Quæ in hominem translata, etiam ad minorem illam GRAAFII abundantiam, tamen in homine facile triplo, quam canis ponderosiori, in viginti quatuor horis noncuplum, & uncias fecerint novem. Neque id nimium fuerit, cum salivæ copiam etiam majorem esse ostenderimus. Pancreas autem, si quinque est unciarum [n] & parotis [o] quæque drachmarum quatuor cum semisse, maxillaris [p] vero quæque drachmarum duarum cum semisse, facta sublinguali sesqui drachmæ, erit summa salivalium

[c] p. 39. ad 46.

[d] SCHUYLIUS p. 94.

[d*] FANTON. obs. 8.

[e] SYLVEI diff. II. n. 20. BRUNNER p. 120. STAHL p. 370. BIANCHI p. 92. seq. LANG l. c.

[f] Etiam in purpura Phil. trans. Vol. 50. Part. 2. p. 588. In crocodilo flavescens HASSELQUIST p. 601.

[g] BRUNNER de pancr. c. 3. p. 19. 20. 32. PECHLIN. de purgant. p. 511. J. LEONICENI metamorphos apoll. & asculap. p. 112. 113. NREDEAM form. fet. c. 4. fin. BOHN. PROG. X. p. 140. WEPFER de cicut. p. 204. LAMY dise. anat. VERHEYEN L. II. p. 75. URATISLAV. MEDICI de exper. p. 20. MORGAGNUS anat. III. p. 35. & ipse demum GRAAF. Subdulcis cum odore alcali volatilis cornu cervi. B. ROBINSON operat. of medic. p. 172. Alcalescere DEIDIER de tumor.

[h] VATER physiolog. p. 667. MUZALT p. 46. ex ovibus & vitulis WHARTON p. 76. &c. Plerumque L. CAPUANUS incert. de medicament. p. 61. ALANG. Physiol. p. 95.

[i] COLLINS p. 407. In hottentotta RHYNE. itin. cap. bon. spec. p. 341. Arteria cæca in pancreate MORG. sed caus. I. p. 38.

[k] Disp. de femin. &c. obs. 50.

[l] p. 65.

[m] SCHURIG de veteri medic. p. 94.

[n] L. XVIII. p. 42.

[o] Ibid. p. 44.

[p] Ex conjectura.

salivalium glandularum drachmarum 17. quod ne dimidium quidem pondus [*q*] est pancreatis. Sed etiam ejus ductus lineam facile latus est, & alias latior [*r*].

Perpetuo cur non fluat, rationem non video [*s*], etsi facile dederim, incitari a motu diaphragmatis, ut in bile vidi [*t*]. Fluentem Cl. Viri viderunt [*u*].

§. IX. *Hypotheses Sylviana.*

Etsi nunc hæc omnia deferbuerunt, neque ea hæresis nostro ævo metuenda videtur, nimis tamen frequens est ejus vergente jam seculo XVII. memoria: neque potest dissimulari, quam late sit dominata.

Cum nempe *Franciscus SYLVIVS*, vir minime vulgaris, spiritus, & glandularum succos acidos esse sibi persuasisset, & acidam salivam, non potuit fieri, quin etiam pancreaticum succum acidum [*a*] faceret, & spiritibus imprægnatum acidis [*b*].

Sed equidem ex acidis facibus bileque æruginosa, & flatibus ructibusque [*c*] corollaria sibi faventia deducebat. Magni autem hunc acorem faciebat. Nam & in intestino cum bile luctari [*d*]; ita chylum separari a facibus, & præterea eosdem succos in sanguinem venire, atque iterato in corde [*e*] dextro configere, vitalemque focum ejus præcipui organi alere, non sine plausu docebat.

Deinde

[*q*] Quatuor lib. cum semisse æstimat *NICOLAI mat. med. p. 177. 139.*

[*r*] Digitum in cachexia *PAYER pancr. p. 182. 183.*

[*s*] Negat in fetu fluere *BURTON Hist. natur. II. p. 456.*

[*t*] *Exper. de respir. oper. mix. n. 55.*

[*u*] Vidit *BOHN l. c.*

[*a*] *Method. med. c. 8. n. 4. seq. Prax. med. L. I. C. XI.*

[*b*] *Diff. VIII. n. 42. 53. Prax. med. L. I. c. 53. p. 319.*

[*c*] *Diff. VIII. n. 44. X. n. 33. 34.*

[*d*] *SYLV. loc. cit. BONTEKOE l. p. 21. (tantum quodam modo) COWARD de ferment. Vol. p. 72. JANNEY p. 260. BAGLIV. DEMOCRITUS CHRISTIANUS vit. anim. p. 46. BAYLE. Etiam DEIDIER, una cum bile, cum cibis acidis fervere, paulo tamen aliter de tum.*

[*e*] *Diff. VIII. n. 63. Diff. X. n. 55. 56. MAYOW oper. p. 340. SWAMMERD. de respir. Utramque effervescentiam SYLVIVM a discipulo suo HARTZINGIO habuisse, DAUSINGIUS objicit Sylva caedua jacens.*

Deinde, ut gratiofus erat SYLVIVS, inque florentiffima Academia præcipuus per triginta fere annos Doctor, ita non paucos reperit difcipulos, qui fua industria præceptoris caufam fublevarent. Ergo prior FLORENTIVS [f] SCHUYL [g], ligato fupra ductum choledochum & pancreaticum intestino, eodem infra eundem ductum lino intercepto, vidit in vivo cane manifeftam luctam, fpumam, penetrabilemque vaporem, cum intestinum aperiretur. Porro compreffo ductu choledochi, inde laxato, reddito pugilum altero, intestinum intumuisse [h].

Denique, cum faccum pancreaticum colligerent, perfuaserunt fibi Cl. Viri, fe acidum [i] reperiffe, fapore fuo manifeflum, etiam ut fuccum heliotropii [k] tingeret, & argentea specilla [m], & lac co-geret [n].

Paffim adeo hæc opinio recepta fuit [o], & ipfam medicinam faciendam direxit, ut frigus febrile effet acidi fucci pancreatici effectus, quem oporteat falibus alcalinis vincere [p]. Neque dudum DIPPELIUS, illo DEMOCRITI CHRISTIANI nomine notior auctor, acorem fucci pancreatici pene ex oblivione revocavit, aufusque eft pronuntiare, deftillatum pancreas plurimum acorem dare, alcali nullum. Fieri autem febrem intermittentem a fpasmo constringente ostia ductus pancreatici & bilarii, & identidem remittente. Remittente eo fpasmo primum pancrea-

[f] De veteri med. p. 88. feqq. & fimilem quidem vaporem, qualis e fpiritu fulphuris cum tartari liquore confligente nascitur. p. 90.

[g] Laborem esse SYLVII equidem objecit le VASSEUR SYLV. confus.

[h] p. 93.

[i] Sæpe acidum, plerumque acidofalfum GRAAF p. 49. In nauta fe acidum reperiffe And. gavis p. 71. Subacidum BAYLE corp. anim. p. 260. Leviter subacidum DIEMERBROECK p. 43. In vacca acidofalfum. VERHEYEN p. 85. In puero morbofo acidum KRAKING obs. 65. In cane fcabiofo MATTEI anim. p. 37. & in cervo TAUVRY p. 133. Nonnulla acidi vestigia admittit VERHEYEN L. II. p. 75. Nonnunquam L. a CAPOA l. c.

[k] VIRIDET prim. coct. L. II. c. 3.

[m] ETTMÜLLER med. hipp. chym. VESLING Ep. 7. J. MAURIC. HORN-
MANN in HORN. p. 191.

[n] SCHUYL. p. 94.

[o] J TACK chryfogen. HARDIE prod. physiolog. DIEMERBROECK. BAGLIV. p. 430. JENS. in tyrocin p. 133. BONTEKOE l. p. 19. van de ziekten en dood. p. 174. HOBOKEN physiolog. HARTMAN anthropolog. p. 68. COWARD de ferment. DUGACINI de humor. DUNCAN. chym. nat spec. p. 147.

[p] SYLV. prax. med. L. I. c. 27. p. 228 Sanguinem lentum reddere admistum, ita febrem facere BONTEKOE ziekten &c Dudum quidem sedem februm eo loco ELLIUS posuerat, & RIOLANUS & PLEMPIUS fundament. p. 130.

pancreaticum succum prorumpere, inde bilem, caloris causam [*q*] : oriri autem id malum a pancreate, quod tumens ventriculum comprimat. Si bilis defuerit, pancreaticum succum intestina erodere, dysenteriam facere (*r*).

Denique de omnibus experimentis dejecti SYLVII adseclæ eo se receperunt, ut latentem tamen subesse aciditatem, & tacitam effervescentiam peragi (*s*) defenderent: lenem enim esse, & vix visibilem GRAAFIUS (*t*) fatebatur.

§. X. *Contra has hypotheses.*

Quæ a sensuum testimonio refutantur, ea non possunt diu regnare. Ipsa primo æmulatio Carolum DRELINCOURTIUM (*a*) in collegam armavit, ut vulnera causæ rimaretur: idem acris ingenii discipulum J. Nicolaum PECHLIN (*b*), cujus nobilissima prosapia nostro tempore ad summos honores pervenit, ad evertendam SYLVII causam suscitavit. Experimenta difficillima juvenis tunc quidem, deinde celeberrimus archiater J. Conradus BRUNNERUS (*c*) sectæ SYLVIANÆ opposuit. In ea porro refutanda consenserunt Johannes BOHN (*d*), FRIDERICUS (*d**) HOFMAN, & successor SYLVII HERMANNUS (*e*) BOERHAAVE.

Et primum merito negarunt, acidum (*g*) esse, de quo quærebatur, succum: aut ab eo lac coagulari (*h*).

Experi-

(*q*) Vit. anim. morb. & medic. p. 75.

(*r*) p. 63.

(*r*) DEMOCRIT. Supplem.

(*s*) p. 78.

(*a*) Sub nomine LUDOVICI leVASSEUR scripsit L. de triumviratu SYLVII ann. 1668. & 12. alterum, qui SYLVIIUS confutatus anno 1673.

(*b*) JANI LEONICENI metamorphosis apollonis & asculapii Par. 1673. 8.

(*c*) Toto L. de pancr.

(*d*) De duumviratu hypochondrior. Lips. ann. 1689.

(*d**) De acidi & visceri pro causis morborum insufficientia Francof. ann. 1689. 8.

(*e*) Praelect. T. I.

(*g*) BRUNNER toto L. Tob. ANDREÆ & R. Andreas CASSIUS Groning. ann. 1668. BETTUS de sanguine p. 18. HEUERMANN T. III. p. 807.

(*h*) VATER physiolog. p. 667.

Experimentum etiam GRAAFII, Andegavis in nauta factum, falsum esse testes producti CRONIER (*i*) & J. MURALTUS (*k*) evicerunt, fuisseque insipidum humorem, cujus acorem GRAAFIUS laudaverat. Etiam J. B. du HAMEL demonstratum a GRAAFIO acorem vix sensu percipi candidus adgnovit (*l*); & cum discipulus *Cornelii* BONTKOE (*m*) bene potus succum nostrum acidum pronunciaret, alter sobrius confirmavit, insipidum esse.

Potuit autem Clar. Viris aut solus sectæ amor imposuisse; aut acidum liquamen ex intestino retrogradum, cumque succo pancreatis commistum, causam dedisse errori: vel, in illis experimentis tinctorum specillorum, morbi violentia. Certe Cl. DEIDIER syrupum violarum a succo nostro virorem concepisse scribit (*n*); etsi etiam id putredini tribuerim.

Porro quod fervorem adtinet cum bile subnascendum, monuerunt ILL. Viri, succum utrumque confusum nihil ostendere febroris, cum neque pancreatis humor acidus sit, neque bilis urinosa (*p*): Neque fieri posse, cum tot in animalibus uterque ductus confluat (*q*), ut in vasculo perangusto fervor locum habeat.

Sed experimentum SCHUYLIJ alias non successisse (*s*), ex auctoris dictatu: alias perinde evenisse, cum alio (*t*) penitus loco intestinum vinculo comprehenderetur; etiam cum vinculum omnem utriusque ductus bilarii & pancreatici confusionem interceptisset (*u*). Manifesto argumento, spumam & intestini tumorem ab aere fieri, per motum peristalticum cum bile, viscido humore, & cum pancreatis succo, & cum massa cibaria intertrito (*w*).

Neque

(*i*) Apud LEONICEN p. 112.

(*k*) *Vademec. anatom.* p. 46.

(*l*) *Corp. adfect.* p. 355.

(*m*) *URATISLAUENSIS de exp.* p. 20.

(*n*) *De humor.*

(*p*) Alias ostendetur L. XXIII. *Secl.* III.

(*q*) p. 443.

(*s*) Le VASSEUR SYLV. *confut.* p. 13. 131. BONN *circ. progr.* X. p. 141.

(*t*) PECHLIN *purgant.* p. 509. *tab.* 4.

(*u*) In cuniculo, cum duodenum ligasset, vinculumque utrique ductui interposuisset VESMEYEN L. II. p. 80.

(*w*) Lepus, cuniculus, hystrix, castor, struthiocamelus.

Neque posse ejusmodi fervorem pro causa late patentis phænomeni haberi, cum in non paucissimis animalium pancreas remotissimis ab hepate locis suum humorem intestino tradat, ut cum bile ne commisceri quidem sit probabile.

Dénique ut ostenderet, vitæ momentum a succo pancreatico non pendere, labore summo BRUNNERUS pancreatis canum magnam partem extirpavit (x): aut certe ductum pancreaticum aut ligavit, aut resecuit (y).

Nunc etsi forte perierunt (x) aliqui canes, ut in administratione difficili expectes, in qua facile intestinum, aut vasa mesenterica lædi potuerunt, etsi totum pancreas in cane extirpari (a) nequit (b); etsi porro aliis in canibus disseci ductus se comprehenderunt (c), aut novus nasci visus est, quem ego credam esse secundum (d), canibus familiarem ductum, post destructum principem canalem in vitiosam magnitudinem auctum, tamen etiam alii canes superfuerunt, & multis mensibus (e) & absque ejusmodi regeneratione (f). Ut certe maxima parte hujus lymphæ ab intestino aversa, vitalem illam effervescentiam, ciborumque potissimum coctionem æquum foret diminui, aut perire, cujus causa ablata, aut vehementer debilitata foret. Eorum contraria evenerunt, canesque, quibus ablatus erat pancreatici succi com-
meatus, etiam magis quam integri, famelici fuerunt (g).

Hisce & aliis ejusmodi rationibus factum est, ut jam coævi aliqui
S Y L.

(x) *De pancreate Exper. 1. 2. 3. 4. 8. p. 180. Exp. 9. p. 182.*

(y) *Exp. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. p. 172. seq.*

(z) GRAAF p. 114. BRUNNER p. 16. VERHEYEN.

(a) Monet SENAC *essay de physiq.* Ed. 1735. p. 160.

(b) Fatetur BRUNNERUS p. 174.

(c) WEPFER *cicut.* p. 205. BRUNNER *Exp. 4. 6.*

(d) *Exp. 7. Conf. PRYER obs.* p. 68.

(e) Mense integro *Exp. 5. Duobus mensibus Exp. 5. p. 29. Exp. 6. p. 41. cum bona animalis valetudine: Tribus mensibus BRUNNER p. 13. Supra quatuor menses Exp. 3. Supra sex menses Exp. 8. p. 177. Supra annum Exp. 7.*

(f) Nullo cum intestino commercio reliquo *Exp. 5. 8.*

(g) BRUNNER *Exp. 3. 5. p. 29. & Exp. 6. &c. WOLF vom Gebr. der Thiere und Pflanz. n. 74. ex chirurgi testimonio p. 143.*

SYLVII (*b*), sedæque SYLVIANÆ (*i*), deinde tota posteritas ab ea hypothefi discefferit.

§. XI. *Verior succi pancreatici utilitas.*

In plurimis animalibus pancreas reperitur, quadrupedibus utriusque sanguinis (*a*), avibus (*b*) universis, & piscibus nonnullis frigidis (*c*). Quibus deest, iis certe appendices illæ cæcæ locum tenent pancreatis. Hæc ostendunt, nobilem atiquam esse hujus visceris utilitatem.

Deinde in omnibus pene animalibus, paucissimis exceptis, pancreatici canales vel eodem (*d*) ostio cum bilariis in duodenum intestinum aperiuntur, vel, quod pene eodem redit, vicinis (*e*). Sufficit enim ad theoriam, si facilis fuerit succi pancreatis cum bile commistio. Videtur ergo ejus succi aliquam esse utilitatem, quam cum bile communem habeat, siquidem eodem loco ad cibi massam adfunduntur.

Porro cystica bilis plerorumque animalium acerrima (*f*) est, & eadem apprime viscida (*g*). Ex illa dote vehementissime intestinum ad motum peristalticum stimulare: non absque vomitus forte periculo. Ex ista parum commode cum cibo misceretur, cum viscor repugnet. Si aliqua absque fellea vesicula animalia sunt, eorum certe nonnullis, remoto loco ab hepatico ductu, pancreaticus (*h*) inseritur.

Est autem in duodeno intestino, ut in ventriculo, sensus ad irritationem acer; hinc motus peristalticus vehemens. Est septi transversi ibi motus, & incumbentis hepatis. Iis viribus lymphæ pancreatis cum bile interteritur.

Quare omnibus computatis, pars certe utilitatis succi nostri erit, diluere

(*b*) DRUSINGII *Sylva cadua cadens*. In *Sylvam Echo*: *Sylva cadua jacens*: tres diff. *antisylviana*. Iste quidem SYLVII alioquin æmulus.

(*i*) Qui tamen aliquantum acoris admiserat *Phyl. VERMEYEN* II. p. 82. seq. & L. a CAPOA, qui rarum esse acorem fassus est *ragg.* II. p. 43.

(*a*) p. 427 428.

(*b*) Ibid.

(*c*) p. 428.

(*d*) p. 443.

(*e*) Ibid.

(*f*) Vide L. XXIII. Sect. III.

(*g*) Ibid.

(*h*) Struthiocamelo, equo; Hystrici parva, aut nulla in canadensi specie *Mém. de* 1727. p. 387. Parva in lepore PAULIN. *lagograph.* p. 74.

luere bilem (*i*) cysticam & mitigare. Ex illo quidem beneficio bilis latius per intestina cibique massam poterit dilui, & cum massa ciborum melius misceri.

Ex isto acrimonia temperabitur, quæ alioquin iter cibi præcipitaret, quem hic maxime oportet coqui.

Inde possis interpretari famem animalium (*i**), post deletum pancreas potius auctam, quam acriori bili in ventriculum resumtæ tribuas: Si omnino constans aliquid in eo est eventu.

Hinc canes, qui, ex pancreate destructo perierunt, & etiam eorum, qui vitales superfuerunt, aliqui biliosa vomuerunt (*k*).

Hinc magnum crocodilo pancreas, cui bilis acerrima (*l*).

Possis etiam in universum recipere, a succo pancreatis cibariam massam dilui (*m*), & dissolvi, ut a saliva, succoque ventriculi. Voracibus nonnullis animalibus in ventriculum effunditur (*m**). Hinc magnum pancreas, multique ductus avibus uncunguibus, quæ potu abstineant (*n*).

Alvus sicca homini, cui scirrhus ductum pancreaticum comprimebat (*o*). Inter canes Brunnerianos fuerunt, quibus, ablato pancreate (*p*), alvus dura fuit.

Facere, cum aliis salivalibus succis, ne vasa lactea inania otientur & coalescant, non repugno (*q*).

Plura possunt esse officia liquoris nondum satis noti.

(*i*) BRUNNER p. 120.

(*i**) p. 451.

(*k*) BRUNNER p. 27. 37. 55. 120. 175.

(*l*) HASSELQUIST p. 601. major quam bovi. Duplex famelico ductus pancreatis ELAS *obs.* p. 58.

(*m*) LOWER p. 22.

(*m**) Bombyci MALPIGH. *posthum.* p. 57.

(*n*) ARISTOT. *hist. anim.* L. VIII. c. 3. p. 1017.

(*o*) VIRIDET *bon chyle* p. 259.

(*p*) BRUNNER p. 175. 176. Non tamen nimium huic experimento tribuo.

(*q*) BIANCHI *hist. hepat.* p. 93.


L I B E R XXIII.

H E P A R. V E S I C U L A. B I L I S.

S E C T I O I.

H E P A R.

§. I. *Communia hepatis.*


L A T E per animale regnum hepar dominatur, etsi paulo angustioribus finibus continetur, quam aut intestinum aut cor. Reperitur in omnibus quadrupedibus, utriusque sanguinis, avibus omnibus & piscibus, constanter ita situm, ut suum liquorem ad ventriculum, vel sub eo in proximum intestinum mittat. Insectis non paucis *aliquid* datum est, non quidem totum simile hepatis, cavumque & cellulosum potius, & similis appendicum (a) pyloricarum, ut tamen a Cl. Viris sit cum hepatis nomine descriptum, ut in cancris (b), inque conchis nonnullis, ostreis (c), cochleis (d), etiam aquaticis (e), limacibus (f), mytulis (g); etiam in sepia (h), gryllo, gryllotalpa (i). In bombyce (k) vasa in ventriculum bilaria ire magnus auctor est.

Omnium

(a) In cochleis LISTER p. 79. In cancris ROBERG. *Diff. de astaco*. De erucis, & cancris MALPIGHIUS.

(b) WILLIS de anim. brut. p. 10. t. 3. f. 1. LISTER de cochl. MERY Mémo. de l'Acad. 1710. p. 418. Habet & HEYDE de mytul. f. 7. SACHS Gammarol. p. 225.

(c) WILLIS ibid. tab. 2. f. 2.

(d) LISTER de cochleis p. 73. 77. 78. SEVERIN Zootom. p. 331. HARDER op. cochl. f. 8.

(e) Spirale glandulosum SWAMMERDAM p. 123. 163.

(f) LISTER foliaceum & venis albis plenum de cochleis p. 23. Exerc. anat. t. 3. f. 3. HARDER Exp. 204.

(g) Huic sunt grana glandulosa liquore flavo plena, quem in intestinum deponunt.

(h) SWAMMERDAM bibl. p. 888. 889.

(i) MALPIGHI gland. conglob. p. 6.

(k) IDEM in diar. TINASSI ann. 1670. p. 170.

Omniū viscerum hepar semper maximum est, aut certe ponderosissimum, si pulmo mole cum hepate pugnauerit. Est autem primum viscerum secretoriorum, quod in fetu nondum confirmato distinguitur, magnumque, quo tempore pulmo vix ullus adparet, & in avibus (l), & in quadrupedibus (m).

Quare etiam in fetu, quam in adulto, majorem (n) ad reliquum corpus rationem (o) habet, quæ perpetuo minuitur, ut homo [vel animal] adolescit. Majus homini esse quam bestiis dictum est (p). Ad $\frac{1}{30}$. totius corporis æstimabat BARTHOLINUS (q) & est fere $\frac{1}{15}$. (q*). Sed in aquila est $\frac{1}{20}$. (r), in cane $\frac{1}{24}$. in pisce cane, $\frac{5}{20}$. (s), seu $\frac{1}{4}$.

Pondus in homine, ut facile intelligitur, varium est, ut ætas, robur, vitæ genus tulerit, majus in hominibus & animalibus quietis (t) laute pastis (u), in chronicis morbis (x), in rachitide (y); minus in ferocibus, & exercitatis (z). Medium pondus in sano homine æstimatur circa 45. uncias. Nam reperio fuisse unc. 28. (a), L. 2. unciarum tredecim (a*), L. trium 1. (b), Unc. 52. (b*), L. 3. cum semisse (c).
Lib.

(l) De la formation du poulet II. p. 123.

(m) Sic in ovium & caprarum embryonibus vidi.

(n) GALEN. de util. part. L. XV. c. 6. GHIGI Sezione del Massa curati p. 18.

(o) PEISTER *hom. & anim. gener.* p. 27. de quadrupedibus. Hepar fetus ad hepar adulti ut 48. 41. SAUVAGES *Embryolog.* p. 11. In vacca hepar ad universum corpus est ut 77964. 6461376. in vitulo abortivo, ut 9965. 427488. p. 120. quarum rationum illa est $\frac{1}{31}$. hæc $\frac{1}{45}$. Duplo ergo in fetu majus.

(p) HEROPHIUS apud ORIBASIIUM p. 112.

(q) *Anat.* p. 127. etiam ad $\frac{1}{35}$. In gallina SCHENK de monstr. p. 661. LOESSE p. 64. ic. Libræ unius *hist. de l'Acad.* 1710. p. 43. In anser bilibre BRASSAVOLA: & trium, & quatuor librarum BRADLEY *farmers direct.*

(q*) Unc 45 in uncis 1140. SAUVAGES I. p. 399.

(r) BORRICH *herm. ægypt. sapient.* p. 265. Aquila pendet l. 10. hepar 34. drachmas.

(s) *Animal libr.* 26. hepar lib. 5. STENON. *myol. specim.* p. 115.

(t) ROBINSON p. 109. 110 LEOPOLD *Opusc. æcon.* p. 504. de anseribus: BRADLEY *farm. direct.* p. 27. de iisdem.

(u) CHEYNE *diseas. of bod. and mind.* p. 188.

(x) ROBINSON p. 112.

(y) STORCH *Kinderkrankh.* T. III. p. 267. *Eph. Nat. Cur.* Vol. VI. GLISSON *rachit.* p. 11.

(z) In sylvestribus avibus, & maribus ut 121. ad 614. 4. in femellis ut 129. ad 525. 6. in cortinis masculis ut 412. ad 1694. & in femellis ut 446. 14418. ROBINSON *food. and. discharg.* t. 1. 2. Tamen grande carnivoris, ut urso SCHRADEK *digest. carnivor.* p. 9. Si ursus vere carnivorus est.

(a) CHESELDEN p. 165.

(a*) SAUVAGES *nosolog.* I. p. 499.

(b) BARTHOLIN. *Hist.* 5. *Cent.* I.

(b*) SPIELMAN *Chem.* p. 179.

(c) *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. ann. 2. obs. 128.

Lib. 3. unc. 12. (d). Lib. 4 & unc. 5. (e). Lib. 4 $\frac{3}{4}$. (f); denique lib. 5. cum sem. (g), sex cum dimidia (h), septem (i), octo (k), novem (l), duodecim (m*), quatuordecim (m) & ultra (n), quindecim cum semisse (n*), & sedecim (o), & triginta sex (p) libr. sed hæc vitiosa. Post longas febres vegrande (q).

Nullum fuisse (r), quod frequenter veteres aruspices renunciarunt, & de nonnullis hominibus legitur: aut vicissim duplex adfuisse (s), non valde credo.

Duo fuisse hepata, & alterum per discedentes musculos de abdomine exivisse, rarissima est adnotatio (t).

§. II. Color.

Levis momenti videtur hæc observatio, & tamen diuturnum errorem omnium scholarum etiam sola evertit. Hepatis nempe color flavescens in plerisque piscibus, in nonnullis etiam albus (t*), flavus (u), cæruleus (x), viridis (y); in aliis tamen purpureus (z), est. In pullo, qui ovo continetur, cinereum (a) primum, deinde pallide rubrum (b), abit inde

- (d) CHESLEDEN p. 165.
 (e) HEURMANN III. p. 687.
 (f) BÜCHNER *miscell.* 1727. p. 65.
 (g) BARTHOL. *Cent. I. hist.* 32.
 (h) In puella BECK *de palpit. cord.* p. 34.
 (i) CHESLEDEN. *Bresl. Saml.* 1720. p. 653.
 (k) CHESLEDEN p. 164. 165. *Fränk. Anmerk.* T. III. p. 530.
 (l) STORK *anim.* II. p. 261. sed steatomata habebat.
 (m*) RENAUME *des bern.* p. 144.
 (m) Materia intus furunculorum simili *Fränkische Anmerkungen* T. III. p. 346.
 (n) In hydropico ZACUT. & unc. 4. CHESLED.
 (n*) MARG. *abes. anat. botan.* in icterico.
 (o) In cachectico purulentum. WOLF *obs.* 22.
 (p) GHIGI *Istoria d'una sezione.*
 (q) ARISTOTELES *hist. anim.* L. III. c. 7.
 (r) ORTILIUS apud PLEMP. *fundam.* p. 134. puto ob connata intestina, tum C. BAUM. ad ROUSSER p. 238.
 (s) ARISTOTELES.
 (t) MORGAG. *sed. & caus. morb.* II. p. 247.
 (t*) HALLER *gener.* p. 155. RONDELET, & cinereus IDEM.
 (u) RONDELET *ibid.* croceus.
 (x) IDEM *ibid.*
 (y) In lampetra BRUNNER, & apud BEAS *anat. anim.* p. 279.
 (z) Mullus SANTORIN. *obs.* p. 4. Murex *Phil. transf.* Vol. 50. P. II. p. 588. Crocodilus VESLING. *Epist.* 5.
 (a) *De la form. du poulet* p. 123. ENT. *apolog.* p. 135. Candidum quadrupedi PEISTER l. c.
 (b) *De la form. du poulet.* *ibid.*

inde in flavum (c) pulchrum, non sine virore. In homine adulto obscure rubrum est, non tamen absque admista flavedine (d), quæ in morbis diuturnis augetur, & non raro sola regnat. In pinguibus gallinis album est (e).

Nunc si album, flavum, viride, cæruleum datur hepar, non ab eo adeo viscere ruber sanguinis color est (f). Is enim humor omnino ruber est cum pellucido hepate, aut flavo, & in omnibus iis piscibus, quibus tot diversi in hepate sunt colores.

§. III. Situs.

In universum hepar abdominis partem superiorem, costis definitam, dextramque & in avibus tenet, & in quadrupedibus, & in homine: tantum ut ad sinistra eo magis se extendat, quo animal junius est, inque avibus perpetuo sinistram etiam hypochondrium teneat, quibus ventriculus, & lien, magis in medio corpore sint.

Ita in fetu humano hepar utrumque pariter (g) hypochondrium occupat (h), & ultra lienem antè & superius producit, etiam in annotino puero, ut lieni adhæreat. In epigastrio mediam pariter totam sedem tenet; & ad inferiora ultra costas exporrigitur, ad umbilicum (i) usque, & ultra (k). In nuper nato (l) fetu eandem tenet magnitudinem, & dimidium (n) abdomen replet, & paulo brevius est umbilico.

Inde

(c) p. 124. Jam bene plumato BOYLE de util. philos. Exp. p. 116. In quadrupedis fetu PFISTER.

(d) WINSLOW. n. 250.

(e) HARVEI.

(f) BRONZEE de hepate lampetr. ENT.

(g) Jam MOTH. ad WORMIUM p. 575.

(h) MARCHETT.

(i) FABRIC. de format. fetus ic. 23.

(k) Infra umbilicum RIOLAN p. 411. ad ossa ilium BERTIN Mémoire de l'Acad. 1753. p. 363.

(l) VERDIER II. p. 95.

(n) Pene totum RIOLAN. p. 411.

Inde sensim in adolescentibus hominibus se sub costas recipit (o) iisque satis accurate continetur (p), ut tantum de hepate nudum sit, quanto spatium costarum deficiunt, vel certe paulum ultra costas emineat, ut aliquoties in tabulas retuli.

Neque tamen etiam inter homines adultos rari sunt, quibus amplius hepar trans oesophagum, in sinistrum hypochondrium (q) lobum sinistrum ad lienem usque mittit (r), & cum eo confervet (s), ut etiam trans lienem ad sinisteriora (t) transisse viderim. A victu lauto ita demum grandescit, ut totum abdomen repleat (u). In adulto etiam homine pariter saepe infra costas eminet (x), & ad umbilicum usque (y), & infra eum (z).

In cane tantum hepar MANGETUS (a) memorat, ut detracto diaphragmate animal subito occiderit.

Vicinas hepatis omnes discere non est facile, in qua re etiam varietas aliqua sit.

Convexa certe pars hepatis tota fere septum (b) transversum contingit, ut modice, & in junioribus aliquanto ulterius, infra id septum producat, in medio epigastrio (c), pone musculos abdominis, rectos inprimis.

Replet

(o) EUSTACHIUS insigniter majus hepar pene ad umbilicum deducit t. 9. longe remotum a VESALIANO L. V. f. 2. 6. 20. 22. quod sit adulti hominis.

(p) VESAL. p. 618. MORGAGN. *Epist.* I. p. 17. Conf. LUDWIG l. c. p. X. Ita reperi in puella 19. annorum, deinde in suspenso, & in alio viro, & iterum in venatore, inque tertio viro. Fere GLISSON p. 50.

(q) VESAL. WINSLOW n. 250. MORGAGN. *sed. & caus. morb.* II. p. 205. LORSEL *de renib. Epib. Nat. Cur. Dec.* II. ann. 2. obs. 128. Vol. I. obs. 75. Rarum esse ORIAS. p. 114.

(r) MARCHETTI p. 25. 26. MORGAGN. *Advers.* II. p. 13. VESAL. f. 20. & L. V. f. p. 504. tump. 618. KALTSCHMIDT in proprio progr. In hydropico PETZOLD obs. 88.

(s) RIOLAN. DIEMERBROECK p. 65. 79. BERTRANDI p. 8. *Histoire de l'Acad.* 1727. n. 9. VELSER *de ingress. intestin.* p. 35. GHIGI *Storia d'una sezione.* BECK *de palp. pit. cordis.* In hydropico STORK *Ann.* I. p. 145. Præter naturam LUDWIG. *Sit part. inf. ventr.* p. X. Et ipse bis vidi

(t) BLAS L. I. obs. 19. GUNZ *de hepate* p. 6.

(u) CHEYNE l. c. Vidit funesto eventu in duobus pueris RAYMOND *Malad. danger. a guer.* II. p. 293.

(x) COWPER *tab.* 18. f. 5.

(y) FABRIC. *progr.* 1759. in hydropico.

(z) GLISSON. p. 50.

(a) *Biblioth.* p. 255.

(b) VESAL. in *fig.* p. 504. & p. 618. JENTY.

(c) WINSLOW n. 250. VESAL. L. V. f. 22. minus f. 6. & p. 618.

Replet autem in dextro latere totum diaphragmatis fornicem (*d*), carnesque ejus septi lumbales, costales, alam tendineam. In medio de-
nuo (*e*) a gula ad carnes costales, tendinem totum. In sinistro latere par-
tem juniore in corpore non exiguam, anteriorem (*f*) costalium carnum,
tendinis alæque sinistræ, ut tamen ea sede lien sibi partem sumat. In
adultioribus, aut se ad dextrum limum gulæ recipit, ut certo vidi,
aut paulo ultra gulam in alam sinistram producit (*g*).

Pars cava magis multiformis est. In dextro latere primum, hepar
per eminentem lineam divisum (*b*) anteriori parte imæ suæ faciei colo in-
cumbit dextro & transverso, & in fetu etiam intestinis (*i*); posteriori
reni (*k*), & capsulæ renali dextræ, cui per cellulofam telam adnectitur.

Inde porro lobus dexter duodenum intestinum tegit, cujus trans-
versi dexter pars vesiculam fellis urget: & pyloro vena umbilicalis (*l*)
respondet, quam tamen etiam multo sinisteriori loco, & ad medium vidi
ventriculum.

Porro hepar ventriculi partem majorem operit (*m*), minoremve (*n*),
sua quidem parte sinistra ventriculi planitiem anteriorem, cujus inci-
tio (*o*) vena umbilicalis respondet, ut tamen alias sinisterior sit,
& medio demum ventriculo immineat. Donec, si tantus est, lobus
sinister superior & anterior lienem contingat (*p*); eaque sede ante gu-
lam prorectus, eam posterius positam urgeat margine averso, qui pro
gula exsculpitur, ad dexteriores lobuli. Idem lobulus inter ostia ventri-
culi inmissus, pancreas tangit & urget.

Præterea

(*d*) VESAL. l. c. & p. 618.

(*e*) IDEM p. 518.

(*f*) Ibid.

(*g*) EUSTACHIUS t. 10. Conf. eund. f. 2. & 3. VESAL. L. V. f. 12. longius in
f. 20 & f. 4. p. 504. JENTY. Tab. celiac. I.

(*b*) BERTRANDI p. 9.

(*i*) FABRIC. format. fet. in ic. cit.

(*k*) VESAL. f. 20. G. f. 25. f. p. 504. BERTRANDI p. 9. CHESELDEN. Tab.
arv. celiac. I.

(*l*) Conf. p. 119. JENTY t. 1.

(*m*) EUSTACH t. 9. t. 10. f. 2. WAINWRIGHT de hepate p. 3. CHESELDEN
t. 21. JENTY.

(*n*) VESAL. f. 12. 6. 6. & p. 618. Hinc ventriculus plenus hepar comprimit CHE-
SELDEN p. 164. & cardialgiam fecisse visum est BECK de palp. cord. p. 34.

(*o*) Pyloro EUSTACH. JENTY. Dexterior appendice DRAKE tab. 1.

(*p*) p. 458.

Præterea in homine erecto pars convexa in dextro latere partim posterior est, partim superior, partim descendens & dextra: in medio partim horizontalis, partim anterior, & perpendicularis; in sinistra parte iterum superior, & anterior.

Margo acutus totus anterior est (*q*), & inferior, idemque tanto superior, quanto sinisterior (*r*). Margo obtusus posteriora tenet.

Facies cava in universum inferior (*s*), in dextro latere præterea partim inferior, versus renes, partim posterior versus duodenum: in sinistra sede tota inferior.

Vesicula, ut alias repetetur, fere transversa (*t*) est. Quando in latus dextrum decumbimus, lobi dextri lateralis pars dextra ima est, sinister mucro supremus, & ventriculus & duodenum a pressione hepatis libera sunt (*u*),

Ita fere se in homine sano habet, multis tamen modis mutari potest, ut hepar ex morbo mole auctum majorem partem abdominis sibi sumat, aut, quod rarius, vidi tamen, insolitam in parvitate limites suos contrahat. Sed etiam a tumoribus (*w*) variis loco moveri potest.

Visum est etiam in sinistro latere (*x*) fuisse, commutatis ejus cum liene partibus. Visum est perpendicularem (*y*) situm tenuisse, ut sinisterior esset pars cava. In thoracem etiam migravit (*z*), & extra abdomen, & ipse vidi (*a*), tum alii Cl. Viri (*b*).

Sed etiam cum diaphragmate perpetuo adscendit & descendit, ut reliqua abdominis viscera, non parvo motu (*c*), ut ad duas costas spurias imas descenderet (*d*): cæterum eo in motu nihil mutatur in viscerum mutuo sito & contactu.

A re-

(*q*) In omnibus iconibus.

(*r*) pariter

(*s*) Conf. CHESLDEN p. 122.

(*t*) Ibid.

(*u*) Credit laxari tunc vesiculam DUVERNEY *postb.* T. II. p. 233.

(*w*) GELISSON l. c.

(*x*) COCCHI *anat.* p. 13. DAUBENTON T. III. p. 205. TALENTONIUS *Chir.* In ariele HEURMAN l. III p. 709.

(*y*) *Eph. Nat. Cur.* Vol. X. obs. 1.

(*z*) BECKER ad l. de morte submersi. sine epota aqua obs. 1.

(*a*) *Opusc. pathol.* obs. 29.

(*b*) HEURMAN l. c. &c.

(*c*) *Oper. anat. min.* Exp. 50. 51. 52.

(*d*) VERDIER l. c.

A repletis intestinis, & a colo potissimum, margo anterior sursum repellitur, ut qui inferior fuit, sit nunc anterior (*e*), & pars convexa, quæ magna parte anterior erat, nunc tota sit superior.

§. I V. *Hepar simplex & multiplex.*

Hepar humanum simplex est, minusque quam in plerisque animalibus divisum; etsi enim fissiditur passim, suosque habet colliculos, non tamen perinde in lobos, (*a*) profunde dissecatur. Vetustas, cum rarius humana cadavera incidereutur, & tamen nonnunquam, conjunxit hominis & bestiarum fabricam, & diversam esse recepit in diversis cadaveribus figuram hepatis, aliasque rotundum esse, alias in duas, tres, quatuor fibras dividi scripsit (*b*). Aliquanto deterius RUFUS (*c*), atque CELSUS (*d*), in quatuor omnino & quinque fibras dividi diserte reliquerunt. Neque subito verior sententia prævaluit. Etsi enim VESALIUS (*e*), COLUMBUS (*f*), & procul dubio EUSTACHIUS meliora docuerunt, & plerumque unicam in hepate fissuram MASSA vidit (*g*), & simplex plerumque PAREUS (*h*) fecit; tamen adhuc PUTEUS (*i*), GALENI defensor, in principe sabando quatuor *Pinnulas* hepatis se vidisse adfirmabat, & C. GEMMA (*k*) hepar in fibras divisum, equidem inter rariora refert, & quadrifidum JASOLINUS dixit (*l*), & satis nuper quinquelobum Clar. GRANDI (*m*), & noster olim SCHREIBERUS (*n*). Paulatim tamen vis veri prævaluit, & PUTEI
hepar

(*e*) Recte DISDIER *splanchnol.* I. p. 116.

(*a*) Λοβες partes hepatis extremæ: λωβος in aruspicina signum in hepate SUIDAS II. p. 453.

(*b*) OBIBAS. p. 112. GUNTHER. p. 216. CARPUS in MUNDINUM p. CXLV. C. STEPHANUS p. 183.

(*c*) *Part. appell.* II. p. 58.

(*d*) L. IV. c. 1.

(*e*) p. 619.

(*f*) p. 164.

(*g*) *Introduç.* p. 27.

(*h*) *Administr. anat.* p. 15. b. add. L. II. c. 17.

(*i*) *Apolog.* p. 1536.

(*k*) *Cosmocrit.* p. 105.

(*l*) A se visum de adipe cord.

(*m*) *Phil. transf.* n. 58. & apud FANTONUM.

(*n*) *Comm. Acad. Petrop.* Vol. VII. p. 228.

hepar quadrifidum fabulosum esse GABRIEL (o) CUNEUS monuit. Etiam J. SYLVIVS duos (p) tantum in hepate lobos vidit, ut tamen sæpe quaternos esse adfirmaret (q), ne a vetustate discederet. Liceat paucis hepatis varietates tradidisse.

Inter quadrupeda simplex solidumque, vel certe humano modo bilobum hepar habet. Pygmæus (s), bos (t), camelus (u), elephante (w), cervus (x), non tamen constanter, alce (y), gazella (z), rupicapra (a), caprea (a*), caprea stepnosarai (b), porcellus brasiliensis (c), tursio (d), manati (e).

Animalibus quadrupedibus, quibus divisi sunt pedes, plerisque etiam hepar in multos lobos dividitur, in simia (f), hyæna (g), lupo (h), cane (i), vulpe isatide (l), panthera (m), leone (n), fele (o), tigride (p), lynce (q), catopardo (r), marte (s), ursulo coati (t) & coati mundi (u), fele zibethica (w), animal cibetho (x), ur-
fo

(o) p. 98.

(p) *Isagog. anat.* p. 70.

(q) *Calum. depuls.* 26.

(s) TYSON. p. 34.

(t) VESALIUS. PARIS. *Compar. anat.* p. 86.

(u) *Comm. petr.* T. X. p. 310 Trilobum PARIS.

(w) BLAIR. *Phil. transf.* p. 326. Simplex & bilobum MOULINS p. 21. & PARISINI.

(x) PARIS. nam in cerva ajunt multilobum fuisse.

(y) PARIS.

(z) Bilobum cum tertio parvo lobulo PARIS.

(a) PARIS. trilobum.

(a*) COLLINS *tab.* 44.

(b) bilobum ut homini *Nov. Comm. Petr.* T. IV. p. 391.

(c) BUFFON T. VIII. p. 9. Lobi duo magni, tertius parvus.

(d) TYSON *anat.* p. 24. Sed bilobum faciunt *Phil. transf.* n. 76. ROND. p. 460.

(e) Duo lobi & tertius quadratus *Comm. Petr. Nov.* II. p. 318.

(f) BLAS *anat. anim.* p. 112. Sex *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs.* 61.

(g) VESLING *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs.* 5. Trilobum BUFFON T. IX. p. 284.

(h) Sex lobi FABER p. 814.

(i) Septem BLAS *misc. anat.* p. 269.

(l) In *Nov. Comm. Acad. Petrop.* T. IV.

(m) Quinque BUFFON T. IX. p. 181.

(n) Octo lobi BARTHOLIN. C. IV. n. 100. Quinque BUFFON T. IX. p. 34.

(o) Sex SEVERIN. p. 314.

(p) Sex lobi BLAS *anat. anim.* p. 125.

(q) Septem PARIS.

(r) Sex PARIS.

(s) Sex BARTH. C. V. h. 14.

(t) *Mém. de Berlin* T. XII. p. 181. Quinque BUFFON T. VIII. p. 367.

(u) Septem PARIS.

(w) BLAS *misc.* p. 269. Sex PARIS. BARTHOLIN. C. IV. h. 1.

(x) BUFFON. T. IX. p. 320. 321.

fo (y), mele (z), genetia (a), mure indico (b), forice aquatica (c), glire aquatico (d), sciuro (e), mure (f), glire (g), talpa (h), mure montano (i), vespertilione (k), ratto sibirico (l), castore (m), lutra (n), lepore (o), erinaceo (p), opossum (q), viverra (r), mustela (s), putorio (t), agouti (u), mani (w). Sed etiam & equo multilobum est (y), & porco bisulco (z), atque apro tayacu (a).

Inter amphibia calida phoca (b) multos hepatis lobos habet, tum ursus marinus, quod aliud genus est phocæ (c).

Aliis

- (y) Octo *Comm. nov.* l. c. Conf. BUFFON T. VIII. p. 269.
 (z) Sex lobi. ARNAULD *hist. natur.* T. V. p. 2. p. 242. 245. 288.
 (a) BUFFON T. IX. p. 350.
 (b) Septem SEVERIN. *zoolog.* p. 328.
 (c) Quinque BUFFON T. VIII. p. 65.
 (d) Sex lobi BUFFON T. VII. p. 354.
 (e) Quinque *Eph. Nat. Cur.* Dec II. ann. 1. obs. 61.
 (f) Sex BARTHOL. *Ep.* IV. n. 51.
 (g) Septem PARIS. In glire vero quinque BUFFON T. VIII. p. 176. 48. in ratto sex p. 288.
 (h) GAUTIER *obs. period.* T. I. p. 28. 29. Septem HARDER *apiar. obs.* 24. Tres BUFFON VIII. p. 91.
 (i) Novem lobi PARIS. Sex lobi *Ph. tr.* 355. Quinque BUFFON T. IX. p. 233. Septem SEVERINUS 325. RICHARD III. p. 136. Quatuor HARDER *apiar. obs.* 22.
 (k) Trilobum HOOKER *Exp.* p. 82. Fere quadrilobum BUFFON T. IX.
 (l) Ultra quinque lobos *Nov. Comm. Petrop.* T. IV. p. 385.
 (m) Septem lobi *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 51. Sex lobi *Act. Erud.* 1684. [p. 362. *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 2. obs. 251.
 (n) Sex lobi PARIS. Septem lobi MARSIGLI t. 23. *Mém. Etrang.* II. p. 201. Quinque BUFFON T. VII. p. 143. Quinque & sex in marina lutra *Nov. Comm. Acad. Petrop.* T. II. p. 377.
 (o) Quatuor lobi BUFFON T. VI. p. 275. Tres BARTHOL. C. II. h. 86.
 (p) Quinque BLAS *anat. anim.* p. 63.
 (q) Tres lobi *Phil. transf.* n. 239. TYSON p. 34.
 (r) In *fuget* sex lobi BUFFON.
 (s) In *beletta* BUFFON *ibid.* p. 232.
 (t) *Fouine* BUFFON T. VII. p. 171.
 (u) Quatuor lobi BUFFON T. VIII. p. 385.
 (w) Quatuor lobi K. *Svensk. Acad. Handl.* X. p. 267.
 (y) BUFFON T. IV. p. 316. Quatuor & quinque lobi GIBSON.
 (z) Quatuor & quinque VESAL. p. 629.
 (a) Huic quatuor lobi *Phil. transf.* n. 153.
 (b) Sex lobi *Phil. transf.* n. 469. Ad octo PARIS.
 (c) *Nov. Comm. Act. Petrop.* T. II. p. 344.

Aliis piscibus frigidi generis mihi quidem integrum (d) visum est, & bilobum (e), ventriculo & intestino ei obverso adtensum. Simplex efoci (f), cycloptero (g), hirundini marinæ (h), lampetræ (i). Bilobum afello (k), galeo (l), pleurostomo (n), orbi (o), blenno (p).

Plures tamen lobos habere dicitur in aliis piscibus, tres (q) inprimis in raja levi (r) galeo acanthia (s), gymnoto (t).

Bilobum sed ulterius divisum est in hufone (u). In rhombo multi sunt lobi (w). Etiam in eodem genere simplex & divisum (x) reperitur.

In avibus etiam continuum, grande, utrumque pene hypochondrium (y) replet, & bilobum (z) est, non tamen sine laciniis, ex quibus plures facias lobos. Bilobum in aquila (a), accipitre (b), buteone (c), Psittaco (d), cornicibus variis (e), casuario (f), struthione (g), anserere

- (d) COLLINS p. 451. HILL. review. p. 115.
 (e) HILL. ibid.
 (f) GRONOV. *mus. ichthyol.* p. 10.
 (g) GRONOV. ibid. p. 56.
 (h) IDEM ibid. p. 9.
 (i) COLLINS T. 38.
 (k) SCHONEVELD p. 20.
 (l) Longissimum RONDELET L. III. c. 19. COLLINS T. 33, Maximum *Merc. de France* 1737. Dec.
 (n) GRONOV. *mus.* p. 27.
 (o) BARTHOLIN. C. II. h. 1.
 (p) GISLER. K. *Swensk. vetensk. Acad. Handl.* 1748. trim. I.
 (q) HILL. l. c. Plerique PARISINI. SCHAEFFER *pisc. Bavar.* p. 31.
 (r) ALDROVAND p. 452.
 (s) KLEIN *miss.* IV. p. 62. Galeo levi PARIS.
 (t) GRONOV. p. 20.
 (u) MÆSIGLI *opus danub.* T. VI. t. 15.
 (w) COLLINS t. 37. f. 3.
 (x) Salmoni Nov. Comm. Petrop. T. III. p. 420.
 (y) C. BAUHIN. *theatr.* p. 148.
 (z) COLLINS p. 449.
 (a) HARDER *apiar. obs.* 15. PARIS.
 (b) BAAS *anat. anim.* p. 131.
 (c) ALBIN. *avium hist.* n. 1.
 (d) COLLINS t. 23.
 (e) ALBIN. T. II. n. 21. 23. 24.
 (f) PARIS.
 (g) VALISNER. *oper.* T. II. P. 244.

fere (*b*), colymbo (*i*), fulica (*k*), laro (*l*), vanello (*m*), himan-
topode (*n*), scolopace (*o*), ciconia (*p*), scope (*p*^{*}), butauro (*q*),
ardea (*q*^{*}), meleagride (*r*), tarda (*s*). In nonnullis trilobum
est (*t*), etiam quadrilobum (*t*^{*}).

In quadrupedibus frigidis pariter bilobum, trilobum, quadrilobum,
ut ne in eodem quidem genere fatis constans sit. In vipera (*u*)
bilobum, etiam in caudifona (*w*), tum in crocodilo (*x*), lacerta (*y*).
In lacerta tockaye trilobum (*z*) est, sic in rana (*a*). Quatuor lobi sunt in
salamandra (*b*).

Ex his omnibus nihil fatis certi, aut alicujus in physiologia momenti
deduci potest, cum neque cum alimenti genere propria hepatis fa-
brica conjungatur, neque cum classe animalis. Homo enim omnivorus
est, animalia, quibus hepar simplex, pleraque herbivora: turio plane
carnivorus. Lepori, cuniculo, muri montano, potissimum herbivoris,
multifidum hepar est. Ut pene cum VESALIO crederes, hepatis nul-
lam certam figuram esse, sed ad viciniam suam id viscus se accommodasse,
nisi

- (*b*) COLLINS t. 20. f. E.
- (*i*) ALBIN. I. n. 82.
- (*k*) IDEM. I. n. 82.
- (*l*) IDEM II. n. 87.
- (*m*) IDEM I. n. 74.
- (*n*) IDEM I. n. 78.
- (*o*) IDEM I. n. 70.
- (*p*) HARDER apiar. p. 2.
- (*p*^{*}) PARISINI.
- (*q*) Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann 2. obs. 31.
- (*q*^{*}) SCHRADER.
- (*r*) PARIS.
- (*s*) HARDER obs. 19.
- (*t*) Tres lobi in cygno BARTHOL. Anat. Cygn. p. 36. in gallo pavone COLLINS
- I. c. in corvo aquatico PARIS. Bilobum in eo ALBIN. II. n. 81.
- (*t*^{*}) In struthione WARREN.
- (*u*) CHARAS T. II. F. F. In serpente prælongum COLLINS t. 41. f. 2. Simplex in
- vipera COITER p. 126. Simplex, sed tota intestina legens PARIS.
- (*w*) Phil. transf. n. 144.
- (*x*) Mém. de phys. & de mathem. p. 22.
- (*y*) JACOBÆUS p. 109.
- (*z*) Mém. de phys. & de mathem. p. 52.
- (*a*) HARDER apiar. obs. 3. RONDELET II. p. 219. JACOBÆUS qui rana quatuor lo-
- bos facit p. 51. Bufoni tres JACOBÆUS.
- (*b*) Quatuor lobi JACOBÆUS p. 120.

nisi satis certum esset, vicinas partes potius post hepar grandescere (c), & ipsas adeo potius ad hepar se contemperare (d). In avibus a corde tamen divisio in lobos nascitur.

§. V. *Hepatis in universum figura.*

Hepatis humani figura verbis vix potest describi. In dextro tamen latere crassissimum & compressum tuber (a) id viscus orditur, quod, uti diximus, diaphragma replet, & hypochondrium ejus lateris.

Inde sinistrorsum gracilescit (b), tamquam de ovo majorem partem per apicem (c), obliqua, non penitus ad basin penetrante, curva sectione abstulisses: & abit in lobum sinistrum hinc convexum inde cayum, donec & gracilior semper & tenuior pene plano apice finiatur (d), in aliis obtusior (e).

Posterior omnia obtusa sunt, anterior pars, quam dicemus, convexa hepatis, cum concava in aciem coit, qui margo sensim sursum (f); & sinistrorsum tendit, & est utique inferior, inque cultri pene modum acutus, dum crassities hepatis antrorsum continuo diminuitur. Is margo in lobo dextro incipit ad renis sedem; adscendit inde mutato ductu, sinistrorsum se confert, in universum, lunatus. Eum marginem nonnunquam quasi aliquæ digitorum impressiones (g) interrumpunt, quarum princeps est pro ventriculo (g*), alia venam umbilicalem admittit (h). Pro emittenda etiam vesicula sinus exsculpitur, non perpetuus.

§. VI.

- (c) *Form. du poulet.* p. 121. sub finem diei IV.
 (d) Vide, si placet, philosophantem de figura hepatis GLISSONIUM p. 10.
 (a) VESAL. f. 18. ad dextra venæ cavæ. EUSTACH. t. 10. f. 2. t. 11. f. 4. CHES-
 ELDEN t. 22. Conf. JENTY t. 3.
 (b) VESAL. f. 18. 22. &c. EUSTACH. t. 9. CHESLDEN t. 21. etiam JENTY.
 (c) GLISSON p. 110.
 (d) VESAL. f. 12. 18. 20. 22.
 (e) EUSTACH. T. XI. f. 4.
 (f) VESAL. L. V. f. 6. 12. 18. 20. 22. EUSTACH. t. 9. JENTY t. 1. f. 3.
 (g) VESAL. f. 18. JENTY t. 3.
 (g*) Conf. GUNZ p. 5.
 (h) VESAL. f. 6. 12. EUSTACH. T. X. f. 2. T. XI. f. 4. CHESLDEN t. 21. 22.
 JENTY l. c.

§. VI. *Pars gibba.*

Simplex hæc pars hepatis est (a), & partim diaphragmati respondet, partim, ut in epigastrio, musculis abdominis. In dextro latere, crasso tubere incipit, cujus lateralis facies ad hypochondrium dextrorsum se admovet; deinde & superior, gibba, septi transversi alæ dextræ obvertitur, atque costalibus & lumbalibus carnibus. Ea sæpe sede hepar crassius est, & accessorium quasi gibbum habet (b).

Inde media pars gibba pene posterius plana est, cui cor infideat, solo septo transverso ab hepate divisa. Ea ipsa sede ad diaphragma adhæret (c).

Quæ pars antrorsum descendit (d), costalibus carnibus anterioribus obversa, ut vel colon tegat vel duodenum, vel ventriculum, ea modice convexa versus marginem deorsum extenuatur.

Cæterum per ligamentum suspensorium (e), ab accessione venæ umbilicalis, retrorsum ad dextra venæ cavæ, convexum hepar dividitur, dexterque lobus dicitur, qui dexterior huic limiti adjacet, sinister, qui sinisterior.

§. VII. *Pars sima (a).*

Multo magis hæc composita est, & multiformis. Ut enim convexa facies foli diaphragmatis & continuis musculis abdominis, ita sima ista diversissimis partibus applicatur, reni, colo intestino, ventriculo, iterum colo, lieni, & ab omnibus fere figuratur, ut convexam eorum figuram sua concavitate exprimat. Deinde hæc potissimum pars vasa recipit, & ob ea variis fissuris dividitur.

Ergo primum lobus dexter duas habet facieculas modice excavatas, quarum anterior major, colo intestino (b), uti diximus, infidet.

Posterior

(a) VESAL. f. 18. EUSTACH. T. XI. f. 3. JENY 1. c.

(b) MORGAGNUS Ep. I. n. 12. 13. BERTRANDI p. 2.

(c) L. XX. p. 352.

(d) VESAL. f. 22. 25.

(e) EUSTACH. l. 9. CHESLDEN, JENY.

(a) POLLUX p. 256.

(b) VESAL. L. V. f. 12. BERTRAND p. 3. CHESLDEN t. 21. DRAKE tab. 2. Junioribus major DUVERNEY II. p. 214.

Posterior (c) reni respondet, & magis sursum capsulae dextrae, ad dextra transeuntis venae cavae. Utramque facieculam linea evidens dividit, quae a cauda lobuli postici continuatur.

Sinisterior lobus molliter excavatur (d), & facie anteriori, magna, ventriculo, minori & maxime anteriori colo imponitur.

Media pars hepatis, inter has, quas descripsimus, sed quae tamen lobo dextro accenseatur, eadem maxime multiformis est. Ordinem a sulcis sumemus.

Ergo ab accessione venae umbilicalis, quae est in parte anteriori, paulum dexteriori, hepatis, retrorsum ad usque venae cavae in hepar adventum, sulcus (e) exit, in universum continuus, quem *horizontalem* (f) dicemus. In puero tenero adscendit, & ductus venosus etiam magis. In adulto homine hepar brevius est.

Ejus sulci pars anterior venam umbilicalem continet (g), pars posterior angustior ductum venosum (h). Media parte cum fissura transversa committitur, satis directe (i), ut tamen saepius ductus venosus paulo dexterior sit (k), & magis sinistra (l) petat: vidi etiam fossam umbilicalis venae serpentinam fuisse. Vidi venam umbilicalem sinisteriorem fuisse. Est ubi tota haec rima aperta est (m): est ubi vena umbilicalis vel ejus certe particula, ponte quasi ex ipso hepate (n) facto tegitur, & per tubulum (o) incedit, huic substratum ponti, a dextro lobo in sinistrum continuato. Vidi duos fuisse ejusmodi pontes. Rarius autem est ejusmodi pontem (p) in ductu venoso conspici.

Haec fissura in parte summa lobum dextrum a sinistro dividit.

Nunc

(c) VESAL. ibid.

(d) VESAL. f. 12. 20. CHESLENDEN t. 22.

(e) *Grande scissure* WINSLOW n. 256.

(f) BERTIN. *Mém. de l'Acad.* 1753 p. 332.

(g) Ubi vena ab umbilico prodit, intervallum est rupium simile ORIBAS. p. 112.

(h) *Sillon* WINSLOW n. 257.

(i) TREW *different. fetus* f. 1. 22. 23. 24.

(k) BIANCHI t. 2. 3. nimium & f. 12. Paulum TREW f. 1. 56. 74.

(l) CHESELD. *tab.* 34. FABRIC. *form. fet* f. 20. GLISSON c. 13. p. 292. & in *tab.* BERTIN. p. 334.

(m) Nudam GARENGEOT BIANCH. *tab.* 2. Rarius nuda est GUNZ. p. 4.

(n) Parvus pons EUSTACH. T. K. f. 2. T. XI. f. 3. TREW. f. 73. *Comm. Ner.* 1733. t. 2. f. 2. ARANT. *de fetu* p. 18.

(o) Tubulus FABRIC. *progr.* n. 1759.

(p) Nunquam etiam GUNZ. p. 4. Sed videtur tectum pingere EUSTACH. 1.

Nunc a media, sed tamen potius paulum a posteriori, parte hujus fulci alter ad rectos angulos dextrorsum procedit sulcus *transversus* (q), amplior, profunde in hepate exsculptus, nunquam ullo ponte hepatico contactus. Is recipit sinistrum ramum venæ portarum. Idem in dextro fine suo in gracilescientem rimam finitur, quæ ramum ejus venæ dextrum continet. Tenet tertiam partem, aut paulo minus, latitudinis hepatis: ut visceris portio hoc eodem sulco anterior multo major sit.

Iterum, ante partem hujus transversæ rimæ dexteriolem, ovata fere vallecule in hepate modice excavatur, non penitus dimidii ovi capax (r); eademque modo in hepate manet (s), ut solet in junioribus, modo ipso in margine hepatis porro exsculpitur (t), quando vesicula de hepate eminet, quod in adultis hominibus frequentius est (u). In hac vallecule fellis est vesicula, ductu horizontali (w), retrorsum (x), & sinistrorsum (y) tendente.

Rarissimum est, & tamen vidi, in sinistro lobo fellis vesiculam fuisse, & trans fossam umbilicalem, quam tegebat, dextrorsum oblique ivisse. Rarum etiam, quod pariter vidi, in eodem cum vesicula fellis hepatis sulco appendiculam coli sedem habuisse.

Denique ad dextra lobuli, quem statim dicemus, similis fere semicylindrica vallecule exsculpitur, quæ hinc *papillam* habet eminentem lobuli, inde posterius advenientem processum *caudatum*, qui dextrorsum in lineam quam diximus, dextri lobi hepatis abit. Inter hos colliculos celeberrima vallecule intercipitur, & in anatome & in pathologicis magni nominis. *Portas* aut dixerunt (z) veteres, aut certe dixisse potuerunt, si hominis jecur iis notum fuit. Nam venam certe *ad portas* dixerunt, sed

(q) HEISTER. t. 3. f. 12. GARENGEOT. BIANCHI *tab. 2. a D. ad P. tab. 3. Second enfoncement* WINSLOW n. 257. *Fissura transversa* GUNZ. p. 4.

(r) VESAL. f. 22. 25. WINSLOW n. 290.

(s) GARENGEOT. VESAL. L. V. DRAKE. RIOLAN. p. 409. FABRIC. in iconibus l. de form. fet. JENTY. Negatur in *Eph. Nat. Cur. Ann. IX. p. 102.* sed sæpe vidi.

(t) Subinde WINSLOW n. 258. Habet BERTRANDI p. 2

(u) RIOLAN. p. 409. EUSTACH. t. 10. f. 2. *tab. II. f. 4.* BIANCHI ubique CHESELDEN t. 22. Media parte VESALIUS p. 623.

(w) CHESELDEN t. 22.

(x) WINSLOW n. 291.

(y) Ita etiam GUNZ. p. 4.

(z) HIPPOCRATICUS *Auctor de anat.* CELSUS L. V. p. 26. GALEN. de *diff. venar.* ab init. Venas ita vocasse RUFUS II. p. 38. I. p. 39.

sed ea per eorum collum intervallum ad hepar advenit. Deinde manifesto ARETAEUS, melioris ille notæ auctor scripsit, a *portis* venam (*a*) recta in hepar ingredi, quæ in multa tenuia & demum in tenuissima per hepar findatur. Inde ORIBASIIUS portas eum locum dixit (*b*), in quem venæ a mesenterio veniunt, quæ certe sunt nostræ. Nam ab iis solis una vena porrigitur in multas fissa, quibus caro visceris interjacet. Et POLLUCI (*c*) *πυλαί* sunt, secundum quas sanguis advenit, ut per unicam venam dividatur. Denique ne de fini hepatis colliculos cogites, ARISTOTELES venam dixit, a majori ortam, qua *portæ* habentur (*d*). Hæc addidi ob ILL. GUNZII dicta (*e*) & BERTRANDI (*f*).

Venit is sulcus sursum paulum dextrorsum in rimam transversam posterius, quam vesicula.

Diximus caudatum processum, obliquum, paulum curvum, eminere a lobulo postico. Ad ejus caudæ dexteriores alius sulcus (*g*) in hepate exsculpitur, qui jam magis (*h*), fere ad convexam partem spectat, oblique antrosum, dextrorsum ducens. Ex eo sulco vena, porro insigni satis flexione (*k*), sinistrorsum (*l*), versus medias vertebrae emergit; modo continuo nuda, non raro a carne hepatis tamquam a ponte contacta, etiam ut integer cylindricus tubulus sit (*m*). Est venæ cavæ a corde, aque foramine diaphragmatico, versus vertebrae tendentis nidus: qua vaginam a peritonæo habet, reliqua tota parte sui extra ejus saccum posita (*n*).

Cæcæ & regula carentes rimæ etiam aliæ in dextro hepate adparent, fere transversæ (*o*). Oportet autem meminisse, sulcum horizontalem

(*a*) *Acut. sign. caus.* II. c. 8.

(*b*) p. 114.

(*c*) p. 257.

(*d*) *Hist. anim.* L. I. c. 17.

(*e*) p. 5.

(*f*) p. 10.

(*g*) Solus sulcus BIANCHI t. 4. Sed nimis longus MORGAGN. n. 28 p. 29. Add. BERTRANDI p. 10. Vena EUSTACH. ibid. BIANCHI tab. 2. 3.

(*h*) MORGAGN. *Ep.* I. p. 14. n. 10.

(*k*) *Idem* ibid.

(*l*) EUSTACH. t. 10. f. 4. MORGAGN.

(*m*) EUSTACH. ibid. Negat VESALIUS L. III. p. 458.

(*n*) KAAUW n. 607.

(*o*) MORGAGN. VESAL. I. c. BERTRANDI p. 11. MALPIGHI c. 2.

talem in hepate suo in situ relicto non adparere, neque ullas inesse patulas in hepate valles: sed fulcorum hepatis oppositas quasi ripas se contingere, easque interpositos quasi fluvios penitus abscondere.

§. VIII. Lobuli.

Lobulos volumus, posticum, anteriorem, & aliquos erraticos.

Posterior celebrior est HIPPOCRATICO (a), forte auctori dictus, certe VESALIO (b), & Jacobo SYLVIO (c); ab EUSTACHIO pictus (d), neque adeo bene a SPIGELIO nominatus (e).

Is lobulus a margine posteriori hepatis incipit, sub trunco venæ cavæ, ibi simplex, & latus. Eo loco vertebris innititur, inter venam cavam & celophagum. Inde adscendit in partem visceris cavam, antrosum (f) eundo, & continuo in duos colliculos dividitur.

Eorum *superior posterior* (g) oblique, & cum curvitate, oblique pone vesiculam dextrorsum migrat, a lobulo in dextrum lobum (h), & limitem facit inter venam cavam, portarumque venam (i). Idem dilatatur denique, sulcumque subtendit, qui ex transversa rima continuatur, porroque lineam orditur (k), quæ renalem facieculam hepatis dextri a colica faciecula separat. *Caudatum* dicas.

Major colliculus, qui solus vulgo lobulus SPIGELII audit (l), antrosum pergit & deorsum, & in magnæ papillæ similitudinem, obtusus desinit (m).

In

(a) *peri ovar.* Sect. 6. duas etiam nominat eminentias: sic duos parvos lobos in sinistra parte SYLV. *column.* 126.

(b) Portiuncula ad ortum venæ portæ protuberans VESAL. p. 620.

(c) Lobulus minimus ad portæ exortum *Varior. corp. diff.* p. 71. Ex eo PARR. L. II. c. 17.

(d) EUSTACH. t. II. f. 4.

(e) A nemine dictum esse SPIGELIUS L. VIII. c. 12. p. 234. t. 8. f. 1. Habet & RIOLANUS p. 748. & alii.

(f) EUSTACH.

(g) Appendicula GUNZ. p. 5. Isthmus MORGAGN. Ep. I. n. 19. Alter, puto, colliculus HIPPOCRATIS, SYLVII & RIOLANI.

(h) *Tab. art. Cæl* I.

(i) EUSTACH. l. c.

(k) *Tab. Cæl* I.

(l) An hic alter colliculus dictus SYLVIO RIOLANO p. 748. *Eminence triangulaire* WINSLOW p. 254. 255.

(m) EUSTACH. t. II. f. 4. *semiovatum*.

In ejus latere dextro, sinistrisque eminentiæ caudatæ finibus sulcus est, qui venam portarum adducit (*n*).

Cæterum hæc papilla infulæ habet modum, ad cujus dextra vena, quam dixi, portarum, ad sinistra ductus venosus, antèrius sulcus transversus hepatis sit. Ipse lobulus inter ventriculi ostia (*o*) quasi urgetur, contiguus pancreati, eumque insidens magnus & sinister lobus premit. Omentum hepaticogastricum ante se habet, & denique liber definit (*p*).

Lobulus *anterior* (*q*) anonymus, pene parallelogrammus, ovato colliculo (*r*) tamen intumescens, ante sulcum transversum ad marginem hepatis anteriorem pervenit, idemque a sinistro lobo fossa umbilicali separatur. Ad dextra habet accumbentem vesiculæ sulcum.

Alii lobuli ab hepate aliquando producuntur, quorum aliquis vel lieni incumbit; vel ante ventriculum descendit, proprio ligamento ad diaphragma nexus. Alius ad dextra & posteriora vesiculæ capsulæ renali incumbit, omnes quidem non perpetui. Lobum minimum petiolatum, alibi citatum lego (*s*). Hepar multilobe fetus (*t*).

§. IX. Vasa hepatis. I. Adducentia.

I. Arteria hepatica.

Solum hepar id habet singulare, quod sanguinem non ab arteria sola, sed a duabus etiam venis habeat, certe dum fetus utero continetur. Quate merito inter prima viscera evolvitur (*a*), & grande jam est, uti diximus quo tempore pulmo, renes, ventriculus, intestina, oculos fugiunt (*b*).

Ut ingens autem viscus est, ita numerosissimas arterias accipit, magnas quidem a coeliaca pene sola: sunt tamen aliæ, non quidem perpetuæ, sæpe tamen magnæ, a coronaria, a mesenterica: tum aliæ, semper minores, a mammaria, ab epigastrica, a phrenica, a capsulari, a spermatica.

Quæ

(*n*) Tab. cel. I.

(*o*) De junioribus Gualt. offero sulla sezione del Mesenterati p. 18. Sed perpetuum est.

(*p*) MORGAGN. l. c.

(*q*) VERHEYEN p. 92.

(*r*) Jam habet SPIGELIUS L. VIII. tab. 8. f. 1. N. N.

(*s*) Phil. transf. n. 464.

(*t*) Nudum idem K. Swens. vetensk. Handl. 1763. Triens. l.

(*a*) p. 466.

(*b*) Conf. de la form. du poulet II. p. 123.

Quæ a coeliaca (c), ea maxima est, eamque diximus adeeam usque fedem, in qua venam portarum adtingit. Est autem, ne repetam, major in juniore homine coeliacæ ramus, transversim per portas ad venam advenæ, inque vena ejus nominis duodenalem emissura, & coronariam. Ex aorta hepaticam prodiisse, inter coeliacam & mesentericam, rara est Cl. BERTRANDI adnotatio.

In funiculum vasorum hepaticorum, venit proprio in sulco lobuli, ut præterea ejus aliquo incurvo quasi processu nonnunquam ambiatur. Plurimis vasculis exiguis lymphaticis & rubris, tum filis imprimis cellulosis cum vena portarum & bilariis ductibus irretita, pergit sursum, dextrorsum, propior lobulo, & sinisterior (f), & conspicua, dum vena portarum latet, a ductibus bilariis & ipsa sæpe partim tecta (g). Eo in itinere ramulos edit minutos ad fasciculum vasorum biliariorum, adque glandulas conglobatas vicinas. Dat etiam nonnunquam hepaticam (h) finistram, etiam prius, quam duodenalem.

In ipsis portis, ante venam ejus nominis, separatur in ramos duos (i), aut tres (k), frequentius tamen, ut puto, duos, dextrum finistrumque: vidi etiam quatuor fuisse.

Dexter major, etsi minus conspicuus (l), profundior vasis bilariis tectus, ipsaque vena portarum, trans venam portarum quam alias contegit, dextrorsum adscendendo (m), in eam parvam partem transversi sulci abit, quæ ab accessione trunci venæ portarum dexterior superest.

Minores autem prius, quam hepar subeat, remos edit ad vasa biliaria (n), cum finistarum furculis, aliisque hepatici trunci propaginibus & duodenalium ramulis irretitos. Nonnunquam etiam pyloricam

(c) Jam SYLVIVS habet *Isag.* p. 70. b.

(d) p. 32.

(e) EUSTACH. t. 10. f. 2. t. 27. f. 1.

(f) IDEM *ibid.*

(g) WINSLOW n. 187.

(i) *Tab. cæl. I.* EUSTACHIUS t. 10. f. 2. t. 27. f. 1. BERTRANDI p. 31. SPICUL. L. VIII. t. 8. f. 1. FECHLIN *obs.* 59. Cent. 1.

(k) LOQUET. de *art. hep.* n. 6.

(l) *Tab. cæl. I.* in ventriculo.

(m) EUSTACH. l. c.

(n) *Tab. cæl. I.*

cam hic edidit, & furculum in pancreas retrogradum, comitem venarum portarum (o). Inde porro dividitur in ramum anteriorem & posteriorem.

Ille sæpius dat *cysticam*, longe plerumque (p), ut raro a sinistra nascatur: *cysticam* dico, quod longe frequentius unica sit, etsi tamen subinde duæ sunt (q).

Ea dextrorsum ad cervicem vesiculæ venit, & constanter satis in duos ramos abit, superiorem, occultum, ad partem vesiculæ in hepar demersum, sed imprimis in vicinum hepar, & inferiorem, manifestum (r), similem, pariter proprie hepatis (s) datum, etsi etiam vesiculæ prospicit.

Isti rami vesiculæ cum arteriis hepatis plurimis furculis inosculantur (t) fundum sulci vestientibus, pro vesicula parati. Earum furculi exigui etiam *cysticam* adeunt.

Arteriæ *cysticæ* in vesiculæ tunica nervea præcipuum & perelegans rete (u) faciunt, stellatisque finibus (w) terminantur; ut multi ex uno centro rami exeant.

A *cystica* etiam arteria ad vicinos bilarios ductus peculiaris elegantior arteria ad cervicem venit.

Quando duæ sunt *cysticæ*, ut aliquoties vidi, earum alteram sinistra (x) coeliaca dedit, alias mesentericæ propago cum hepatica dextra conjuncta, alias ramus dexter arteriæ duodenalis.

Reliquus truncus anterior adit lobum anonymum & dextrum.

Truncus *posterior* hepaticæ, tectus plerumque vena portarum, tamen etiam manifestus, dat ramum dexterem lobulo SPIGELIANO, etiam anonymo (y), & aliam magnum per fissuram colliculo caudato subjectam.

(o) L. XXII. p. 412.

(p) ORIBAS. p. 122. VESAL. p. 621. SPIGEL L. VIII. t. 8. f. 1. PECHLIN. obs. 59. Cent. I. RUYSCH Ep. V. t. 5. f. 4. COWPER app. t. 3. f. 34. BIANCHI tab. 2. ab u ad i. WALTHER de cœliaca. HERBSTREIT conf. venar. LIEUTAUD p. 490. BERTRANDI p. 31. Tab. cœliac. I.

(q) Duas habet VESALIUS p. 490. ic. p. 484. WINSLOW n. 189. HEISTERUS, KULMUS &c.

(r) Tab. cœl. I.

(s) Ibid. RUYSCH. tab. cit. f. 4. Tbes. X. n. 132. Tbes. I. aff. II. n. 7. Hist. de l'Acad. 1705. n. 9.

(t) LOQUET. n. 4. RUYSCH. f. 4.

(u) RUYSCH. ic. cit.

(w) SEGER. p. 15.

(x) WALTHER ven. port.

(y) Tab. cœl. I.

etiam, dextrorsum euntem. Dat etiam nonnunquam cysticas, & trunco suo, posteriori loco, totus per hepar dextrum dividitur.

Numerosi autem ab eo [& ab aliis hepaticis] ramuli in superficiem (z) hepatis emergunt, perque eam sub externa membrana conspicui ludunt, carne hepatis perforata, reteque faciunt, quo hepar ab omnibus aliis visceribus distinguitur. Hi sunt procul dubio furculi, qui de superficie hepatis tenuem humorem exhalant (a).

Sinister ramus hepaticæ arteriæ, plerumque minor est, & valde exiguus (b), quoties coronaria arteria major magnum ramum per ductum venosum ad hepar dat. Cæterum ante venam portarum incedit. Eadem in magis consueta fabrica dat coronariam minorem ventriculi (c); dat ramulos ad vasa biliaria, cum prioribus inosculatos: sequitur venæ portarum ramum sinistrum (d), per sulcum hepatis transversum; ad aliquam tamen distantiam: & tribus fere truncis, sed cum varietate aliqua, adit lobum anonymum (e), lobum, SPIGELII [exque eo in fossam etiam ductus venosi] fissuram umbilicalem, & venosi ductus fossam, perque eas rimas in lobum sinistrum.

Ab eo sinistro ramo elegantes anastomoses nascuntur, cum truncis minoribus hepatis. Et a ramo quidem fossæ umbilicalis alias tamen a trunco potius dextro, aliqui rami oriuntur, qui per eam fossam cum vena (f) ad epigastrium (g) & umbilicum veniunt, inosculati cum epigastricis (h), & mammariis (i).

Alius ad idem ligamentum (k) sed anterieus & versus umbilicum se addit, pariter & priori inosculatus. Idem dat venæ umbilicali.

Alius

(z) MORGAGN. Ep. I. n. 21. *adv. anat.* III. p. 39. RUYSEN. *Epist.* V. p. 22. t. 5. f. 5. t. 6. *Thes.* 10. t. 3. f. 5.

(a) BOYLE de poros. corp. p. 18. KAAUW n. 562.

(b) Tab. art. cœl. I.

(c) L. XIX. p. 150.

(d) EUSTACH. t. 27. f. 1.

(e) Tab. cœl. I.

(f) BIANCHI t. 2. RUYSEN *Epist.* V. T. V. f. 5. Tab. cœl. I.

(g) Tab. art. brach. I. 34.

(h) Ibid. 35. Huc refero, quæ MORGAGNUS habet *Epist.* I. n. 4.

(i) Tab. art. brach. 36. p. 8. & 9.

(k) An iste LOQUETO dictus n. 8. aut BERTANDO p. 32.

Alius (1) ad ligamentum suspensorium venit, ex ipsa carne hepatis, legit radicem ejus ligamenti, & hinc cum mammaria (m), inde cum phrenica (n) numerosis furculis coit.

Denique ad posteriora ligamenti suspensorii ex carne hepatis ramus accedit, qui & retrorsum radicem ejus ligamenti sequitur, & antrorsum cum arteria modo dicta, in arcum continuatur, quæ de fossa umbilicali exiit, aliamque cum phrenica sinistra coronam facit retrorsum redux.

A ligamento etiam sinistro ramuli hepaticæ sinistræ eunt in lienem (o), & diaphragma, per ligamentum sinistrum (p).

Quando tres sunt arteriæ hepaticæ rami, tunc dextra est, sinistra, & media.

Media ista, quæ minus frequens sit, est etiam minor, magisque in superficie visceris manet. Edit ramos pyloricos, coronariam parvam, ramulos ad ductus bilarios, adque cervicem vesiculæ, denique ad duodenum, adit lobum anonymum, & fossam umbilicalem, perque pontem huic instratum in sinistrum lobum exit.

Alter a coeliaca hepaticus truncus plerumque parvus est, & a coronaria majori advenit, datque omento hepatico gastrico, & in fossam ductus venosi (q), perque ligamentum ad sinistrum lobum. Idem tamen nonnunquam magnus est truncus (r), & dextræ hepaticæ par. Quando ejusmodi est, tunc rami sinistri lobi omnes, & plerique rami lobi anonymi, & SPIGELIANI, & illi cum phrenicis & mammariis communicantes, sunt ab hoc trunco, quem nunc dicimus, medio.

A duodenali, quæ est a coeliaca, & ad ductus bilarios ramuli veniunt, inmixti hepaticis, & aliquando ad proximum hepar.

Cæterum hepatica, etsi forte pro visceris portione non maxima, non (s) tamen exigua est, neque ejusmodi, ut recte cum bronchiali (t) compares. In alio enim cadavere puerili dextram 10. sinistram

31.

(1) Tab. cal. I.

(m) Tab. art. brach. 8. & 9.

(n) Conf. RUYSCHE l. c.

(o) FALLOP. p. 117. b.

(p) Tab. cal. I. ad 9.

(q) Fasc. III. p. 55. Habet HEUERMANN T. III. p. 714.

(r) WALTHER SCHMIEDEL de inflam. intest. p. 8. 9. Tab. cal. I. Huc videtur etiam spectare WINSLOW n. 181.

(s) Monet PECHLIN. l. c. LISTER de hum. c. 38.

(t) ORTLOB. de negot. cholep. n. 16. WEISS vaf. propr. vife.

11. centesimarum pollicis reperi, ut summa diametrorum quadratorum esset 121. in alio cum tres essent trunculi 7. 9. & 11. ut summa foret 251. quæ erat quarta pars luminis venæ portarum, cujus diameter foret 32. & quadratum 1024. (u). Fines dicentur, cum reliquis vasis ipsius hepatis.

§. X. *Aliæ arteriæ hepatis.*

Perpetua (a) primum est, quæ ex mesenterico trunco, omnium prima, prodit. Ea cum arteria pancreaticoduodenali facta anastomosi, sociata venæ portarum, pone pancreas, & pone eam venam, per dexteriora vallecule portarum, tecta ipsa magna ea vena, ad hepar dextrum venit, & arcum cum aliqua hepaticarum habet, quas dat cæliaca.

Plerumque exigua est, non tamen raro (b) adeo grandis, ut rami dextri cæliacæ abentiam suppleat, ejusque solitos ramos ipsa edat, hepaticos dextros, in sulci transversi hepatis finem euntes, & in fossam ductus venosi, & in umbilicalem (ba); & in lobos adjacentes: tum coronariam ventriculi dextram, cysticas (b*), & primam (b†) duodenalem, cum mesenterica solito more inosculatam, etiam pancreaticam (b**), duodenalem sinistram, quæ cum aliis duodenalibus arcum facit, etiam alias. Quando ramus a cæliaca dextra una adest (c), ea a mesenterica propago locum tenet trunci posterioris dextri hepatici. Rem sæpe satis vidi; & alii ante Cl. viri (d). Vidi diametrum 11. centes. poll. habuisse.

Proxima

(u) Majorem homini esse, quam brutis WAINSWORTH liver. p. 84.

(a) Fasc. VIII. p. 31.

(d) GALENUS, cum arteriam eandem mesenterium ajat adiisse & hepar de arter. & venar. dissect. D. de MARCHETTI comp. anat. p. 27. S. COLLINS & WILLIS apud COLLINS system. NICOLAI Commun. Lit. Nor. 1732. hebdom. 33. CHESLUDEN anat. Ed. III. tab. 20. f. 7. Edit VI. p. 188. WINSLOW p. 189. KRUGER anat. & theodidactos p. 10. WALTHER de intest. angust. obs. 3. PETSCHER diss. n. 49. § 1. HENSING de periton. n. 41. MOSEDER de vesic. fell. p. 8. GUNZ. l. c. n. 10. HEUERMANN III. p. 714. SCHMIEDEL de inflamm. intest. p. 8. 9. HENRICI de omnib. ALBINUS apud LAMBRICHTS obs. p. 25.

(ba) Etiam HENRICI.

(b*) Etiam SCHMIEDEL. HENRICI.

(b†) Ramum ad duodenum SCHMIEDEL.

(b**) Ad pancreas SCHMIEDEL.

(c) PETSCHER. WALTHER.

(d) GUNZ. WALTHER.

Proxima classis est, quam mammaria ad hepar mittit. Earum princeps (*e*) non minima est *phrenico pericardiaca*, quæ non rarissime perforato diaphragmate in gibbam partem hepatis descendit, prope posteriorem terminum ligamenti suspensorii, atque cum ramulis hepaticis ad superficiem visceris erumpentibus inosculatur.

Porro alia (*f*), ad quintum costarum intervallum nata, ad peritonæum super umbilicum & anteriora ligamenti suspensorii, & cum duplicibus arteriis ab hepatica inosculatur, & cum venæ umbilicalis sodalibus, & per ejus venæ fossam advenis: eadem cum ea vena in eam fossam & in hepar dat ramum aliquando.

Ultimi furculi sunt rami musculo phrenici (*g*), qui & ipsi ligamentum suspensorium adeunt, similes facturi anastomoses. Nonnunquam majores sunt.

Porro ex ipso trunco mammariae abdominali (*h*) alij furculi peritonæo dati, in vena umbilicali & in ligamento, quod dixi, ramulos habent, cum hepaticis irretitos.

Arteriis *phrenicis* multiplex cum hepate commercium est. Dextra phrenica (*i*) mistas cum capsularibus hepaticas emittit, quæ cum vena cava ad lobulum, & ad dextra & posteriora hepatis veniunt.

Alius ramus, post priorem ortus, proxime (*k*) ostium venæ cavæ, ad dexteriores ejus venæ, posteriora hepatis adiit, cum hepaticis solitis varie inosculatus. Duas etiam fuisse vidi ad sinistram venæ cavæ latus propagines: alteram ad fossam pro vena cava exsculptam, eamque sedem hepatis: alteram in partem hepatis, quæ est pone eminentiam obliquam. Ab ea ad ductus bilarios, & ad pancreas ramum vidi ivisse.

Hi a sinistro ramo arteriæ phrenicæ dextræ, a dextro aliæ, inter capsulares natæ, ad ligamentum dextrum, & per idem ad hepatis sedem convexam posticam veniunt.

A sinistra porro phrenica fere ex origine (*l*), ramus ad sinistra venæ cavæ sedemque ductus venosi tendit.

A ramo

(*e*) Fascic. VI. p. 8. Habet HENSING l. c. a mammaria arterias ad hepar.

(*f*) Fascic. VI. l. c.

(*g*) Fascic. VI. l. c. p. 9.

(*h*) Fascic. VI.

(*i*) Fascic. III. p. 53. 54.

(*k*) Fascic. VIII.

(*l*) Fascic. VIII.

A ramo ejus phrenicæ sinistro (*m*) cum ligamento hepatis sinistro duo furculi adveniunt. Eorum alter ad lobum sinistrum & ad lienem tendit; alter in sulcum ductus venosi venit, cum arteriis ligamenti suspensorii, ejusque sulci, inosculatus.

Sed a dextro ramo sinistrae phrenicæ ramus (*n*), legit radicem ligamenti suspensorii, qua id ligamentum hepati innascitur, & contrarius occurrit arteriæ ab hepaticis, ab anterioribus secundum eandem radicem advenienti (*o*). Eadem cum aliis hepaticæ furculis, huic ligamento datis, & cum mammariis, & cum epigastricis inosculatur.

Et a mediis sive anticis capsularibus (*o*^{*}) rami minuti ad partem hepatis venæ cavæ proximam veniunt, & cum hepaticis communicant.

A capsularibus imis (*p*) sive renalibus, ad lobum SPIGELII, aut ad lobum dextrum veniunt, cum hepaticis varie mixtæ.

A spermatica dextra duo rami hepar adeunt, comites venæ cavæ, anterior & posterior, in sulcum ejus venæ dati, varie cum hepaticis superficialibus, & cum aliis conjuncti, qui profunde per ejus visceris parenchyma ad venæ cavæ sedem veniunt,

Ab epigastrica (*q*) furculi in regionem umbilicalem sedemque venæ umbilicalis minuti veniunt, ejus venæ socii, in hepar & in ligamentum suspensorium, cum hepaticis ex sulco umbilicali advenientibus (*r*) inosculati.

§. XI. II. Vena umbilicalis (*a*).

Etsi hæc vena pariter possit in fetus historia describi (*b*): in longo tamen opere, incertus vitæ, tempore præsentem utor; ne abrupto forte opere,

(*m*) Fascic. III. p. 53.

(*n*) Hæc forte dictæ RUYSENIO l. c. Epist. IX. p. 10. & Cl. HEBENSTREIT de vasor. confin.

(*o*) p. 475. 476.

(*o*^{*}) Fascic. III. p. 57.

(*p*) l. c.

(*q*) Fascic. V. p. 8.

(*r*) p. 475.

(*a*) Secundam venam umbilicalem vidit KERRING ad mesaraicam pertinentem, qualis est in animalibus obs. 37. In vitulo habet RUYSEN obs. post valv. lymph. 7. Dicitur in fetus historia.

(*b*) Ut in Comment. Eourb. T. V. p. 2.

opere hac tota magni momenti contemplatione jecinoris historia destituitur.

Ergo princeps vena funiculi umbilicalis (c), quando ex eo exivit, sursum tendit, & sinistrorsum (d), inposita peritonæo, & tecta alba linea, aliqua etiam cellulosa tela obnupta, quam non bene *falcem* (d*) dicas. Brevis in fetu, cui hepar proxime ad umbilicum descendat, in adulto longior (e) subit, uti diximus, imam partem ligamenti suspensorii (f), inter dextram sinistramque laminam, & per foramen peritonæi in sulcum, sibi paratum, horizontalem, qui non raro tubulus est, se demergit (f*).

Dum per eum sulcum retrorsum it, intumescit eundo (g), & ex eo tumore ramos insignes (h) ad angulos sinistrorsum acutos in hepar emittit, ad lobum anonymum, & sinistram; hos majores (i), & in directione venæ umbilicalis. Multum cæterum in eorum numero & magnitudine varietatis est. Viginti (k) omnino numeravi, & vidi inter eos, qui venam portarum æquarent.

In alio exemplo primus ramus, antequam pons hepaticus (l), adiit lobum anonymum, mediocris iste, sinister alter grandis: porro alius magnus, bifidus, ducta dextrorsum contrario ad venam portarum (m), alter maximus, multifidus, in eum ipsum pontem ivit: alium ad lobum SPIGELII misit, & tunc demum ductum venosum edidit (n).

Is nunc tumor pergit ad usque conjunctionem cum vena portarum & demum, qua sulcus transversus cum horizontali coit, inflexa vena umbilica.

(c) TREW *Comm. Liz. Nor.* 1733. *tab.* 3. f. 2. FABRIC. f. 16. 18. 19. 20.

(d) *Comm. Nor.* 1737. *tab.* 1.

(d*) Solent tamen vaginam dicere & a funiculo deducere BIANCHI *tab.* 2. 4. TREW *Comm. Nor. ann.* 1732. n. 13. *Falcem* dicit BARBAUT.

(e) JENNY t. 1. EUSTACH. t. 9. VESALIUS f.

(f) p. 351.

(f*) Peritonæo non continetur HENSING *perit.* n. 13. 44. non bene.

(g) EUSTACH. *tab.* 27. f. 1. qui duos habet. MORG *Ep.* l. n. 25. CHESLDEN t. 34. FABRIC, *form. fet.* f. 16. 17. &c. TREW *de differ. fet.* f. 156. BERTIN. p. 332. &c.

(h) Negarunt ex vena umbilicali ramos exire NEEDHAM, TAUVAY p. 140. TREW p. 73. GUNZ *diff.* p. XVI. ALBIN. *explic. tab.* EUSTACH. p. 243. & 166. 167.

(i) Etiam Cl. BERTIN. majores esse sinistros p. 336.

(k) Numerosi rami CHESL. FABRIC. f. 16. 17. 18. 19. 20. HARBER *apiar.* n. 8. MOROKEN *secundin. vitul.* Habet & ill. TREW, sed alio refert & ad portarum venam, tum HEBENSTREIT f. 22. 23. 55. 56. Neque diffitetur GUNZIUS n. 13.

(l) p. 468.

(m) Recte eos ramos tuetur Cl. BERTRANDI p. 17. & imprimis BERTIN. p. 332. seq. 335. 336. 337. 339. in ic. ccc. &c.

(n) unum in fossa TREW *Comm. Nor.* 1733. D. unum ex sinu transverso d.

umbilicalis (o), cum venæ portarum sinistro ramo ita continuatur (p) ut is magis ad umbilicalem venam (q), quam ad eam pertinere videatur, quæ per portas advenit; cum & multo major sit, & umbilici venæ e directo in sinum transversum continuetur, vena vero portarum, vix ductu venoso major, impar sit tantis ramis producendis (r). Et omnino vena umbilicalis bifida videtur, ut alter ramus sit venæ portarum sinister truncus, alter venosus ductus (s). Utique vero nulli erunt venæ umbilicalis ad hepar rami, si excæcata parte eam finias. Nihil in ea vena valvulosi (x) est, & cera & aer utrumque iter facillime legit.

Sed e directo venæ umbilicalis, uti diximus, aut paulum ad latus dextrum (x*), ex ipsa tamen vena umbilicali (x**), educitur ramus præcipuus venæ umbilicalis, qui per fossam sibi paratam (y) ductus venosi (z) nomine, absque ramo, quem unquam viderim (a), paulum sinistrorsum, in cavam venam, jam jam hepar subituram, aut in venam hepaticam (b), quæ sit inter cavæ radices, patulus & paulum dilatatus (c), & proxime venam phrenicam, pene in istam, aperitur, ut angulum cum cava sursum acutum, deorsum obtusum faciat. Vidi in ostio suo, quo ad sinum venæ portarum patet, futura quasi transversa fuisse

(o) TREW *Comm.* l. c.

(p) *Trunc de reunion* BERTIN. p. 339. 341.

(q) BERTIN. toto libello.

(r) BERTIN. p. 342. seq. 358.

(s) *Icon.* TREW in *Comm. Nor.* 1733. l. c. BERTIN. p. 333. Bipertiri & altero ramo in sinum portarum inferi EUSTACH. l. c. SPIGEL *form. fet.* L. II. c. 1. ARANTIIUS *de fetu* p. 40. RIOLAN. & c. etiam FABRICIUS in *iconib.*

(x) Plicam pene circularem ad conjunctionem cum sinu venoso TREW. f. 1. Non multum ei tribuit p. 44.

(x*) Ad dextram BIANCHI t. 2. 4.

(x**) Ex venæ portarum HEUERMAN T. IV. t. 4. f. 3.

(y) TREW *Comm. Lit. Nor.* 1733. l. c.

(z) Inventor dicitur ARANTIIUS *de fetu* p. 40. Sed manifesto habet EUSTACHIUS l. c. & eodem tempore descripsit VESALIUS *Exam. obss. fallop.* p. 90. b. 91.

(a) Habet GUNZ n. 13.

(b) Sic fere TREW *differ. fet.* f. 23. Etiam BERTIN. p. 334. & in *ic. Add. FLORANT* T. II. p. 124.

(c) Quadruplo GUNZ n. 13. *Amplex* BERTIN. p. 334.

fuisse (*d*) terminatum, quæ esset in directione sinus venæ portarum. Etiam ad cavam venam simile quid Cl Viri dixerunt (*e*). Vidi semel omnino, ductum venosum nullum fuisse (*f*).

Addi debet, necessario, venam umbilicalem multo (*f**), quam venam ad portas majorem (*g*) esse. Duplo alias major mihi visa est, alias diametrum habuit 27. centes. cum vena portarum esset 20. quæ rationes lumina faciunt 729. & 400. In alio fuit 23. centesimalar.

Deinde venosum ductum multis vicibus minorem (*b*) esse umbilicali vena, nimis est manifestum. Vidi ei ductui diametrum fuisse 11. Cent. cum vena umbilicalis esset 27. nempe ut lumen sextuplo minus esset (*i*): alias diameter ductui fuit 10. cent. cum umbilicalis vena esset 23. nempe lumen ductui quintuplo minus (*k*), Vidi diametrum fuisse 14. centes. cum venæ umbilicalis diameter esset 22. quæ rationes sunt 484. ad 156. ut venosus ductus subtriplicus sit (*l*), Vidi ductum venosum æqualem venæ portarum (*m*), vidi multo majorem (*n*).

Quare, cum manifesti ex umbilicali rami in hepar veniant, atque multo minor sit ductus venosus, quam qui omnem sanguinem per eam venam adlatum avehat, dudum mihi visum est (*p*), in fetu umbilicalis venæ sanguinem, non per solum ductum venosum, sed utique per

(*d*) Aliquid simile TREW f. 1. 18. 19. 64. Eperon dixit BERTIN. 333. Habet TAUVRE HUYBERS de valvulis n. 24. HESS. in Specimine anat. botan. qui statum morari vidit.

(*e*) TREW t. 1. f. 8. TAUVRE. CROESER p. 4. HUYBERS ibid p. 44. [Non vidit. Negavit BESLERUS veras esse valvulas p. 19.]

(*f*) Etiam GUNZIUS K Svenska vetensk. Acad. Handling. 1751. Trine. I. ejus locorum venæ portarum vidit, in hepar divisum.

(*f**) Ad venam portarum est ut 9. ad 4. BERTIN. p. 358.

(*g*) CHESLEDEN TREW. p. 45. f. 1. 22. 21. 56. 73. 74. BERTIN. p. 339.

(*b*) TREW Comm. Lit. l. c. Dimidio VESALIUS.

(*i*) 729. 121.

(*k*) 100. ad 529.

(*l*) Etiam variam rationem facit BERTIN. p. 334. 357. Sed tamen esse fere ad venam umbilicalem ut 2. 9. p. 358. Valde parvum pinxit EUSTACH. l. c. Quam parti sinus æqualem RIDLEY p. 202. Minorem TREW f. 1. 23. 73. 74.

(*m*) Pene æqualem FABRICIUS f. 16. 17.

(*n*) Majorem IDEM f. 20.

(*p*) Ab anno 1738. M. Januar, inde de omento tab. 2. edita ann 1742. deinde Comm. in Præl. Boerb. T. V. P. l. p. 310. edita anno 1744. Physiol. prim. lra. edit. 1747. n. 832. Eadem est sententia BERTINO Mém. de l'Acad. de Science. 1753. & apud ILL. SENAC. de Cœur. T. II. p. 70.

per hepaticos (q) pariter ramos, perque ejus visceris carnes in cavam venam venire. Et sanguinem a vena umbilicali per sinum transversum pergere, & per ramos sinus transversi etiam lobum anonymum & SPIGELII adire. Et demum venam portarum in fetu, eas tantum dexteriores (r) venas hepatis replere, quibus pro sua diametro, suaque sanguinis copia sufficiat (s). Inde Cl. BERTINUS etiam partem lobi dextri a vena umbilicali ramos habere maluit (t). Quare, ut finiam, si bilis ex venis nascitur, si ductus biliaris radices habet a lobo sinistro, anonymo, & SPIGELIANO, etiam in fetu pars bilis a vena umbilici nascetur. Venæ vero utriusque sanguinem misceri, nemo negavit (t*). Vena umbilicali hepar in fetu componi dudum dictum est (u).

§. XII. Vena umbilicalis in adulto.

Et si nunc continuo, nihil porro ad venam umbilicalem venit, quando a partu de funiculo fetus solutus est, atque adeo ea tota penus sanguinis hepati subtrahitur, non ideo continuo vena umbilicalis clauditur, quam 21. die, & quadragesimo (a), mense sexto & septimo, octavo (b) apertam repererim, & in annua puella in hepate plenam, ad umbilicum inanem; demum septimo anno dimidiam cum ramis perviam, & sanguine plenam Cl. DUVERNEY (b*). Aliquousque per venam portarum aliquot annis repleti (b†) alius Vir Cl.

Certum etiam videtur, sanguine plenam fuisse in hominibus annorum viginti (c), triginta (d), & triginta quinque (d*), in quorum multis

(q) Etiam TRÆW p. 46. RIDLEY. CHESLDEN. Eam copiam nimis parvam facit LEMERY *Mém. de l'Acad.* 1739. p. 155. Tres quartas BERTIN. p. 331. 355. Maximam partem non bene HEBENSTREIT *ven. communic.*

(r) Ita etiam BERTINUS p. 330.

(s) *ip.* 483.

(t) p. 337.

(t*) LEMERY *Mém. de* 1779. p. 152. addito fine.

(u) Venam umbilicalem hepar facere GALEN. *form. fet.* HARVEI p. 62.

(a) Secundo mense ex umbilico sanguis HOECHSTETTER.

(b) Jam crassior erat.

(b*) t. II. p. 138.

(b†) VATER *mus. propr.* p. 58.

(c) DUVERNEY *oper. posth.* T. II. p. 138.

(d) *Eph. Nat. Cur. Cent. X. opp. obs. 2.* Sanguine plena.

(d*) Etiam COITER p. 117.

tis cum periculo sanguinem sponte (e), vel cum læderetur (f) effudit, ut mentes etiam ea via fluere (g) Danum in summo senio cavitatem suam retinuisse (h) exempla existant. Tursioni, adulto, aperta (h*).

Plerumque tamen inanita clauditur, ex compressione, ut puto, quam a musculis abdominis contra grande hepar, & contra diaphragma se contrahentibus intercepta patitur. Quare & ipsa excæcatur, & abit in quamdam ligamenti speciem, quæ *teretis* nomine innotuit (h**), & sanguis in hepar porro unice per portarum venam advehitur. Qui ergo ejus visceris rami ab umbilicali vena sanguinem accipiebant, ii nunc a vena portarum replentur, & ejus sanguinem, pro umbilicali sanguine, nunc ad cavam venam convehunt. Et manifesto vidi collato pueri anniculi hepate cum femine non juvenis & cum suspensi viri jecinore, partem venæ umbilicalis, quæ est inter ostium magnarum ramorum (i), & inter ramum sinistram venæ portarum, apertam manere (k), & nunc esse ejus rami sinistri partem.

Ductus venosus inter lobum SPIGALII, & sinistram interceptus, in fossa perangusta ab eadem contractione hinc diaphragmatis, inde abdominis costarumque ad invicem accessione, juga hepatica ad se mutuo adprimente, sensim eliditur & inimitur, cum præterea vel recto sub angulo, vel etiam ad angulum acutum cum sinu venæ portarum cohereat, & sub eo difficilius sanguinem accipiat.

Ea etiam sede is ductus excæcari incipit, dum ad cavam apertus superest (l). Vidi in fetu 70. dierum (l*) & in homine trigesimo anno cum ductum plenum (m) fuisse.

Quare

(e) HILDAN. *Cent. III. obs. 27.* RIDLEY *obs. p. 174.* ut videtur. LANZON *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 9. obs. 147.* [Comm. Lit. Nor. 1737. hebdom. 6. *Hist. de l'Acad. des Sciences. 1737. hist. 7.* Menstruatim in hexagenario SCHUBIG *hematol. p. 293.*

(f) HILDAN. *Cent. I. obs. 53.* ubi funesta hæmorrhagia supervenit, cum umbilicus læderetur; tum in serenissima persona PLEMP. in CABROLIUM p. 90.

(g) Cf. MIG. ea ætate sanguine coacto plenam vidit, quæ singulis mensibus sanguinem sudaverat.

(h) In femina 96. annor. COSCHWIZ *valv. ureter. p. 23.*

(h*) HOFMAN *ven. portar. p. 7.*

(h**) TYSON p. 31.

(i) p. 480.

(k) Etiam WEITBRECHT *syndesm. p. 224.*

(l) Ita FANTON. *diff. p. 239.* Vidi in puero 40. dierum.

(l*) Undecima hebdomade clausus TREW f. 39.

(m) In puero 3½. ann. apertus MORBIUS *diff. a. 6.*

Quare in hepate non valde hactenus nota sanguinei circuitus fit commutatio, ut a funiculo primum sinisteriores venæ sanguinem habeant, deinde a portis.

Eademque causa facit, ut hepar (o) in fetu maximum (p), post partum perpetuo minus fiat, breviusque, magna nunc parte ejus sanguinis intercepta privatum, qui in ejus carnes ante partum veniebat. Primus autem & magis diminuitur lobus sinister (p), qui sanguinem suum omnem a vena umbilicali habuerit, & ad quem sanguis venæ portarum longiori via perveniat, quam ad dextrum. Quinto (q) anno, aut ferius hepar ad eam magnitudinis suæ ad alia viscera rationem redit, quam in adulto conservat.

§. XIII. III. Vena portarum. Pars prior sive radices.

Vena ad portas (a) aut portarum, quam etiam portam possis ex RUGI (b) auctoritate vocare, cum vena umbilicali, ut alia multa, ita hoc habet commune, quod utraque & radices habeat & ramos, absque corde interposito. Illa quidem ex funiculo radices suas in unum truncum colligit; ex quo porro sanguis per ramos decrecentes tamquam ex arteria per hepar dispergitur (c); & secundo per venosas radices denique ad cavam venam internam, & ad cor revehitur. Ita portarum vena ex omnibus visceribus chyli elaborationi inservientibus, sanguinem, quem tres grandes arteriæ coeliaca, mesenterica & mesocolica advexerunt, una reducit, in truncum, qui per hepatis pariter sulcum singularis ad id viscus venit, pariterque in ramos decrecentes ramosque divisus, hactenus arteriæ similis, in venosas radículas suum sanguinem reddit, quæ ad eam-

dem

(o) BERTIN. p. 163.

(p) GALEN. util. part. L. XV. c. 6. PLATER. quest. physiol. p. 254. DIEMMEBROEK p. 227. VERHEYEN L. II. p. 377. COWPER ad tab. 62. &c.

(q) BERTIN. ibid. p. 364. Neque tamen arteriæ hepaticæ in fetu parvæ sunt; neque hepar informe ibid.

(r) COWPER l. c. BERTIN. p. 363.

(a) Επὶ πύλας GALENO diff. ven. ἀπὸ τῆς πύλων auctori HIPPOCRATICO de v. m.

(b) l. p. 39. Jecoris porta vena est.

(c) OLIVAS. f. 114. ABBATAUS L. II. Sign. acut. c. 8.

dem venam cavam redeunt. Utraque exemplo est, sanguinem, ut arterioso more per ramos decrecentes didi queat, cordis alicujus vi non ita egere, quin vis arteriis impressa, cum potestate respirationis conjuncta, eum sanguinem per eas difficultates urgere queat.

Ergo vena portarum præcipuas habet radices mesentericam venam; gastrocolicam; colicam mediam; hæmorrhoidalem internam, five mesocolicam, splenicam: reliquæ parvæ sunt, ut gastrica minor, & cystica, duodenæ, pancreaticæ.

Mesenterica vena vera est & continua ad portas vena (*d*), sed rectius cum intestinis describitur, a quibus sanguinem revehit. Truncus ejus ad mesentericæ arteriæ dextra & anterior (*e*) recipitur, inter mesocoli transversæ laminas (*f*), ad dextra transcuntis intestini jejuni, primum eo loco ex duodeno nati; & in eo intervallo, pressius tamen ad laminam inferiorem, inmissam sub pancreate grandem venam *gastrocolicam* accipit (*g*). Ejus ramus (*g*^{*}) dextrorsum antrorsum euns sodalis est arteriæ colicæ dextræ, & cum ea describitur.

Ramus posterior adscendens dat insignem ramum (*h*), qui circumit cavum arcum duodeni, cum arteria pancreatico duodenali: & pariter ad pancreas transversos aliosque ramos, & ad duodenum furculos radiatos mittit, & minores ad pylorum; eum tamen ramum circumlegentem cavum arcum duodeni vidi ex colico trunco venisse.

Dat eadem pene ex ortu conspicuam *epiploicam dextram* (*i*), ad laminam posteriorem omenti & ad colon, aliamque majusculam ad colon, quando ventriculum jam adiit. Dat porro gastroepiploica ipsa alias pancreaticas, & duodenales, dextras & sinistras, & denique pyloricam.

Eadem denique dextrorsum reflexa est vena *gastroepiploica dextra* (*k*), cujus venæ ventriculares (*l*), & omentales (*m*), & anulus (*n*) cum vena gastroepiploica sinistra factus arteriarum similes sunt.

Est

(*d*) EUSTACH. t. 27. f. 2. 4. WINSLOW n. 233.

(*e*) EUSTACH. l. c.

(*f*) p. 357.

(*g*) EUSTACH. t. 27. f. 2. 4. SALZMANN de vena port. p. 16. WINSLOW n. 244. seq. *Gastroepiploicam* a colica nasci MARCHETT p. 26. Sic WÆTHER progr. tab. 2. p. 4. 9.

(*g*^{*}) EUSTACH. l. c. WINSLOW n. 246.

(*h*) Puto etiam EUSTACH.

(*i*) SALZMAN obs. p. 54. WINSLOW n. 247. ad mesentericam refert.

(*k*) WINSLOW n. 245. conf. p. 154. & EUSTACH. l. c.

(*l*) p. 154.

(*m*) Ibid.

(*n*) EUSTACH. t. 27. f. 2.

Est ubi hæc gastroepiploica seorsim a colica nata in venam portarum se confert (*o*), supra colicam, sed id rarum est.

Post eam editam gastrocolicam venam, aliquando tamen prius, truncus mesentericus *colicam mediam* (*p*) recipit, sodalem arteriæ cognominis, quæ alias etiam ex hæmorrhoidæ nascitur (*q*). Est ubi tres recepit colicas, duas, quas diximus, tertiamque mediam (*r*). Etiam hæ colicæ pancreaticas alias ediderunt.

Inde porro truncus mesentericus ante duodenum (*s*) pone pancreas adscendit, recipit ibi ramos minores pancreaticos (*t*), numerosos, recipit etiam duodenales dextras, & sinistras (*u*), & illas inosculatas duodenis supremis, has reliquis intestinalibus (*w*).

Deinde, dum pone pancreas est, adrepentem circa originem jejuni intestini grandem venam habet, & accedentem sibi *colicam sinistram* (*x*), sive hæmorrhoidæ, a crassis intestinis reducem, a recto, & a colo sinistro; quæ alias in splenicam (*y*), paulo tamen rarius, sanguinem suum effundit, aut in angulum (*z*) splenicæ cum trunco interceptum: vidi etiam duas fuisse. Ejus unicum ramum hic adduco, qui ex angulo cum splenica natus profunde (*a*) ad pancreas adscendit; dat mesocolo parvos ramos, & trans venam portarum arcum facit cum ramo venæ gastroepiploicæ. Omento furculos dedisse videtur (*b*).

Paulo post, in superiori nunc sede pancreatis sub duodeno tamen, recipit *splenicam* (*c*), venam paulo se ipsa minorem, quam alias diximus

(*o*) *VESAL.* p. 444. *SPIGEL.* L. V. *tab.* I.

(*p*) *EUSTACH.* f. 2. *WINSLOW* n. 243. *SPIGEL* L. V. c. I. 2. *SALZMAN* p. 16. *WALTHER* II. p. 8. *Tab. nostr. art. mesens.*

(*q*) *EUSTACH* f. 2. 4.

(*r*) *SALZMAN* p. 16. *SPIGEL* p. 149.

(*s*) *WINSLOW* n. 231.

(*t*) *SALZMAN* p. 17. *WINSLOW* n. 256. *WALTHER* p. IX.

(*u*) *SALZMAN* p. 17. *BIANCHI* *WINSLOW* n. 247.

(*w*) *WINSLOW* *ibid.*

(*x*) *EUSTACH.* l. c. f. 4. *LEONCENA.* *GLISSON* p. 113. *RIOLAN.* p. 113. *BOHN.* *FABRICIO* tribuit ramos ad renes cunctos *BARON.* *oper. mesens.* p. 243.

(*y*) *EUSTACH.* t. 27. f. 2. *SPIGEL* *tab.* I. L. VI p. 100. *MARCHETT* l. c. pro pene perpetuo *BOHN.* p. 283. *RHOD mant.* n. 49. *COWPER* *Phil. transf.* n. 280. *WALTHER* p. X. *WINSLOW* n. 262. 233. *BIANCHI.* Ex ipso liene *HEURERMAN* p. 61.

(*z*) *SALZMAN* p. 15. & pene *BIANCHI* *tab.* 8. & *WINSLOW* n. 233. 262. *MARCHETT* l. c. & *Phil. transf.* n. 307.

(*a*) Duodenam *WINSLOW* n. 263.

(*b*) *SALZMAN* *obs.* p. 54.

(*c*) *EUSTACH.* t. 27. f. 2. 4. *CASSER.* L. VI. *tab.* I. L. *VESAL.* L. III. c. 5. p. 444. *CHELSEA.* *tab.* 18. f. 2.

mus (*d*), & in quam sanguis omenti sinisterioris, lienis, ventriculi sinisterioris & superioris se conjungit.

Et nunc transit pone duodenum primum vena nostra, & ad portas accedit, hinc lobulo SPIGELII, inde caudato lobulo terminata, sursum euns, paulumque tamen in eo sulco dexterior, qua in sede coronariam (*e*) minorem, a dexteriori, posteriori parte ventriculi, habet insertam, & duodenam superiorem (*f*), sociam arteriæ (*g*), circa convexum duodeni arcum flexam, & pancreati pariter dantem, quæ ipsa alteram etiam retis venosi originem edit. Sed etiam nonnunquam cysticam (*h*) in truncum suum recipit, & minorem duodenalem venulam, quæ numerosis suis ramulis rete (*i*)-facit, quo vena portarum, arteria hepatis & ductus bilarius obnubuntur: Dat etiam duodenam primam & ramos ad cysticas glandulas, & parvas, pyloricas (*k*), & nonnunquam coronariam parvam, & cysticam. Etiam coronariam magnam eo loco dedit (*l*), & quod non vidi (*m*), gastroepiploicam majorem.

Unicus nunc truncus est, grandis, tamen quam vena cava minor. In fetu, cui parva est (*m**), diametri fuerunt 15. & 24. cent. Etiam 20. cum vena cava inferior esset 37. In nuper nato infante vidi fuisse 37½. cent. cum arteria mesenterica fuisset 17. colica 11. coeliaca 13., & vena cava superior 40. nam ad cor neglexi metiri. In alio puero 7. mensium fuit vena portarum 32. cent. arteriæ hepaticæ 11. 9. & 7. In adulto homine fuit eadem 23. cum vena cava ad hepar esset 35. Alias fuit ad eam venam ut 48. ad 55., & ut 25. ad 35.

ER

(*d*) p. 401. seq.

(*e*) EUSTACH. t. 27. f. 2. nam in f. 4. nullam habet. SPIGEL p. 149. WALTHER II. p. 4. qui pyloricam vocavit. BIANCHI t. 8. f. 2. r. Rarius esse WINSLOW n. 240. Pyloricam jam SPIGELIUS dixit.

(*f*) LEONCENA 6. VERHEYEN d. BIANCHI l. c. c. u. SALZMAN l. c. WALTHER p. 6. WINSLOW n. 234. 239. Primus dixit CARPENSIS *Isag.* p. 148.

(*g*) p. 411.

(*h*) Duas facit SALZMAN *vena port.* p. 15. Duas WINSLOW n. 236. Duas MARCHETTI p. 41. Sunt cysticæ LOQUET n. 4. Unicam ramosam habet SPIGEL p. 149. Unam BERTRANDI p. 15. 16. Unam VERHEYEN t. 39. f. 2.

(*i*) SALZMAN p. 5. & WALTHER p. 24.

(*k*) WINSLOW n. 234. 288.

(*l*) PARR' L. II. c. 21. WALTHER p. V. SALZMAN ad HORST ep. p. 448. SPIGEL L. V. t. 1. N. BIANCHI Ex sinu venæ portarum HUMMEL apud WENCKER de *util. ventris.* p. 15. Addit WALTHERUS, aliquando ex splenica oriri. Verum ea pene constans ejus origo est, quam diximus.

(*m*) WALTHER p. IX. BIANCHI d. *inferius.*

(*m**) RIDLEY *obs.* p. 201.

Incedit autem in fasciculo vasorum hepaticorum posterior, occulta, testis glandulis cysticis, & reticulo arteriolarum, atque venularum, tum arteriis & biliaris ductibus, omnibus utique major.

§. XIV. *Rami venæ portarum.*

Truncus venæ portarum integer est, dum portarum vallecule continetur. Eam ubi emensus est, in parte pene dexterrima sulci transversi hepatis, in duos (a) perpetuo grandes ramos, nunquam in quinque (b), rarissime in tres (c) dividitur, quando duo sunt sinistri rami.

Si rami ad maximum angulum a se invicem secedunt, ut sibi sint pene e directo (d), & truncus, perinde ut solent arteriæ, ad sedem divisionis paulum latefcere videatur (d*), Dexter aliquanto major (e), brevi spatio conspicuus est (f), cum sulcus transversus ad dextra ingredientis venæ portarum pene continuo finem sui faciat (g), & venæ, quæ per eum sulcum incesferant, hepatis carne operiantur. Recipit frequenter venam cysticam, quæ non facile duplex (h) est visa, & a media fere vesicula advenit: etsi præter eam numerosæ sane venulæ ab hepate, ex ovali sulco, ad vesiculam adrepunt (i).

Cæterum duobus (k) fere magnis ramis, eorumque numerosis ramulis

(a) VESAL. *rad. chin.* p. 177. KERKRING. LIEUTAUD p. 301. GUNZ n. 5. p. 13. BERTRANDI p. 16. ALBIN. ad EUSTACH. p. 163.

(b) Quatuor, & quintus ad vesiculam AVICENNA p. 24. Quinque SPIGEL p. 148. GLISSON ad p. 293. CARP. *Isag.* p. 14. WINSLOV n. 275.

(c) Tres constanter EUSTACH. t. 27. f. 1. 2. 4. Aliquando esse tres ALBIN. *ibid.* Earum duæ sunt sinistræ, quarum minor cum umbilicali connectitur, major sola sinistrum lobum adit.

(d) Ita fere KERKRING.

(d*) ALBIN. ad EUSTACH. p. 161.

(e) WALTHER *progr.* II.

(f) Nimis longus LEONCENÆ: & nimis parvus. Nimis longum etiam faciunt GLISSON ad p. 292. & BIANCHI l. c.

(g) Add. GUNZ p. 13. BERTRANDI. MORGAGN. n. 25. GARENGEOT *splanchnolog.* T. I. p. 288. f. 3. Sexta pars mihi superesse videtur.

(h) Duplex VESAL. p. 623. Magnum esse ORIBAS. p. 122. Sed facile credo MASSÆ, qui non semper invenire potuit *introduc.* p. 26. Recte a portis esse, non a cava GALBA-
CIUS *Comm. Acad. Bonon.* T. II. P. II. p. 337. LOQUET. n. 4.

(i) Multas esse GUNZ n. 10.

(k) KERKRING.

lis, per hepar dextrum totus dividitur. Vidi, cum accurate requirerem, tres (*l*) fuisse, transversalem in fossam pone vesiculam felleam & lobum dextrum; anteriorem in lobum dextrum; posteriorem in confinia lobuli & lobi dextri (*m*).

Celebrior est *sinister venæ portarum ramus*. Is enim majorem nactus sulci transversi longitudinem (*n*), eam replet, modice tectus ductibus bilariis, & arteriis, & eundo alias contractior (*n**) fit, in adulto, puto, alias latior ut in fetu. Ejus sulci longitudinem emensus, incurvatus (*o*), fossam umbilicalem subit, qua olim incurvus pariter truncus umbilicalis in ramum venæ portarum sinistrum adveniebat. Vidi fuisse ejusmodi ramum in medium lobulum quem alias truncus dat; alium minorem ad fossam ductus venosi & lobulum: duos mediocres in lobum anonymum; ramos pluculos illos (*p*), quos dabat olim umbilicalis vena, in lobum anonymum & sinistrum: in fossam transversam pluculos parvos; duos grandes in lobum sinistrum: Vidi sinistram venæ portarum ramum coronariam minorem accepisse (*q*). Cæterum numerum (*q**) vix ineas, qui in aliis corporibus alius sit, multi tamen semper sunt rami.

Hi rami per carnem portarum distributi (*r*), perinde, ut arteriæ, etiam ad superficiem veniunt, & de hepate exeunt per ligamentum suspensorium & sinistram (*s*), in peritonæum (*t*): & per ligamentum sinistram etiam in lienem (*u*); denique ut videtur, nam non vidi, ad ventriculum (*w*).

Ita

(*l*) GARENGEOT.

(*m*) Duos tantum habet GUNZ & subinde tres, duos KERKRING.

(*n*) TREW f. 73. 74. GARENGEOT, KERKRING.

(*n**) ALBIN. p. 162.

(*o*) p. 480. 481. add. MORGAGN. Ep. I. n. 25. & 75.

(*p*) GUNZ n. 5. p. 13.

(*q*) Dextrum SCHRADER obs. Dec. I. n. 7.

(*q**) Duos, tres magnos, multos minores, imprimis in fetu emit tit ALBINUS ibid. p. 164.

(*r*) In hominibus KERKRINGII, GLISSONII CHESLEDENII & aliorum. Vidit ARETÆUS *sign. acut.* L. II. c. 8.

(*s*) GUNZ n. 6. 7. f. 1. 2.

(*t*) GUNZ n. 8. FALLOP. p. 117. b. qui addit, descendere ad dorsum, & cum aliis venis a portis uniri, extra hepar natis.

(*u*) FALLOP. l. c. In fele, non in homine BERTRANDI p. 16.

(*w*) PAW. obs. 26.

(*x*) Flatum communicasse SCHRADER l. c. BERTRANDI p. 16. & venas septi transversæ cum venis ad portas anastomoses habuisse EUSTACH. *de renib.* p. 133. tum de vena brevi & diaphragmaticis RIOLANUS p. 115. Habet etiam cum venis ab azyga natis anastomosis. Negat DUVERNEY T. II. p. 223.

Ita cum ramis phrenicis ad azygam, adve cavam venam pertinentibus (x), venæ ad portas anastomoses habent.

Etiam alibi id venarum systema, quod sanguinem ad portas revehit, cum venis spermaticis per mesocolon dextrum & duodenum advenientibus & ad cæci intestini ligamentum (y), cum renalibus (z), cum hæmorrhoidæis porro mediis (a) & externis (b), cum uterinis aut vesicularibus (c) varie communicat, ut ex ordine alias dicemus. Parvæ vero sunt inosculationes, quales ubique inter vicinos trunculos locum habent.

Vena portarum hætenus etiam arteriarum similis est, quod perinde de superficie hepatis injectum humorem aqueum exhalet (d).

§. XV. *Quæ vena portarum peculiaria habeat.*

Habet primo naturam, quam diximus, arteriosam, ob quam dudum ad arterias (a), hætenus relata fuit. Pariter enim, ut arteriæ, summa luminum ramorum hujus venæ lumen trunci vehementer superat, inque eadem ratione necesse est sanguinis portarum motum tardari ex iis, quæ alibi ostensa sunt (b).

Sed etiam ideo magis probabiliter cum arteriis conjungitur, quod insigni robore omnes alias venas corporis humani (c), & eo magis arterias una vena portarum superet. Accurata experimenta ostenderunt, venæ portarum tunicas, ad sanguinæ cylindri diametrum comparatas, minime crassas

(y) BERTRANDI p. 15.

(z) Inter venam gastricam sinistram, & renalem sinistram, ramus est communicans SCHMIEDEL n. 19. A sinistra hæmorrhoidæam externam natam dicit BARTHOL. Hist. 32. C. I.

(a) Comm. Boerb. T. V. P. I. p. 409. Fascic. V. not. 17. Fascic. III. p. 50. Fascic. VIII. p. 37.

(b) Fascic. III. p. 50. Fascic. V. p. 1 c. Nempe hæ cum mediis, mediæ cum internis.

(c) De femina STAHL & de vagina SCHMIEDEL var. vas. n. 15. Negat BERTRANDI p. 15. Sed vidi in Fascic. VIII. de arteriis. De venis vesicæ & vesicularum feminalium & penis admittit IDEM BERTR. p. 14. not. c. De utisque Fascic. III. p. 50. Fascic. VIII. p. 37.

(d) GUNZ n. 12. KAAUW n. 562.

(a) PECQUET diff. anat. I. p. 32. LISTER de cochl. p. 101. BOERHAAVE Pralect. T. III. p. 182. Semiarteriam vocat BIANCHI p. 23.

(b) L. VI. p. 176. seqq.

(c) CLIFTON, WINTRINGHAM viri præstant. enquiry p. 204. 230.

crassas (*d*) esse ; cum ea ratio sit in ove pene ut 23. ad 1. in cane ut 17. ad 15. Robur tamen cum ea tenuitate insigni conjungitur. In ove enim eadem vena tulit atmosphæras quinque & pressionem libr. 139. unc. 10. & ultra (*e*), habetque robur computatum ad robur venæ cavæ ut 6. ad 5. (*f*) ad aortæ vero robur ut 7. ad 5, & paulo ultra (*g*). In cane eadem pene 6. atmosphæras tulit (*h*), & pressionem 64. libr. & ultra (*i*), roburque habuit, ad aortam comparatum, iterum ut 7. ad 5. (*k*) ad cavam venam ut 3. ad 2. (*l*). Splenicam etiam venam superat in ratione pene 51. ad 10. sive decupla (*m*) venam renalem vero in ratione 47. ad 10. (*n*).

Sed primarium, ut quidem creditum est, venæ ad portas privilegium, est in capsula propria, quam a GLISSONIO nominant (*o*), quem pro inventore habuerint: etsi *Johannes WALÆUS* (*p*) ejus paulo prior meminit, & posterior etiam *WALÆO PECQUETUS* (*q*) GLISSONIO antiquior. Nempe vena portarum multam cellulofam telam ex mesenterio & liene secum adfert. Præterea membrana flava lubrica, externa hepatis (*r*), a sulco transverso hepatis, & a fella vesicula, ad duodenum & colon transit, & ejus pars, quæ est in sulco transverso, dicitur *omentum minus*, pars ad ejus dexteriores pertinet ad mesocolon (*s*). Cum ea sustentante membrana, & cum arteria hepatica (*t*), poroque bilario, vena portarum sustentatur plurimis filis cellulosis, longis, absque adipe, quibus ea vasa omnia inter se mutuo revinciuntur:

(*d*) Tenuiores non bene GUNZ p. 10. Crassiores esse PECQUET. Duplicem habere tunicam ut arteriæ GLISSON p. 233. BARTHOLIN. p. 132.

(*e*) 4. 98 p. 179.

(*f*) p. 180.

(*g*) Ut 14. 4. 1000. p. 181.

(*h*) 5. 73. p. 189.

(*i*) p. 190.

(*k*) Ut 1407. 1000. p. 191.

(*l*) Ut 1544. 1000.

(*m*) Ut 5187. ad 1000 p. 181.

(*n*) Ut 4751. 1000. Exp. 46.

(*o*) Jam anno 1642. etsi demum a 1654. liber prodit *Anat. hep.* c. 28. p. 256.

(*p*) In *bist.* ann. 1640. edita cum SPIGELIO p. LXXXIV.

(*q*) *De sang. & bilis motu* c. 2. f. 32. Prodiit certe ann. 1650.

(*r*) *Tab. Oment* 1.

(*s*) GUNZ *de hep.* p. 7.

(*t*) PECHLIN. WINSLOW.

tur: & quam augent ramuli nervei (u) ramuli retis venosi, jam descripti (w); & ramuli arteriosi ab arteria hepatica nati & a duodenali, & vascula demum lymphatica (x). Ea omnia vasa, eæque membranæ, inter se invicem colligatæ, cum cellulosa tela conjunguntur, quæ venæ portarum parietes constituit.

Similis porro cellulofitas, cum eodem omento minori, in sulco transverso venæ portarum, ramum dextrum, & potissimum finistrum cum bilaris vasis, cumque arteriis hepaticis conjungit. Similis etiam venam umbilicalem, ductumque venosum, ad suos sulcos religat. Ipsa etiam vesicula felle (y) cellulosis fibris ad suum sulcum revincitur.

Sed etiam ramos venæ portarum, & artenarum, & bilariorum ductuum ejusdem naturæ cellulosa tela per hepar comitatur ad minima (z).

Ea porro cellulosa tela utique peculiare robur vasis hepaticis addit, cum venæ portarum rami dissecti non perinde concidant (a) & complacentur, ut aliæ venæ solent, sed arteriosa cum firmitate se sustineant, lumenque servant circulare.

Ita hæc vere se habent, reliqua hypothesis addidit. Vaginam nempe arteriosæ (b) tunicæ proximam, debiliorem tamen, dixerunt, factam ex fibris carneis (c), intricatis.

Eam dixerunt venæ portarum, & ejus ramulis in ipso hepate, circumponi, cæterum pollere vi contractili (d), & ad cordis similitudinem pullare, nihilo debilius quam aorta (e), non tamen eo pleno robore

(u) Ob id rete fila mercurio plena in capsula GLISS: vidit VIEUSSENS *obs* p. 116.

(w) p. 288 Habet VIEUSSENS *obs* p. 133. HUBER *epist.* p. 23.

(x) VIEUSSENS l. c. & p. 557. Externam tunicam a peritonæo esse exsanguem; internam vasculosam, in qua sunt lymphatica LOQUET, n. 11.

(y) GLISSON p. 258.

(z) VIEUSSENS p. 114. Tenuis est intra jecur POZZI p. 71.

(a) Collabi WINSLOW n. 280 Sed sustineri vidi.

(b) GLISSON p. 257. 306. BURCHART *de bile* p. 53. GORTER *mot. vitalis*

(c) GLISSON p. 257. WAINWRIGHT *of the liver* p. 46.

(d) Musculum esse BELLINI *Prop.* 30.

(e) LISTER *hum.* p. 253.

re (f) quo cor. Alternis adeo vicibus laxari & adstringi (g), venisque largiri (h) robur adfine arterioso, bilemque propellere (i).

Quare cor abdominale (k) non pauci dixerunt partem venæ portarum, quam sinum (l) vocant, qui vel solus sinister (m) est ramus venæ portarum, vel cum continuato dextro (m*). Id cor dixerunt sanguinis iter per universum hepar adjuvare, alioquin lentissimum futurum. Neque defuerunt, qui etiam nostro seculo carneam naturam ejus, capsulæ restituere sunt conati (n).

Magna fuit hujus hypotheseos celebritas, unustamen alterque auctorum hujus seculi pulsationem aut impugnavit (o), aut ad arterias retulit (p). G. COWPER (q) etiam de musculo capsulæ robore dubitare cepit, quem alii sunt secuti. Arteriæ munus ab ea removit SCHELHAMMER (r), fibrasque carneas parvi fecit (s). In fabrica non arteriosa & in pulsationis defectu adiutorem habet STAHLIUM (t) & parum ei tribuit ILL. MORGAGNUS (u). Primus tamen, ni fallor, FANTONUS (w), deinde AUGUSTINUS FRIDERICUS WALTHER (x) naturam cellulosam hujus textus detexit; quem & ipse secutus sum (y), & plurimi nuperorum (z).

Rubedi.

(f) GLISSON p. 387. NEEDHAM *form. fet.* c. 5. Pene pulsare SALZMANN *ven. port.* n. 6.

(g) Constringi a plexibus fibrosis STAHL. *obstruct.* n. 35.

(h) GLISSON p. 233.

(i) DUVERNEY II. p. 236.

(k) NEEDHAM. TIMMERMAN *lus. natur.* p. 24. BOERHAAVE *prælect.* T. III. p. 115.

(l) BOERHAAVE ut videtur.

(m) LIEUTAUD p. 301. Sed nullum esse sinum OVERKAMP *ven. port.* Esse ramum dilatatum VINK *van bloedvaten.* p. 204.

(m*) ALBIN. l. c. p. 161.

(n) POZZI p. 70. in cocta capsula fibras adparere p. 71.

(o) REVERHORST *circul. bil.* p. 13.

(p) WINSLOW n. 282.

(q) Ad BIDL. t. 75.

(r) *Analect. anat.*

(s) *Physiolog.* p. CCVI.

(t) STAHL *ven. port. mal.* p. 9.

(u) *Atvers.* III. p. 48.

(w) Nihil differre ab aliis arteriarum vaginis, & nihil in ea esse virium contractilium. FANTON. *anat.* p. 109. Ed. 1711.

(x) De *ven. port. progr.* I. Ad omentum refert GUNZ & HENSING *de periton.* n. 46. Non penitus recte. Nam fila verâ cellulosa sunt, etiam ubi nullum omentum est, circa venam umbilicalem, inque sulco vesiculæ fellis.

(y) In *Comm. ad Boerb.* T. III. Ed. 1741.

(z) GUNZ. LIEUTAUD p. 299.

Rubedinem, & fibras in cocto hepate facile ad arterias, venas, nervosque referas.

Denique, quod vena portarum valvulis careat (*a*), de natura arteriosa participare videtur.

In plerisque classibus animalium vena portarum reperitur, peculiaris nempe vena systematis chylopojetici, etiam in avibus (*b*) quadrupedibus amphibiiis (*c*), & frigidis (*d*).

§. XVI. *Sanguis venæ portarum.*

Magnum etiam venæ portarum privilegium est, quod sola venarum omnium succum aliquem separet de sanguine. Sed id quidem demonstratione indiget.

Hoc loco autem liceat de natura sanguinis quærere, quem ea vena ad hepar advehit. Credibile certe videtur, diversum esse a sanguine aliarum venarum. Eæ enim, ut ab uno viscere, & uno membró, sanguinem revehunt, ita videntur unius ejusdemque ingenii sanguinem continere. Non ita vena ad portas. Ea enim a diversissimis visceribus sanguinem revehit. Oleosum quidem ab omento & mesocolo, nam, etsi nolis recipere MALPIGHII experimenta (*a*), certe tamen olei partem in sanguinem regredi necesse est fatearis: si autem regreditur, non alia ei oleo, præter venam ad portas, via patet. Est etiam in bile tanta vis adipis (*b*), ut non videatur superfutura ejus in vena materies, nisi per venam ad portas suscepta rediret, postquam certe arteriæ omnes, & potissimum omentales, mesocolicæ, & mesentericæ, tantum deposuerunt adipis.

Quin ex intestinis tamen mesentericæ venæ aquam, sed halitu putrescibili plenam, resorbeant, vix dubitari potest (*c*). Qui homo fæces fluidas percepto stimulo egerere neglexerit, & curru vel equo vectus naturæ instinctum moratus fuerit, is post plussculas horas sæpe durissima egeret. Ea omnis aqua, quæ decessit his excrementis, ut durescerent, in crassis
intesti-

(*a*) L. II. p. 144.

(*b*) Struthione VALISNERI oper. T. I. p. 244. 245.

(*c*) PAUCA SEVERIN. p. 32.

(*d*) In rana BERTRANDI p. 18.

(*a*) De Oment. p. 42.

(*b*) Sect. III. Etiam piscium hepata mero sunt adipæ.

(*c*) Dicitur L. XXIV.

intestinis vel potissimum, non per vasa lactea acescente plena chylo, sed per venas mesentericas ad sanguinem rediit: prægnans utique putredine, & fætido halitu, quanta enim sit ejus ad febrem incitandam potentia, vel ex morbis adparet, in quibus continuo æstus sanguinis effervesceat, quando alvus cessat, & subsidet idem, postquam clystere eluta est ea quasi putridi humoris sentina.

Sic etiam vapor ille abdominalis, fætidus, pariter & volatilis, qui de omni superficie vivi animalis conspicuus halat, is omnis per venas re-forbetur utique (d), & sanguini ad portas redituro se addit.

Quæ de lienalis sanguinis peculiari indole diximus, huc oportet revo-care (e). Et de bilis ad hepar reditu alias etiam videbimus. Neque defunt, qui chylum ipsum venis mesentericis recipi viderint, & ipsum multo pingui fetum.

Quare in sanguine venæ portarum plus erit adipis, quam in ullo alio totius corporis cruore secretioni destinato. Eritque in eodem sanguine multum putrescibilis & subalcalescentis vaporis.

Nunc hæc omnia non videntur refutari posse, si per ipsas rerum cau-sas refutare tentaveris. Num per experimenta vero sanguinis venarum ad portas convenientium peculiaris indoles perinde confirmetur, id est ex-pendendum.

Chylo cinereo (f) misceri venarum mesentericarum cruorem, & ejus chyli strias in his ipsis venis vivo in animale ligatis conspici (g), cæte-rum diversa indole esse ab aliarum venarum sanguine, neque perinde cogi (h) lego.

In ipsis portis sanguinem amarum esse (h*), inque vena portarum ligata, postque duas horas aperta, amarum adparuisse (i), fluidumque & mobilem (k) dilutum magis & quasi biliosum (l), alii auctores sunt. Utcunque hæc probabilia sunt, non ideo continuo sunt vera. Nempe sæpe

(d) p. 342. seq. Adtenuat sanguinem hepaticum KAAUW *perspir.* n. 623.

(e) p. 416. seqq.

(f) BERSIUS *Epist. diff.* p. 21. 22.

(g) JOH. SWAMMERDAM not. ad. I. v. HORNE *prolr.* p. 28. 29. etiam GLISSON; cum casu vinculum prope hepar injecisset, *ventric. & intest.* p. 280.

(h) HELMONT *sexupl. digest.* n. 38.

(h*) GLISSON. p. 395. CORN. CONSENT. CLOS. PAPA *de humor.* p. III. BIANCHI.

(i) FANTON. ad MORGAGN. *Epist.* II. p. 209. LANCIS ad FANTON. p. 124.

(k) EXILL. MEKELII experimento *Mémoire de l'Acad. de Berlin.* T. 12. p. 40. 41. HEURMAN *Physiol.* T. III. p. 716. CLOS. FASLIUS *de sang. ven. port.* p. 29.

sæpe ea est nostra infelicitas, ut experimenta negent confirmare, quæ tamen ex ipsis rerum causis necessario fluere videantur. Non quod ideo non vera sint, sed quod experimentorum nondum satis captum sit; quod omnino capi non possit. Quare idem hic repeto, quod sæpe oportuit repetere, non me negare, quæ sensuum testimonia non confirmantur: tantum non recipere.

Ita quidem cinereum illum sanguinem venarum mesentericarum contraria experimenta magnorum virorum refellunt (*m*).

Sed neque admittunt illam majorem (*n*) fluiditatem, negatque BOHNIIUS, difficilius hunc sanguinem cogi, eo quem ex jugularibus venis sumseris.

Et polypum solidum ramos venæ portarum replentem idoneus testis vidit (*n*). Minusque aquæ, plus vero olei & alcali habere, auctor existat (*o*). Neque in sanguine ad portas veniente magis consentitur, & omnino eum sanguinem negatur, quidquam a venæ cavæ (*p*) sanguine distare. Subsalsum alii & subdulcem vocant (*q*), sed ejusmodi est sanguis de quacunque vena sumtus. Nigrum esse alius VIR ILL. (*r*), ab amisso sero, ex quo non colligas fluiditate excellere.

Repetitis experimentis in sanguine venæ portarum sani animalis, ut vituli, hæc oportet definire, non uno, neque paucis. Si enim in viginti experimentis plus in eo sanguine fuerit aut aquæ, aut adipis, vix fallitur, qui perpetuo plus inesse pronuntiaverit: semel si experimentum fecerit, poterit alia causa subesse.

§. XVII.

(*l*) BOHL. *de lact. viis* n. 49.

(*m*) STENONIUS apud BARTHOL. *Cent.* III. Ep. 56. p. 218. BOHN. *progymn.* XII. p. 195. ENT. p. 363.

(*n*) CHESELD p. 165.

(*o*) HEUERMAN III. p. 736.

(*p*) HARVEI *circul* p. 142. BARTHOL. *defens.* in RIOL. p. 120. NEEDHAM. *philos. trans.* n. 85. SLEGEL p. 82. STENONIUS l. c. BARTHOL. l. c. & *hepat. defunct.* p. 84. DIEMERBROEK p. 489. TAUVREY *med. rais.* p. 47. 48 per experimenta

(*q*) FIZES *de liene* p. 178.

(*r*) SENAC. II. p. 90. Fuscum BARBETTE ad BARTH. *desp. hep. caus.* l. 1.

§. XVII. *Vasa avehentia.*I. *Vena cava (a).*

Vena cava quando præteriit lobulum posteriorem (*b*) hepatis, tangit diaphragma, & per aptum sibi (*c*) foramen, in parte non contractili (*d*) tendinea interceptum, subit thoracem, & nunc est in auricula dextra. Homini enim, cui cor tota sua basi septo transverso infidet (*d†*), nulla est vena cava thoracica inferior, ut quidem bestiis, quarum cor solo mucrone id septum adtingit. Sunt etiam duo alias foramina (*d**), quorum alterum est pro hepaticarum venarum altera (*d***).

In eo brevi per hepar itinere vena cava angustior est, quam sub hepate versus renes, & sub ipso diaphragmate rami de hepate venosi in venam cavam subeunt, de lobulo multi, parvique, sex, septem (*e*). Deinde de universo hepate grandes venæ, quæ sensim versus convexam hepatis partem coeunt, & in truncos duos (*f*), vel tres (*g*) colliguntur: eorum dexter maximus est, sinister minimus, & in lobulum aliquando tertius etiam sinistro major. Vidi alias sinistram majorem fuisse. Hi trunci in cavam venam aperiuntur, etiam cum phrenica vena commissi. Est in tanta distantia a corde brevitate, ut tamen in ipso hominis pectore in cavam venam subierint (*h*).

Ad earum grandium venarum in cavam insertionem valvulas esse dictum dictum est. Id nunquam vidi, & ægre plicæ aliquæ adfuerint, aut exstantes limbi, quos obliqua insertio faciat, tot quot sunt venæ ad cavam tendentes, neque moraturi sanguinis quodlibet iter. Primas dixerat

(*a*) Altera vena ad convexam usque in spinam euns ARÆTÆUS *sign. acut* II. c. 8.

(*b*) p. 470.

(*c*) L. VIII. p. 83.

(*d*) Ibid.

(*d†*) L. IV p. 301. EUSTACH. t. 26. t. 16. f. 1. VESAL. *ic. art. venar.*

(*d**) MORGAGN. *sed. caus.* II p. 381. 491.

(*d***) IDEM *ibid.* p. 387. *Epist.* I. n. 26.

(*e*) Habet EUSTACH. l. c. MORGAGN. l. c. VESAL. l. c. C. C. WINSLOW *Expos.* IV. n. 310.

(*f*) Habet EUSTACH. *tab.* 27. f. 1. VESAL. L. III. c. 6. p. 458. cum *ic.* GLISSON. *de hepate* p. 292. f. 1. 2. pene tres. MORGAGN. *Epist.* I. n. 29. Conf. ARÆTÆUS l. c.

(*g*) MORGAGN. *Epist.* I. n. 26. BIANCHI *tab.* 3. KERKRING *tab.* 29. f. 2. KULMUS p. 89. WINSLOW IV. n. 309. VERDIER II. p. 98. etiam CASSEBOMIUS, ut pro lobulo unicus truncus numeretur.

(*h*) MORGAGN. l. c. & *de sedib. & caus. morb.*

rat inter valvulas venosas *Jacobus SYLVIVS* (i), repetierunt pluri-
mi (k), refutaverunt dudum Cl. Viri (l).

Grandissimam eo loco esse venam cavam (m) & mereri nomen *la-
cus* (n) non tamen video, neque adeo multo majorem esse, quam est
sub hepate.

Nunc, si de sanguinis itinere quæres, vena portarum suam penum-
trahit ramis venæ cavæ hepaticis, sic cordi. Nam & mesenterica vena (o),
& splenica (p), & ipsa portarum (q) vena, vinculo injecto turgent ad
id viscus, a quo adveniunt: & ad hepar, intercepto nunc sanguine, in-
aniuntur. Sola vena cystica, cum nulla alia sanguinem ex vesicula fellea
ad venam cavam ducat, necesse est sanguinem per ramos suos in trun-
cum venæ portarum revehere. Eam etiam viam & facile quidem legit
hydrargyrus, arteriæ hepaticæ injectus (r) & a vena portarum in cysti-
cam (s) subire (t) negatur. Mihi, quoties venam portarum sebo re-
pleveram, vena cystica semper repleta est.

Porro aer (u) aquosus humor (w), hydrargyrus (x), cera (y), fa-
cile & expedite ex portarum vena in cavam transeunt; &, nam oportet
fateri

(i) *Isag. Anat. c. 4.*

(k) *VESAL* l. 3. c. 5. f. 13. *BARTHOLINUS anat.* p. 137. *REISER Eph.
Nat. Cur. Dec. I. ann. 9. 10. obs. 141.* *WINSLOW l. c.* *WINTRENGHAM* p. 221.
FOURNIER. In vacca barbarica PARISINI.

(l) *KEMPER de valv. p. 29.* *FABRICIUS ostiol. tab. 3.* *RIOLANUS* p. 346.
ILL. SENAC. conf. L. II. p. 143.

(m) *WINTRENGHAM* p. 234.

(n) Lacum superiorem inter hepar & cor dixerat *FOURNIER anat. pacifq. p. 13.*

(o) *Conf. L. III. p. 213.*

(p) *Ibid.*

(q) *Ibid. PECQUET. diff. anat. I. p. 32.*

(r) *VIEUSSENS obs. p. 203.*

(s) *I. F. ORTLOB cholep. negot.*

(t) Idem de venis membrana externæ adnotat *LOQUET* n. 7. quod nunc experimen-
tum non possum iterare.

(u) *VESAL. p. 443.* *RIOLANUS anat. pneum. p. 168.* *BACK. de corde p. 168.*
BARBETTE p. 27. *GALLACIUS Comm. Bonon. T. II. P. II. p. 334.*

(w) *BERGER nat. hum. p. 211.* *MARCHETT apud des NOUES p. 19.* *FRAN-
CKEN de hepate p. 19.* *BARBETTE HEUERMAN III. p. 728.* *GLISSON p. 287.*
LISCHWIZ. THRUSTON resp. p. 115. *ORTLOB n. 11.* *COWPER ad t. 38. f. 2.*
MURALT vadem. p. 99. *ROEDERER apud SCHEEL de hepate p. 16.*

(x) Prius quam in ductum biliarium *VIEUSSENSII obs. p. 156. 129.*

(y) *RUYSCH. apud BOERHAAVE de fabr. gland. SCHACHER administr.
anat. p. 31. de cera.*

fateri, vicissim per venam cavam in truncum portarum regurgitant (z). Et tanta est experimenti facilitas, ut COWPERUS ob eam rem laxiores esse & ampliores in hepate quam alibi anastomoses (a) concluderet (b). An eadem fuit causa, cur LAURENTIUS (c) & PICCOLIHOMEUS (d), enormes inter cavam & portarum venas anastomoses pinxerint, quas severius iudicium refutaret (e).

Si ergo sanguis venæ portarum in hepar fluit, si ab hepate aperta in venam cavam via est, non oportet dubitare, eum de hepate sanguinem in venam cavam & cor venire.

Sed etiam arteria hepatica sanguinem suum venæ cavæ reddit. Nam in ramos quidem minores ex arteriosa indole sanguinem suum dividit, & ex ea arteria in cavam impulsu aquei humores (f) penetrant, & hydrargyrus (g), & cera (h).

Comparata humorum adducentium mole cum revehentibus: reperitur plures (i) omnino & grandiores ramos venæ portarum esse, & quemque ramum magis ramosum (k), & maiorem adeo partem hepatis ad venam portarum pertinere, minorem ad cavam venam (l), etsi aliter Cl. Viri senserunt (m).

Minores adeo & pauciores rami sunt venæ cavæ, quam venas ad portas. Illos maiorem partem gibbi hepatis tenere, hos cavi probabile est (n), etsi & ad gibbam sedem a vena portarum, & ad sinistram a cava ramos venire non negatur

(z) In cysticum GALEACIUS *Comm. Bonon* l. c. VIEUSSENS *obs.* p. 129.

(a) Continuationem ramorum venæ portarum cum ramis venæ cavæ GLISSON habet p. 222. 246. 274. & RUYSCH. *Thes.* VI. n. 82.

(b) *Ad t.* 18. f. 5.

(c) p. 31. f. 1. C. BAUHIN. *theatr.* p. 151. t. 35. f. 4.

(d) *Præcl.* p. 117.

(e) BARTHOE. p. 59.

(f) COWPER l. c. ORTEOB l. c. n. 9. VIEUSSENS *tr. des liq.* p. 354. HALESBANASTAT. Faciliorem, quam a vena portarum viam esse BIANCHI p. 144.

(g) VIEUSSENS. *obs.* p. 115.

(h) ALBIN. apud VISSCHER *de cholepoies.* n. 16.

(i) Triplo SPIGEL p. 235. add. RIOLAN. in SLEGGEL p. 302. J. v. HORNE *ad Microscop.* p. 69.

(k) BARTHOE. p. 112.

(l) RUYSCH *Thes.* II. *aff.* 3. n. 1. *Thes.* V. n. 17. *Thes.* VI. f. 3. 4.

(m) MALPIGHIUS *de hep.* p. 61. nuper natis usus animalibus, quibus vena portarum exigua est; GLISSONIUS qui pauciores cavæ ramos videri scripsit, quod essent ampliores, quod teneriores forent, quod facilius abrumperentur, cæterum summam luminum æqualem fecit p. 249. 233.

(n) SPIGEL p. 161. C. BAUHIN. l. c. Hinc durior pars gibba CARR. *ad MUND.* p. CXLII. Negat GLISSONIUS p. 226.

negatur (*o*). Iidem venæ cavæ rami extra cellulosum ramorum ad portas tendentium textum positi, solitarii, angulos cum ramis venæ portarum magnos faciunt, & pene rectos.

Quare, cum venæ cavæ radices solæ, & arteriæ non minimæ & venæ se ipsa majoris, sanguinem revehant, manifestum argumentum est, celeriores in ea vena, quam in portarum venis sanguinis motum esse; atque adeo vi derivationis sanguinem ex hepate refluxum accelerari.

Neque immerito, cum ex legibus dudum dictis sanguis venæ portarum tantum de sua celeritate amittat (*p*), quanto majus est ramorum simul sumtorum lumen trunci lumine. Et vicissim vena cava tantum celeritatis sui sanguinis incrementum (*q*) adquirat, quanto lumen venæ cavæ diaphragmaticæ minus est conjunctis ramorum hepaticorum luminibus, quibus oportet addi venam cavam renalem.

Ita fit, ut venæ portarum sanguis lentius motus (*r*), majorem partem hepatis occupet, cum per motum in vena cava acceleratum angustiora vasa sufficere possint.

§. XVIII. II. *Vasa lymphatica.*

Hæc vasa in hepate adeo prompta (*a*) sunt visu, ut eo ipso in viscere, inque portis, primum a FALLOPIO (*b*) sint detecta, visa deinde ab ASELLIO & a VESLINGIO (*c*): sed etiam Jacobi de BACK (*d*) vas lacteum in hepate visum huc pertinet, & TILMANNI filamenta quæ stilum reciperent (*e*). Etiam in hepate vasa pellucida PECQUETUS vidit & RUDBEKIIUS. Eorum historiam ita dividimus, ut cavi primum hepatis vascula lymphatica describamus, deinde gibbi.

Oriuntur

(*o*) GLISSON p. 222.

(*p*) L VI. p. 176.

(*q*) Ibid. p. 344.

(*r*) QUESNAT *Ess. sur l'Oecon.* p. 234. 235. Sed de ea re uberius.

(*a*) Hoc loco magis conspicua BARTHOL. *lymph.* p. 18.

(*b*) *De venis* obs. 3.

(*c*) In *Epist. posth.* multis locis & vide not.

(*d*) p. 106.

(*e*) TILMANNUSCOUS. p. 15.

Oriuntur in ipso cavo hepate, undique ex intima carne (*f*), ut tamen intra hepar difficiliter ostendantur (*g*).

Repunt sub membrana hepatis exteriori (*b*); in qua undique apparent in cellulosis cæruleis lineis (*i*), quas alias dicemus: internuntur capsulæ GLISSONII, ut in ea non contineantur (*k*): & demum ex sulcis hepatis cum vasis rubris prodeunt (*l*).

Abeunt in fasciculum vasorum numerosorum, qui adit glandulas conglobati generis (*m*), quæ in fasciculum vasorum hepaticorum per portas (*n*) euntium se immiscunt, & vesiculæ felleæ (*n*^{*}) cervici etiam adfident. In cane (*o*) & in capra manifestum plexum pellucidum vidi, in gazella PARISINI, alii in aliis animalibus (*p*).

Eadem trans pancreas arteriam mesentericam ad aortam usque (*q*) sequuntur, & uno (*r*) pluribusve ductibus (*s*), inferuntur vesiculæ chyli (*t*), ductuive thoracico (*u*), commista cum vasis lacteis secundi generis (*w*), aut supra eadem (*x*).

Vasa

(*f*) Hist. de l'Acad. 1721. p. 30 in hydropico. In centro hepatis morbofi DEIDIER Physiol. p. 41. 42. Consult. T. III. p. 122.

(*g*) WINSLOW. GLISSON p. 269. Ex celluloso rete externo nascire VIEUSSENS obs. p. 167.

(*b*) REVENHORST T. I. f. 2. WINSLOW n. 289. BIANCHI t. 3.

(*i*) Ipsas lineas esse lymphaticas PETSCHER n. 83.

(*k*) VERDIER H. p. 99. BIANCHI p. 20. tab. 3. &c. Plexum in ea fuisse HEURMAN III. p. 718. Tamen in membrana, quam vocat internam capsulæ, lymphaticam ponit LOQUET n. 11.

(*l*) ASSELL. f. 4. BIANCHI.

(*m*) HEISTER Compend. T. II. n. 29. GLISSON p. 315. BRUNNER pancr. p. 82.

(*n*) C. ASSELIUS de lact. f. 2. 3. & imprimis PECQUET exper. nov. anat. p. 116. T. BARTHOLIN. vas. lymphatic. p. 16. 18. Cent. II. Ep. 19. lact. thorac. p. 48. lymph. hum. p. 17. VESLING syntagm. anat. c. 8. t. 2. a. a. a. RUYSCH de valv. lymph. f. 2. RUDBECK duct. hep. aquos. t. 1. HIGHMORE. p. 50. BIANCHI tab. 3.

(*n*^{*}) VIEUSSENS obs. p. 169.

(*o*) HARDER apiar. p. 20.

(*p*) In echino SEGER apud BEAS anat. anim. p. 83.

(*q*) GLISSON p. 268. 417.

(*r*) ZELLER admin. vas. lymph. c. 1. MURALT p. 43. BLAS anat. can. [p. 199.

(*s*) RUDBECK. RUYSCH. NUCK. p. 144. REVENHORST.

(*t*) RUDBECK ibid. PECQUET. GLISSON p. 457. BARTHOL. lact. thorac. p. 21. & Amstelodamenses observ. p. 35. Id glandulam vicinam BIANCHI t. 3.

(*u*) In ductum thoracicum HEURMAN III p. 719.

(*w*) RUDBECK p. 270. SWAMMERDAM Act. Hafn. II. obs. 97.

(*x*) HENNINGER de mesenter. n. 13.

Vasa lymphatica vesiculæ felleæ (y), sub ejus tunica externa repunt, vel ab ea ipsa, vel a vicino hepate (a), orta, pauciora; sequuntur iter ductus cystici (b) & bilarii pori, conveniunt cum priori fasciculo ad portas (c) & una cisternam adeunt (d).

Convexi hepatis vasa lymphatica sub membrana externa (e) uberrima repunt, absque valvulis (f) ramorum minorum: dum se in suos truncos colligunt (g) equidem valvulosa. Eadem in ligamentum suspensorium (h) eunt, & inter ejus laminas adparent (i).

Finis nondum satis notus est. Per intervallum triangulare septi in thoracem adscendere (k) Clar. Viri. Alii ad glandulas venæ cavæ inpositas ducunt (l) sub diaphragmate, hinc in cisternam (m): alii in cavam ipsam (n). Sed hæc tota aquolorum vasculorum historia hætenus in fragmentis substitit.

Revehentium vasorum genus esse lymphatica, & aliunde adparet, & quod tenuis liquor, ipseque aer, ex vena portarum (o) in ea vasa subeat, non facillime, sed iubeat tamen: sed etiam ab arteria (p) hepatica aer in ea vasa transiit, & oleum terebinthinæ rubrum.

Etiam

(y) BARTHOLIN. *anat.* p. 151. *Epist.* 88. *Cent.* III. *lymphat.* p. 18. 32. RUDBECK. *ibid.* REVERHORST, t. 1. f. 2. t. 2. f. 4. COURTIAL *Journ. des sav.* 1688. n. 24. in cane: VIEUSSSENS *obs.* p. 204. HEUERMAN. *BIDLOO* t. 37. f. 2. BIANCHI *tab.* 3. GLISSON. p. 268. KERKRING *obs.* 5.

(a) NUCK. *Epist.* p. 145.

(b) COURTIAL, BIANCHI.

(c) REVERHORST.

(d) HEUERMAN III. p. 719.

(e) HEUERMAN p. 718. VIEUSSSENS p. 130. SCHMIDDEL in proprio *progr.* RUYSCH *Epist.* V. p. 21. *tab.* 6. WINSLOW n. 284. REVERHORST t. 1. f. 1. BIANCHI T. I.

(f) SCHMIDDEL GUNZ n. XI.

(g) SCHMIDDEL *ibid.*

(h) RUDBECK, t. 4. RUYSCH. t. 5. f. 5. BIANCHI. HEUERMAN T. III. p. 719.

(i) LOQUET n. 8. CASSEBOHM. *posib.* &c.

(k) ESCHENBACH p. 672.

(l) TAZIN. *anthropol.* II. p. 149.

(m) PETSCHE n. 83.

(n) REVERHORST p. 17.

(o) LOQUET n. 7. VIEUSSSENS p. 169. & 130. WINSLOW in scholis M. S. quas mecum communicavit Cl. D. SCHOBINGERUS auctor *disp. de fistula lacrymali.*

(p) COWPER ad t. 38. f. 2.

Etiam vinculum venosis truncis rubris circumjectum, quo una lymphatica vasa (*q*) comprehenduntur, iter ejus succi ostendit, denique & valvularum ductus rem totam declarat (*r*). Sola maceratione MALPIGHIUS utebatur (*s*) ut ea vascula ostenderet, ut credas etiam a morte aquam conbibere.

§. XIX. III. Ductus bilarii in universum.

Priora vasorum genera hepar cum toto corpore humano communia habet, hæc sibi propria. Nullum est animal, cui hepar sit, & quod ejusmodi ductibus careat (*a*), neque viscus haberetur pro hepate, si biliaris ductibus careret, etiam in cochlearum (*b*) genere.

In homine quidem undique de (*c*) hepatis ambitu, & de ipsis per nuperiora experimenta ligamentis (*d*), adveniunt radiculæ biliaræ, quæ etiam ex intimis hepatis ubique natæ, in trunculos sensim majores ad venarum modum confluunt, comites venæ portarum, & pariter cellulosa tela (*e*) comprehensæ, ut denique fere duo (*f*) trunci sint, dexter & sinister.

Vidi ramum de lobulo exiisse; alium anteriorem sinistrum ex fossa umbilicali venisse; alterum posteriorem majorem ex fossa ductus venosi & sinistro lobo accessisse, eos in unum confluisse. Vidi alias sinistrum truncum ductus bilarii confluisse ex ramo lobi anonymi, ramo lobi sinistri, in extrema fossa transversa, ramoque ductus venosi. Deinde alium de lobulo advenisse; & alium ramo majori ante vesiculam etiam anteriorem, alio minori posteriore pone vesiculam in ramum dextrum coivisse. Vidi etiam quatuor ramos fuisse, dextros duos, totidem

(*q*) RUDBECK *vas. hep. aquos.* c. 5. p. 294. DRELINCOURT *canicid.* II. DIEMERBROEK L. I. c. 13. BARTHOLIN. *nov. vas. lymph.* c. 3. p. 220. edit. HEMSTREHUS. BIANCHI p. 921.

(*r*) *Id.* RUYSCH.

(*s*) *Gland. conglob.* p. 3.

(*a*) Nisi forte molam excipias, cui negat Vir ILL. esse ductum hepaticum *Comm. Bonon.* T. III. p. 333.

(*b*) SWAMMERDAM *bibl.* p. 123.

(*c*) BIANCHI c. 5.

(*d*) FERRIN L. C.

(*e*) WINSLOW n. 315. 277.

(*f*) GLISSON. p. 255. 16.

tidem sinistros; vidi tres (g). Plerumque certe prius conjunguntur, quam ductus cysticus accedat, aliquando tamen aliquis prior in cysticum aperitur. In animalibus id frequens est, ut tres quatuorve ex hepate ductus se cum cystico conjungant, ut in cane (b), echino (i), tigride (k), catopardo (l), lutra (m), urso (n), fele (o), putorio (p), porcello guineensi (q), hystrice (q**), glire (q†), simio (r), mele (r†), etiam in lacerto, torpedine (r*). Alias ramus aliquis hepaticus in choledochum ductum sub concursum cystici se inmittit (s).

Exeunt adeo de hepate, sodales venarum (t), numeroque pares, perque sulcum transversum (u), in ipso trunco venæ sinistro fere medio coeunt, qua sede bilarius ductus latefcit (w).

Denique in unum conflunt *ductum hepaticum biliarium*, aut *choledochum*, nam & olim ita dictus est, & qui nunc ita vocatur communis ductus, is vero cum hepatico continuatur (x), tantum ut eo major sit (y).

Communis nunc truncus bilarius in trunco etiam venæ portarum manifestus

- (g) Ita fere BIANCHI l. c.
 (b) HARDEE *apiar. obs.* 20. tres, & tres etiam apud WERFFER (2). p. 201. aliquot apud SCHRAEDER p. 19. Add. BLAS *anat.* p. 65.
 (i) Multi ductus hepatici cystico uniuntur. Duo CALDESI t. 5. f. g.
 (k) BLAS t. 31. PARIS. Quatuor CALDESI *tab.* 5. f. 2.
 (l) Duo DEVERNOI *Comm. Petr.* I.
 (m) LORENZINI p. 23. 24.
 (n) Quatuor *Comm. Litt. Nor.* 1734. n. 30.
 (o) SCHRAEDER p. 14.
 (p) CALDESI t. 5. f. 6.
 (q) Duo hepatici CALDESI t. 5. f. 10.
 (q**) IDEM *ibid.*
 (q†) IDEM *ibid.*
 (r) PARIS.
 (r†) Quatuor CALDESI t. 5. f. 7.
 (r*) Unus hepaticus cum cystico conjungitur, reliqui duo inter se LORENZINI p. 22. *tab.* 2.
 (s) In vipera MORGAGN. *adv.* III. p. 54.
 (t) Tot ramos quot vena portarum ramos habet SWAMMERDAM *prodr.* p. 40.
 (u) GLISSON *ic.* p. 255.
 (w) IDEM *ibid.*
 (x) Cum cystico WINSLOW n. 303. DISDIER *splanchnolog.* p. 174.
 (y) PECHLIN *purg.* p. 500. Conf. CHESLEDEN, *tab.* 25. GLISSON l. c.

nifestus, dexterior (*z*) quam arteria, venæ parallelus (*a*) & plexu celluloso sive capsula irretitus, adparet, perque portas exit; inde ad pancreas tendit ea sede duodeno circumfusum, a vena portarum recedit, & porro dextrorsum, retrorsum descendens, aliqua parte pancreatis, per fescuncem (*b*) tectus, ad posteriora duodeni, inter laminas mesocoli, cum ductu pancreatico coit, & eodem sinu in ejus intestini aliqua eminente ruga aperitur (*c*). Longo spatio, quo cum ductu pancreatico unitus est, inter membranas intestini intercipitur aliquanto minus quam uncia. Sunt qui duo viderint ostia, bifidumque (*d*) ductum, quale quid mihi quidem non occurrit.

In ventriculum aperitur in multis piscibus (*e*), aut certe proxime sub (*f*) stomacho, nonnunquam etiam in homine (*g*), si fides est auctoribus.

In colon terminatum fuisse (*g**), aut ductum ab hepate ad renes tendisse (*g***), nuperior industria non confirmavit.

Natura biliariorum ductuum peculiaris est, nisi vesiculæ seminales aliquid haberent simile. Exterior nempe membrana stricta fit ex tela cellulosa robusta, & crassa (*b*).

Sequitur textus cellulosus laxus & inflabilis, in quo vascula arteriosa repunt (*i*): tunc nervea tunica, cum villosa superinducta, ex intestino continuata utraque, hæc elegenter reticulata, jugis teneris (*k*) vario

(*z*) EUSTACH. t. 10. f. 2. *Id. art. cæl. I.*

(*a*) EUSTACH. *ibid. Id. art. cæl. ibid.*

(*b*) EUSTACH. *tab. 10. f. 3.*

(*c*) Conf. p. 437. 438.

(*d*) ORIBAS. p. 116. JASOZIN. Sæpe se reperisse VATER *de divert.* p. 25. BARTHOLIN. p. 153. BLAS *part. IV. obs. 11.* Duplex undique hepaticus BARTHOLIN. *anat.* p. 153. Duo sunt struthioni DUVERNEY. II. p. 543. Bifidus in gallo africano STERNON. *gland.* f. 40.

(*e*) Anguillæ CALEDESI t. 5. f. 11. cyprino PETIT. Conf. L. XIX p. 308.

(*f*) Simiæ PARIS. hystrii *Id. cuniculo* HARTMAN *de bile erinaceo* *ib.* Alter struthionis porus DUVERNEY T. II. p. 547. Duo psittaci COLLINS t. 21. Xiphiæ HARTMAN.

(*g*) In pylorum GALEN. *art. medic.* p. 8. Conf. L. XIX p. 308. 309. Uncia a pyloro RIDLEY *obs.* p. 220. GIERING *Select. Francf. T. III.* p. 359.

(*g**) BARTHOLINUS ex SEVERINO p. 155.

(*g***) MARCHETT *Journ. Sav.* 1682. n. 15.

(*b*) Crassiores quam venæ portarum BARTHOL. p. 332.

(*i*) LOQUET n. 14.

(*k*) BIANCHI *tab. 5. tab. 7. f. 1. add.* MOREAGN. *Epist. I.* n. 52.

rio ductu intricatis & interceptis scrobibus (*l*) fossulisque, in quibus sunt, qui cryptas se vidisse persuadeantur (*m*). Valvulam in hepatico ductu nullam vidi (*n*).

Musculosa fabrica obscura est; irritabilitas ad venena (*o*) aliqua, ad ferri aciem nulla (*p*), neque certus motus. In animale tamen viderunt Cl.

Viri (*q*), ab ea vi bilem promoveri (*r*), & in bove fibras motrices (*s*) fuisse, & introsusceptionem, quam credas absque aliquo peristaltico motu oriri (*t*) non posse.

Valde dilatabilis est, & ad magnam molem (*u*) distenditur, digiti capax (*w*), & pollicis (*x*), & vena portarum tandem aliquando latior (*y*) fuit, etiam duplo (*z*).

Acriter sentire credas ob dolores acerrimos, quos ægri patiuntur, quibus calculus bilarius major per eum ductum ad intestinum migrat (*c*). Inde delirium (*d*), & feminae fuerunt, quæ minus acres parturientium dolores putarent (*e*).

§. XX.

(*l*) BERTRANDI p. 28.

(*m*) Journ. Sav. 1688. n. 24. BIANCHI ic cit. MALPIGHI de liene p. 120. HUBER Phil. transf. n. 492. COURTIAL. DUVERNEY II. p. 219. Credit ita se habere LOQUET. n. 15. Negat BERTRANDI p. 25.

(*n*) Habet copiosas JUSTUS VESTI obs. 1. in hepatico. Negat PLEMP fundam. p. 132.

(*o*) ZIMMERMAN p. 46. Exp. nostr. in oper. minor. I. n. 266.

(*p*) Transversas fibras habet GLISSON p. 134.

(*q*) FOELIX Exp. 6.

(*r*) In columba FANTON. diff. anat. p. 262.

(*s*) LOQUET n. 15.

(*t*) BLAS L II obs. 3. MEKERN. obs.

(*u*) BOEHMER præf. ad obs. fascic. p. 18. du HAMEL p. 264.

(*w*) Phil. transf. n. 282. inicterico. MORE. Sed. II. p. 187. Duplo solito latior PETZOLD cholcl.

(*x*) BIANCHI tab. 6.

(*y*) JENTY Course of anatomy T. II. p. 129.

(*z*) LOQUET n. 15. In saccum dilatatus Opusc. Bonon. T. IV. p. 35.

(*c*) VIEUSSENS obs. SCHUBIG lithol. p. 239. LORAY Journ. de med. 1756. nov.

(*d*) COE bil. concr. p. 149.

(*e*) p. 150

(*a*) MURALT p. 99.

(*b*) LISCHWIZ de princip. venar. p. 32.

(*c*) BORRHAAVE de fabric. gland. p. 36. FRANKEN de hepate p. 19. HEUERMAN T. III. p. 728. OVERKAMP vena port. n. 55.

(*d*) VIEUSSENS obs. p. 129. 155. 156.

(*e*) GALLACIUS l. c. p. 334.

§. XX. *Humorum per eum ductum iter.*

Iter ad intestinum alio loco rectius confirmabimus; sed reductorii vasis genus esse, quem descripsimus, ductum, adparet ex transitu humorum tenuiorum, ex vena portarum, exque arteria hepatica, qui in ductus bilarii radículas transeunt.

Ex illa quidem vena humor tenuis (a), & spiritus vini (b), & ceracea materies (c), & hydrargyrus (d), & aer (e), in ductus bilarios transiverunt: ut sæpe vidi. Etsi sunt qui difficilius (f), & aliqua demum parte in ductus bilarios transire (g), & alii omnino transire negant (h). Sed alii etiam facilius viam eam legere testantur, quam ad cavam venam (i).

Contrario ductu ex hepatico poro humor in venam portarum urgeri potest (k), & ipse sæpe urfi (l).

Sed etiam ex arteria hepatica rami profunde, quos diximus, in membranam pori bilarii penetrant (m), demumque injecta cera eam viam sequitur (n).

Negant alii (o), sed etiam facilius repleri GUNZIUS confirmat (p). & negantium argumenta accuratissima & numerosissima requiruntur, ut adfirmantium fidem evertant.

§. XXI. *Alia anastomoses.*

Quas hactenus diximus, eas facile cum receptis opinionibus concilies, cumque legibus circuitus sanguinis: difficilius quæ sequuntur.

Primum non valde intelligitur, quid commercii esse possit inter venam portarum & arteriam hepaticam: quorum utrumque sit de genere vasorum efferentium, & quali parallelo similique ductu sanguinem avehat.

Et

(f) COWPER ad tab. 38. f. 5.

(g) FRANKEN.

(h) SCHNEEL p. 16.

(i) VIRUSSENS l. c.

(k) HEUBERMAN T. III. p. 728. VIRUSSENS *struct. des viscer.* De aere negat VERHEYEN II. p. 80.

(l) COMM. Boerb. T. III. p. 188.

(m) PAULI in V. HORNE. LOQUET n. 14. Profundius, quam venæ ad portarum truncum pertinentes WEISS. de arter. viscer. progr. p. 19.

(n) VISCHER de cholepoesi n. 16. GUNZ K. Svensk. vetensk. Acad. Handl. 1751.

(o) VIRUSSENS l. c. p. 115. OVERKAMP n. 56.

(p) K. Wetenk. Acad. Handl. l. c.

Et tamen liquor in venam portarum injectus in arteriam hepaticam (a) transit.

Et vicissim liquor tenuis in arteriam (b), hepaticam impulsus venit in venam portarum, in cujus tunicam vasculosam alioquin distribuitur, (c). Num etiam perforat, & tenue quid in eam venam exhalat? (d*).

Altera, ceruissima, anastomosis est ex ductibus bilariis in cavam venam (d), quam Cl. ante me viri viderunt, & mea experimenta confirmant, uti vicissim ex vena cava mercurius (e) in porum bilarium transit, aut gluten, ut vidi piscium, aut aqua (e*).

Id iter etiam morbi demonstrant, cum bilis ipsa in sanguinem (f) frequenter redeat, quam ostendemus, amarore integro & flavo tinctorio colore per universum corpus dominari.

Difficile nunc fuerit, de anastomosi inter duo revehéntia vasa cogitari, quorum contrarii ductus sint. Credas potius venæ portarum ramum in cavæ venæ radicem non longe ab ea sede continuari, in qua de eadem vena portarum ductus bilaris secessit; ut per exiguam particulam venæ portarum, tamquam per medium ramum, communicationi inter venam cavam & ductum bilarium via pateat (g).

Sed neque id facile intelligitur, ut lymphatica vasa cum ductu bilario consentiant; & tamen si aquam & lac (h), & aerem (i), in poros bilarios inpuleris, ductus lymphæ replebuntur, eamque methodum CASSEBOHMIUS in posthumis ei præfert, in qua aer in venam portarum impellitur.

(a) VIRUSSENS *obs.* p. 129. difficilior tamen. HEBENSTREIT *ven. comm.*

(b) ORTLOF *cholepojes. 12907.* VIRUSSENS *trait. des liq.* p. 354.

(c) LOQUET n. 12. etiam de vena cava.

(d) Flatus ex ductu hepatico in eas venit SYLVIVS *diff.* VI. n. 51. & SORGERIOS *æconom. corp. Thes.* 63. COPPENOLL *de motu bilis* n. 7. Aqua, lac NREDHAM apud BIRCH T. III. p. 233. Cera HEUERMAN T. III. p. 728.

(d*) SERGERUS *de motu bilis cyst.* n. 4. Sanguinem arteriæ hepaticæ in venam portarum transfundi putat. Add. RUYSCH *Comm. Lit.* 1738. JASOLIN. &c.

(e) VIRUSSENS *obs.* p. 155.

(e*) ORTLOF n. 9.

(f) *Sect.* III. n. 26. 27.

(g) Ex arteria hepatica in porum demum bilarium ceram ire, quando per hepaticas venas transivit VISSCHER l.c.

(h) NREDHAM apud BIRCH T. III. p. 233.

(i) AERE COWPER ad t. 38. f. 1. *Primit. Polon.* T. II. p. 122.

litur. Etiam aliorum ductuum excretoriorum exempla consentiunt (*k*). Ligatis demum bilariis ductibus cum duodeno nodosa hepatis vascula pel- lucida replentur (*k**).

Denique, sed hoc facilius est, liquor injectus venæ portarum (*l*) venæ cavæ, ductui bilario, in cellulofam telam hepatis exsudat, vidi- que, cum cæruleum esset gluten, totum ductum & omnes ejus in he- pate rames, cæruleam cellulofam lineam aliquantum latam, comitem & parallelam habuisse. Credas per poros inorganicos liquorem exsudasse. Verum si patent in cadavere, cur non in vivo, calente animale? An forte ad bilem vapor de arteriis secretus se addit? an hæc est via, per quam a ductu bilario in lymphatica vascula liquor transit? Ita HUNTER- US putaverit & MONROUS.

§. XXII. *Nervi hepatici.*

Numerosi satis (*a*) ad hepar adveniunt, conjuncti ex octavo pare, exque nervo magno sympathico.

Illorum quidem aliqui anteriores (*b*) cum coeliaca arteria & hepatica, ad fossam umbilicalem, sulcum transversum hepar dextrum, vesicu- lam ituri.

Alii posteriores, & pone venam portarum (*c*), & ante eam, ad sul- cum transversum, lobum anonymum, dextrum, vesiculam fellis, lobum SPIGELII.

Sinistri (*d*) nervi a plexu anteriori ventriculi nati, trans minus omen- tum, & fossam ductus venosi, ad lobum sinistri lateris accedunt, ut ta- men cum prioribus jungantur.

Etsi nunc hepar nervos habet cum capsula GLISSONII (*e*) irreti- tos, comites ramorum venæ portarum (*f*), & pariter in intima vi- fceris

(*k*) L. II. p. 166.

(*k**) VIRUSSENS p. 169.

(*l*) Hæc putem esse fila mercurio plena, per venam portarum injecto, quæ capsulam GLISSONII faciunt apud VIRUSSENS obs. p. 156.

(*a*) Minimi GALEN. util. part. L. XIV. c. 17.

(*b*) L. X. p. 237. 263.

(*c*) Ibid.

(*d*) L. II. p. 236. 263. BERTRANDI p. 35.

(*e*) Conf. BERTRANDI p. 36. WINSLOW n. III. n. 406. CALDAN Lett. III. p. 95.

(*f*) VIRUSSENS obs. p. 135.

sceris deductos (*g*), tamen cum parvi sint, & in experimentis vivorum animalium (*b*) hepar vix quidquam sentire videtur, & in vulneratis hominibus (*i*), & demum in morbis (*k*), in quibus sæpissime occultum ulcus hepar depascitur, & ægro ignaro, & medico.

Nervis tribuas, quod in sede cardiæ ab uno ictu homo proster-natur (*l*).

§. XXIII. *Fabrica hepatis. Membrana extima.*

Membrana hepatis communis a peritoneo (*a*) est, & ejus naturam se-quitur, pariter alba, vasculis picta minutis, solida, absque fibris con-spicuis, & undique levis. De hepate, cui per ligamenta advenit (*b*), secedit in fossa transversa & in fossa ductus venosi, facitque omentum mi-nus (*c*). In fossa etiam ovali super vesiculam fellis se conjicit & eam con-tinet, qua sede nulla est in ejus fossæ fundo membrana hepatis extima, nullaque inter duas laminas ligamenti suspensorii, & qua sede omentum de hepate decedit.

De interiori facie, qua ad viscus ipsum respicit, cellulosa tela undique efflorescit, ex communi peritonæi natura, tenera, macilenta, brevis, in qua vascula illa superficialia (*d*) hepatis rete faciunt, & cujus ope mem-brana extima hepati adhæret (*e*). Sed intervalla sunt in hepate reticu-lata (*f*), subcærulea, in quibus rimæ quædam hepar dividunt, & cel-lulosa tela profundius se de extima tunica in viscus demergit.

In ea cellulositate corpuscula sedent, quæ pro glandulis habita fue-runt (*g*).

§. XXIV.

(*g*) WINSLOW ibid.

(*b*) Experimenta nostra sunt in *oper. minor.* 120. 121. 122. 123. neque dissentit JAUS-SERAND, neque de membrana externa LORRY *Journ. de med.* p. 756.

(*i*) MULLER *biga obs. chir.* p. 19. Omnino sensu caret] la MOTTE *Chir. compl. obs.* 59.

(*k*) BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 496. obtuse sentire VALCARENGHI *Med. rat.* p. 31. Exiguus sensus cum maximo hepatis abscessu ROLFINK *de hep.*

(*l*) *Art. de faire les rapports. nouv. ed.* p. 591.

(*a*) p. 350.

(*b*) Ibid. & seqq.

(*c*) p. 365. seqq.

(*d*) p. 475.

(*e*) DUVERNEY *posthum.* II. p. 215.

(*f*) Reticulatum habet DUVERNEY l. c. p. 220. Hæc sunt lymphatica membranæ extimæ VIEUSSENS p. 132.

(*g*) SAVIARD p. 495.

§. XXIV. *Fasciculi vasorum & lobuli.*

Commune est omnibus visceribus, fasciculos vasculosos, sensim diminutos, ramosos, cellulosa tela obvolutos, per eorum intima dividi; ita viscus in lobos majores, mediocres, parvos, minimos, demum microscopii solius auxilio conspicuos distinguitur.

In hepate hæc omnia potius evidentiora sunt. Fundamentum cujusque fasciculi præbet venæ portarum (a) ramus: & ductus bilarius adfidet; circa eum arteriæ ludunt (b), & nervi (c): obnubit omnia reticulum cellulosum.

In experimento repleti ductus bilarii facile mihi fuit distinguere, cæruleam materiam solam cellulosam vaginam ei ductui propriam replevisse, ut reliquis vasis nihil tincti circumfunderetur. Credas eo facilius iis, quæ citavi ex CASSEBOHMIO & WINSLOWO (d), cuique vasi suum esse cellulosum tenerum textum, continuum forte cum reticulato illo externæ tunicæ substrato (e); deinde GLISSONIANAM telam, nunc tenuiorem, involvere omnia.

Vena cava extra eam capsulam est solitaria (f), cum paucioribus arteriis (g), per ejus tunicas distributis (h). Ad ramos venæ portarum rami venæ cavæ in decussim feruntur.

Ex his vasis, cum cellulosa tela, fit peculiaris hepatis caro. Duritas cellulosæ, brevitæ, & copia ad vasa comparata, faciunt duritatem peculiarem hepatis. Partes solidæ, non diffilibiles, in hepate sunt 2898. (i), 2435. (k), 2304. (l), 1953. (m), quando in cortice cerebri sunt

2148.

- (a) WINSLOW n. 310
- (b) VIRUSSENS obs. p. 115. 135. WINSLOW l. 2.
- (c) Ibid.
- (d) WINSLOW n. 315.
- (e) RAU apud VALENTIN. p. 92.
- (f) POZZI p. 71.
- (g) VIRUSSENS obs. p. 135.
- (h) LOQUET n. 13.
- (i) HAMPELGER p. 188.
- (k) p. 189.
- (l) p. 190.
- (m) p. 187.

2143. (n), 1940. (n*), 1550. (o), & 1477. (p), earum partium, quarum hepar integrum & recens pependit 10000. Pondus specificum 1083. (r), majus quam in aliis glandulis (s), accuratissimus MUSSCHENBROECKIUS reperit, in homine 1. 05203. 1000. in bove 1. 0744, paulo majus.

Firmius etiam vel ad digitum est, quam alia viscera, & fero putrescit. Hepata per multos annos ab aruspibus adservata fuisse legimus, & a se ipsa visa diutissime conservata PETITUS (t) habet. Centum annis durasse, per obsidiones compertum est (u), ut pene lapidea fiant (w). Non ita in aliis animalibus. Equi fatigati hepar subito putrescit & dissolvitur (x). Piscibus mollissimum, oleosum (y), pene saniei modo diffuit (z).

§. XXV. *Acini hepatis.*

Fasciculi isti vasorum cum suis cellulosa telae vaginis hepatis lobos in minores & minores lobulos dividunt, usquedum denique carnis hepatis minimae quasi insulae (a) supersint, quas nullae porro conspicuae cellulosa lineae dividant; & quarum propria fila (b) cellulosa cum suis vasis firmiter coharecant, quam cum cellulosa circumfusa. *Acinos* vocant, & in nonnullis bestiis, ipsoque in homine (c), angulosos, hexagonios (d) esse

(n) p. 185.

(n*) p. 190.

(o) p. 188.

(p) p. 183.

(r) SAUVAGES diff. sur l'act. des med.

(s) In glandula maxillari 1590. cum hepar sit 1953. HAME. p. 183.

(s*) *Introduct.* p. 556.

(t) *Miscell.* L. I. c. 7.

(u) PLINIUS L. XI. p. 629. add. RIOLAN. p. 123.

(w) BOEHMER *effect. rubiae* n. 12.

(x) KERKEING *obs.* 77.

(y) RONDELET L. III. c. 19. de cartilagineis piscibus: de orbe pisce BARTHOL. C. II. hist. 1.

(z) In *Xiphia* HARTMAN *anat. ejus piscis.*

(a) RUYSCH *resp.* ad BORRM. p. 72. WEPFER ad J. H. PAULI *dubi* p. 98. DUVERNY T. II. p. 219. WINSLOW n. 286. MALPIGHI. p. 61.

(b) WINSLOW n. 285. 286.

(c) MALPIGHI. p. 61.

(d) COLLINS p. 437. *Mém. de 1749.* p. 497. BARTHOL. *Fig. nris* WINSLOW n. 285. PARIS. in ciconia, in dorcade.

esse scribunt, in sue (e), mure montano (f), sciuro (g), talpa (h), erinaceo (i), dorcade (k), elephanto (l), bove (m), capra (n), catopardo (o), fele (p), tigre, leone (q), civetta (r), coati mundi (s), ciconia, scope (t): in piscibus (u), lampetra (w), garfish (x), anguilla (y), galeo (z): inter frigida quadrupeda in lacerta (a); demum in cochlea (b).

In eorum acinorum quemlibet ramus a vena portarum se diffundit, ramis radiatim undique ex trunculo sparsis (c).

In eum etiam porus biliaris advenit, & ramus arteriæ hepaticæ, etiam eam quidem aliqui scriptores exclusam voluerunt (d), quæ non esset, nisi bronchialis arteriæ quoddam irritamentum, inque cellulosa tela glissoniana consumeretur (e), nullo ad verum (f) hepatis parenchyma ramo dato (g). Sed arterias nusquam longe credas abesse.

Nam

(e) In sue BIERWIRTH *struct. hep.* f. 2. Angulosi in sue BIANCHI p. 1160. Noduli ex alvo rubentes BOEHMER *effect. rub.* l. c.

(f) PARIS.

(g) MALPIGH. p. 59.

(b) MALPIGH. *postb.* p. 31.

(i) PEYER p. 80.

(k) PARIS.

(l) MOULINS p. 21.

(m) MALPIGH. *hep.* p. 60.

(n) LANG. *Physiol.* p. 13.

(o) PARIS.

(p) WEPFER *cicut.* p. 185. MALPIGH. p. 60. PEYER p. 70. 33. Varii anguli COLLINS p. 437.

(q) PARIS.

(r) PARIS.

(s) Ibid.

(t) PARIS.

(u) MALPIGH. p. 59.

(w) COLLINS p. 436. Trifolii esse similitudine p. 437.

(x) Ibid.

(y) Globuli ten RHYNE *vet. med.* p. 121. Acini MALPIGH. p. 59.

(z) MALPIGH. *ibid.*

(a) IDEM *ibid.*

(b) SWAMMERDAM *biol.* p. 123. MALPIGHII *de hep.* p. 61.

(c) Penicillum dicit S. BIERWIRTH f. 1. Pedem anserinum VIEUSSENS *obss.* p. 119. qui de vena cava similia adfirmat.

(d) LOQUET n. 9 14. 16. ORTLOF *cholep. negot.* n. 16.

(e) GLISSON. c. 29. p. 259. J. V. HORNE apud SYLVIVM *diff.* VI. n. 52. LOQUET.

(f) LOQUET.

(g) Ita veteres OMIBASIVS p. 114.

Nam arteria hepatica & in omnia puncta (*b*) se diffundit inque acinos (*i*), & inflata acinos inflat (*k*), perinde ut vena (*l*) aut biliaris porus.

In his ipsis acinis venæ a cava venas ad portas adtingunt, & in iisdem illæ humorum suorum inter vasa venosa arteriosa & biliaria sunt communicationes, quas per experimenta evicimus (*m*).

§. XXVI. *Num hi acini cavi sint.*

Acinos nemo rejicit, ne R U Y S C H I U S quidem, sed de interiori fabrica disputatur.

MARCELLUS MALPIGHIUS ex ea lege, quam universo corpori præscripserat, cum in hepate & rotunda tubercula videret, & secretionem nosset peragi, cavis glandulis hepar constare docuit. Prior equidem W E P F E R U S (*a*) anno 1664. hepar glandulosum fecerat; sed I L L. Viri glandulas meros esse lobulos minores MALPIGHIUS reposuit (*b*).

Docet ergo MALPIGHIUS, acinos (*e*) fieri glandulis simplicibus in racemum collectis, quem propria membrana obvolvatur. Eas glandulas cavas esse, nam insectorum hepate sacculos esse cavos, in eruca, gryllo (*d*), gryllotalpa, cancro. In sue utriculos ampliores a reticulo vasculoso comprehensas, sponte sua (*e*) adparere. In gazella (*f*) simillimos videri, glandulæ simplicis acinos cum suo foramine, & similem esse in civettæ fabricam (*g*).

Eam cavitatem demonstravi, quando per morbos hepar vitiosa materia obfarcitur. Tunc glandulas hepatis in rotunda receptacula materia illa

(*b*) PETERMAN *Scrutinium icter.* R U Y S C H *Tbes. max.* n. 86.

(*i*) VIEUSSSENS *obs.* p. 201.

(*k*) WINSLOW n. 286. JENTY T. II. p. 116.

(*l*) PARIS. in scope BERGER p. 211. WINSLOW n. 287. WINSLOW n. 219. MALPIGH. p. 61.

(*m*) p. 508. 509.

(*a*) l. c. & ipse sibi vindicat. *de apopl.* p. 374.

(*b*) *Posthum.* p. 32.

(*c*) *De hepate* p. 61.

(*d*) *Fabr. gland. conglob.* p. 6.

(*e*) BIANCHI p. 1160.

(*f*) PARIS. l. p. 100.

(*g*) *Ibid.* p. 170.

illa morbose plena converti. Aqua repletas abire in hydatides (*b*), qui adeo vulgaris est hepatis morbus, ut exempla excitare labor frustraneus videatur. Alias gypseam materiam (*i*), aut veros calculos, aut scirrhum concrementum in iis glandulis esse. Omneque genus vitiose grandiscentium in hepate tuberculorum (*k*) ad distentas valvulas pertinere. Multi etiam amici nuperi ejus sententiæ adjecerunt, vesiculas minimas (*k*^{*}) bile plenas, se in reticulari textu hepatis vidisse. Bile (*k*[†]) evidenter in leone tumidas fuisse, tum in hydropico, cum grandiori essent mole (*l*). Et in pullo hepar fieri vesiculis ad ductus hepaticos appensis (*l*^{*}). Visas fuisse morbose hepatis vesiculas, in ductum choledochum resumtas (*m*), & per venam portarum vel per choledochum ductum eminentias cellulares hepatis inflatas intumuisse (*n*). Totum demum hepar vesiculis fieri biliaræ adfinibus, quæ bilis sint receptacula (*o*). Denique & villos radiatos, concentricos, in iis acinis adparuisse, & in centro depressam foveam (*p*).

Addi

(*b*) Conf. L. VII. p. 384. & vide RUYSCH *Cent. obs.* n. 65. *Thes.* I. *ass.* 2. n. 12. *Thes.* VIII. n. 10. GLISSON p. 83. BIDLOO *Exerc.* II. *de hydat.* p. 58. PACCHIONI *de dura matr.* *Diss.* IX. p. 253. COURTIAL *obs.* I. *Zod. med.* Gall. ann. . p. 102. BIANCHI *hist. hepat.* p. 119. VALSALVA apud MORGAGNI *Epist.* 3. n. 7. 8. 9. 10. FANTON. *diss. anat.* p. 68. BARTHOL. *Cent.* III. *hist.* 81. VALISNER. *Gal. de min.* VII. n. 55. LANCIS *dissert.* III. CHESLEDEN p. 163. 212. LITTRE *Hist. de l'Acad.* 1704 n. 18. SENAC II. p. 686. Morbus inde bubulus epidemicus *Act.* HAFN. Vol. III. *obs.* 76. & ovium pestilentia LINDEN *physiol.* 108.

(*i*) Sphærulæ gypseæ RENEAUME *des bern* p. 114. BURCHART *gland scirrhus*.

(*k*) Glandulæ manifestæ PLANCUS *monstr.* Grana miliacea *Select. Francof.* Vol. IV in ictero WOODWARD *cases* p. 196. 97. Etiam glandulas hepatis morbosas habet MALPIGH *posth.* p. 30. BROWN *Phil. trans.* n. 178. LITTRE *hist. de* 1701 *obs.* 2. BURGGRAV *Comment. Lit. Nor.* 1735. *hebd.* 31. RIDLEY *obs.* 1. p. 8. in hydropo In eodem glandulosi lobuli evidentissimi MORGAGNI. *sed. caus.* II. p. 103. MANGET *bibl. anat. nov. prælim.* p. 63. *Theatr.* p. 370. GIBSON *Edimb. Ess.* II. p. 357. PEYER *obs.* 6. *Act. Lit. Suec.* 1722. p. 373. COWPER t. 38. f. 5. in hypochondriaco acervo globulorum similes. Ipse ejusmodi puncta alba & duriuscula vidi. Hepar fetidis crassis glandulis constat MANGET *theatr.* p. 370. In piscibus globuli duriusculi SCHÆFFER *pisc. bavar.* p. 80.

(*k*^{*}) DUVERNEY T. II. p. 622.

(*k*[†]) COLLINS p. 447.

(*l*) LEIGH. *nat. hist. of Lancashir.* II. p. 71. add. VALSALVA n. 9. NANNI p. 328. FOZZI p. 70.

(*m*) VALSALV. n. 10.

(*n*) SENAC. *du cœur.* II. p. 686.

(*o*) HELVET. *econ. anim.* p. 141. ex CHIRACO. Etiam inter NANNIANA exempla fuerunt folliculi similes vesiculæ felleæ vel piri *Comm. Acad. Bonon.* T. I. p. 328.

(*p*) WINSLOW n. 286.

Addi posset tenacitas bilis, quæ in humoribus dominatur per cryptas excretis: similesque possis citare folliculos, in vesicula bilis certo obvios.

Hiscæ rationibus moti multi Cl. Viti in MALPIGHII sententiam transierunt (*q*), ut acinos hepaticos pro glandulis simplicibus haberent, in quas liquor ab arteriis [aut a vena portarum] depositus, haberet ductum choledochum pro excretorio canali.

Venam portarum in cellulas membraneas ovales abire (*r*), & vaginam GLISSONII in cellulas desinere (*s*), ut in pulmone fit, celebris incisor monet.

§. XXVII. *Quæ contra ista dicantur.*

Cum ipse in juventute RUYSCHIUS (*a*) glandulas, ut in aliis visceribus, sic in hepate admisisset, post superiores tamen administrationes sententiam mutavit, ut acinos quidem negaret propriam membranam habere, cæterum esse (*b*) fasciculos venarum, & ramorum pori bilarii, in fasciculos indissolubiles & penicilli similes, conglomeratorum. Qua in re ita cum bono sene consentit ILL. ALBINUS, ut eos acinos vascula faciat esse, quæ versus se invicem incurvata, fere conniventes rosas hierichuntinas referunt (*c*). Porro in hepate acinos minutissimos FERRENIUS (*d*) detexit, in unius lineæ spatio millenos, qui tamen omnes abirent in vasculum, in spiram anuli, aut in dimidium anulum curvatum: & similia in rene avium, ut in alauda vascula (*e*) reperit.

Satis etiam mihi ex meis curis certum videtur, illos animalium hexagonos acinos, non elementum, sed agmen elementorum fuisse, lobulum

(*q*) Petrus NANNI. Job. FANTONI diff. 6. KEIL anat. abrigid. p. 72. POZZI p. 70. SENAC. du coeur. L. II. p. 686.

(*r*) VIEUSSSENS p. 120.

(*s*) RAU p. 92. apud VALENT.

(*a*) Centur. obs. med. chir. n. 51. Mus. rar. thes. B. reposit. 4. n. 15.

(*b*) Thes. I. aff. 2. n. 7. tum Thes. IX. n. 59. & t. 4. f. 1. 2. 3. & Thes. II. aff. 3. n. 1. aff. 4. n. 15. Thes. II. n. 3. Thes. VI. n. 82. 88. 108. Thes. VII. aff. 1. n. 17. Thes. X. n. 77. 80. & de fabr. gland. BIERWIRTH f. 1.

(*c*) FRANKEN. de hep. p. 18. Sic fere VIEUSSSENS obs. p. 139.

(*d*) Mém. de l'Acad. 1749. p. 497.

(*e*) p. 519.

bulum nempe hepatis (*f*), ex multis minoribus particulis compositum; sola clausum cellulosa tela. Quare etiam manifesto & caret communi (*g*) membrana, & flatum impulsum in cellulosa spatiola circumposita dimittit, ut vesicas sub externa membrana excitet (*h*).

Plurimum potest apud me illa, olim proposita, consideratio (*i*): transire ex vena portarum, etiam ex arteria hepatica, in acinos hepatis materiem ceraceam. Nunc si inter venam, interque ductum biliarium interpositæ forent cavæ, manifestum est, in eas se diffusuram materiem injectam, & cavam glandulam in nodulum tumefacturam, neque prius in vias bilarias transituram, quam folliculum ei viæ præpositum distendisset. Nihil autem simile, neque clausos nodulos in ejusmodi hepate vidi, quoties impulsæ materies ex vena in porum biliarium viam invenerat, neque longitudo ductus choledochi, cujus aliqui rami semipedem æquare possunt, videtur cum fabrica glandulosa posse conciliari. In proximum cavum mucus de crypta effluere potest, per brevem ductum: per distantem canalem, ut fluat, non videtur satis retinere celeritatis, quam fabrica cryptæ necessario destruat (*k*).

Offert etiam meditati se alia speculatio. Folliculi simplices omnes, vera fide noti, in membrana plana disponuntur, cui circumpositum plerumque est aliquid musculosi. Ita mucum secretum exprimi posse intelligitur. Non perinde, si ejusmodi folliculi in maximos glomeres, viscusque hepatis simile conpingerentur. Pressio nempe quæcunque, qualem hepato certo experitur, folliculos contra folliculos ita urgeret, ut & ipsi intercepti ductus mille modis a vicinis folliculis premerentur, & eliderentur; siquidem folliculorum massa nascente poro maxima ratione major est.

Ad argumenta sumpta ab hydatidibus alias respondimus (*l*): fiunt ex in cellulosa fabrica, & ideo vascula habent, pluresque membranas, & aliæ alias continent (*m*).

Quare

(*f*) Etiam FERREIN p. 497. Vide in civetta apud PARIS. in aliis animalibus COLLINS p. 437.

(*g*) BIERWIRTH f. 1.

(*h*) WINSLOW n. 287. JENTY II. p. 116.

(*i*) L. VII. p. 386.

(*k*) Ibid. p. 393. 447.

(*l*) Ibid. p. 390. seqq.

(*m*) VIEUSSENS p. 139. LIEUTAUD p. 300. FIZES de l'ame p. 143. BERTRANDI p. 44. 45. &c.

Quare nuperiores scriptores fere opinionem MALPIGHIANAM deferuerunt.

Non ideo continuo admitterem GLISSONII (n) capsulam telam esse vasorum lymphaticorum, & organum secretorium bilis. Nemo enim hactenus demonstravit, vera fila cellulosa cava esse.

S E C T I O I I.

V E S I C U L A F E L L E A.

§. I. *Quibus animalibus nulla sit.*

Dantur animalia, & ex omnibus classibus, quæ non aliam bilis habeant officinam, quam id ipsum hepar, in cujus descriptione versati sumus. Inter quadrupeda docilia, & herbivora multa huc pertinent, potissimum elephas (a), camelus (b), quem PARISINI dromedarium dixerunt, equus (c), asinus (d), cervus (e), caprea (f), dama (g), alce (h), rheno (i), manati (i*); deinde inter herbivora, & pene omnivora, aper indicus in dorso *umbilicatus* (k) & aper zain, idem puto

(n) VIEUSSENS *obs.* p. 157.

(a) ARISTOT. *Hist. anim.* L. I. c. 17. L. II. c. 15. in maximis animalibus hepar absque felle esse Et de elephante GILLIUS *descr. eleph.* p. 505. CALDESI p. 46. MULLINS p. 22. BLAIR *Phil. transf.* 126. STUKELBY p. 96. PARIS. ic. RAY *synops. quadrup.* p. 138. In China coram imperatore incisa bellua, neque ulla reperta est vesicula *Receuil. d'obs. cur.* T. IV. p. 89. 35.

(b) CALDESI, PLIN. L. XI. p. 628. PARIS. T. I. p. 75. Fel venis quibusdam inest ARISTOT. *part. anim.* L. IV. c. 2.

(c) ARISTOT. *hist. anim.* L. II. c. 15. P. *anim.* L. IV. c. 2. SNARE p. 31. *Act. Hafn.* Vol. I. *obs.* 11. Vol. III. *obs.* 11. Habere vesiculam SANCASSAN *dilucid.* p. 80. KUNDMAN *Seutenh.* p. 229. Sed nullam reperit Cl. DAUBENTON T. IV. p. 316.

(d) *Act. Hafn.* Vol. V. p. 272.

(e) ARISTOT. II. CC. CALDESI. PLIN. NEMESIUS L. I. c. 4. p. 11. BUFFON T. VI. p. 109. 102. in hinnulo HARDER *apiar.* p. 82. Conf. PARIS. P. 2. p. 71. 74. Etiam cervus brasiliensis PISO. *hist. natur. ind.* p. 98.

(f) CALDESI. PLIN.

(g) CALDESI PLIN. II. CC.

(h) PARIS. P. I. p. 175.

(i) LINN *Cervus Rheno* p. 19. SCHAEFFER *Lupon. ill.* p. 326.

(i*) *Nov. Comm. Acad. Petrop.* T. II. p. 318.

(k) *Tayacu* BARTH. C. II. *hist.* 96. *Phil. transf.* n. 153.

puto priori (*l*). Inter omnivora animalia quædam (*m*) de murina classe, mus rattus (*n*), mus *surmulot* (*o*), hystrix canadensis (*p*), rattus cauda squamosa (*q*), glis minor (*r*).

Inter aves vesicula carent princeps struthiocamelus (*s*), deinde pavo (*t*), gallina montana (*u*), psittacus (*w*), columba (*x*), palumbus (*y*), cuculus (*z*), grus (*a*).

Inter pisces myrus (*c*), gadus (*d*), lampetra (*e*), sarda (*f*), mulus (*g*), faber (*h*). Legas etiam passim homines vesicula destitututos fuisse (*i*).

Adparet inde, hepar solum generandæ bili sufficere; & , si fides est dissectionibus, satis esse naturæ, dum in ductu choledochi diverticulum (*k*), & lacum aliquem recipiendæ bili paraverit (*l*). In delphino enim ductus choledochus in ovalem amplitudinem dilatatur, rugis & cellulis variam (*m*). Vesiculæ plures erant, ad sex, in homine, veræ vesicæ loco, quæ nulla aderat (*n*). In lutra ductus cysticus appendicem

- (*l*) WORM *Mus.* p. 349.
 (*m*) PLIN. ARISTOT. *part.* L. IV. n. 2. *hist. anim.* L. II. c. 15. BARTHOL.
 (*z*) BUFFON T. VII. p. 315. BLAS p. 270.
 (*o*) BUFFON T. VIII. p. 212.
 (*p*) *Phil. transf.* n. 196.
 (*q*) BUFFON. T. VIII. p. 186.
 (*r*) *Mém. de l'Acad.* 1727. p. 387.
 (*s*) *Phil. transf.* n. 386. 394. PARIS. II. p. 140. VALISM. *Oper.* p. 244.
 (*t*) *Act. Hafn.* II. p. 289.
 (*u*) *Phil. transf.* n. 307.
 (*w*) COLLINS t. 23.
 (*x*) *Oeconom. Abbandl.* V. p. 80. FANTON. *diff. anat.* p. 262. *Act. Hafn.* I. obs. 96.
 GRAF *pancr.* p. 20. CALDESI. COLLINS p. 456.
 (*y*) CALDESI *ibid.*
 (*z*) COLLINS.
 (*a*) COLLINS. BARTHOL. *Cent.* IV. *hist.* 12.
 (*c*) RONDELET p. 408.
 (*d*) GRONOV. *Act. lit. succ.* 1742. p. 95.
 (*e*) CALDESI. BLAS p. 279.
 (*f*) CHARLET. *Mantiss.* p. 25.
 (*g*) RONDELET p. 293.
 (*h*) *Idem* p. 329.
 (*i*) Fuisse nonnullos ARISTOT. *Part. anim.* L. IV. c. 2. & PLINIUS. Habet etiam TARGIONI obs. p. 138. SCHURIG *hamatol.* p. 232. HUBER *Phil. transf.* n. 492. *Hist. de l'Acad.* 1705. n. 9. *hist. de* 1702. p. 54. BERTRANDI p. 29.
 (*k*) HARTMAN *de bils* c. 2. Etiam in vipera bulbus adest ductus choledochi FANTON. p. 10.
 (*l*) FANTON. l. c. Amplissimos canales bilarios habet REDI L. c. p. 112. 113.
 (*m*) BERTRANDI p. 28. 29.
 (*n*) TARGIONI *Hist. de l'Acad.* 1705. n. 9.

dicem habet (n*). In aliis hominibus vesicula fellea carentibus ductus choledochus certe major (o) est: sic in hinnulo (p) manati (q), hystrice (r).

Quare autem aliqua animalia absque vesicula sint, difficillimum fuerit dictu. Fel habere, quibus sanguis minus purus, & contra, A R I S T O T E L E S (s). Sed cur bovi magis quam equo purus sanguis fuerit? Et in murium genere alii vesicula carent, dum alii ea destituuntur. Inter cervos equidem nullus vesiculam habet, ut moschus (t), & caprea steppoisarai (u), & rupicapra (w), non videantur ad cervos pertinere.

Fortē etiam rem ipsam adnotatio minus accurata difficiliorem fecerit. Parvam certe vesiculam sæpe pro nulla habitam fuisse certum est, ut in ovibus (x) ponticis, chalcidicis (y), quæ dicuntur felle carere; in suis (z), quæ notissimam habent vesiculam, & tamen dictæ sunt absque ea fuisse; in meleagridibus (a), quas legas non omnes vesiculam habere, cum vix tantam naturæ inconstantiam liceat imputare; in mure montano (b), sorice saquatico (c), ratto aquatico (d), mure domestico (e), in glire (f), talpa (g), lepore (h), cyprino (i),
phoca

(n*) CALDESI.

(o) TARGIONI *Hist. de l'Acad.* 1705. n. 9.

(p) HARDER l. c.

(q) *Nov. Comm. Petr.* l. c.

(r) SARAZIN l. c.

(s) *Part. anim.* L. IV. c. 2.

(t) *Nov. Comm. Petr.* T. IV. p. 403.

(u) *Ibid.* p. 391.

(w) PARIS.

(x) ÆLIAN. L. XI. c. 29. & in universum de ovibus frigidarum regionum L. XI. c. 21.

(y) ARIST. *part. anim.* L. IV. c. 2. *Hist.* L. I. c. 17. PLINIUS.

(z) MATTEI *anim.* p. 174.

(a) Non omnes habuisse vesiculam PARIS.

(b) BUFFON T. IX. p. 232.

(c) T. VIII. p. 69.

(d) T. VII. p. 354.

(e) Negat BORRICHIVS apud BARTHOLINUM *Ep.* 51. *Cent.* IV. PEYER *obs.* 15. CALDESI t. 5. f. 12. Sed habet ARNAULD. *Hist. des anim.* Tom. VI. f. 4.

(f) BLAS p. 270. BIANCHI & C. *Conf. MORGAGN* *Ep.* II. n. 36. CALDESI, BUFFON. T. VIII. p. 170. REDI *oper.* T. V.

(g) Negat GAUTIER *obs.* T. I. habet HARDER *apiar. obs.* 24. BUFFON. L. VIII. p. 91.

(h) Negat REDI *anim. viv.* p. 71. BARTHOL. *Cent.* II. n. 85. Habet FANTOM. *diff. anat.* p. 257. PAULIN. *lagograph.* p. 54. BUFFON. T. VI. p. 275. Etiam cuniculo innata hepatis vesicula est & parum conspicua.

(i) Negatur Bresl. *Saml.* 1723. *April.* Sed manifesta est.

phoca (*k*), noctua (*l*), in quibus animalibus aliqui scriptores vesiculam fellis descripserunt, & quæ tamen accuratius re inquisita felle non carent; in tursione (*m*), quem plerique scriptores negant fel habere, & tamen subinde eo præditum esse nuperus auctor existat; in galeo (*n*), cui negant alii, alii tribuunt. Sic etiam in homine vesicula fellea nulla videbatur, quæ accuratiori facta inquisitione adparuit (*o*). Et potuit hepatis immerfa vesicula latuisse (*p*): potuit contracta fuisse & exigua (*q*), & ductu cystico non latior (*r*). Potuit denique consumpta fuisse (*r**), uti consumptam vidi.

Totam etiam oviparorum quadrupedum tribum (*s*) ea vesicula carere admitti nequit; vidi in rana, in lacerta (*t*), in salamandra; alii in chameleonte (*u*), crocodilo (*w*), testudine (*x*), lacerta tockaye (*y*).

Quare si rejicere licet tursionem, galeumque piscem, eo res fere rediret, ut felle carentia animalia sint de classe herbivora, poteritque nasci suspicio, ea animalia, quæ nunquam adipe vescantur, non eguisse tanta in bile acrimonia, ut carnivora quidem animalia, quæ pinguedinem inter cibos recipiant. Esset & alia conjectura, in animalibus parci victus, certe inter quadrupeda, illam ad tempus passionis adstrictam necessitatem copiosioris bilis non eam esse, ut proprio receptaculo egeat.

§. II.

(*k*) Negat ARISTOTELIS II. cc. Restituunt nuperi.

(*l*) *Phil. transf.* n. 469. HARTMAN *anat. ejus pisc.*

(*m*) ARISTOT. *part. anim.* L. IV. c. 2. *Hist. anim.* L. II. c. 15. FANTON. *anat.* p. 110. REDUS I. c. p. 112. 113. RONDELET p. 460. TYSON p. 29. KLEIN *miss.* I. p. 25. BARTHOL. *Cent.* II. *hist.* 25.

(*n*) CHARLETON *mantiss.* p. 86. In Galeo acanthio KLEIN *Miss.* III. Sed habent PARIS. T. I.

(*o*) LIEUTAUD *essay* p. 306. CAI. TACCONUS sive JANUS PLANCUS apud BIANCHUM p. 960 post MORGAGNI *Epist.* II. p. 299. Minimam etiam BIANCHI admittit. t. 6.

(*p*) In mure SCHRADER I. c. p. 23. in piscibus PARIS. de galeo, & in universum de piscibus cartilagineis HILL. *review* p. 115. in testudine terrestri CALDESE.

(*q*) JENTY *cours. of anat.* II. p. 129. add. RUYSCH. *Centur. obs.* 31.

(*r*) SCHMIEDEL *pericard.* p. 28.

(*r**) KERKRING *obs.* 82.

(*s*) ARISTOT. *hist.* L. II. c. 15. Sed fere in omnibus reperit REDI *anim. viv.* p. 4.

(*t*) Etiam HARDER *apiar. obs.* 21. FANTON. I. c.

(*u*) VALISNERI.

(*w*) HASSELQUIST p. 295. BORRICH *herm. Egypt. sapient.* p. 276.

(*x*) CALDESE p. 36.

(*y*) *Mém. de physiq. & de mathem.* p. 52.

§. II. *Figura. Situs.*

Quadrupedibus ergo carnivoris & herbivoris (*a*) plusculis commune est bilis receptaculum, quod veteres fere *fel* dixerunt, nuperi *vesiculam felleam*.

Ponitur in sulco, quem diximus (*b*) hepatis, transversa retrorsum & sinistrorsum; aliis minus, aliis tantundem sinistrorsum ac retrorsum inclinata, horizonti in adulto homine, & in puero, sæpe etiam in annuo infante, parallela (*c*), ut tamen cervice (*d*), sua paulum adscendat, parallela etiam venæ portarum. In fetu tota adscendit (*e*). Decumbenti descendit ad perpendiculum (*f*). Vidi vesiculæ fundum paulo superiorem fuisse, ut versus ductum cysticum descenderet, vidi in fetu (*g*) ex perforato pro ipsa vesicula hepate eminuisse. Vidi in lobo sinistro nidum habuisse, & cervicem oblique dextrorsum in dextrum lobum venisse. Dicitur gibbo hepatis innata fuisse (*h*).

Duodenum contingit finemque fere (*i*) transversus ejus ductus, raro pylorum (*i†*). Finis cæcus colo intestino incumbit (*i**), & peritonæo respondet, & nonnunquam adnascitur (*k*).

Figura aliquid habet piriforme (*l*), ut nempe antè cæco, pene hæmisphærico, sacco incipiat, inde in maximam sectionem subito aucta, sensim & lente retrorsum decreascit. Est tamen ubi omnino ovalis (*m*) fuerit

- (*a*) Bovi, ovi, rupicapræ.
 (*b*) p. 469. Aliquando nullus fuit MORGAGN. *Sed. caus.* I. p. 252. Solet tertiam partem vesiculæ continere VERDIER II. p. 100. etiam ultra conf. FABRIC. *form. fet. ic.*
 (*b**) TREW f. 1.
 (*c*) COLLINS t. 7. f. 2. CHESLIDEN.
 (*d*) Etiam BERTRANDI p. 21.
 (*e*) HUBER *Eph. Nat. Cur.* IX. obs. 102.
 (*f*) De situs varietate WINSLOW VERDIER II. p. 100.
 (*g*) Sic in vulpe *Ans. Mém.* T. II. p. 244. in tigide PARIS. Vidit etiam. ut nunc lego, MORGAGNUS *Sed. & caus. morb.* I. p. 57.
 (*h*) BLAS L. II. obs. 3.
 (*i*) VESAL. f. 12. MONRO *Ess. of a Soc. at Edimb.* IV. t. 1. EUSTACH. t. 10. f. 2.
 (*i†*) COLLINS T. I.
 (*i**) Aliquando adnascitur VOGEL *Anmerk.* p. 70. & in colon dat calculos.
 (*k*) PETIT *Mém. de l'Acad. de Chir.* I. p. 286. *Select. Francf.* Vol. IV. *Journ. med.* 1759. mens. Maj. VOGEL *Anmerk.* T. IV. & in *Hamburger Magazin.* T. XIV.
 (*l*) Sic fere EUSTACHIUS t. 10. f. 2. t. 11. f. 4. tum GLISSON. &c.
 (*m*) GALLINGEOT *Splanchnolog.* t. I. p. 288. f. 3. 5. &c.

fuerit, est ubi præter modum longa (n) & gracilis; est ubi finem cæcum longum & acutum reflectit, & pene bifurcatum (o) habet.

Raro aut nunquam axi suo secundum longitudinem recto procedit, sed plerumque cis cervicem, ductusque cystici principium a tela cellulosa antrorsum replicatur (p), unde, secundo flexu, sursum in ductum cysticum continuatur, & sinistrorsum primo, deinde deorsum, ad duos angulos rectos, in eum ductum abit (q). Viderunt alii Cl. Viri serpentinam (r). Hæc autem omnia delentur, quando purgaturus incisor cellulosam telam destruit (s).

Est ubi in appendiculas & diverticula exuberat (t).

Duas fuisse passim lego, etiam in homine (u), & duas in glire (w), vulpe (x), fele (y), ardea (z), cyprino (a), sparco (b). In Naxo insula oves esse duplici felle (c) veteres. Olim ita in victima visum (d); ego quidem nunquam vidi.

Magnitudo incerta est, & in diversis hominibus, & in eodem, cum a pleno ventriculo inaniatur, eodem inani repleatur. Intestino æqualis in hernioso (e). Duas uncias in mediocri corpore continet (f) etiam tres (f*).

Adeo

(n) In fetu cylindrica ROEDERER *fet. perf.* n. 25.

(o) RUYSCH *Centur. obs.* n. 90. *catal. rar.* p. 161. *Comm. Lit. Nor.* 1738. *hebd.* 47. *tab.* 7. f. 10. 11. hic ex vitulo.

(p) Incisionem habet RUYSCH *Ep.* V. t. 5. f. 6. & PECHLIN *L. l.* *obs.* 59. replicationem vix quisquam. Inflexa in pygmaeo TYSON p. 36. ic.

(q) Sat bene CHESLEPEN t. 25. C. BAUHIN. t. 38. f. 1. nulla re mutata JASOL. *de por. choled.* RUYSCH *Epist.* p. 5. l. c. *Thes. max.* n. 170. REVERHORST t. 2. f. 4. Capiti aviculæ comparat WINSLOW n. 297. 298.

(r) RUYSCH *cat. mus.* p. 182. FANTON. *anat.* p. 158.

(s) Ut in iconibus EUSTACHII, BIANCHI, GLISSONII, VESALII.

(t) RUYSCH. *catal.* l. c. p. 161. MORGAGN. *adv.* III. p. 74. HOFFMAN *Instit. med.* p. 91. 94.

(u) BLAS *L. IV.* *obs.* 10. GOHL. *Comm. Lit. Nor.* 1738. *Ep.* *Nat. Cur.* ann. IX. *obs.* 102. *Phil. trans.* n. 207.

(w) CALDESI *tab.* 5. f. 1. p. 46.

(x) CALDESI p. 46.

(y) GRAAF p. 16. 18.

(z) Garza bianca CALDESI. *ibid.*

(a) *Comm. Nor.* 1738. *hebd.* 47.

(b) SEVERIN *Zootom.* p. 128.

(c) AELIANUS *anim.* L. XI. c. 29. Grande Austerov. *L. l. c.* 17.

(d) PLUTARCHUS in ARATO.

(e) FANTON. *obs.* 18.

(f) *Select. Francos.* III. p. 381.

(f*) In tertiana febre MORG. *Sec.* II. p. 257.

Adeo tamen per morbos augetur (g), ut duas libras (h), sesqui pintam (h*), & tres pintas (i), & quinque mensuras (k) [demi-septiers] (l), & octo libras (m) & decem cum duabus uncis (n) omnino receperit. Bovi uncias octo ad undecim capit (o), in lue 12. 15, uncias (o*), etiam 8. libras (p).

In morbis etiam magna ejus copia subito fere excernitur. Libræ tres in febre petechiali (q) vomitu ejectæ, & in ictero de ano, puto hoc ex fonte egestæ (q*), tres pintæ post icterum (r), libræ decem unciaæ duæ (r*), libræ quindecim uno mane (s). Turget etiam in famelicis, non vescentibus (s*). Quatuor digitis ultra hepar emittit (st).

In universum piscibus grande est fel (t), & animalibus carnivoris (u) famelicis, etiam castori (w).

§. III. Fabrica vesiculæ felleæ.

Membranaceum, & tunicatum hoc est receptaculum, in universum ejusdem cum aliis saccis in corpore humano fabricæ.

Extima membrana in majori, & inferiori parte vesiculæ est, nata ab hepatis membrana externa (a), quæ vesiculæ quasi superjicitur:
dum

- (g) RUYSCH obs. 13.
(h) Cum ductus biliaris calculis clauderetur RAYMOND *des malad. dangereux. à guérir* II. p. 244.
(h*) RUYSCH obs. 13.
(i) *Phil. transf.* n. 449.
(k) *Mém. de l'Acad. de Chir.* I. p. 296.
(l) *Ess. of a Societ. at Edimb.* II. n. 30.
(m) *Phil. transf.* n. 333.
(n) BUFFON T. I. p. 493. Unc. 10. dr. duas sem. scrup. duos GHERARDESC giorz. di Parma 1687. p. 193.
(o) BUFFON T. IV. p. 493. (o*) ENGELMAN *Verbandl.*
(p) BUCHWALD *de lue Bourn.* Quadruplo major & pedis diametro MANGET *reflex.* p. 163. 196.
(q) VALCARENCHI *med. ration.* p. 168. Tantum 12. 15. unc.
(r) PETIT *Mém. de l'Acad. de Chir.* I. p. 260. 261.
(r*) *Phil. transf.* n. 333. in hydropica.
(s) RAYMOND. *malad. danger. à guérir.* p. 47.
(s*) L. XIX. p. 299. add. RIOLAN. p. 125. *Zod. Gall.* ann. 4. Febr. In serpentibus BOELL. *mot. anim.* II. prop. 147. (st) MILITIA p. 74.
(t) EZIAN. L. XI. p. 628. In Siluro MONAVIUS.
(u) In leone BARTH. *Cent.* IV. n. 100. *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 2. p. 6. In Lynce BUFFON T. IX. p. 247. in urso SCHRADER p. 77.
(w) BUFFON T. VIII. p. 315.
(a) VESAL. p. 623. WINSLOW n. 292. add. EUSTACH. t. II. f. 4.

dum pars minor, in sulcum jecinoris recepta, absque ejusmodi membrana, sola cellulosa tela longa & laxa ad hepar revincitur. A vesicula prope collum ostendimus, membranam hepatis externam ad duodenum & colon transire (b).

Intra hoc velamentum commune cellulosa tela (c) laxa est, fibris facta variis, in qua non rarum est adipem colligi (d) etiam steatoma. In ea vasa lymphatica repunt, & elegantia illa vasa rubra RUYSCHII (e).

Sequitur quam musculosam vocant, sed est in ea varietas. Vidi, aliique ante me Cl. Viri viderunt, in ea fibras non rubras quidem, sed splendentes (f) potius, vario ductu, tamen ut pene longitudinem (g) vesiculæ sequerentur, & ad valde inæquales angulos se secarent. Circulares etiam (h), etsi infrequentius vidi. Est ubi nullæ adparuerunt, nullæque a nuperis, sed neque a vetustioribus (h*) harum rerum gnaris admittuntur.

Irritabilitas (i) est ejusmodi, ut a venenis vesicula se contrahat, non perinde (k), quantum ego memini (l), ab aliis verioris notæ irritationibus. Constringi equidem, ut bilem Cl. FELICIS (m) est adnotatio. Circa calculos etiam sæpe se ita angustat (n), ut articulatam filiquam (o) raphani referat, & inter duos calculos arctissimus isthmus sit. Alias
pigra

(b) L. XX. p. 365.

(c) DUVERN. II. p. 234. WINSLOW n. 294. LIEUTAUD p. 304.

(d) HARTMAN *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. ann. 7. obs. 23. VERHEYEN p. 93. BORRICH *Act. Hafn.* II. obs. 53. MORGAGN. *Epist. anat.* I. n. 62. DUVERNEY II. p. 234. in bove ORTLOB *cholep. negot.* n. 9. LOQUET n. 4.

(e) Ep. V. t. 5. f. 4. Hæc est lamina interna vasculosa LOQUETI n. 4. Duas etiam habet PAULI.

(f) HEUBERMAN T. III. p. 760.

(g) DUVERNEY p. 234. PAULI *de siphon.* Wolf. WINSLOW ibid.

(h) DUVERNEY ibid. PAULI ibid. WINSLOW n. 293. facit duas laminas. Admittit etiam fibras musculares Cl. LUDWIG *de viis bilis cyst.*

(h*) RIOLANUS in LAURENTIUM p. 659. SCHÆLHAMMER *physiolog.* VIREUSSENS *tr. des liqueurs* p. 355. CASSEBOHM. LORENZ. *singular. ad vesic. fell.* Parum iis tribuit PERSON *diff.*

(i) Irritabilem esse GLISSON p. 184. BOHN. p. 245. BORDEU *sur les glandes* p. 426. PAGANI & BONIOLI p. 193.

(k) *Exper. nostr.* 265.

(l) Neque GERARD in celebri thesi, etsi id vocat sensile.

(m) *Exper.* 6. 7. 8. PAGANI & BONIOLI p. 193. Add. nostra experimenta *de part. irritab.* 252. 253. 255. 256. 257. 258. 261. 263. 263*. 265. 266.

(n) *Opusc. patholog. obs.* 33. *hist.* I. II. 13.

(o) Habet etiam RUYSCH. obs. 31. Cl. de HAEN *rat. med.* IV. p. 21. Add. *Journ. de med.* 1759. nov.

pigra fuit, neque contractilis (*p*), & certe minus alacris est, quam urinaria vesica (*q*).

Cellulosa altera inprimis, ut solet, vasculosa (*s*), elegante reticulo arterioso percurritur.

Sensu sat acri gaudere aliqua suadent (*r*).

Nervea se habet, ut in intestino; tum tenerior cellulosa tertia (*t*), & villosa (*u*), semper ut in intestino, pulchre reticulata (*w*), jugis eminentibus, brevibus, inter se invicem intricatis, scobibusque intermediis. Floccos propendentes non frequenter, sed tamen vidi. Versus cervicem plicæ longitudinem magis sequuntur (*x*).

In animalibus carnivoris, leone, tigride, fele, lynce (*y*), panthera (*z*), catopardo (*a*) plicæ ingentes vesiculam quasi septo (*b*) aliquo distinguunt (*c*). Etiam hæ plicæ destructa cellulosa tela abolentur (*d*). In homine non sunt rarissimæ (*e*). Etiam contracta visa (*f*) est, & suo modo minor (*g*).

Non perpetuo reperiuntur, sed tamen, cum aliquando adsint, possunt pro perpetuis haberi, folliculi veri glandulosi (*g*^{*}), qui in media parte

(*p*) SPROEGEL l. c. p. 48. *Exper. nostr.* 254. 259. 260. 262. 289. Parum tribuit GLISSONIUS huic suæ irritabilitati l. c.

(*q*) *De part. irrit.* p. 380.

(*r*) LORRY *Journ. de med.* 1756. m. Nov.

(*s*) RUYSCH *Epist.* V. t. 5. f. 3.

(*t*) Habet WESTPHAL *exfist. duct. hep. cyst.* p. XII.

(*u*) PICCOLHOM. *prælect. anat.* p. 130.

(*w*) BIANCHI t. 5. tab. 7. f. 2.

(*x*) DUVERNEY p. 235. WINSLOW n. 295.

(*y*) Plicata BUFFON T. IX. p. 247.

(*z*) BUFFON T. IX. t. 16.

(*a*) *Comm. Petr.* T. I.

(*b*) PARIS. BUFFON T. IX. p. 34. *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 11. obs. 5. MERY apud FANTON. p. 113. COLLINS p. 455. In mola pisce PLANCUS.

(*c*) In galeo foliaceæ intus valvulæ PARISINI.

(*d*) BUFFON.

(*e*) RUYSCH. obs. 31.

(*f*) MORGAGN. *sed. caus.* I. p. 18.

(*g*) II. p. 332.

(*g*^{*}) Habet MALPIGH. *de liene* p. 120. FANTON. p. III. DUVERNEY T. II. p. 235. RIDLEY obs. p. 174. 196. SANTORIN. c. 9. n. 11. BERGER *natur. hum.* p. 220. DISDIER *splanchnolog.* I. p. 173. BIANCHI t. 7. f. 3. RUYSCH. *Epist.* V. tab. 5. f. 2. 3. *Thes.* V. n. 19. EWALDT *de somno* BERTRANDI p. 24. WINSLOW n. 295. qui lacunas vocat, tum PERSON. LIEUTAUD p. 305. Habet TREW. *Chylos. fet. obs.* I. tab. 2. f. 1. 2. *Journ. sav.* 1688. in animalibus. In leone PARIS. Pori muciferi FANTON. *diff. anat.* Ed. nov. p. 248.

parte vesiculæ, & circa cervicem (g^{**}), conspicuis poris mucum rubrum effundant, de quo alias dicetur.

Sed etiam arteriæ hepaticæ ramuli minores per ultimam cellulosam membranam distributi, succum tenuem (g^{\dagger}) in vesiculam exhalant, etiam hydrargyrum (h), denique aerem (i), etsi non semper succedit experimentum (k). Et vicissim venæ portarum radiculæ aliquid de ea vesicula sorbent (l); certe aquam, tenuemque liquorem, in venas impulsam (m) videmus in ejus caveam dimitti, & in tunicam interiorem BERGERUS duxerat (n).

Pori etiam inorganici (o) frequentes sunt, ut bilis per integram vesiculam perspirans colon late tingat (p), & flavedo in thoracem penetret (p^*), & aliam avium sapore suo (q), & ventriculum gelatina biliosa inquinet (r), & hepar amarore. Lympham flavam & subamaram alii circa vesiculam viderunt (s). Aqua in vesiculam injecta pariter exhalat (t), ut de ventriculo.

§. IV. *Ductus cysticus.*

Vesicula fellis in omnibus animalibus mihi notis ductum excretorium educit, quem *cysticum* nunc ab origine dicimus; veteres enim (a), minus accurate his vocibus sunt usi. Is in homine (b) & in omnibus quadrupedibus mihi notis cum ductu hepatico convenit; ferius aliquan-

to

(g^{**}) MORGAGN. *Epist.* I. n. 96. MOSEDER *diff. de vesic. fell.* p. 10.

(g^{\dagger}) OVERKAMP *ven. port.* n. 75.

(h) VIRUSSZENS *obs.* p. 205. 206.

(i) Aer SYLVIVS *diff.* VI. n. 53.

(k) Aerem non transire VERHEYEN II. p. 80. nempe in humano cadavere.

(l) Utrique refluit GALEACIUS I. C. p. 337.

(m) OVERKAMP. n. 76.

(n) p. 211.

(o) Etiam HUNTER *Comm. Med.* T. I. p. 41.

(p) TULP. L. II. c. 27. BLAS L. II. *obs.* 4. G. V. SWIETEN T. III. p. 500.

(p^*) MORGAGN. *sed. caus. morb.* II. p. 24.

(q) *Examen du L. de M.* TRONCHIN p. 42. 43.

(r) In febre putrida *Journ. med.* 1762. m. Mars.

(s) KERKRING *obs.* 5. PECHLIN L. I. *obs.* 60.

(s^u) IDEM *ibid.*

(t) KAAUW n. 562.

(a) MORGAGN. *de sede & causis morborum* II. p. 85.

(b) CALDESI t. 5. f. 8.

do (c), demum in sinu duodeni, etiam in phoca (d). Ita in oviparis quadrupedibus plerisque crocodilo (e), lacerta (f), chamæleonte (g), salamandra (h), testudine (i), rana (k), serpente (l), vipera (m), tum in avibus nonnullis porphyrione, qui poule fultane (n), anate, ut accuratior docet BOHNIUS (o).

Inter pisces uterque ductus conjungitur in raja piscatoria (p), anguilla (q), torpedine, trocta, ut coram video, & puto in multis.

Ejus in homine fabrica est ejusmodi. Vesiculæ felleæ finis posterior conicus bis (s) replicatus, in ductum gracilescit (t), paulum decrefcentem eundo, qui sinistrorsum ad hepaticum accedit. Eam cervicem vidi furcam arteriæ hepaticæ a duodena secedentis replevisse. Idem ductus multis cellulosis vinculis in se ipsum retractus plicis per cellulosa tela conjunctis (w), spirale (x) quid habet, alias evidentius, minus manifestum in aliis.

Advenit ad hepaticum in ipsis portis, dexterior inter vasa ejus par-
tis, & longe ei adglutinatur, ad eum multa cellulosa tela revinctus,
& parallelus (y), & quasi bilocularem (z) ductum effecturus, demumque
in

(c) Vidit tamen ductum cysticum in homine ab hepatico ad usque duodenum divisum
VATER *cat. mus. propr.* p. 93.

(d) HARTMAN p. 10.

(e) PARIS. P. III. t. 25.

(f) HARDER *apiar. obs.* 21.

(g) PARIS. P. I. p. 49.

(h) BIANCHI p. 990.

(i) Terrestri CALDESI T. IV. f. 11. marina f. 12.

(k) JACOB. C. 3. HARDER *apiar. obs.* 3. BLAS p. 292.

(l) MORGAGN. *Adv.* III. p. 14. BLAS *anat.* p. 333.

(m) MORGAGN. *ibid.* BOHN. p. 233.

(n) PARIS. Nempe cum altero hepaticorum P. III. t. 12.

(o) L. C.

(p) CHARLETON *manif.* p. 78.

(q) CALDESI t. 5. f. 11.

(r) LORENZINI p. 22. t. 2. f. 3.

(s) p. 524.

(t) Conf. WESTPHAL. p. XIII.

(w) Ligamentum proprium vocat SEGER p. 10.

(x) Etiam in phoca contortus CALDESI, & in panthera BUFFON IX. *tab.* 16. p. 180. 181.
in mola PLANC. *Comm. Bonon.* T. II. P. 2. p. 301.

(y) VESAL. L. V. ic. 12. 20. VIDUST. 64. f. 11. BAUHINUS t. 30. f. 2. hic optime. WINS-
BOW IV. n. 102. GARENGEOT *tab.* 10. f. 1. COE t. 2. LORENZ n. 10. GIBBING *Select.*
Francof. T. III n. 5.

(z) BAUHIN. LUDWIG *progr.*

in eum ita aperitur, ut altera ductus communis sit radix, qui ex hepatico continuatur (a). Deleta cellulosa tela angulus acutus nascitur (b), aut omnino rectus. Hepatico ductu plerumque multo minor est (c), vidi fere æqualem fuisse, vidi majorem (d). Longior est, & pene duplo, choledocho ductu.

Valvulam in conjunctione utriusque ductus multi posuerunt (e), quæ equidem nulla est, nisi eminens non maximum calcar, quale etiam in venarum concursu solet.

Fabrica hujus ductus in universum eadem est, quæ vesiculæ, & membranas habet easdem (f), cum aliqua, non manifestissima irritabilitate (g).

Qua vinculis cellulosis extus in sulcos colligitur, ibi intus rugæ tunicæ villosæ & nerveæ eminent, quæ possint aliquam spiralis (h) fabrica imaginem referre, valvulaque nomen ferre (i), ut tamen molles, alternæ (k), transversæ aut obliquæ plicæ (l), singulares, deorsum, sive ad intestinum, concavæ (n) sint, neque tamen iter bilis valde morentur (o), etsi videntur morari (p). Prima valvula (p*) maxima est

(a) CHESL. t. 25.

(b) EUSTACHIUS GLISSON. BIANCHI &c.

(c) PECHLIN *purgant.* p. 500. JASOLIN. c. 5. & in ic. CHESL. t. 25. ic.

(d) Fabrica ludere TRICHMEYER *anthrop.* p. 130.

(e) LAURENTIUS *histor.* p. 315. ed. Paris. LAUREMBERG p. 259. MARCHETTI *compend. anat.* p. 28. WINSLOW n. 303. Cum tuberculo LOWERI FANTONUS comparat. *diff. anat.* p. 149. 253.

(f) p. 525. 526.

(g) Habent PAGANI & BONIOLI p. 193. ZIMMERMAN p. 46.

(h) HEISTER *compend.* f. 9. VATER *divert. bil.* p. 20. FABRIC. *Progr.* n. 1759. Aliquanto reperiri TRICHMEYER *anthrop.* p. 130. STROHLEIN p. 8.

(i) JASOLIN c. 5. p. 125. 126. BACK p. 131. JUSTI VESTI *obs.* 1. RIOLAN. p. 129. SCHRADER *obs.* Dec. I. n. 4. CALDESI p. 40. t. 2. f. 10. RUYSCH. f. 3. BIANCHI t. 7. f. 1. COE *bil. concret.* tab. 2.

(k) DUVERNEY p. 233.

(l) Duas, tres SPIGEL p. 238. BAUHINUS p. 15. t. 6. C. BARTH. *anat.* p. 84. PLANCUS. plures, quinque & ultra RUYSCH. *Thes.* X. n. 78. LAUREMBERG p. 259. Tres majores prope ostium, septem & octo in ductu VIEUSS. *obs.* p. 207.

(n) Etiam VIEUSS. l. c.

(o) Negat fuisse valvulam spiralem CASSEBOHM & omnino valvulas adesse non vult CALDESI p. 41. Rugas dicit, quæ factæ sint, ut ductus constringi & dilatari possit Cl. LORENZ n. 12. & valvulas esse negavit. Defuisse eas valvulas, raro tamen, CALDESI p. 41.

(p) Valvulas esse, & iter ita regere, ut ne flatus quidem contra eat LAURENT. p. 319. Sustinere iter bilis ex vesicula expressæ SPIGEL l. c. Stilum facile in ductum ire, non contra SCHLHAMMER *phys.* p. CCXIV.

(p*) TREW *chylos. fet.* t. 2. f. 3. 4. BUCHNER *miscel.* 1727. p. 61.

est, & sæpe pene totum ostium vesiculæ claudit, reliquæ ex ordine minores.

Reticularem fabricam idem ductus habet, & depressas, ut in chole-
docho ductu, scrobes. Sphincterem in ostio musculosum (q) non re-
perio (r).

Ita nunc in homine se habet, avibus autem bene multis (s) du-
ctus cysticus seorsim, absque conjunctione cum hepatico, aperitur in
intestinum. Eo pertinet pavo (s*), gallus (s**), etiam indicus (t).
tarda (u), casuarius (w), anas (x), fulica (y), grotto (z), nume-
nius (a), pavoncello (b), ciconia (c), ibis (d), platea (e),
phœnicopterus (f), scops (g), regia (h) avis, pelicanus (i), ar-
dea (k), grus (l), aquila (m), falco (n), corvus (o), vultur (p).
Sic

- (q) GLISSON p. 139. In salmone PEYER *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. p. 207.*
(r) CL. BERTRANDI p. 24. VATER *diuetic. bil. p. 16.*
(s) MORGAGN. *Adv. III. p. 54.* STENONIUS *de musc. gland. p. 39.* RENUS *anim.*
vro. p. 5.
(s*) Ut videtur BLAS p. 169.
(s**) HARDER *apiar. p. 73.*
(t) PARIS. *Mem. pour. l'hist. des anim. P. I. t. 34.*
(u) PARIS. II. p. 105. t. 52.
(w) PARIS. P. II. p. 57.
(x) BOHN. p. 233. *Colleg. priv. Amstelod. obs. p. 36.* BLAS *anat. anim. p. 261.*
REDI T. VII. f. 4.
(y) PEYER p. 103.
(z) REDI l. c. f. 1.
(a) REDI f. 6. ALBIN. I. n. 79.
(b) RED. lb. f. 5. Est Vanellus.
(c) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 6. obs. 109.* PARIS. f. 3. t. 14.
(d) PARIS. P. III. t. 14.
(e) PARIS. p. III. t. 6.
(f) PARIS I. III. t. 9.
(g) PARIS. P. II. p. 8.
(h) PARIS. P. III. t. 29.
(i) PARIS. P. III. t. 27. REDI t. 7. f. 3. ALDROVAND III. p. 51. B.
(k) *Bresl. Saml. 1725. Dec. COLL. t. 22. 23.* REDI t. 7. f. 2. BLAS p. 147.
(l) CALDESI t. 5. f. 3.
(m) BORRICH. *Hermet. Ægypt. Sapient. p. 260.* PARIS. P. III. t. 5. HARDER *apiar.*
obs. 15. CALDESI t. 5. f. 6.
(n) MURALT *vadem. p. 366.* PEYER *obs. p. 107.*
(o) PEYER *obs. p. 100.* SCHRADER *carniv. p. 27.*
(p) *Bresl. Saml. 1726. p. 36.* PARIS. P. III. p. 215. ut videtur.

Sic in piscibus frequens est, ut in alosa (*q*), perca (*r*), lucio (*s*), rhombo (*t*), hippoglossio (*u*), xiphia (*w*), & in testudine marina (*x*), serpente (*y*), salamandra (*z*), quæ testimonia, ut adversa sunt prioribus, aut de alia specie vera, aut omnino falsa esse oportet.

In colon ivisse (*a*) pariter ut videtur, parum accurata est observatio: & ab adhæsiōne vitiosa nasci potuit.

§. V. *Ductus hepaticystici piscium & avium.*

Nullum, quod sciam, animal vesiculam absque hepate nactum est, nullum etiam, cui vesicula ab hepate libera sit, & distans. Videtur quidem vesicula ab hepate soluta (*a*), uti ductu non communicat, itaneque cohærere aliis modis, in nonnullis potissimum piscibus (*b*) alosa (*c*), perca, lucio, hippoglossio, xiphia (*d*), rana piscatrice (*e*), salmone (*f*), milvo, doro (*g*), inque serpente (*h*), vipera (*i*), interque aves in tarda (*k*), corvo marino (*l*), ossifraga (*m*).

Non

- (*q*) BLAS t. 49.
 (*r*) BLAS p. 281. ut vid.
 (*s*) t. 52. f. 12.
 (*t*) t. 50. f. 6.
 (*u*) Ibid. f. 8.
 (*w*) HARTMAN *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 2. p. 13. append. SCHELHAMMER apud VALENTIN. p. 166.*
 (*x*) PARIS. I. c. P. II. p. 184. t. 59. Testudo aquæ dulcis CALDES. t. 4. f. 10.
 (*y*) SEBA *Thes. T. I. tab. 109. f. 12. SEVERIN. 2001. p. 365.*
 (*z*) PARIS. P. III. t. 16.
 (*a*) DIEMERBROECK p. 74.
 (*a*) Piscium multorum fel semotum a jecore & adjunctum est intestino ARISTOT. *part. anim. L. IV. c. 2.*
 (*b*) Aliis piscibus fel in jecore, aliis sejunctum & dependens ARISTOT. *hist. anim. L. II. c. 15.* Modo ab hepate pendere, modo ad intestinum adhærere RONDELET L. III. c. 20.
 (*c*) In iconibus BLASIANIS.
 (*d*) Per membranas tamen adhæret HARTMAN.
 (*e*) CHARLTON I. c.
 (*f*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs. 85.*
 (*g*) REDI p. 4. 5.
 (*h*) SEBA I. c. BLAS p. 281.
 (*i*) VESLING *Epist. IV. SEVERIN. p. 234. In caudifona Phil. trans. n. 144.*
 (*k*) PARIS. II. p. 105.
 (*l*) PARIS. I. p. 219.
 (*m*) CORTES apud ALDROV. I. p. 226.

Non tamen ideo continuo licet pronuntiare nullum esse in iis animalibus hepatis cum vesicula commercium: nam uti plerisque avibus, ita & in iis speciebus, parum puto perspectis, aliud genus communicationis locum habere potest.

Et nimia quidem fere sunt, quæ de hepatis a vesicula distantia dicuntur. Nihil simile vidi in piscibus, quos dissecai, etiam in trocta, quæ de salmonis genere est.

Deinde ductus quidem cysticus in intestinum peculiari loco se aperit. Sed oriuntur de hepate radices, quæ in unum ductum confluentes, etiam in duos, pluresve, aut in vesiculam se inmittunt. Alias non ex hepatis quidem parenchymate, sed ex ductu hepatico nati rami in vesiculam se inaniverunt.

Frequens id est imprimis in avibus. Ex ipso hepate ductus in cystidem inmittitur in phœnicoptero (*n*), scope (*o*), anseri (*p*), cornice (*q*), fulica (*r*), falcone (*s*); aut duo ductus in platea (*t*), ibide (*u*), ciconia (*w*), corvo (*x*), & incerto numero in ave regia (*y*).

Ex ductu hepatico in vesiculæ cervicem aperti ductus sunt in ardea (*z*), grue (*a*), butauro (*b*), laro (*c*), aquila (*d*), bubone (*e*), avibus gabbiai & mugna (*f*); inter quadrupeda ovipara in testudine (*g*), crocodilo (*h*), vipera (*i*).

Sic

- (*n*) PARIS. P. III. t. 10. p. 47.
- (*o*) P. II. p. 8.
- (*p*) ALDROV. L. XIX. p. 107.
- (*q*) PEYER p. 100. Locum insertionis non nominat.
- (*r*) IDEM p. 104. perinde.
- (*s*) p. 107.
- (*t*) PARIS. P. III. t. 6.
- (*u*) P. III. t. 14.
- (*w*) Ibid. PARIS.
- (*x*) PEYER p. 101. 106.
- (*y*) PARIS. P. III. p. 204.
- (*z*) FANTON.
- (*a*) CALDESI tab. 5. f. 3. FANTON.
- (*b*) CALD. lb. f. 4. duo rami in collum inserti.
- (*c*) FANTON. *diff. anat.* p. 264.
- (*d*) DUO CALDESI t. 5. f. 6. Unus PARIS. II. p. 96. in fundum vesiculæ insertus. magni & multi HARDER *apiar. obs.* 15.
- (*e*) CALDESI t. 2. f. 1. in cervicem. Hepaticysticum ductum habet PEYER p. 113. WEPFER *cicut.* p. 173.
- (*f*) In corpus vesiculæ CALDES.
- (*g*) Giorn. di Parma 1687. p. 68. CALDESI t. 4. p. 37.
- (*h*) PARIS. P. III. t. 25. in cervicem.
- (*i*) VESLING *Epist.* p. 72.

Sic in piscibus ego teneros meatus (*k*) ex hepate in vesiculam venire, in raja (*l*), acipensere (*m*), dentice, muræna, gladio : adde salmonem (*n*), garfish (*o*), torpedinem (*p*), milvum (*q*).

Omni bus comparatis, nihil hi ductus a communi fabrica videntur differre. Nam per continuos gradus, hepaticus porus cum cystico ductu, vel proxime intestinum (*r*), vel pluribus ramis (*r**) & superius, ut in homine, & in cervicem vesiculæ (*s*), & demum in ipsum ejus corpus, aut ipse convenit, aut inmittit ramum, pluresve ramos.

Ipsi ductus, qui in vesiculam inferuntur, sunt ab hepatico meatu, quoties in minima inquiritur (*t*).

Et si nunc paucae aliquæ avium aut piscium sunt species, in quibus nemo hætenus hepatici ductus commercium cum vesicula fellis profectus est, valde tamen probabile fit, ex analogia numerosissimarum specierum, ex eadem classe sumtarum, & universorum quadrupedum, etiam in iis animalibus ejusmodi commercium iri repertum, si periti incisoris curiositas accesserit.

§. VI. *Ductus hepaticystici quadrupedum.*

In testudine, vipera, crocodilo, anate, torpedine duplex est ductus hepatici cum vesicula commercium; prius, per ductus cystici cum hepatico consensum, alterum per ductus hepatici ramulos cervici, corporive cystidis felleæ infectos.

Hæc nunc eadem in plurimis quadrupedum est fabrica, ut & cum cystico ductu choledochus jungatur, & præterea alii canaliculi minores numerosi de hepate prodeant, seque in vesiculam inmittant.

Primariæ

(*k*) Bilem a jecore per meaturum proximum adtrahit SEVERIN l. c. In cervicem COLLINS p. 456. f. 11. 12. In testudine terrestri & marina in cervicem.

(*l*) ARIST. *hist. anim.* L. II. c. 15. inde RONDELET L. III. c. 20.

(*m*) Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs. 85.

(*n*) COLLINS t. 38.

(*o*) Tres in cervicem LORENZINI p. 23.

(*p*) REDD C. 4. 5.

(*q*) In lutra.

(*r*) In testudinis duabus speciebus CALDESI t. 4. f. 11. 12.

(*r**) p. 505. Leviter nexa in erinaceo cum hepate vesicula. Sed ductus hepatici duo in cysticum inserti. CALDESI p. 43.

(*s*) CALDESI icon. t. 2. & 5. PARISINI.

Primaria experimenta sunt in bove facta, cujus maximum hepar inquirenti se facilius præbet. Similem ut in avibus ductum reperit in bove *Societas Amstelodamensis* (a), & post eam Cl. PERRAULT (b), grandem utique, & in ipsam vesiculam apertum, ut ostio præfixam valvulam (c) haberet: altero fine in ductum hepaticum aperiri PERRAULTUS addit (d). Unum alterumve ductum in bove ex hepate in vesiculam patere PECHLINUS auctor est (e), multos in corpus vesiculæ, & majorem valvula munitum in cervicem insertum BLASIUS dixit (f). BOHNIIUS vasculum inter ductum hepaticum & vesiculam medium habet (g), sic in bove VERHEYENIUS (h). Similes inter ductum hepaticum & cysticum communicationes BIDLOUS pinxit; & unum majorem & plures minores ductus ab hepate natos in vesiculam duxit (i), & ex ove & bove DUVERNEYUS (k), nam huc ob memorabilem magnitudinem refero, etsi ostia cervici sunt propiora. Numerosa, & in vesiculam & cervicem in bove ostiola CALDESIUS pinxit (l), & dixit WEPFERUS (m), FANTONUS in bove ductus ab hepatico plures in cysticum canalem vidit produci (n), magnos etiam vidit SEGERUS (o), & omnino CALDESIUS in vitulo, ligato cystico ductu, per hepaticum aerem in vesiculam adegit, cujus in vicinia cum collo per conspicuum ostium exiit (p).

Deinde prior GLISSON (q), & post eum Cl. PERRAULT (r), minorem ductum aciculæ fere capacem ex hepate natum pro re nova, etiam

(a) *Colleg. priv. Amst. obs.* p. 16. 17. f. 7. BLAS *miscell.* p. 287. 288.

(b) *Description d'un nouveau conduit de la bile. Essays de physique.* T. III. p. 339. 348. tab. 2. *Journ. Sav.* 1680. n. 26. *Mém. avant.* 1699. p. 476. T. X. Socius inventi PEQUETUS est, cui hoc loco tribuitur.

(c) PERRAULT G. p. 341.

(d) l. c. F.

(e) *Purgant.* p. 498. 499.

(f) *Anat. Anim.* p. 20.

(g) *Act. Lips.* ann. 168. t. 2. quæ non sunt ad manus.

(h) *Quatuor D. D.* f. 6. t. 11, p. 94. 95. Adde post L. I. p. 23.

(i) t. 38. f. 4.

(k) *Mém. de 1701.* p. 136. f. 2. 3.

(l) t. 2. f. 3.

(m) *Cic. aquat.* p. 176.

(n) p. 111.

(o) p. 17.

(p) CALDESI p. 44. 45.

(q) p. 136.

(r) *Ess. de physiq.* T. III. p. 342.



etiam duos GLISSONIUS vidit (*s*), & cum hepaticis ductibus communi-
care reperit (*t*). Habet ejusmodi ductum in ove COWPERUS (*u*): habet
GLISSONII fere verbis in bove BOHNIIUS (*w*). In bubulo ductu cy-
stico LOQUETUS decem ostia duoque majora vidit cervici vicina (*x*).
Unum in collo WEPFERUS (*y*). Unum in cervice, plura in vesi-
cula FANTONUS (*z*), RUYSCHII figura pertinet ad vulgarem
illam fabricam, secundi hepatici ductus in cysticum inserti (*a*). In ove
quatuor, in cervicem apertos ductus pingit CALDESIUS (*b*),
unum in lepore (*c*), inque erinaceo (*d*), idemque multis in ani-
malibus eandem fabricam locum habere addit (*e*). Vidit in lupo J. M.
HOFMANNUS (*f*), neque in cane desiderantur (*g*), cum hepate pres-
so bilis guttulæ per oscula in folliculum elabantur (*h*). In lutra nume-
rosos poros & in cervicem & in ductum cysticum apertos (*i*), idoneus
auctor dixit.

Inflato ductu choledocho, cystico ligato, aerem in vesiculam irrum-
pere, & in vivo animale, dum calet, bilem de revulsis radiculis effluere
SCHACHERUS (*k*).

Etiam hæc fabrica cum ea consentit, in qua plures ductus hepatici cum
unico ductu cystico conveniunt. Adparet enim etiam in quadrupedibus
hanc conjunctionem, modo pene in exitu cystici canalis (*l*), modo
alibi per ejus longitudinem, aut simplici canali (*m*), aut duplici (*n*),
modo

(*s*) p. 133.

(*t*) p. 180.

(*u*) Ad BIRD. t. 38. f. 4.

(*w*) *Circul. anat.* p. 232. 235.

(*x*) n. 15.

(*y*) *Cicut.* p. 176, *apopl.* p. 355.

(*z*) *Diff. anat.* p. 263.

(*a*) *Obs.* 31. f. 31.

(*b*) t. 2. f. 4. p. 45.

(*c*) f. 7.

(*d*) t. 5. f. 2.

(*e*) p. 44.

(*f*) v. HORNE p. 162.

(*g*) Desiderari BOHN. *Act. Erud.* 1683. p. 127.

(*h*) PECHLIN. *progr.* p. 458.

(*i*) LORENZINI *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 9. 10. obs.* 175. *Crampfish* p. 23.

(*k*) *Administr. vasor.* p. 38.

(*l*) p. 529.

(*m*) In homine.

(*n*) p. 505.

modo in cervicem (o), modo in vesiculam perfici (p), quæ sit cystici ductus caput & initium.

§. VII. *In homine.*

G A L E N U S de meatibus in vesiculam ducentibus primus sermonem fecit (a): deinde J u l i u s J A S O L I N U S (b), in cervice vesiculæ humanæ, cis incurvationem, aliquot oscula pinxit, & manifestius vascula tenuissima vesiculæ dixit se invenisse, ex hepate (c) nata. Eadem sede repetiit S P I G E L I U S (d), neque improbavit R I O L A N U S (e). Et H I G H M O R U S (f), similia vascula pinxerat, & toti vesiculæ & cervici inserta, & ductui cystico. Inde A d e M A R C H E T T I S (g), poros in fundo vesicæ felleæ vidit, qui bilem sudant, dum de hepate separatur (h).

Johannes B O H N (i), ductum G L I S S O N I A N U M bis in cadavere humano sibi visum esse auctor est. D U V E R N E Y U S junior (k) multa oscula vasorum biliariorum, oblique vesiculam perforantia in humano cadavere, sed valde morbofo vidit. Cl. B R A N T H W A I T, inflato poro bilario, aerem per multa oscula in vesiculam penetrare, demonstravit auditori D R A K I O (l). Neque tamen hominem ait fuisse, quem incidisset.

Johannes F A N T O N U S (m) quem adeo nuper amissimus, cum suspi-
catus

(o) p. 529. 533.

(p) Ibid.

(a) *Loc. adfect.* L. V. c. 6. Hepatis pars cava vesiculæ fellis bilem dat P O L L U X p. 256.

(b) f. 2. inter u. & x.

(c) c. 5. & ic. cit a. a. a. f. 1. D. D. p. 57.

(d) p. 238.

(e) *Icones* laudat R I O L A N U S p. 74. & 126. Addit vesiculam tenuiorem bilem per membranas de hepate fugere p. 130.

(f) p. 58. t. 5. f. 1. 2. e. e.

(g) *Phil. transf.* n. 307.

(h) Sic F R A N K. *diapedes restituit.*

(i) *Circul. anat.* p. 235..

(k) *Mém. de l'Acad.* 1701. p. 150.

(l) L. I. p. 210.

(m) *Anat.* p. 111.

catus esset, etiam in homine ejusmodi ductum reperiri, & in bove facile reperisset (*n*), frustra quoque saepe in eos per humana cadavera inquisivisset, denique in icterico (*o*) credidit, se vidisse ductum ex hepatico in cysticum communicantem, ut tamen ipse fateretur, rem ambiguam esse, neque se suo experimento multum tribuere. Idem alio loco peramplos in ductu hepatico hominis meatus excretorios styli capaces describit (*p*).

Inter nuperiores CAJETANUS TACCONUS (*q*) admittit equidem eos ductus, magis tamen ob physiologicam aliquam necessitatem, & quod obstructa a calculis vesicula tamen amaram bilem continuerit. Eodem fere modo ligato cystico, inflato (*r*) choledocho, vesiculam tamen tumuisse legimus. Sic *Josephus* PAPA ductus ejusmodi admisit (*s*).

Vere in homine repertos esse, inter hepaticum ductum & cystidem communicantes, WINSLOWUS refert (*t*), non proprio, quantum videtur, usus experimento. Post eum ILL. SENAC (*u*), alii (*w*), & Cl. GALEACIUS (*x*), ductum reperit a vesicula biliaria ramis suis ortum, & in ductum hepaticum apertum; sed fatetur, in caveam vesiculæ non patere.

In cadaveris humani monstrifica vesicula ductum hepaticum ostensum (*y*) esse lego. Oscula aliquam stili portionem admittentia non rejicit MORGAGNUS (*z*).

Manifestius Cl. BERTRANDI (*a*) ductus ait, a poro hepatico ortos, divisos in duos, tresve minores ramos, euntes versus vesiculam, eique insertos osculis fetam recipientibus, neque habuisse valvulas: in homine se vidisse non addit.

Ductus ab hepate in collum vesiculæ abeuntes GARENGEOTUS a
Cl.

(*n*) Ibid.

(*o*) *Diff. anat.* p. 249. 250.

(*p*) Ibid.

(*q*) *Hepat. adfect.* p. 335. *Comm. Ner.* 1743. hebdom. II.

(*r*) *Bresl. Saml.* 1713. Januar.

(*s*) *Humor.* c. 8. p. 107.

(*t*) n. 296.

(*u*) *Ed.* 1715. p. 174.

(*w*) VERDIER T. II. p. 105. *Elem. de Physiol.* p. 76. 71. BAUBRANT *splanchnolog.* p. 151.

(*x*) *Comm. Bonon.* T. II. P. II. p. 333. 336.

(*y*) *Phil. trans.* n. 449.

(*z*) *Advers.* III. p. 57.

(*a*) p. 28. seqq.

Cl. VERDIER ostensos esse adfirmat (*b*). Refert Cl. WESTPHAL (*c*) experimentum, in quo de toto hepate inferiori exilissimi ductus in principio filo non latiores, in progressu diametro majori aucti, ad vesiculam accesserint, & in tres ramos bile plenos collecti in collum vesiculæ se immiserint, ut per eos cystis inflari potuerit.

In homine ductus ex hepatico in vesiculam ducentes & apertos repertos esse C. N. JENTY (*d*), Cl. DETHARDING aliud quid, huc tamen pertinens, profert, duos nempe ductus bilarios proximos ramulis inter se mutuis communicasse (*e*). Ex his, & ut puto, ex brutorum animalium historia, J. Baptista BIANCHI systema ornavit, productis etiam suis in homine factis experimentis. Ductus esse alios *cystihepaticos* (*f*) fecit qui ex præcipuis hepatici pori truncis oriantur, & inferantur circa vesiculæ cervicem, qui iidem ductus bilem ex vesicula in porum bilarium efferant.

Alios contra *hepaticysticos* (*g*) dixit, qui & ipsi ex ductus hepatici, sed ex minimis ramulis nascantur, exilissimi, inque corpus ipsum fundumque vesiculæ aperti, ex hepate bilem in folliculum deferant.

§. VIII. De iis ductibus dubia.

Primus, puto, PECHLINUS (*a*) venas esse monuit, quas HIGHMORUS pinxisset.

Deinde Fridericus RUYSCHIIUS, idoneus in iis auctor, quæ sola industria professoris nituntur, in prioribus jam operibus oscula perpauca, si ulla, in vesicula admisit, ut de iis eum dubitasse manifestum sit (*b*).

Deinde e ductu cystico (*c*) radices advenire dedit, omnino quales ter quaterve vidimus; nempe ductus ab hepatico præter communem confluentem

(*b*) *Splanchnolog.* T. II. p. 296.

(*c*) *Exsistent. duct. hepaticyst.*

(*d*) *Cours. of anatomy* II. p. 118.

(*e*) *Anat. jucund & util. dem.* 3.

(*f*) t. 5. d. d. p. 961. & c. 23. p. 15.

(*g*) t. 5. a. a. a. p. 115. &c.

(*a*) p. 497.

(*b*) *Obs.* 31.

(*c*) *Mus. rar.* p. 183. & *Tbes.* IV. a. 87.

fluentem in cysticum missos. Quæ vero in fundum ire dicerentur cystidis (*d*), ea vasa rejecit, & demum vesiculæ radices in universum refutavit (*e*).

COWPERUS (*f*) etiam, cum BIDLOI tabulas ederet, in homine nihil simile se reperisse memoravit. P. J. HARTMANNUS (*g*), ductus GLISSONII negat se invenisse.

Rejecit inde BERGERUS (*h*), RUYSCHII discipulus, & major DUVERNEYUS (*i*); & in universum nuperiores se in iis viis admit- tendis difficiliores ostenderunt, MORGAGNUS (*k*), HEISTERUS, Janus PLANCUS (*l*), LUDWIGIUS (*m*), PERSON, LIEU- TAUD (*n*), DISDIER (*o*), & junior PEYERUS (*q*). Addidit CHES- SELDENUS (*s*), revincto, vel obstructo, ductu cystico non intumuisse vesiculam, ut quidem in bove (*t*): eo major autem ejus vi auctoritas est, quod eos ductus a se inventos fuisse putaverit. Qui peculiarem la- borem in viis bilariis impendit Cl. GIERING (*u*), eosdem omnino rejecit, eademque est egregii viri SEGERI opinio (*w*).

Vasa fuisse, rubra, quæ pro bilariis ductibus habita fuerint, post PECH- LINUM, RUYSCHIIUS (*x*), & GUNZIUS (*y*) monuit, & PER- SON: ductusve hepaticos alii, supra vesiculam repentes (*z*).

Ego quidem sæpe in humano hepate sum expertus, neque unquam vidi, alia via, quam per ductum cysticum, bilem ex hepate in vesiculam venisse: neque vidi inflatum ductum choledochum, revincto cystico,
tamen

(*d*) Ibid.

(*e*) *Respons.* ad BIDLOI *vindic.* p. 38. &c.

(*f*) *Tab.* 38. f. 3. etli in ove adiant & in bove.

(*g*) *Perit. anat. vet. spec.* p. 59.

(*h*) p. 223.

(*i*) *Postb.* T. II. p. 233.

(*k*) *Epist.* I. n. 42. etiam *sed. caus. morb.* I. p. 252.

(*l*) In *hist. Catharina VIZZANI.*

(*m*) *De viis cystic. bil.*

(*n*) *Essays* p. 305.

(*o*) Negat se de iis ductibus sibi satisfacere potuisse I. p. 171.

(*q*) *Obs.* p. 32. in rana.

(*s*) p. 163. 166.

(*t*) CALDERI l. c.

(*u*) l. c. p. 374.

(*w*) *Dissert. crit.* p. 14. 18. 24. &c.

(*x*) *Epist.* V. p. 19. *Thes.* IV. l. c.

(*y*) *De hepat.* n. 11.

(*z*) *SEGER* p. 21.

tamen aerem in vesiculam dedisse; uti ductu hepatico avium, aut boum inflato vesicula turget. Sæpe etiam ductum hepaticum tenui materie replevi, quæ in cellulosa spatia circumposita exsudaret: nihil ivit in vesiculam.

Sollicite denique vesiculam felleam (a) de hepate solvi, ut singula vascula numerarem, quæ refecarem: vidi ramos arteriosos plurimos ex hepatico vesiculæ alveo in ejus membranas tendentes: vidi venulas: vidi cellulosa fila, omnia ista flavissima (b), ut facile pro biliariis canalibus habuissem, si placuisset mihi imponi. Sed originem naturamque veram sollicite rimatus, nunquam reperi, bilarios esse meatus, aut in cavum cystidis patere. Non repugnat, ut a membrana externa hepatis (c) alibi, sic ex ea sede, qua vesiculam tegit, ductus bilarios nasci, & eo GALEACII referas adnotationem.

Neque vidi, cum vesiculam aere plenam, aut bile, de hepate solve-rem, ullam particulam ejus humoris aut de vulnere hepatis stillasse, aut de vesicula lente revulsa.

JASOLINUM, & Clar. VIROS BRANTHWAITH BERTRANDI & SCHACHER nihil repugnat animalia incidisse.

Pro ostiolis in vesicula visis, folliculorum ductus excretorios, aut scrobiculas inter retis villosi areolas credo habitos esse.

In morbosis cadaveribus potuerunt de hepate viæ non naturales in vesiculam se aperuisse. Contra WESTPHALIANAM adnotationem a testibus præsentibus dubia mota percepi.

Quare omnibus computatis, non credo eas peculiare bilis in vesiculam felleam vias, in historiam constantioris fabricæ humanæ recipi posse, si unquam vere adfuerunt, pro *varietate* habuerim, quales a communi modulo recedentes vasorum distributiones non rarissime etiam in aliis & maximis vasis reperimus.

SECT.

(a) Sic. MORGAGN. Ep. I. n. 42.

(b) Etiam lymphatica circa vesiculam vasa flava sunt & subamara KRAKKEING obs. 5.

(c) p. 511.

(d) Ita ORTLOF *cholepojes. negot.* n. 21. neque aerem, neque bilem effluxisse vidit.

S E C T I O I I I.

B I L I S.

§. I. *Num duplex bilis.*

PRIMUM oportet statuere, quis liquor bilis nomine venire debent. Vulgo omnem humorem ita vocamus, qui vel in vesicula biliaria continetur, vel in vasis illis de hepate ad duodenum patentibus. Intercessit nuper VIEUSSENIUS (a), qui id omne lympham vocat, quod est in hepate, ut hepar princeps lymphæ colum (b) sit.

Statim adparet, si eam rationem tenuerimus, bene multa animalia absque bile esse, ea nempe omnia, quæ vesicula ab hepate diversa destituuntur. Non bene tunc quidem, cum eorum animalium aliqua veram, amaramque bilem in hepate habeant, ut cervus (c), elephas (d).

Bilis ergo est, quæ de hepate per ductus bilarios exit; superest ut quæ-
ratur, num ejusdem cum cystica generis sit: num oporteat duas facere bilis species,

Equidem non infrequenter in humano hepate subflavum, non spissum, parum amarum, modice mordacem liquorem reperi, cum cystica bilis amarissima, & viscida & obscuri alicujus coloris esset (e). Renoni nulla vesicula, sed hepar dulce (f). Quæ felle carent animalia, iis hepar dulce (g); & in equo credas debiliorem bilem esse, cum PLINIUS inter fella medicata animalium equinum damnari ajat (h). Columbæ bilis viridis, sed non amara (i).

Videntur hæc cum JASOLINI (k) placitis consentire, qui obscuram
&

(a) *Obs. d'anatom. & de medec. prat.* p. 171. 173. Paulum bilis a cysticis ramis accipere dat p. 171.

(b) p. 218.

(c) Intestina cervi amarissima ARISTOTELES *hist. anim.* L. II. c. 15. Amarissimum hepar DOEBER *Jäger prat.* p. 13.

(d) MOULINS

(e) Dulcem olim ALBINUS.

(f) LINN. *cervus rhen.* p. 19.

(g) ARISTOT. *part. anim.* L. IV. c. 2.

(h) PLIN. L. XXVIII. n. 40.

(i) Cum vesicula careant *Oeconom. Abbau.* T. V. p. 80.

(k) *Epitoch.* III. c. 2. 4.

& permixtam de hepate bilem advenire docuit, in vesicula claram & sinceram. Ita MALPIGHIUS (1), hepaticam bilem flavam & minus amararam reperit, cum vesicula destructa esset, & hepaticam puram haberet. PECHLINUS (m) in avibus inque rana nigricare hepaticam bilem, cysticam virere reperit.

Melius, si nostris adnotationibus credimus, Johannes BOHN (n) ex hepate canis bilem aqueam, modice amaram, pene falsam effluere vidit; & in vesicula viridescentem, & obscuram posuit. Bilis in duodeno flava, cum in folliculo viridis esset RIDLEY (o). Dulcior hepatica bilis, cystica amara (p), [cum dulcedine] & viridior (q). In noctua PEYERUS Junior (r), in hepatico poro amarore viridem & tenuiorem, in folliculo atram & amarissimam collegit. Et hæc fere recepta est sententia (s), ut duas biles fere scriptores admittant (t). Sulfuream magis bilem hepaticam, & contra salinam atque terream, quæ in folliculo est GALEACIUS (u).

Neque tamen desunt contrariæ sententiæ suæ rationes; nam & cystica bilis sæpe absque amarore fuit, aquea, & fluida; & in fetu (w) constanter dulcis est, mucosa, rubra, insipida.

(v) Etiam

(1) De liene c. 6. p. 120. seq. posth. p. 33.

(m) Purg. p. 494. BARTHOL. anat. p. 281. SCHULHAMMER l. c.

(n) Circ. anat. phys. p. 233. 236. VERBUC usage des part. T. I. FANTON. anat. p. 115.

(o) Obs. p. 220. 221.

(p) VERHEYEN II. p. 79. Non amara ROEDERER progr.

(q) ORTLOF cholep. n. 17.

(r) Obs. 50. p. 113.

(s) BIANCHI hist. hepat. II. p. 94. REVERNORST & c.

(t) BARTHOL. lect. thorac. p. 61. PECQUET diff. p. 91. BOHN, l. c. BAYLE 604p. anim. p. 287. KEIL abridgm. p. 76. JUNKER p. 288. FIZES physiol. conspect. p. 17. VERHEYEN II. p. 29. SCHULHAMMER physiolog. p. 212. 213.

(u) Comm. Bonon l. c. p. 356.

(w) In fetu non amara est SWAMMERDAM resp. p. 113. WIDEMAN corpulent. nim. VIRIDET bon chyle p. 254. SANCASSANI Gal. di minero. V. p. 297. albumine plena in puero Eph. Nat. Cur. Dec. Vol. IX obs. 102. adv. RIDLEY p. 196. Ego in fetu & in nuper nato homine, & in puero 14. dierum insipidam reperi: semel in modo nato sub-amaram. In calculosis pene constanter insipida est. In febre BIANCHI p. 942. In hydropse RIDLEY p. 174. de HARN T. IV. p. 123. & c. In cachexia LIEUTAUD p. 96. In vetula ichor coagulabilis in folliculo LANCISI diff. 3. In alio casu Cor. bil. coheret. p. 157. In ictero Gal. di minero. T. VII. p. 198. Vidit etiam non aciem WIERUS ad HILDANUM.

Etiam in ranunculo (x), inque pullo avium teneriori (y) insipidam reperi (z). Eadem hora 303. bilis in pullo (a) acris fuit, & hora 336, amara (b).

Et vicissim diversitatem hepaticæ bilis a cystica idonei judices nullam repererunt (c). Amaram in minimis ductibus hepaticis magni testes viderunt, & ipse non frequenter, sed tamen in sana & strangu-lata femina, iterumque in fure suspenso amaram reperi, ut in vesicula tamen furis cystica bilis amarior & viridis esset. Ex hepate vulne-rato bilis flava & amara fluxit (e), & amarissima fuit in ductu hepatico, cum vesicula a calculis obstrueretur (f). Horum similia *Guilielmum* *COLE* (g) vidisse necesse est, qui acriorem hepaticam bilem, cysti-cam mitiorem fecerit, cum a cysticarum glandularum succo mitigetur.

In elephanto etiam, cui nulla vesicula sit, sed choledochus ductus peramplus, tamen in poro flavam tenuiorem & gelatinosam, in eo receptaculo vero, quod hæc bellua solum habet, viridem bilem bonus auctor vidit (h). Sic in scirrhuso hepate, cum reliqui rami aperti ha-berent bilem fluidam, in scirrhusa parte virescebat (i) eadem; & in ductu choledocho, cum nulla vesicula esset, satis amaram *ILL. HUBERUS* (k) reperit. Cum vesicula inutilis esset, multa & amara tamen ad duodenum fluebat (l).

Hæc omnia collecta ostendunt, in hepate quidem bilem minus amaram esse, posse tamen per moram solam in robusto animale, & denique in sano homine, amarescere, dotesque consequi, quæ sunt in cystica bile. Contra bilem quidem cysticam in sano & adulto homine amaram: neque tamen hunc saporem ei proprium esse, cum ad cysticam fetus
bilem

(x) *SWAMMERDAM* *biol.* p. 824.

(y) *Form. du poulet.* T. II. p. 126.

(z) *MAITREICAN* *form. du poulet.* p. 205.

(a) *l. c.* p. 122.

(b) *SCHENK* *exerc.* p. 400. *DIEMERBROECK.* p. 72. *RUYSCHE* *obs.* 31.

(c) *FERRIN* *Hist. de l'Acad.* 1733. *POZZI* *Epist.* p. 77.

(e) *Hist. de l'Acad.* 1730. p. 40.

(f) *LUDWIG* *de viis bilis cyst.*

(g) *Secret. anim.* p. 240.

(h) *MOULLEN* p. 22.

(i) *BOHN.* p. 245.

(k) *Phil. trans.* n. 492.

(l) *LUDWIG* *de viis bilis cysticæ.*

bilem nondum quidem accesserit: de bile morbosa denique frequenter decedat.

§. II. *Bilis indoles propria viscor, pondus.*

In hoc toto sermone bilem dicemus, quæ de cystide sumitur. Amaro-rem enim, & reliquas dotes bili proprias perfectiores possidet, & fa-ciliter ad experimenta colligitur.

Prima fere dos bilis est, viscidam esse: eam enim naturam in fetu præ se fert, quando neque amaror natus est, neque color.

Est autem inter viscidissimos humores, ut calida bilis octies plus sustineat ponderis quam aqua (a). Cum albumine comparat Cl. VISSCHER (b).

Ea viscedo augetur, tum per ætatem, nam bubula, quam vitulina (c), viscidior est, tum per morbos; abit enim & in olei (d) speciem, & in glu-ten vix a membranis detergendum (e), & similis in boum lue reperta est (f): sic in peste bilis viscida fuit (g), & in febre leipyria (h), & flava illa Americani (i) morbi bilis viscida est, & in variolis fuit (k), & in ma-nia (l). Picea, spissa, & fætida in femina post magnos moerores (m). Et in podagrigo similis (n). In ictero vesicula atrabilario succo plena (o) fuit spif-fove

(a) SAUVAGES ad HAZES *hamastat.* p. 43.

(b) l. c.

(c) ROBINSON *on the act. of medicam.* p. 200.

(d) BORDEU *recherch. sur les glandes* p. 300. & scirrhusum pancreas, post fre-quentem vomitum.

(e) In vacca morbosa coacta in suis vasis ad coralli morem. *phil. transf.* n. 358.

(f) Fränk. *Anmerk.* II. p. 105. SAUVAGES *Mém. sur la maled. des boeufs*, p. 15.

(g) COVZIER *tr. de la peste* p. 398. 402. SOULIER *ibid.* p. 273. a CASTRO *pest. Rom.* p. 10. ut vix detergeri posset. Viscidissima, fila trahens RIEDEL *Versuch von der Viehseuche.* Pici fuscae similis MANGERT *reflexions* p. 132.

(h) BARBERE *obs. nov.* p. 133. seqq.

(i) *Ess. of a Societ. at Edimb.* T. II. p. 384. Ed. nov.

(k) HOFMAN *bil. med. venen.* n. 12.

(l) *Idem* *ibid.*

(m) G. V. SWIFTEN *Comment.* T. III. p. 500.

(n) HOFMAN *Consult.* T. II. Dec. V. c. 3.

(o) VALCAKENGHI *med. ration.* 1737. p. 94. Vesicula turgida palmum longa. Bilis coagulata scissilis.

fove sedimento (*p*), inque fluxu hepatico (*q*). Post colicam materies picea per vomitum, & alvum egesta (*q*^{*}).

Demum omnium frequentissime, ut alias dicetur, in calculum cogitur.

De pondere ejus aliquantum ambigitur: graviolem quidem, quam aqua est, omnes fecerunt (*r*), & bilis bubula in aqua fundum petit (*s*): sed levior quam lac (*t*) aliis, & certe quam sanguis (*u*) est.

Sed HARTMANNUS bilem etiam sanguine ponderosiolem reperit (*w*), & Cl. PAYEN (*x*), omnino tota sedecima parte sanguine ponderosiolem. Potest in ipsa bile varietas subesse.

Globulos; sed minimos dicitur continere (*y*).

§. III. Amaror.

Quadrupedibus adultis, & homini, bilis sana est amara, ut maximam aquæ portionem suo sapore imbuat admista, & sex guttæ aquæ unciam vehementer amaram reddant (*a*). Amarior tamen est animalibus adultis, tum carnivoris, si cum herbivoris comparaveris (*b*). Falconi amarissima.

In quadrupedibus oviparis acerrima (*c*) est, & pungente sapore: sic
in

(*p*) Schol. ad SPYNDLER obs. 3.

(*q*) MRSAPORITUS VALISNER. T. III. p. 167. tenacissimam, coloris piceæ, semper se reperire.

(*q*^{*}) VALENT. Chir. med. p. 229.

(*r*) VISSCHER de cholepojes. n. 37. in ratione 102. ad 100. & 810. ad 795. Paulo aliter HARTMANNUS coroll. I. 2. Ut 38. 37. LAMURE des secret in fin.

(*s*) TORTI therapeut. spec. p. 32. BOHM. p. 247.

(*t*) Ut 272. ad 277. SILBERLING ponder. specif. humor. p. 15. ut 2004. ad 2086. Ad. Frider. HOFMAN nov. hypothes. physiol. p. 5.

(*u*) Ut 272. ad 281. SILB. ut 395. ad 406 $\frac{1}{2}$. HAMBERGER in vacca p. 190. Ut 2006. 2072. Ad. F. HOFMAN l. c. Graviolem etiam faciunt. Batavi, ut VISSCHER l. c. p. 46. NARCISS. de recept. Chyl. n. 8. ex JURINO, ut ratio sit 100. 102.

(*w*) Ut 129. ad 125. ibid.

(*x*) In Theib. ann. 1735. Parisiis propositis & prius BRANCHI I. p. 85.

(*y*) LOBB. p. 140. ASCHE in Disp. saepe cit. obs. 60. 61.

(*a*) Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 6. obs. 125.

(*b*) ROBINSON Act. of medicam. p. 200.

(*c*) In crocodilo HASSELQUIST p. 195. 601.

in piscibus, in quibus non adeo amara (*d*), acerbo tamen & diu durante sapore est, ut in cyprino.

Acidam fuisse, & heliotropii succum tinxisse in galeo (*e*) pisce, aut in Caudifona (*f*) vipera, id explices ab admisto alieno humore, et in WOODWARDI (*g*), ægroto non quidem acida, & amara bilis os deglubens sibi alterne successit, sed bilis vicem acidum ventriculi liquamen (*h*) alternis vicibus tenuit. Eo acidam bilem veterum (*i*) reïero, quam ajebant cum ipsa terra fervere. Acida cum stupore dentium redita fuit, sed ex abusu limonum (*k*). Minima enim acoris particula, quæ in bile latet, in sapore non est manifesta. Massæ quidem farinaceæ pro fermento esse potest (*l*), sed idem & caro facit.

Per morbos insipida fit (*m*), qualia exempla produximus.

Una fere crescunt hinc visciditas & acrimonia, inde per morbos tenuitas & aquea debilitas.

§. IV. Color.

Color in plerisque animalium viridis (*a*) est, tum in piscibus (*b*), quadrupedibus oviparis (*c*), avibusque.

Carni-

(*d*) AMARISSIMAM SCHNEPPE pisc. bavar. p. 31.

(*e*) PARIS. P. I. p. 122. Etiam vermibus diuturnus acer sapor in bile superest, ut in cochlea SEVERIN. Zootom. p. 311.

(*f*) MATHER. Phil. trans. B. 339.

(*g*) Cases. p. 228.

(*h*) p. 316. 317.

(*i*) GALEN. de atrabile meth. med. L. XIV. Conf. SENNERT instit. med. L. II. P. II. c. 6.

(*k*) HUXHAM de colic. Damnon. p. 20.

(*l*) BORELL. Cent. II. obs. I. ORTLOF Cholepojes. ZYRÆUS p. 81. Negat quidem SBARAGLI vigil. ment. & ocul. p. 117. Sed confirmat VALISNERI cum pane acetosum spirare & panem fermentare Gal. minerv. VI. p. 87. Oper. III. p. 141. & lac coagere TESTI ibid. p. 148. & fermentationem augere PRINGLE p. 398. 413. de bile ovilla.

(*m*) Bilis iners cum secundæ ad quantum annum in abdomine mansissent PETERMAN T. I. obs. 5. In febre acuta tenuis nec amara bilis BIANCHI p. 942. In lue boum aquea MANGET l. c.

(*a*) In herbivoris, ove, capreolo, vacca. cuniculo FLOYER præternat state of hum. p. 115.

(*b*) Dulcem ex amara esse in fluviatilibus, & minus amaram quam quadrupedum FLOYER p. 18. Sed non ita reperio: acerrima est, etsi non vere amara.

(*c*) Rana, chamæleonte HASSELQUIST p. 297. 298. testudine WELSCH beca-zoff. I. n. 47. Azurea caudifonæ vipera MATHER.

Carnivoris animalibus obscurior est color (d), & flavedo plurima admiscetur, ut in homine bilis extensa, inque minuta vasa translata, aut in succo aliquo diffusa, flava adpareat (e). In lepore rubra nigricat (e*).

In morbis pene ad nigredinem accedit, ut in peste (f), inque febre flava (g), & morbo nigro (h), & in atrabilariis hominibus (h*), in peste boum (i).

Ab admistis contentis ventriculi & intestinorum color mutatur, ut idem homo, ex ordine, pallidam, vitellinam, æruginosam, isatoden demum revomuerit (m).

Crassiores esse particulas bilis, quando flavescit, tenuiores quando cærulescit, lego (n).

Cum amarore & viscedine intensior color conjungitur; aquosa & insipida expallescit in cachexia, hydrope, ictero: etiam in fetu ad bilem viredo die decimo (o), & undecimo (p) accedit, & præcedit amarorem (q), ut credas tingentes particulas prius generari, serius amaras. Ita per morbos colores induit varios, ut tamen in systema vix consentiant; Sic alias viridis in peste (t), & flava (u) fuit. In peste boum nigra (w) nigro viridis

(d) Nigra leoni BARTH. Cent. IV. n. 100.

(e) Flava est in cane, porco, homine, FLOYER p. 116. in mustela flammea IDEM p. 118.

(e*) BUFFON T. VI. p. 275.

(f) COUZIER l. c. & ibid. p. 201. 278. a CASTRO. DEIDIER p. 513.

(g) l. c.

(h) TISSOT Epist. p. 28. 29. WALTHER, ut etiam tingeret. In homine deliquis obnoxio bilis vesiculæ aterrima MORGAGN. sed. caus. morb. I. p. 251. Cum pancreate sub scirrhuso nigerrima IDEM I. II. Epist. 30. Sanguini nigro similis dejecta PASTA in aphor. hipp. Ep. 69.

(h*) WALTHER de atrabile.

(i) Luteonigra Fränk. Anmerk. l. c. RAUDOV p. 22. Fusca SAUVAGES Mém. p. 16. MANGET reflex. p. 162. Scripta Soc. Danic. p. 393. seq.

(m) COVER Silesiac. V. p. 48.

(n) ROBINSON l. c. p. 198.

(o) Form. du poulet T. II. p. 115.

(p) MALPIGH. form. fet. p. 11.

(q) p. 545.

(t) SOULIER ibid. p. 261. 264.

(u) SCHREIBER obs. 12.

(w) Vide not. (i).

(x) GOELICKE de luc contag. boum. PLANCHET lll. p. 30.

dis (x), fed alias splendens & fluida (z), & flava (a), alias æruginosa (b); alias picea, alias aquea (c) fuisse legitur. In hydrophobia viridis nigricans (d): in hysterica aliquando isatodes (e) adparuit. Sed hæc omnia, & quæ alia his cohærent, nihil habent constans & perpetuum.

A rubiæ usu visa est rubro colore tingi (f).

§. V. Vapor.

Exhalans portio bilis recentis odore est fatuo (a), fere incisi abdominis: in nonnullis animalibus acrior. Ursi marini hepar odore fætido veratri (b) est, fætet mustelæ, & putorii bilis (c), & bilis in lue boum fætebat (d). Ut in moschi odorem transeat, continuo dicitur. Sic in femina post longos mœrores (d*); & in hydrophobo (d**). Eædem particulæ exhalant, quæ colore sunt imbutæ, & sapore (e).

§. VI. Phænomena mixtionis cum aliis corporibus.

Bilis primum recens, facile cum aqua miscetur, cum oleo (a) difficilius (b): miscetur tamen intertrita (c): etiam calculus bilarius colorem & vim suam aquæ impertit, fere ut gummi gutta (d). Cum aqua subacta

(z) HIED. p. 28.

(a) PEANQUE.

(b) PLANQUE bibl. T. III. p. 31.

(c) MANGET. reflex. p. 162. Mém. 1748. p. 137.

(d) LIEUT. precis. p. 475.

(e) FLOYER p. 117.

(f) BOEHMER effect. rub. tinctor. p. 24.

(la) Aromaticum vocat RAMSAY de bile p. 4.

(b) STELLER Nov. Comm. Petr. II. p. 344.

(c) FLOYER l. c. p. 118.

(d) GORRICK l. c. MANGET l. c. p. 196.

(d*) G. V. SWIETEN T. III. p. 500.

(d**) JAMES p. 64.

(e) p. 528.

(a) VISSCHER n. 48. BOHN. p. 247. cum oleo juniperi C. I. LANG. FLOYER p. 124.

(b) RAMSAY p. 5.

(c) BOHN. p. 247. VISSCHER n. 48.

(d) POMET dict. des Drog. II. p. 32. Journ. des Sav. 1690. n. 10. KUNDMAN p. 229. & de felle Tauri PLIN. L. XI. p. 628.

subacta vires gerit saponis, & solvit oleum (e), ut aquæ misceatur (f), & maculas omnes eluit, quæ ab adipe sunt (g). Resinas etiam dissolvit & cum balsamis miscetur (b). Et cum pariter in aqua diluatur (i), etiam gummi species varias dissolvit, ipsam myrrham, bdellium (k), & aloes viscorem optime destruit (l), & ceram, ut vitellus ovi colliquat (l*). Ad suum vernicem Chineses admiscunt (m).

Demum humores humanos creditur fundere (n), cum icterus sanguinis densitatem in aquosam tenuitatem mutet (o).

Quare vires dissolventes bilis imprimis in oculorum morbis omni tempore celeberrimæ fuerunt, & apud Græcos (p), & apud Arabes (q), & apud nuperos (r), demum & apud Chineses (s).

Adversus albuginem (t), & ungues (u) corneæ eo tempore, quo l. *Tobie* scriptus fuit, vulgo solebat adhiberi, & avium (w), & piscium (x) quidem etiam magis, & crocodili (y). Crudo gallinæ jecur

(e) FLOYER *præternat. stat.* p. 124. DOSSIE *introduc.* I. p. 418.

(f) BAGLIV p. 428 VISSCHER l. c.

(g) HOFMAN *med. syst.* p. 183. Vermiculos cutaneous dissolvit HOMBERG. *Mém. de l'Acad.* 1709 p. 263.

(b) VISSCHER.

(i) LE FEVRE *physiolog.* p. 54.

(k) GESNER *quadruped. de Tatro.*

(l) *Pharmacies moderne* p. 98.

(l*) *Act. Acad. Mogunt.* II. p. 293.

(m) *Mém. des savans étrang.* T. III. p. 121.

(n) QUESNAY *æcon. anim.* p. 181. G. V. SWIETEN III. p. 500.

(o) Coactionem impedire HUBERMAN T. III. p. 796.

(p) Suffusiones APOLLONIUS Pitaneus felle felino curabat PLIN. L. XXIX. n. 38. & MILETUS *ibid.* L. XXV. n. 2. de felle humano: GALEN. ad PISONEM c. 9. de hyænæ felle. Ad amblyopiam fel hyænæ, perdicis, & aquilæ laudat ALVANDER TRALLIANUS L. II. c. 5. PLINIUS, & fel leonis PLIN. L. XXIX. n. 25. & MARCELL. *Empir.* L. XXVIII. n. 40.

(q) JAN. DAMASCENUS L. IV. c. 9. Ad oculos debiles fel avis Hoobaara SHAW *travels* p. 252.

(r) De felle viperæ WEDDEL *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs.* 126. BARTHOL. *merb. bibl.* 12. 15. FORESTUS L. II. obs. 9. HEISTER *de cataract.* p. 282 MANUTII *hermes.* p. 786. de felle aquilæ MONRIN. *med. lap. Luleens.* Ejusdem & cygni & lupi bilem in unguentum ocularium faciunt HARMENS *med. lap.* n. 15.

(s) Fel elephantii.

(t) Fel caninum DEMETRIUS *cur. accipit.* p. 559. vulturis IDEM p. 633.

(u) BURRHUS *de felle humano.*

(w) Aquilæ, aut vulturis fel ad suffusionem PLINIUS L. XXIX. n. 36. Rapacium avium AVICENNA L. II. tr. 2. c. 256.

(x) Hirundinis fel ad suffusiones RONDELET p. 186.

(y) HASSELQUIST p. 296.

jecore cæcitas vespertina (*z*) sanata legitur ; etiam assum hepar (*a*) , & fel ad pupillæ dilatationem (*b*) a veteribus laudatur. Ipse vapor coctorum hepatum , ad eandem cæcitatem (*c*) , ad amblyopiam , ad morbos oculos vetustum est remedii genus. Ad coryzam & oculos felis tauri lapis (*d*) ,

Sed etiam scrophulas bile bubula FULVIUS GHERLI sanabat (*e*) , & ganglium (*f*) tendinis extensoris frictione cum ea bile administrata superatum est : eademque & flatuosam colicam (*g*) dispulit. Bonum emeticum medicamentum est tinctura spirituosa fellis bubuli (*h*) .

Ad icterum demum solvendum bilis bubula (*i*) , & calculi bilarii ipsi (*k*) , laudati fuerunt. Ad rachitidem fel anguillæ BOERHAAVIUS commendat (*l*) .

In septentrione salmonis sicca bilis (*m*) , ad varios morbos , & ad ulcera & tumores adhibetur.

Calidissimis in regionibus nimia sua acrimonia in venenum abit , ut ex pisce *guamajacuatinga* (*n*) : tum fel bufonis *cururu* (*o*) apud barbaros inter summa venena habeatur (*p*) ; sed neque ego dosin majorem fellis cyprini facile deglutiri suaderem , in tanta acerbitate saporis.

Ita bilis cadaverum peste mortuorum in venas canis injecta (*q*) occidit. In acuta (*r*) febre , etiam in maligna (*s*) non perinde funesta fuit.

§. VII.

- (*z*) SPORI *Reisebeschreib.* p. 9. C. Aug. a BERGEN in *disp.*
 (*a*) KRAMER L. p. 92. & anguillæ jecur PANAROL. *Pentec.* III. *obs.* 49.
 (*b*) AVICENNA I. c.
 (*c*) In China SAUVAGES *medic. sinens.* p. 4. Du HALDE LAMBERT *obs.* L. X. p. 212. *Recueil d'obs. cur.* p. 361.
 (*d*) AVIC. L. II. tr. 2. c. 400.
 (*e*) *Obs.* p. 102. RONCALLI *hist. morb.* p. 43.
 (*f*) KALTSCHMIDT *de bilis intern. & extern. usu.* n. 42.
 (*g*) ZACUT *prax. med. mir. obs.* 30. L. XXXI.
 (*h*) ARNAULD *hist. natur. des anim.* T. IV. p. 68.
 (*i*) VALISNER. L. III. p. 599. ad 15. & ultra guttas.
 (*k*) SCHMIDT *de usu bilis* SACHS *gammarolog.* KRAMER *Med. Castr.* I. p. 76. Ad viginti & quadraginta grana VALENTIN. *de pedra del porco* p. 18. & *polychrest. enor.* p. 43. SCHURIG *libol.* p. 790.
 (*l*) *Prax.* I. p. 164.
 (*m*) BRANDES *Piscatur.*
 (*n*) Pis. *hist. nat. bras.* L. I. p. 295.
 (*o*) IDEM p. 297. 298.
 (*p*) p. 272.
 (*q*) DEIDIER *exp. sur la peste Exp. 1. 3. 5. des tum.* p. 388. 389.
 (*r*) *Journ. des Sav.* Decembr. 1722.
 (*s*) DEIDIER *Exp.* 10. ut tamen bestia agrotaret.

§. VII. *Ut se habeat ad acidæ.*

Pleraque horum experimentorum cum bile bubula (a), aliqua cum ovilla (b), nonnulla cum canina (c), paucissima cum humana (d) capta sunt. Neque perperam: cum enim bilis a putredine insigniter mutetur, præstat, ut recens sit, ex bestiis domesticis habere, cum earum præterea bilis sapore, colore, aliis dotibus parum ab humana differat. Et etiam tunc metus est aliquis, ne putridæ bilis phænomena se in ea immiscuerint, quæ proponemus; plurima autem fide digna sunt GAUBIANA, descripta apud summi viri discipulos.

Initium faciemus cum mutationibus, quas bilis cum acidis subit liquoribus.

Præmittemus syrupum violarum, cum quo virescit (e), deinde cum tinctura malvæ (f)

Lac dicta est coagulare (g), non bene (h), cum etiam adtenuet, accrescentiam arceat, etiam coactum lac solvat (i).

A contentis ventriculi porcini acidis cogitur (k).

Acidi sales ficci, ut alumen (l) bilem coagulant, fere ut spiritus acidi. Additur etiam eos cum felle effervescente (m).

Acidi liquores vegetabiles parum mutant, neque a vino fel cogitur, neque cum eo effervescit, ne cum rhenano (n) quidem acidiori. Sed neque putredo bilis a vegetabili acore impeditur (o). Cum succo limo-
num

(a) GAUBIANA, BAGLIVIANA p. 439. BOHNIANA, SCHEUCHZERIANA, VERHEYENIANA.

(b) BAGLIV. p. 435. seq.

(c) Apud ORTLOBIUM.

(d) BAGLIV. p. 439.

(e) HOFMAN med. syst. I. p. 283. VERHEYEN L. II. p. 90. FLOYER p. III. STEEF Hamb. Magaz. T. VI. n. 4. cum grumo nubeculoso viridi. Negit RAMSAY p. 5. Sed confirmat de bile cystica Cl. SPIELMANN. in literis ad me datis.

(f) DEIDIER tum. p. 52.

(g) TESTI Galer. di mineru. T. VI. p. 145. seqq. VALISNER. galer. Miscer. T. VI. p. 87. Oper. T. III. Off. var. p. 141. ORTLOB cholepoje. negat.

(h) Non cogit MOSZDER negat. p. 14.

(i) VISSCHER l. c. n. 49. NARCISSE. p. 9.

(k) FLOYER p. 124.

(l) FLOYER p. 121. ut grumi fiant flavi.

(m) HOMBERG Mém. de l'Acad. 1709. p. 360.

(n) BIRCH T. II. p. 22. Ab eo diluitur ORTLOB.

(o) BAGLIV. p. 439.

nūm non fervet (*p*), cum aceto etiam parum mutatur (*q*). Subsidebat tamen grumus viridis (*r*), & nonnunquam bilis coacta est (*s*). Canina bilis cum aceto instillato in filamenta abiit (*t*), & a spiritu aceti destillato, etiam de æruginē, nihilo magis mutatur (*u*).

Cum omni acore minerali cogitur (*w*), dum satis meracus fuerit (*x*), & in durabilem ossam tota abit, si is acor fuerit generosior (*y*), ut ceræ similis stet (*z*), & ad ignem demum colliquescat (*a*), etiam quando septem totis diebus fervata (*b*) fuit, & demum in arenulas conteratur (*c*). Neque tamen id experimentum semper perinde succedit (*d*), neque cum felle nonnullorum animalium, ut talpæ (*e*), sciuri, erinacei, & piscium (*f*). Cum eodem fossili acore in universum viridem (*g*) colorem induit (*h*), quæ flava fuerit. Fætet acriter cum acidis liquoribus mista (*i*).

A spiritu salis, qui reliquis liquoribus stillatitiis acidis de gente fossili debilior sit, etiam bilis minus efficaciter coagulatur (*k*), neque valde ejus phænomena differunt ab iis, quæ cum aceto (*l*) nascuntur. Grumus ta-

men

(*p*) LEONICEN. *metam.* p. 106.

(*q*) VISSCHER *cholepojes.* n. 49. Solvi potius SCHAFFER *corp.* p. 27. Effervescere ROBINSON *oper. med.* p. 201. 202. aliter quam reliqui.

(*r*) STIEF. *Hamburg. Magaz.* T. VI. n. 4. RAMSAY p. 9. NARCISSUS p. 8.

(*s*) VISSCHER n. 50.

(*t*) ORTLOB n. 18.

(*u*) RAMSAY p. 9. Coactam fuisse CARTHEUSER l. c.

(*w*) VISSCHER n. 50. NARCISSUS p. 8. RAMSAY p. 6. HARTMAN.

(*x*) Non cogitur si debilis fuerit HARTMAN.

(*y*) HARTMAN *de bile.* BAGLIV p. 439. CALDESI p. 49. VERHEYEN II. p. 90. VISSCHER n. 50. NARCISSUS p. 8. NEUMAN p. 1253. Præcipitatur sedimentum RAMSAY p. 6.

(*z*) HARTMAN.

(*a*) IDEM *ibid.*

(*b*) *Ibid.*

(*c*) *Ibid.*

(*d*) IDEM *ibid.*

(*e*) IDEM *ibid.*

(*f*) IDEM.

(*g*) IDEM.

(*h*) VIEUSSENS *traite des liqueurs* p. 357. BAGLIV. p. 429. Vuidem cere. Izum BROEN. *dupl. bil. vet.* p. 36.

(*i*) HARTMAN.

(*k*) FLOYER p. 120.

(*l*) STIEF. l. c.

men subsidet viridis. In canina bile nequidem fluida natura mutata est [m]; - bubula bilis, aliunde spissior, magis cogitur [n]. Efferbuisse BAGLIVIVS [o]; sed negant idonei testes [p], & experimenta ejus viri in bile putrida facta videntur, quæ utique cum ejusmodi acore ferveat; non ita sana & incorrupta [q]. Si idem salis spiritus meracior fuerit, utique bilem in offam coagulat [r]. Auget idem amarorem [s].

Spiritus nitri bilem efficacius cogit [t], ut virides & duri grumi in fero subsideant. Viridem fecit, quæ flava fuerat [u]. Amarorem auxit [w]. Cum bile hominis ante viginti quatuor horas mortui efferbuit [x], non ita in aliis experimentis, cum bilis bestiarum adhiberetur [y].

Cum aqua forti alias arbusculæ virides [z] natæ sunt; & grunus in fundo subsedit. In aliis puto meracioris acidii exemplis, bilis in coagulum amarum [a], viridis resinæ [b] simile, abiit, aut in resinam inflammabilem [c]. Etiam efferbuisse visa est [d].

Cum spiritu vitrioli [e], & etiam [f] magis cum oleo, efferves-
cit,

[m] BOHN p. 247.

[n] IDEM ibid.

[o] p. 437.

[p] VERHEYEN II. p. 90. NARCISSEUS. BOHN. p. 139. Paulum fervere NEUMAN p. 1253. Ovilla cum chymico acore non fervet RAST.

[q] HOFMAN *acid. viscid.* p. 35.

[r] VISSCHER, &c. BRUNO *de bile* BOHN. p. 139.

[s] FLOYER p. 125. BAGLIV. p. 437.

[t] FLOYER p. 120. BOHN. VISSCHER n. 50.

[u] In meis experimentis, etiam FLOYER p. 115. 120. & BOHN.

[w] FLOYER p. 125.

[x] *Misc. Taurin.* T. I. p. 77. GREW *parts of anim.* p. 250. etiam cum vetusta bile BAGLIVI p. 438. Etiam apud GRAAF *succ. pancre.* p. 82. Paulum fervet NEUMAN 1253.

[y] VERHEYEN T. II. p. 98. NEUMAN *oper. chem.* p. 1252. NARCISSEUS, BOHN. p. 139.

[z] STIRFF l. c.

[a] NEUMAN *oper. chem.* p. 191.

[b] CARTHEUSER *mater. med.* p. 247.

[c] SCHAPER l. c. p. 18.

[d] HOFMAN l. c.

[e] SCHEUCHZER *ad DRID* p. 41. Omnino non BOHN p. 139. Debiliter BAGLIV. p. 438. magis p. 439. A debili, puto, spiritu sulfuris non cogitur du HAMMEL *hist.* p. 76.

[f] CALDESI p. 50.

fcit, ut calor nascatur [g], & fumus [h]. Cogitur [i] etiam, grumosve duros deponit [k], deinde eo magis cogitur, quo ipse acor est meracior [l].

Virescit [m], etiam bilis hominum peste extinctorum [n]. Amarorem a spiritu sulfuris admisto amittit [o], & cum debilior sit ejus acor, tantum filamenta in bile nascuntur [p]. Cum sublimato hydrargyro soluto mista coit [q].

Spiritus vini, qui in sanguine & fero vim exercet similem efficaciam acidorum spirituum, neque cum bile effervesceat, etsi id dictum est [r], neque coit [s], nisi aliquando [t] debiliter [u]. Putredinem arcet [w]. Sapa & præcipitati fellis sedimentum ad partem maximam in spiritu vini solvitur [x].

§. VIII. *Cum salibus mediis, cum lixiviosis, cum urinosis.*

Parum est, quod cum ejusmodi salibus, aut liquoribus, bilis patitur. Amarorem a lixiviosis frangi [a] video, ut etiam rhei amaror ab admisto oleo tartari debilitatur.

Non effervesceat cum salibus mediis [b], & placide miscetur. Non cogitur

- [g] VISSCHER n. 50. HOFMAN. Etiam spuma BOHN.
 [h] VISSCHER. BOHN. BAGLIV. In butyri speciem FABRA. aq. Nucerin.
 P. 40.
 [i] In flavos grumos FLOYER p. 110. SCHEUCHZER p. 23. BAGLIV.
 [k] HARTMAN. SCHEUCHZER.
 [l] VISCHER. BOHN. &c.
 [m] SCHEUCHZER. p. 23. BAGLIV.
 [n] DEIDIER Exp. I.
 [o] FLOYER p. 125. Acida fit BAGLIV.
 [p] In canina bile ORTLOB.
 [q] BOHN. p. 257. SCHEUCHZER ad DEIDIER BAGLIV. p. 419. ORTLOB. Ponit sedimentum albescens l. c. n. 18.
 [r] ROBINSON l. c. p. 201. 202. *Projet pour l'hist. des anim.* p. 235.
 [s] HARTMAN, BAGLIV. p. 428.
 [t] Coire BOHN. p. 246.
 [u] NARCISSUS l. c. Nebulas facit NEUMAN p. 253. Mucosi quid deiecit.
 RAMSAY p. 5.
 [w] BAGLIV. p. 436.
 [x] RAMSAY p. 8.
 [a] FLOYER p. 125.
 [b] VISSCHER n. 50.

gitur cum sale marino [c]; neque cum sale ammoniaco [d], aut nitro [e], sed utique cum tartaro vitriolato [f]. A liquore terræ foliatæ tartari diluitur [g].

Cum *fixis* salibus non effervesceat [h], neque mutatur [i], & clarior potius facta est [k], & flavedo intenditur [l], ut fit in rheo cum ejusmodi sale misto. Aliquando bilis turbatur [m], & nonnihil de ea subidet [n]. Magna tamen copia adfusis ejusmodi salibus cogitur [o], sed leviter [p], aut nihil quidquam [q]. Odorem urinosum cum ejusmodi sale mista spargit [r].

Cum spiritu salis ammoniaci diluitur [s], & commode unitur [t], & color intenditur [u], ut olivaceus fiat. Cum bile a spiritu vitrioli coacta idem alborem facit [w].

A spiritu cornu cervi bilis vix mutatur [x], aut [y] colore intenditur, neque a tinctura cantharidum [z]. A spiritu sanguinis humani solvitur [a].

Quando

[c] VISSCHER.

[d] FLOYER p. 121.

[e] VISSCHER.

[f] IDEM. Aliquid deiecit RAMSAY p. 10.

[g] HARTMAN.

[h] VERHEYEN l. c. NARCISS. RAMSAY p. 5. FLOYER p. 121. HARTMAN Habet jam L. TESTI l. c.

[i] RAMSAY HARTMAN. Tantum spissari BROEN l. c. BAGLIV. p. 436. BURCARD *de bile*.

[k] SCHEUCHZER.

[l] DEIDIER *Exp. I.*

[m] PETIT *Epist. II.* p. 30. 31. VALISNER. l. c.

(n) NEUMAN, STIEF. Muci similis fit ORTLOB.

[o] BAGLIV. p. 439 STIEF: in mellis speciem BOHN. p. 247. non tamen canina.

[p] VISCHER, VERHEYEN p. 91. ut agitando solvatur.

[q] RAMSAY p. 5.

(r) VISSCHER.

[s] HARTMAN, BOHN. p. 246. VISSCHER, MOSED. p. 1. Non mutari ORTLOB. Non cogi FABBA *aq. nuc.* p. 40. RAMSAY.

[t] NEUMAN.

[u] STIEF l. c. Rubinea fit BAGLIVI p. 438.

[w] FLOYER p. 124.

[x] STIEF. Præcipitari porci bilem, sed parum FLOYER p. 112.

[y] BAGLIV.

[z] BAGLIV. p. 437.

[a] BOHN.

Quando cum acidis coacta fuit, solvitur ab addito alcali [b]. Etiam sapibilis, quæ per exhalationem nata est, solvitur in [c] salibus lixiviosis. Sanguinis etiam coagulationem impedit [d]. Cum aqua abdominali, puto urinosa, commista rubrum colorem induit [e].

A limatura martis turbatur & virescit [f], aut omnino nigrescit, in lue certe pecorum [g].

§. IX. Bilis putrescit.

Experimenta Cl. Virorum hac de re ita sibi sunt obposita, ut vix possint conciliari.

Sunt qui negant bilem facile sponte putrescere [a], ne in suspensa quidem vesicula servatam [b]. Cum caro hora sexta fæteret, in eodem calore bilis tantum post 48. horas odorem moschi induit [c], (quem alii Cl. Viri demum longæ putredini ajunt supervenire).

Alii utique bilem facile putredinem concipere scribunt [d], etiam celeriter [e], celerrime inter humanos [f] humores, & humanam celetius quam bubulam [g], & etiam intra hominem vel animal ex morbis ita mutari, ut cum acidis liquoribus stillatitiis ferveat, ut in ictero [h], tum in morbo boum epidemico [i], inque lue pannonica [k], & in omni morbo maligno fere [l] vitiatam esse. In lue boumaerem generat,

[b] CARTHEUSER, RAMSAY p. 8.

[c] RAMSAY l. c.

[d] HEUERMAN III. p. 796.

[e] Fränk. Anmerk. V. p. 573.

[f] OESTLOE.

[g] FISSCHER p. 201.

[a] LOWER pyretol. WILLIS defens. p. 109.

[b] QUESNAY Oecon. anim. T. III. p. 50.

[c] RAMSAY p. II.

[d] BOEHMER de effect. rub. NARCISS. p. 3. VISSCHER: Phil. transf. n. 495. BAGLIV. p. 431.

[e] Cito sponte fætere ALSTON. on quiklime p. 35.

[f] BOERHAAVE Praelect. I. p. 430. VISSCHER n. 34. NARCISS. SENAC. Ess. de physiq. I. p. 311.

[g] GABER p. 78.

[h] PRINGLE diseases of the army. p. 435.

[i] SALCHOW von der Viebsseuche, cum spiritu vitrioli.

[k] HOFFMAN acid. viscid. p. 35. cum in sanis hominibus non ferveat.

[l] SCHREIBER de peste p. 87.

rat, ut videtur, hinc vesiculam eo magis distendit, uti morbus est acutior [m].

Accuratius Cl. GABER bilem humanam frigido loco intra duas a morte horas [n], jam fætere testatur, & cum aqua forti effervesce-
re [o], aut cum aliis acidis liquoribus ejus generis in calore 25°. R, intra vigesimam quartam horam [p], esseque inter humanos humores eum, qui omnium citissime effervescentem naturam induit [q], ut etiam cum aceto pugnet [r]. Tardius & intra triduum putrescere alii Cl. Viri [s]. In morbo a longo moerore, putridissima fuit cum summo fæto-
re [t].

Fætet autem, dum putrescit [u]. Sed eum fætorem tandem deponit, in-
que odorem non ingratum transit [w], & citius quam natura lixiviosa fætor oritur, & diutius durat, nam vis effervescendi cito perit [x], & visa est natura acida renata fuisse [y].

A putredine utique mutatur, & odorem moschi [z] induit & ipsa [a], & ejus aqua [b], & extractum [c], ipsæ demum fæces alvi [d], & eorum aqua decies distillata [e].

Sapor cum putredine fit acerrimus [f].

Salem

[m] *Phil. transf.* n. 456. Expandi, ut vase suo non contineatur HEERINSTRAT de ca-
lore p. 45. In eo morbo fætet MANGER *reflex.* p. 196.

[n] *Miscell. Taurin.* p. 76. sic MOSERER p. 14.

[o] Add. VISSCHER.

[p] Ibid.

[q] p. 78.

[r] Ibid.

[s] VISSCHER n. 39.

[t] G. v. SWIETEN T. III. p. 500.

[u] GABER p. 79. BOERHAAVE T. I. p. 431. BAGLIV p. 416. G. v. SWIETEN.

[w] Ibid.

[x] p. 78.

[y] PRINGLE p. 398. 419. Sed addito pane.

[z] GRULICH. *cholelog* p. 48.

[a] RAMSAY *Exp.* 25. 26. celeriter iste & biduo. Lente & longo tempore BOERHAAVE
p. 431. Post aliquot menses ALSTON. p. 35.

[b] CARTHEUSER *mater. med.* p. 464. MEAD. *of poisons.* p. 34. De tinctura felle
lupini SCHROEK de moscho.

[c] RAMSAY p. 28. CORVIN. de olfact. p. 61.

[d] Post abactam aquam moschu m olet HOMBERG. *Mém. de 1711.* p. 44.

[e] PRECHLIN *obs.* p. 325.

[f] NARCISS. VISSCHER.

Salem alcalinum digesta ante aquam [g] dat copiosiore[m] [h] & acerrimum [i].

Cæterum natura per acorem mineralem coagulabilis in putrida bile superest [k].

Demum sibi relicta abit in liquidum supernatans [l], & id quod turbidum subsidet.

Non est tamen balsamum, quod a putredine sanguinem fervet [m].

Putredinem adjuvat addita terra absorbens [n], avertit rubia [o], sal medius Neuholtensis aquæ [p].

§. X. *Extractum bilis.*

Vel lenis ille calor, qui in atmosphæra [a] fere regnat, vel paulo major, qui tamen non superat gradum ebullitionis, abigit de bile aquam ad $\frac{7}{8}$. totius [b].

Paulatim filamenta in arbusculæ speciem conjuncta fundum petunt [c], & coeunt in massam spissam [d], amaram [e], cum dulcedine [f]. Ea in aere deliquescit [g], in aqua lactescit [h], inque spiritu vini aquoso solvitur [i], etiam in alcohole [k]. In igne liquefcit [l],
&

[g] VISSCHER.

[b] HENNINGER *de bile*.

[i] MOSEDER p. 14. Magis volatilem. BRUNO *de bile* n. 8.

[k] RAMSAY *Exp.* 27. HARTMAN. Alias debilitatur IDEM.

[l] VISSCHER, NARCISS.

[m] HELMONT *sextupl. digest.* n. 34. GLISSON.

[n] GILBERT *putred. in corp. anim.* p. 18. Utique adeo in vivo homine alcali generari potest.

[o] BOEHMER l. c.

[p] RUTTY *synops.* p. 307. Etiam cum ea aqua mista septimo demum die putrescit IDEM.

[a] RAMSAY *Exp.* 5.

[b] DAVIDS *calc. bilar.* p. 5. RAMSAY.

[c] STIFF l. c.

[d] Terebinthinæ similis GHIARESCHI. Picea STRÖHLEIN. Sicca in frigore & fragilis RAMSAY *Exp.* 7.

[e] VISSCHER n. 45. RAMSAY, ROBINSON p. 173. Amarissima CARTHEUSER.

[f] GIARESCHI *Giorn. di Parm.* 1687. p. 194. post distillationem VISSCHER.

[g] VISSCHER, NARCISS. Cera cum terebinthina mistæ comparatur *Epb. Nat. Cur.* Vol. X. obs. 91.

[h] JAHN *physiolog.* p. 219. DAVIDS. VISSCHER. RAMSAY.

[i] STRÖHLEIN *calc. bilar.* p. 8. DAVIDS VISSCHER.

[k] STRÖHLEIN, VISSCHER. Negat DAVIDS & CARTHEUSER: & difficilius liquefcere neque totum RAMSAY p. 15.

[l] HARTMAN, NARCISS. VISSCHER.

& in calore [m], inque sale lixivo [n]; ignique expōita flammam concipit [o], & partim deflagrat [p], tota vero quando terra pinguis admiscetur [q]. Porro non putrescit eadem [r]. Crassamentum ab acore minerali coactum inflammatur [s], idemque cum multa aqua in bilis recentis similitudinem redit [t].

Odor, dum deflagrat, est capillorum ambustorum [u].

Cum sabulo in calculum coalescit [w], aut cum argilla [x]. Porro non putrescit [x*] sapa bilis.

Ex putrida bile simile magma [y] potest parari, quod in aqua frigida induratur [z] moschumque olet. Aqua, in qua solutum fuit coagulum ab acore minerali factum, in crystallos abit acicularum similes, acidissimas [z*].

Sicca bilis cum spiritu nitri fervet (z†).

§. XI. Calculi bilarii.

Ejusmodi nunc coagula non raro in bile nascuntur, non solum animalium, quæ splene destituuntur [a], sed omnino sanorum [b].

In piscibus etiam globuli albi duriusculi [c] reperiuntur: in homine concrementum sebosum cum calculis mistum [d] & grumi [e]. In icterico

[m] RAMSAY *Exp.* 7.

[n] RAMSAY *Exp.* 14.

[o] MOSEDER p. 14. HARTMAN DOSSIE I. p. 461. COE p. 160. STRUVE *Exerc.* III. p. 159. STROHLEIN DAVIDS *calc. bilar.* GHIARESCHI, VISSCHER, BAGLIV p. 428. HOFMAN p. 182. RAMSAY.

[p] DAVIDS *ibid.*

[q] COE I. C.

[r] VISSCHER.

[s] HARTMAN, MOSEDER p. 16.

[t] RAMSAY *Exp.* 12.

[u] GHIARESCHI.

[w] MOSEDER.

[x] DAVIDS.

[x*] VISSCHER.

[y] VISSCHER. RAMSAY *Exp.* 28.

[z] RAMSAY *Exp.* 11.

[z*] RAMSAY *Exp.* 28.

(z†) GREW *parts of anim.* p. 250.

[a] BOHN. p. 249.

[b] IDEM *ibid.*

[c] SCHAFER *pisc. havar.* p. 80.

[d] ROEDERER *progr.*

[e] BARTH. *Cent. I. hist.* 80.

rico calculus in ductu cystico immobilis, & una bilis in vesicula granulosa [e*].

Bilem in globulos coactam post icterum [f], & coagulum album in ductibus bilariis cum globulis in cystide durioribus [g] legimus. Molles intus globulique sebacei natantes [h]. Molles erant quos in oleum dissolutos vidit VALISNERIUS [k], cum ægrotus oleum amygdalarum bibisset. Molles viridesque pilas alter excrevit ictericus [l]. Calculus unus & cum eo concretiones in bile molles [l*]. Ictericus calculum exeravit quem pilæ virides molles secutæ sunt [l**]. Egesti ab icterico calculi 72. inter quo aliqui molles [l†]. Tres in vesicula molles calculi [m]. Unus gummeus [n] lapillus, & gummei calculi redditi [o]. Concretiones nigricantes pilulares [q]. Calculi ex puero annuo: pisi mole, molliculi multi [r]. Bilis glutinosa in morbo lento [s]. Vesicula plena bile coagulata scisili [t]. Per anum redditus calculus mollis pene semuncialis [u]. Calculos BEWERWYKIUS vidit in aqua fundi, & ad naturam bilis redire [w]. Etiam hystricis calculus in ventriculo mollis est [w†]. Ea concrementa sunt calculorum primordia [w*].

Sed

[e*] STORK ann. 1. p. 150.

[f] HOFMAN bilis med. & venen.

[g] Comm. Nor. 1738. hebdom. 18.

[h] SCHENK Exerc. p. 478.

[k] T. III. p. 132.

[l] MEERMAN apud SCHURIG chylolog. p. 562. & IDEM p. 142. 143. sed isti durebant in aere. Alia exempla habet PETIT Acad. Chir. I. p. 308.

[l*] MORGAGN. sed. caus. I. p. 38.

[l**] MEERMAN apud SCHURIG chylolog. p. 562.

[l†] PETERMAN scrutin. icter.

[m] Zad. Med. Gall. I. p. 128.

[n] Ibid. p. 73.

[o] COE p. 83. una ex eodem ægro arenosi.

[q] Phil. transf. n. 173.

[r] ADOLPHI de colo intestino multor. morbor. vide.

[s] CAMERAR. exstispic.

[t] VALISN. oper. T. III. p. 197. 198.

[u] PETIT Acad. Chir. I. p. 308.

[w] Schatz der Ungesundh. p. 216.

[w†] BONT ad GARC. ab ORTA. c. 45.

[w*] Mém. de l'Acad. 1722. p. 161.

Sed eadem bilis multis modis inque multis animalibus magis induratur: in bobus etiam frequentius, per hibernos [x] maxime menses, quibus & sicco [y] foeno aluntur, & motu carent: addunt, in Hungaria [z], & Turcia [a] frequentius malum esse, etsi neque in Dania [b], rarum est, neque in Germania [c]. Frequens esse [d] credas, quod omnium primum inter calculos felleos medicis innotuerit [e].

Est autem duorum generum: prius [f] pene bobus proprium, crusta est flava, subfusca, reticulata, qua ductus cysticus [g], & hepatici pori [h], in eo animale ita obducuntur, ut exemta arbusculæ siccae & ramosæ [i] imaginem referat. Ea crusta aquam tingit, coloremque dat.

Altera species, humanis calculis similior, unice in vesicula bubula reperitur [k]. Grandis etiam [l], & sæpe lamellata [m] rotunda figura aut angulosa [n], amarissima, in aquam colorem suum diffundit: eadem levis est & aquæ innatat [o], flammamque plerumque concipit [p]. Sponte visa est loco humido in liquorem contabuisse [q]: in aceto etiam [r], & in spiritu vini mollescit. Usta ambram oluisse dicitur [s].

Etiam

[x] GLISSON p. 89.

[y] CHESELD. p. 167. BETTUS *de sanguine* p. 275.

[z] KRAMER *medic. milit.* II. p. 176.

[a] BELLON *suæul.* III. p. 46.

[b] DETHARDING.

[c] In Saxonia Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. obs. 44.

[d] Ita RUYSCH obs. 31. MALPIGH. postb. p. 31. & DETHARDING l. c. p. 390. Multos ejusmodi calculos a laniis habuit MATTHIOLUS. Habet etiam pro re frequente GLISSON p. 88. 89.

[e] RHazes *fac. anim.* c. III.

[f] Anuli modo in felle boum reperitur RHAZE ibid.

[g] RUYSCH.

[h] Habet RUYSCH obs. 18. REVERHORST, GLISSON. p. 88. 89. Colleg. Amstelodam. p. 18. LOQUET. p. 5. BOERHAAVE T. III. p. 185. Cum corticibus comparat LEIGH. *natural. hist. of Lancash.* l. c.

[i] GLISSON, REVERHORST.

[k] *Hist. nostr.* X. p. 80. RUYSCH obs. 17. MAJOR progr. p. 10. Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. obs. 44. MALPIGH. l. c. BOYLE *util. philos. exp.* p. 140. KUNDMAN p. 229. Bresh. Saml. 1724. m. Mart. SACHS *Gammarel.* p. 296. qui etiam in ventriculo eorum sedem ponit. MORBIUS *de usu hepat. & bilis.* BARTHOL. *Hist.* 32. Cent. II. Jam WIESUNG apud MOEBIUM *de bile* auctor est, vesiculam in lue boum lapideam fuisse.

[l] Drachmarum sex VALENTIN. *polychrest. exot. de pedra del porco* p. 18.

[m] WELSCH ex hepate bubulo GREW *mus. rar.* p. 26.

[n] WELSCH *hecatost.* obs. 3. LEIGH. *Lancash.* II p. 47.

[o] DETHARD *Act. Societ. Dan.* T. II. p. 385. 387. Subinde fundum petit *Act. Lit. Suec.* 1725. p. 75.

[p] DETHARDING p. 387.

[q] CHARLTON *lithogen.* p. 24.

[r] DETHARD. l. c. p. 387. &c.

[s] Bresh. Saml. l. c.

Etiam elephas [t], cum vesiculam non habeat, calculum in poro habuit. Et in equi alvo calculi inflammabiles [u] triangulares, levesque reperiuntur, de bilario genere sunt. Et ex vesicula equi (puto ex ductu cholecho) KUNDMANNUS calculos flavos habuit laminatos [w], non inflammabiles [x]. Neque rarum est, epidemice in equis calculos reperiri [y].

Hystricis celeberrimus calculus est [z], etiam medicis notus, tunicatus, ad tactum unguinosus [a], amarissimus [b], aquam tingens amaro sapore coloreque viridi [c], & vi, ut creditur, medica [c*].

Quem F. SLARE descripsit, fistularis [d], idem videtur de priori bubulorum classe esse.

Diversi ab hystricis calculis sunt porcini, similes humanorum, angulosi, natantes [d*], qui & in nostratibus suis reperiantur. Qui vero ex apro indico [e] calculus intus pilos & fibrillas habet [f], is non est de biliaria classe, neque ad cysticos pertinet, & a *pedra del porco* debet distinguui.

Testudinis vesicula [g] lamellatum calculum continet.

Inter carnivora occurrit tigridis lapis [h], & canis molossi trianguli, crystallini [i] calculi, & in ibide [k]. Inter omnivora simiæ lamellatum
concre-

[t] SEBA *Thes.* t. II. tab. 113.

[u] BROMEL *Act. Lit. Suec.* 1725. p. 33.

[w] *Seltenb.* p. 229.

[x] VALISN. III.

[y] KRAMER II. p. 176.

[z] Garc. ab ORTA L. I. c. 16. SEBA T. I. t. 30. f. r. p. 82. SPENER de *muribus marinis*. Non in omnibus hystricibus DAELMANN p. 156. Esse ex hystrice contra REVENHORSTIUM p. 48. ob pondus in aqua subsidens negantem confirmat VALENTIN. *polychrest. exot.* & KÆMPFER.

[a] SEBA. Etiam mollis BONT. c. 46.

[b] VALENTIN. *append.* III. *Epist.*

[c] *Phil. trans.* n. 305. LINN *system. natur.* ed. Belg. T. I. P. 2. p. 368. SEBA, VALENTIN.

[c*] DECKERUS qui caro vendebat.

[d] *Bezoar* p. 17. seq.

[d*] Mergi REVENHORST.

[e] SEBA t. 13.

[f] CAMELLI *Phil. trans.* n. 305. PIELAT *Thes. ccilam.* p. 46. BLVERWYK *lithogenes.* p. 14.

[g] *Hist. de l'Acad.* 1729. n. 5.

[h] SEBA T. II. tab. 113.

[i] PLANCUS in *Excerpt. Lit.* 1759. n. 13.

[k] PARIS.

concrementum (*l*), cysticum idem & humano simile est. In castoreo, quod multa cum bile communia habet, etiam lamellati, inflammabiles, felleorum similes calculi visi sunt.

§. XII. *Calculi fellei humani.*

Pauca de plurimis decerpo, cum innumeras pene historias (*a*) huius morbi coram habeam, neque paucas ipse viderim, aliquas etiam post editum libellum. Invenio eum morbum (*b*) vulgarem esse (*c*), multo frequentiore calculo urinae (*d*) vesicae, etsi plerumque sub colicæ nomine latet. Juniores (*e*) ei minus obnoxii sunt, senes magis (*f*), tum feminae (*g*). Frequenter in utraque vesicula calculus est (*h*).

Multa varietas est eorum lapillorum, in quos bilis concrevit, neque facile classes constituas, cum præterea historiae pleræque non valde plenæ sint. Græci scriptores, nisi fallor, hunc morbum non habent, qui sub tempora renovatarum litterarum innotuerit.

Possis

(*l*) *Oryctologie* p. 378.

(*m*) *Mémoire de l'Acad.* 1712. p. 210.

(*a*) Etiam ducentas in inimitabili MORGAGNI *de causis & sede morborum* opere.

(*b*) GENTILEM, inde NICOLUM id malum dixisse MORGAGNUS II. p. 77. Globuli in vesicula fellis PEIRESC. p. 58. E. & D. CLARÆ reliquiis exemptus calculus mole olivæ CÆL. RHODIGINUS. Inde *Alex. BENEDICTUS* p. 21. BENIVENIUS nigrum de vesicula sumtum calculum habet c. 94. VERSALIUS duorum pugnorum æqualem vesiculam vidit, plenam calculorum *Exam. obs. fall.* p. 124. CARDANUS calculum in leproso vidit *subtil.* L. VII. p. 210. & *de venen.* p. 47. Eo laborabat Hieronymus SCHREIBER operum MONTANI editor CRATO *Epist. ad GESNERUM CORDI app. præmissa* MELCH. ADAMI *Elog.* p. 83.

(*c*) Frequens esse C. STEPHANUS, p. 356. SANCTOR. *meth. vit. error.* p. 354. RIO-LANUS p. 131. HEISTER *Ann. Jul.* 1726. Aug. *Ess. of a Societ. at Edimb.* I. p. 265. BAGLIV. p. 433. MORGAGN. *sed. morb.* II. p. 77. Non rarum WIER ap. HIED. I. *obs.* 52. Ad alios morbos in universum, se habuit, etiam ad supplicia, uti 14. ad 230. *Opusc. patbol. obs.* 33. p. 70. In peripneumoniciis frequentes sunt *Mém. des savans etrang.* III. p. 443.

(*d*) Ut 7. ad 1. *Opusc. patbol.*

(*e*) COR p. 67. Ne semel quidem in juvene vidi: habet tamen calculos pisi mole in vesicula infantis VALENTINUS *polychr. exot.* p. 42.

(*f*) C. STEPHANUS.

(*g*) COR p. 67. *Phil. Corr.* FABRICIUS *progr.* 1759. p. 25. DETHARDING I. c. p. 386. Nostri non repugnant.

(*h*) BAGLIV. p. 434. Exemplum habet WELSCH *Episagm.* 65. MORGAGN. *Epist.* I. n. 78. *Phil. transf.* n. 336. SCHURIG *litbol.* p. 143. *Giorn. de Letter.* T. XXIX. p. 207. BERGER p. 22. HELWIG *obs.* 17. *Phil. transf.* n. 185. MEKEL p. 97. CONNOR. *Hist. of Poland.* T. I. p. 200. TITSINGH *rustauren.* p. 289. GOCKEL II. o. 99. BERGER p. 220. WEICKMAN *de marte.* HOECHSTETTER *Dec.* X. LANCIS. *Diff.* X. VITI *diat.* IV. p. 109.

Possis tamen utcunque duas classes facere. Grandes alii. (i), iidemque subrotundi (k) sunt, olivæ (l), nucis (m), ovi (n), aut alia ejusmodi elliptoide figura: etiam tesserarum (o) similes, quando plures in eadem vesica se confricuerunt (p), ut planæ superficies levesque natæ sint, fere ut in carpi (q) ossiculis, atque convexitas cavitati respondeat (r). Eos sæpe quasi capsula aliqua vesicula contracta continet (s), alias totam replevit unus (s*).

Hi calculi plerumque, ut de meis loquar, non (t) sunt lamellati, & alias ex calce aliqua albisque (u), aut flavis (w), aut viridibus

(i) Pondere gr. 126. *Phil. transf. Vol. 50. P. II. p. 546.* Ambitu $3\frac{1}{2}$. unc. longitudine 2. pondere gr. 130. *BETZOLD choelolith. n. 2.* Calculus tripartitus pondere drachm. ij. gr. 45. *Comm. Nor. 1742. hebdom. 32.* Ad grana 150. *Ad. Med. Hafn.* Pondere unc. 4. drachm. duar. cum sem. *Mém. Chir. III. p. 55. 56.* Drachmarum sex pondere in recto intestino retentus *Journ. Med. ann. 1756.* Unciarum quatuor *SCHAARSCHMIDT ad Cl. D. COTHENIUM.* Duo maximi *COITER p. 122.*

(k) Flavescerites ovaies aut rotundi *BIANCHI I. p. 475.*

(l) Olivæ mole *SCHURIG lithol. p. 143.* *CÆL. RHODIGINUS CONTULI lapul. 8^o pod. p. 64.* *Mém. de Berlin. XI. n. 92.* Olivaris *CONTULI p. 64.*

(m) Juglande major *ROBINSON of the Stone p. 62.* *HEISTER Ann. Jul. 1722. p. 129.* *HILD. I. obs. 66.* Gallæ turcicæ æqualis in electore F. *WILHELMO BIERWIRTH Structur. bep. p. 17.* Ovi pulli æquales ex femina prodeuntes *Phil. transf. n. 282.*

(n) Ovi columbini mole *J. a CASTRO pest. Rom. p. 78.* *Ad. Philexotic. FISCHER de calc. p. 3.* Ovi gallinacæi mole *Journ. Sav. 1697. n. 30.* *VAEISNER. III. p. 96.* Etejusmodi per anum egestus calculus *HOOKER Exp. p. 79.* Vesiculam replens *STORCK Ann. I. p. 129.* *SCHAARSCHMIDT 1740. n. 26.* *REDI Lettr. T. II. Magnitudine ovi gallo pavonis COE p. 113.* Cucurbitæ figura cum appendicibus *MOSEDER. Magnus 5 $\frac{1}{2}$. uncias longus pondere 14. dr. MEKEL T. X. p. 95.*

(n*) Nucis moschatæ magnitudine *RUSSEL tab. p. 166.* Moschatæ nucis mole per vomitum redditus *ORTESCHI diar. p. 283.* Similem *SOLEMANDER* ex vesicula fellea excidit: similem, cum pancreate scirrhuso habet *DANGEAU ad BAGLIV. p. 171.* In dysenteria epidemica *Journ. Sav. ann. 1756. m. Nov.*

(o) *Obs. nostr. I. 6. II. 12.* *TITSING van Steensnyden p. 17.* qui per alvum egestus est. Septem lapides cubici *LANCIS. Diss. X.* Tres magni nigricantes ex viridi *SCHURIG p. 143. 296.* Quinque pentagoni, nisi hi sunt classis sequentis *BARTH. C. II. hebdom. 54.*

(p) *HILDAN. Cent. IV. n. 44.*

(q) *MOSEDER p. 24.*

(r) *MOSEDER. ibid. de HAEN IV. p. 21.*

(s) *Obs. nostr. I. 2.* *MORGAGN. sed. caus. morb. II. p. 79.* *RUYSCH. n. 31.* *LIEUTAUD Essays p. 306.*

(s*) *SCULTET. obs. 61.*

(t) *ALBIN. adnot. L. I. III. c. 13.* *HEISTER Annal. Jul. 1726. Aug. MOSEDER p. 22.* *FANTON. p. 114.* *SCHAARSCHMIDT, ut puto.*

(u) *Obs. nostr. 13.*

(w) *Obs. 2. G. V. SWIETEN T. III. p. 107.*

bus (x), glebulis componuntur, friabiles iidem (x^*), & insipidi. Eam calcem crusta fere nigra (y), continet aut alba (z). Est ubi nondum in calculum ea calx coivit, sed arenosorum lapillorum (a), aut gypsi (b) calcisve, aut crustæ specie bilarios ductus obsidet (c).

Alias crystallini quid habent (d), & centrum, ex quo radii aliqui non valde bono ordine, nitidi, in ambitum exeunt.

Est ubi tunicati (e) cepearum ad morem sunt, ut bezoar illud animale solet, superficie plerumque glabra, nigra bile picta.

Aspera tamen alias superficies, aut his, aut crystallinis calculis est, ut cum aliqua mori similitudine granulis tota hirta sit (f).

Plerumque (g) ad ignem colliquefcunt, & funduntur fere ut cera sigilla-

(x) Obs. 1.

(x^*) Journ. med. ann. 1756. m. Nov.

(y) Obs. 2. Extus flavus intus viridis MORGAGN. adv. p. 60. Alterne flavi & viridis ibid. Albicantes subflavi SCHAARSCHMIDT l. c.

(z) COE p. 83. 99.

(a) COE p. 97. Sabuli WELSCHE Episagm.

(b) GEILFUS de mora p. 11. C. BAUHIN theatr. p. 114.

(c) FANTON. p. 114. POZZI p. 70. In cellulis KUYSCHE mus. rar. catalog. p. 161.

(d) PETERMAN. Crystallinus in pyramides diffiliens SCHINZ de calce n. 39. FANTON p. 114. de HAEN V. p. 51. HAGEDORN Cent. II. n. 8. BAGLIV. 433. Intus talcosus Journ. Med. 1760. Août & T. III. n. 1. Add. Bresl. Saml. 1719. MEKEL T. X. p. 9. TREW. Comm. Nor. 1743. h. 28. Pellucidus BETZOLD SCULTET. obs. 61. HELWIG obs. 81. HILDAN. VI. p. 58. Calculus in vesicula crystallis incrustatus Phil. transf. n. 209. Crystalliformis, pellucidus, felleus PETERMAN Scrut. icter. Pellucidus ille grandis SCULTET. obs. 61. Asperimus fuscus, cui multa fragmenta lucida FANTON. p. 114. Extremis finibus levis, cæterum asper CONTULI p. 64. Nigri quasi crystallini, ut sale facti BAGLIV. p. 433.

(e) MERRY Mém. de 1713. p. 112. 113. ALBIN. Adnot. L. III. c. 13. Mém. de Chir. T. III. p. 55. 56. MORGAGN. sed. & caus. T. I. n. 47. 48. BOSCHUS facult. anatom. 1570. BIANCHI hist. hep. l. p. 476. de flavescentibus calculis una mollibus tophaceis TACONI hepat. adfect. p. 320. BETZOLD f. 3. 4. In calculo ochreo, nucleo crystallino. BETZOLD n. 2. In cysticis TACON. Mém. de fist. II. p. 306. In vesicula lamellatus calculus BETZOLD Chilolith. f. 3. 4. In WALPOLIO Phil. transf. In magnis illis HILD. IV. n. 44. In variis HILD. II. o. 24. ALBIN. l. c.

(f) COE t. 2. p. 97. Moriformis Fränk. Anmerk. T. IV. p. 480. DAUBENTON III. p. 299. P. C. FABRIC. progr. 1759. Phil. transf. n. 209. MOSEDER p. 25. Bresl. Saml. l. c. REVERHORST t. 2 f. 4.

(g) Plerique ardent COE p. 99. MORGAGN. Ep. I. n. 49. In universum POSTER. factum p. 39. REVERHORST p. 48. NEBEL c. 5. Omnes nostri ignem conceperunt: sic magni illi per alvum egesti FRIDERICI SLARE ad KORNIG p. 30. 21. VALISNER. III. p. 593. Lamellati Mém. de Chir. l. c. Fuscus COE p. 99. Maximi MEKEL p. 95. Non lamellatus ille HEISTERI Leviores [magis inflammabiles sunt MEKEL] ibid. sic vomitu redditus BEKERI, tum Crystallinus & inflammabilis Bresl. Saml. TREW. Friabiles TACONI grandes Act. Erud. Hafn. De alvo egesti Journ. de medec. T. III. n. 1. HEISTER l. c. Mém. de Chir.

figillaris, flammamque etiam concipiunt, etiam qui cretacei & calcarii videbantur. Nempe in istis bilis abundat (*b*).

Est tamen ubi ardere recusant (*i*), ex magnorum virorum testimoniis. In his plus terræ est (*k*).

Natant per sæpe (*l*), merguntur alias (*m*).

Denique frequentissimi sunt (*n*) calculi minores unius, alteriusve grani,

Chir. T. III. p. 55. 56. *Assembl. de Beziere* 6. Dec. 1731. Flavos flagrare & guttatim diffundi BIANCHI p. 479. Hepaticos melius ardere IDEM ibid. Flavi ardent le ROI l. c. Etiam obscuri inflammabiles sunt DAVIDS p. 4. & virides TRICHMEYER p. 12. Etiam duri MOSED. p. 24. Flammam etiam concipiebat ille *Journ. med.* ann. 1759. & tubuli similes corticati BRENDEL. Plerique ardent *Journ. med.* ann. 1758. mens. Nov. Albos ardere MEKEL *Brot.* T. X. p. 98. eo magis quo leviores.

(*b*) COE p. 82.

(*i*) Virides difficulter ardere le ROI *Quæst.* 10. Add. MEKEL T. X. MORGAGN. p. 84. & non inflammari BIANCHI p. 479. RICHARD T. IV. p. 79 & cysticos minus bene BIANCHI IDEM ibid. & TACONI l. c. p. 306. nec crystallinos ignem concipere MEKEL. Non ardere albos arenosos COE p. 99. Magni illi non ardebant l. *Med.* 1756. Nov. Albos, cinereos, gypseos vix ardere, & ceræ modo fluere DAVIDS. Nigri non inflammabiles MORGAGN. l. p. 252. Magnos nigros non inflammari *Berlin. Mém.* T. X. p. 98. In febribus mesentericis nigri plerique non arserunt RICHARD *Epit.* III. p. 78. 79. Alius per anum egestus non inflammabilis *Journ. med.* ann. 1756. m. Nov.

(*k*) IDEM ibid.

(*l*) Tophacei BIANCHI l. c. Flavi plerumque MORGAGN. l. Ep. I. n. 45. 46. etiam nigri n. 46. Natarunt radiati *var. der Monde* l. c. tum aliqui apud COE p. 94. & crystallini TREW. in *Journ. de med.* l. c. In universum natæ, qui per anum reddebantur *Journ. med.* ann. 1756. m. Nov. SLARE ad KOENIG. REVENHORST. Lamellati illi BRENDLII. Fere natæ CHESLON p. 166. Sæpe FERNEL. *pathol. hep.* c. 22. MORGAGN. *Adv.* III p. 59.

(*m*) Flavi paulum macerati merguntur BIANCHI l. p. 475. Magnetem sequentes SCHURIG Magnus ille *Journ. de medec.* 1756. Nov. Utique post tempus subsident COE p. 95. Walpoli tres subsiderunt quasi politæ, & laminati *Phil. trans.* V. n. 49. P. I. p. 207. De ano egestus BUCHNER *misc.* 1730. Sæpe merguntur MORGAGN. *sed. morb.* II. p. 82. etiam nigri magni p. 84. Non omnes natant SCHURIG *lithol.* p. 248. Non illi in epidemica dysenteria *Journ. med.* l. c. Non sphaericus ille MORGAGN. *caus. sed.* II. p. 447. Magni sex non inflammabiles nigri p. 84.

(*n*) FERNEL *corp. human. delin. pathol.* L. VI. c. 10. BAUHIN. *bezoar.* C. GEMMA *cosinocrit.* p. 99. VESAL. *chir.* p. 251. MEKEL p. 96. BIRCH. T. III. p. 481. BORELL. *Cent.* III. obs. 22. WISLICIENUS. STRIN. BROMEL. BERGER. p. 220. SACHS. GAMMAROL. p. 100. *Phil. trans.* n. 300. PETERMAN *de ictero* CHIFFLET, BESSE *Thes.* app. 280. *Giorn. de Lett.* t. 29. p. 207. TACON. *Mém. di fific.* n. 2. *Act. Erud.* II. n. 21. STROHLEIN *calc. bil.* Obs. nostr. 26. *Journ. Sav.* 1723 m. Jan. BARTHOE. *med. Danor.* p. 43. VALISNER. III. p. 338. BETZOLD *de cholelith.* BERGER *Phil. trans.* n. 142.

grani, fere semper nigri (o); etiam pellucidi (o*), angulosi, figurarum polyhedrarum (o**), quæ videntur aliquid cum granatis simile habere (p), in quibus sæpe adgnoscas rotundos (q) fuisse, & hedras per frictionem natas (r) esse. Sæpe lamellati sunt (r*). Est ubi multi in unum quasi conglutinantur (s). Numerosi sunt (t), de hoc genere calculi, non ad viginti, sed ad centum (u), ad 150. (w), ad 200. (x), ad 500. (y); etiam ultra mille, & ter mille (z).

Plerique eo pertinent, qui per ulcus aliquod exeunt quales sæpe vidi (a).

Hi

(o) FERNEL. C. BAUH. MEKEL &c.

(o*) HELWIG *obs.* 81. Crystallini aliqui inter 500. MEKEL.

(o**) GEMMA, VESAL. *Chin.* p. 251. *Journ. med.* III. n. 1. GUIDETI, GMERLIN, BILLEBAULT *Journ. med.* 1756. m. Apr. 1757. m. Novembr. HELWIG *obs.* 81. MORGAGN. p. 217. & *Opusc.* T. I. VOGEL. BROMEL *Act. Lit. Suec.* 1726. p. 133. BERGER p. 12. BECKER. GMERLIN *Phil. transf.* n. 142. C. BAUHIN. *bezzar.* p. 157. Triginta tesseram referentes ROLFINK *de calc.* In hydropica triginta per anum excreti trianguli lithogenes. Angulosi 32. in folliculo GEMMA p. 95.

(p) GUIDETI I. Non vero corpore regulari MORGAGN. *Ep.* I. n. 44. 45.

(q) Etiam flavi STEIN, etiam rotundi IDEM. HEYDE *disc.* p. 160.

(r) Tesseram referentes triginta ROLFINK *de calc.* CONNOR. HOFMAN *mus.* p. 95. 96.

(r*) *Phil. transf.* n. 142. BERGER. BILLEBAULT. Ex centro radiati *Journ. med.* III. n. 1. VOGEL *Anmerk.* p. 63. ORTLOB. C. BAUHIN.

(s) COR p. 117. FANTON. *anat.* p. 114.

(t) Plurimi ORTLOB Multi nigri *Edinb.* II. n. 27. Numerosi ex alvo egesti. *Journ. med.* III. n. 1. Calculi 36. & innumeri in ductibus bilariis MATANI. *Excerpt. lit.* 1761. T. IV. in ictero. Calculi 53. VITI *dial.* p. 109. Calculi 67. HELWIG. Calculi 70. quasi cubici intus bile madidi, crusta alba MORGAGN. *Sed.* I. p. 217. Calculi 60. nucleo resinoso, splendentes, extus fosci LUDWIG *progr.* Uno die 70. egesti de ano COR p. 154. Post icterum egesti 72. PETERMAN Calculi 82. COLLOT. p. 6. Manipulus ex legato lusitanico extractus *Phil. transf.* n. 282.

(u) Centum in ictero ten. RHYNE *vet. med.* p. 222. Centum per anum egesti BIRCH. T. IV. p. 321. Super centum congesti COR p. 120. Centum & ultra BROMELL. *Act. Lit. Suec.* 1726. p. 133. & ultra TROTTER *de lethargo* p. 124. HEYDE *disc.* & 130. BOEHMER *præf. obs.* p. 17. Calculi 140. REVERHORST p. 16. In icterico lapilli 145. TACONI 316. seq. BECKER *post. l. de submers. mort.* sine aqua. *Obs.* II.

(w) Lapilli 151. subflavi, duri Eph. *Nat. Cur.* Vol. X. *Obs.* 36. 181. STEIN *lithogen.* 157. STORK *ann.* II. 165. Ad 180. GMELIN *cholelith.* Ad 182. butyracei non amari GMELIN.

(x) Plus ducentis in iracunda FABRIC. *progr.* ad HOFMAN. Ducenti in vesicula Eph. *Nat. Cur.* Vol. X. *obs.* 36. Sensim ad 200. calculos egestos haber VOGEL 5. *Anmerk.* Ducenti septem in vesicula *Journ. med.* 1757. m. Nov. Ducenti G. V. SWIETEN III. p. 132. 133. ex vetula CHIFFLET *obs.* 41. STORK *ann.* p. 126. Eph. *Nat. Cur.* II. *ann.* I. Calculo 300. RHOD III. n. 2.

(y) Ad 500. MEKEL T. X. p. 97. Conf. MORGAGN. *sed. morb.* II. p. 79. Centum in ictero excreti, inde alii 300. RUSSEL. *tab.* p. 163.

(z) MORGAGN.

(a) LITTLE *ann.* 1704. *hist.* 15. &c.

Hi mihi semper visi sunt arsisse (*b*). Non ita aliis claris viris (*b**). Fundum petunt (*c*), sæpe, non semper (*d*).

Neque a ductu cystico absunt. In eo calculus 20. granorum immobilis (*d**). Ductus cysticus, quasi tartaro obstructus (*d***). Inter ejus valvulas calculos vidi (*d*†).

Superfunt calculi hepatici (*e*), qui in ductu hepatico aut choledochu reperiuntur (*e**), inque ejus ductus quasi sacculis. Inde ostium digito capax, puto, a transmissis calculis (*f*). Varia figura sunt, subrotundi (*g*); etiam angulosi (*b*).
&

(*b*) TACCONI *Mém. di físic.* II. p. 306. VISLIGEN *lapid. bilios. lymph.* STRÖMLIN. FABRIC. *progr. ad disp.* HOFMAN. VANDERMONDE III. P. I. POZZI *Epist.* p. 69. BROMEL. PETERMAN. BERGER. MEKEL. De fuscis BESSE *Thes. app.* p. 280. 281. Plerique inter 120. minores MORGAGN. *Adv.* III. p. 60. Calculi 4. subcubici *sed & caus.* p. 287. & 16. alii II. p. 48. Per anum egesti *Journ. med.* 1756. m. Nov. Ducenti & ultra FABRIC. ad HOFMAN *progr.* Alii 70. MORGAGN. *Hist.* I. p. 217. Calculi 120. BROMELII.

(*b**) Non omnes MORGAGN. l. c. Non qui crySTALLINI MEKEL T. X. p. 97. Non unguinosi illi GMELIN. Non nigri 15. MORGAGN. *Sed.* II. p. 355. Non illi in *Opuscul.* MORGAGN. duri fundum petentes, liquecebant tamen. Non illi 200. aculeati fundum petentes N. *Eph. Nat. Cur.* Vol. II. obs. 1.

(*c*) FABRIC. PETERMAN. BERGER *Eph. Nat. Cur.* Vol. X. obs. 36. Utroque loco TACCONI. FABRICII ducenti. Nigri 19. MORGAGN. *Sed.* II. p. 355. & alias *Opusc.* T. I. Ferrei DOLMI *Epist.* IV. aculeati 200. N. *Eph. Nat. Cur.* Vol. II. obs. 1. Non penitus natabant VIRIDET *bon chyle* p. 632. Pars exterior fundum petebat PETERMAN.

(*d*) Natantes *Hist. de l'Acad.* 1704. n. 15. *Journ. de med.* III. I. 1756. m. Nov. 1758. m. August. *Phil. transf.* Vol. II. p. 549. *Suppl.* 192. GMELIN P. I. MORGAGN. n. 45.

(*d**) STORK. *ann.* I. p. 150.

(*d***) POZZI p. 69.

(*d*†) Etiam LUDWIG *de viis bilis cystic.*

(*e*) Jam BENIVENIUS habet c. 3. In bibacibus BAYNARD. p. 381.

(*e**) REVERHORST t. 2. f. 1. In venis hepatis CAMENICENUS ad MATTH. p. 324. In sacco duodeno facto viginti intus micantes *Hist. de l'Acad.* 1710. n. 3. In ductu hepatico ossescentia dentata AË. Budissin. p. 376. & innumeri calculi MATANI *Excerpt. Litt.* 1761. T. IV. Calculus in ostio duodeni ductum obstruens SCULTET obs. 61. Calculi 136. in ductu hepatico ORTLOB n. 17. Ductus choledochus dilatatus in saccum, in quo 20. calculi non inflammabiles *Comm. Bonon.* IV. p. 35.

(*f*) HEISTER *annal. jul.* 1722. p. 129.

(*g*) Duo avellanæ mole VIEUSSENS obs. p. 449. Ovi mole in funiculum contractæ ALBIN. apud SAVASTO *lithogenes.* Moriformes obs. nostr. h. 7.

(*b*) BARRIER *Nov. obs. anat.* p. 133. seq. DILTHEY obs. 8.

& numerosi (*i*), ut in fellis vesicula, inflammabiles (*k*), flavi (*l*), alias tamen sterrei & non inflammabiles (*m*). Alias, uti in bubulis ductibus, ramosi (*n*), ut bilarii ductus nonnunquam materia calcarea claudantur (*o*). Concrementa in ductibus bilariis levia (*p*). Duo avelanæ mole in choledochus (*q*). Et in vesicula fellea calculi & in ductibus bilariis (*r*).

Etiam arenulæ in hepate reperiuntur (*s*), ut ægri pro pulmonicis haberentur (*t*). Calculi per hepar in arthritico (*u*). Hepar sphæris gypseis plenum (*w*). In Barbado patritio calculus in hepate (*x*). Quatuor calculi in gibbo hepate (*y*). Hepar argilla pene plenum (*z*). Huc refero fere sex cylindros cartilagineos, ex cava parte hepatis in convexam penetrantes (*a*).

Denique potest in hepate calculus ex rupta vesicula advenisse (*b*). In hepate sacculus, in quo septem calculi angulosi inflammabiles (*b**).

§. XIII. *Bilis analysis Aer in bile.*

Est non absque cauto iudicio corporum naturam ex iis mutationibus definire

(*i*) Centum LENTIL jatrocinem. Centum triginta sex ORTLOS l. c. n. 17. Add. MATANI Excerpt. lit. 1761. trim. 4. Ductus choledochus plenus calculis bilariis TRAFELMAN.

(*k*) BARRERE. TACCONI p. 307. BIANCHI p. 479.

(*l*) BIANCHI p. 479.

(*m*) Comm. Bonon. T. IV. In sacco ductus choledochi dilatati. MORGAGN. Ep. I. n. 47. CAMERAR extispic. hepat defunctor. In animalibus frequens CONTULI p. 60.

(*n*) BIANCHI p. 480. PLATER. obs. 13.

(*o*) POZZI p. 70. FANTON. p. 114. RAYMOND II. p. 244.

(*p*) CHESELDEN p. 186. aid. Comm. Litt. Nor. 1738. hebd. 18. In animalibus frequenter sabula in hepate CONTULI p. 60.

(*q*) VIEUSSENS obs. p. 449.

(*r*) Comm. Nor. 1738. n. 18.

(*s*) Principis Poloniæ CONNOR. l. c. In bibace VIRIDET bon chyle p. 9. In animalibus CONTULI lap. 8^o pod. p. 60.

(*t*) LA METTRIE obs. 63.

(*u*) CHIFFLET obs. 46.

(*w*) RENEAUME des hernies p. 114.

(*x*) CARDAN variet. p. 334.

(*y*) FONTAN. ad VESALII Epist. p. 21.

(*z*) LANCIS subit. mort. l. c. XI. In eo tophacea sabulosa materies CAMERARIUS extispic.

(*a*) STORK ann. I. p. 120.

(*b*) COE p. 77.

(*b**) BARRERE obs. d'anat. p. 133. seq.

definire licet, quæ ignis in corporibus excitat, habent tamen prudenter adhibitæ aliquam utilitatem. Aer in bile proditur in spuma, quam in vacuo (a) spatio agit; in colore prius etiam spumat, quam aqua communis, & gradu fere 104. FAHR (b).

In calculis etiam felleis maxima copia aeris est, ad 108. uncias re-plens in lapillo sexta parte uncix non majori, adeoque ad 648plam molis prioris portionem, quæ totius calculi fuit (c).

§. XIV. Aqua.

Ut in omnibus humoribus humanis maxima portio aquæ est, sic in bile. Ea ex recente bubula (a) fere bile, lento igne & leni abacta insipida prodit, non acris (b), odore singulari, sub moschato (c).

Portio in GAUBIANIS experimentis fuit 112. part. 128marum (d). CL. STIER habuit earundem partium 88. (e). CASSIUS partes 110 (f). P. VERHEYEN 111. & pene 112. (g), J. C. BARCHUSEN partes 117. (h). GHIARESCHI ex bove 109. (i), ex vitulo pene 88. quod non satis videtur respondere (k). F. HOFMANNUS partes 114. (l). Pancratius BRUNO partes 116. (m). P. C. HARTMAN partes 103. (n), & alias 94. (o). C. DRELINCOURT 106. (p).
J. N.

(a) HARTMAN de bile.

(b) VISSCHER n. 44.

(c) HALES *vegetab. statik.* p. 190.

(d) Omnia pondera reduxi ad libram 128. drachmarum.

(e) HENNINGER & C. STIGBLIUS ad HILD. VISSCHER.

(f) CARTHEUSER l. c. p. 469. MEAD. of pois. p. 34.

(g) VISSCHER n. 45. NARCISS. n. 8. Habet etiam HEUVERMAN III. p. 783. & HAYMAN *Comm.* III. p. 458.

(h) *Hamburger Magaz.* T. VI. p. 399.

(i) *De triumvir. intest.*

(j) L. II. p. 28.

(k) *Post acroam. Exp.* 6.

(l) *Giorn. di Parm.* 1687. p. 193.

(m) *Ibid.*

(n) *De bile med. & venen.*

(o) *De bile.*

(p) *De bile.*

(q) *Ibid.*

(r) *Epimew. de liver.*

J. N. PECHLIN. 117. (q). PARISINI tantumdem (r), Cl. SCHAFER partes (s) 116. Multum non addito pondere alii (t).

Digesta bilis dedit aquam magis urinofam, ut quæ fecerit viridescere syrupum violarum, ad partes 88. (u).

Et bilis ex pecoribus luc consumtis aquæ dedit partes fere 102. (w).

Post Cl. VISSCHERI experimenta sapa, sive extractum superfuit, quale diximus (x). Ejus dosis fere fuit quartæ partes totius bilis.

§. XV. Spiritus.

Putredo aquæ sale volatilem præmittit.

Recens post bilis aquam dat aquæ multo sale volatili (a) imprægnatæ, fætidx & lixiviosæ portionem aliquam, ignei coloris. Ejus liquoris pondus pauci dederunt. Habuit tamen BARCHUSEN ejus partes 2. HARTMAN (b); sed cum oleo misti spiritus partes 4. CASSIUS partes pene 5. (c). D. KNIGHT pene 3. (d). Cl. SPIELMANNUS spiritus alcalini non minus quam 40. & spiritus medii 32. partes (e) BARCHUSEN. VISSCHERUS cum sale volatili partes $6\frac{2}{3}$. (f). BRUNO pene 7. HOFMANNUS pene 11. Clar. SCHAFER $14\frac{1}{2}$. Olei cum sale volatili, puto & spiritu mistis $5\frac{1}{2}$. DRELINCOURT (g). VERHEYEN pene 17. HARTMAN alias pene 32. (h).

§. XVI. Oleum.

Multis modis oleum in bile ostenditur, quod in eo liquore abundat,

(q) Metam. Apoll. & Aesculap. p. 199.

(r) Anc. Mém. II. p. 27.

(s) De corpusc. sang. p. 28.

(t) VISSCHER NARCISSUS.

(u) p. 1254.

(w) l. c. p. 379.

(x) p. 559. 560.

(a) EDIT. DVM. CHRIST. l. c. Cum sale tartari addidisset extracto sanguinis spiritus alcalicus prodiit HOFMAN l. c.

(b) Per alembicum.

(c) l. c.

(d) l. c.

(e) Instit. Chim. p. 179.

(f) VISSCHER n. 46. Ad sanguinis spiritum uti. 10 12.

(g) p. 805. Unciam in 14. unciis

(h) Per retortam.

dat, nam & *extractum* debile inspissatum ardet (*a*), & calculi fellei plerique flammam concipiunt (*b*) atque deflagrant, & HOMBERG IUS alumine cum bile concusso (*c*) solidum de ea adipem ad tundum vasis deiecit. Sic ex uncis duabus bilis cum drachmis duabus tartari elixatis habuit scrupulos duos amari adipis (*d*). Loco vesiculæ fellis, quæ nulla aderat, HARTMANNUS in suis plusculis adipis globum reperit (*e*).

Porro quando humor de bile pene omnis abactus est, adscendit oleum (*f*), levius primum spiritu, & flavum, rubrum, lentum: deinde alterum gravius quam spiritus est, piceum, nigrum, empyreumaticum (*g*).

GAUBIUS oleum leve seorsim appendit & invenit fuisse partium quatuor (*h*). Oleum vero grave GAUBIUS partis (*h**), non integræ & fere ad $\frac{2}{3}$. Parum TACONUS (*i*). Reliqui commiscuerunt: BARCHUSEN olei fætidissimi, ut vocat, habuit $5\frac{1}{3}$. & olei crassi CASSIUS pene 10. Cl. KNIGHT partes fere $3\frac{1}{2}$. (*k*). VERHEYENIUS non penitus 3. sed perierat plusculum, præter id oleum, quod in spiritu hæret. PARISIINI $4\frac{1}{3}$. DRELINCOURT supra 5. Cl. SPIELMANN 4. Olei cum spiritu misti SCHAPER partes 3. Etiam in putrida superest bile. In felle animalium a lue occisorum nondum 2. Cl. STIEF minus, quam in sanis armentis. Suilla bilis dedit 11. 16omas five fere 8 (*l*). HARTMANNUS non separavit.

§. XVII.

(*a*) p. 566.

(*b*) p. 567.

(*c*) l. c. p. 366.

(*d*) SCHAPER p. 28.

(*e*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 7. obs. 23.*

(*f*) VISSCHER n. 46. DOSSIE I. p. 460. HARTMAN.

(*g*) VISSCHER 46. HARTMAN. In altera analysi totum oleum in spiritu natavit.

(*h*) VISSCHER n. 46. Rubrum non fætidum *Eph. Nat. Cur. Vol. X. obs. 91.*

(*h**) Nigrum fætidissimum *Eph. Nat. Cur. l. c.*

(*i*) *Opusc. med. phys. II. p. 311. ex femina.*

(*k*) IDEM semidrachmas 49. ex uncis 110.

(*l*) Du HAMEL *Hist. Acad. p. 247.*

§. XVII. *Sal volatilis.*

Plurculi auctores, qui bilis analysin sunt adgressi, omnino salem volatilem separare non potuerunt (a). Pauculum alii admiscerunt (b), & abundius auctores *Collect. Chym. Leidens.* (c). NEUMANNUS invenit $\frac{1}{3}$. BRUNO non supra $\frac{1}{2}$.

In bile animalium lue enectorum habuit Cl. STIER, fere ad $\frac{1}{4}$.

§. XVIII. *Carbo.*

Postquam abactum est oleum, carbo superest, uti de sanguine solet, nigerrimus (a), falso sapore. Copiam NEUMANNUS fecit $4\frac{1}{3}$. VISSCHERUS 4. SCHAPER fere perinde. Ex eo incenso fuligo (b), fere insipida ad collum (c) retortæ aliqua surgit. Is carbo incensus deflagrat, cineremque relinquit, in quo est salis fixi exigua portio (d), cujus lixivium cum acidis effervescebat (e). Invenit $\frac{1}{10}$ fere NEUMANNUS (e*). Cl. STIER æstimavit ad $\frac{1}{23}$. (f). C. DRELINCOURT pene ad $\frac{2}{3}$. (g). Minus dimidia parte (h) PARISINI (i). F. HOFMAN omnino ad integram partem (k): sic BARCHUSEN. Tantumdem BRUNO & paulo ultra. Sic etiam HARTMANNUS (l), non tantum, sed tamen ultra 1. SCHAPER ad 1. & $\frac{1}{3}$. KNIGHT. fere $1\frac{1}{2}$. (m).
A pu-

(a) HARTMAN, VERHEYEN II. p. 90. BARCHUSEN, TACONI, GAUZIUS *Comm. Mor.* I. c.

(b) DOSSIE, VERHEYEN p. 88.

(c) p. 131. 132.

(d) DEMOCR. CHRIST. VISSCHER n. 46. HENNING 52. n. 4. TACONI. DOSSIE. SPIELMANN *Eph. Nat. Cur. Vol. X. obs.* 94.

(e) HARTMAN, TACONI ad $\frac{23}{256}$.

(e*) HARTMAN I. c. HEUERMAN.

(d) VISSCHER n. 46. NARCISSUS I. c. HEUERMAN T. III. p. 785. *Comm. Litt.* TACONI Abunde DEMOCR. CHRIST.

(e) *Eph. Nat. Cur. Vol. X. obs.* 95.

(e*) p. 1254.

(f) Drachma in 192. partibus p. 806.

(g) VERHEYEN p. 88. impuri vero duplum.

(h) *Anc. Mém.* II. p. 27. nempe 5. dr. ex Lib. VI.

(i) I c.

(k) Unc. 18. gr. 73. Alias tantum $\frac{1}{8}$, nempe gr. 7. ex drachmis 77. & gr. 7.

(l) Drachmas 10. ex drachmis 880.

(m) VISSCHER n. 47. NARCISS.

A putrida bile nullus carbo superest (*n*), cum ea degeneratio omnes sales volatiles reddat. Ex sale marino ortum esse nuperi (*o*).

Cum eo sale etiam terræ (*g*) aliquid de lixivio superest. Eam ad 2. æstimat BARCHUSEN.

§. XIX. *Analysis calculorum vesiculæ felleæ.*

Cum ii, certe qui sunt de classe inflammabili, bilis fere sint inspissata, non putavi id præsidium detegendi veri negligi debere, quod potest a calculorum analysi colligi. Insipidi fere sunt (*a*), tamen etiam amari, certe nucleus (*b*). Aliqui in aqua solvuntur, non quidem omnes (*c*) Solvuntur etiam a salibus lixiviosis, quale tartari oleum est (*d*).

In spiritu terebinthinæ optime colliquescent (*e*), etiam in oleo, certe aliqui (*f*).

In spiritu vini aliqui solvuntur (*g*), alii non mutantur (*h*): aliqui tamen dederunt tincturam amaram (*i*), fere ut succinum. In spiritu nitri tenerescunt (*k*), & solvuntur, & nonnunquam cum acore saturato fervent (*l*). Cum oleo vitrioli non fervere lego.

Etiam in raphani rustici succo (*m*), crusta exterior mollescit, & in succo cochleariæ (*n*), atque nasturcinarum plantarum hi calculi solvuntur, ut arena sit in alvi excrementis (*o*).

Etiam

(*n*) STRUVE Exerc. III. p. 159.

(*o*) Ibid.

(*p*) Comm. Litt. Nor. 1. c. TACONI. SCHAFER.

(*a*) Mém. de Chir. T. II. p. 586. Non amaros esse HARTMAN c. 5.

(*b*) Eyb. Nat. Cur. Vol. X. obs. 91.

(*c*) MOSEDER p. 14.

(*d*) HALES p. 192. WISLICHEN.

(*e*) Giorn. de Letter. T. XXXII. p. 146. 147.

(*f*) TACONI p. 320.

(*g*) STRÖHLERIN. Comm. Litt. 1737. h. I. Fervere cum eo spiritu GREW p. 252.

(*h*) VALISNER.

(*i*) KNOLLE.

(*k*) TACONI Mém. di Fisic. II. p. 308.

(*l*) De nucleo VIREUSSENS obs. p. 223. de calculo GREW p. 252. qui de spiritu vitrioli negat. Etiam cum aqua forti fervent le ROI. Negat solvi de suis, nitidis, per anum ejectis inflammabilibus calculis VALISNER. III. p. 593. Negat, Comm. Lit. 1743. hebdom. 28. Negat Cl. BETZOLD.

(*m*) De VRIES p. 27.

(*n*) p. 28.

(*o*) BORRMAAVE de calcul. p. 8.

Etiam in universum succus vegetabilium recentium icterum sanat (*p*). & fecit, ut calculi fragmenta prodirent (*q*); & in hungaricis bobus, adeo crustis bilariis infestatis, uti diximus, recens & vernale gramen malum ita solvit, ut Viennæ nullus calculus supersit (*r*), quo aguntur.

Porro, qui calculi inflammantur, solent carbonis aliquantum cinerisve (*s*) relinquere.

Ignе subjecto calculi mollescent & liquefcunt, ut cera sigillaris; deinde phlegma adscendit (*t*). ad paucas guttas, & oleum flavum (*u*), porro rubrum, denique nigrum empyreumaticum, oleo tartari simile: & mansit carbo ater (*w*) & splendidus.

Plus omnino olei continent, quam urinarii calculi (*x*). Id oleum ob empyreumate repurgatum gratum odorem spirat (*y*). Idem cum spiritu acido minerali coit (*z*), inque crystallos abit.

Bilis in vesicula fells reperta, cujus ductus obstructi erant, insipida, nauseosa, ad ignem coagulabilis, ab admisto oleo destillato deponebat terram calcariam, dabatque spiritus salis odorem (*a*).

Totum hepar cum vesicula destillatum dedit spiritus alcalini partes $\frac{1}{12}$. olei flavi non tenacis $\frac{7}{104}$. (*b*).

§. XX. Horum experimentorum corollaria.

Supereft, ut quantum ejus fieri poterit, ex iis, quæ produximus, experimentis indolem bilis definire tentemus.

Quid non sit, primum dicemus (*a*). Nempe non acida est bilis, &

(*p*) CHESELDEN p. 167.

(*q*) G. V. SWIFTEN p. III. 134.

(*r*) KRAMER l. c.

(*s*) MERKEL p. 96. COE p. 99. BETZOLD.

(*t*) STRÖHLEIN & ex eo, ut puto, KNOLLE *Oeconom. Anmerk.* p. 373.

(*u*) *Eph. Nat. Cur.* Vol. X. obs. 91.

(*w*) STRÖHLEIN.

(*x*) HALLER l. c.

(*y*) *Eph. Nat. Cur.* l. c.

(*z*) Pumici comparat WISLICIENUS.

(*a*) LUDWIG *de viis bilis cyst.*

(*b*) SPIELMANN p. 179.

(*a*) VALESNERI l. c. Acidam esse, cum ex vervece sumta cum spiritu vitrioli lactescat VIEUSSENS *Phil. transf.* n. 241. Sed id experimentum nullum acidem demonstrat. Tinctoriâ partem acidam esse cum oleo, FLOYER.

& adeo vehementer ab ea indole recedit, ut nullum acoris (b) vestigium, in ea sola inter humores humanos, reperiamus, ne in oleo quidem, cujus elementum salinum acidum esse solet. Quod cum terra fervet in atra bile (b*), videtur ex cibis in acorem conversis esse.

Neque est alcalina. Qui Cl. Viri magnam in bile salis volatilis (c) copiam dixerunt, vehementer aberrarunt ab experimentis. Cum enim ex sanguine, urina, aliisque partibus humani corporis manifestus adscendat, & copia, de sanguine, non exigua (d) prodeat, ex bile aut nullus obtinetur, aut nulli proximus (e).

Etsi nunc porro de bile spiritus volatilis adscendit, in quo volatilis sal cum oleo mistus contemperatur, etiam a sanguine bilis vincitur; sunt enim in bile, secundum optima experimenta, partes similes decem (f), quarum ex sanguine partes similes prodierunt duodecim (g).

Contra bilis olei copia vincit, quæ sit, per eadem experimenta 7. partium, quod in sanguine quatuor partes paulum superet; cum tamen GAUBIANÆ (h) rationes sint inter eas, quæ olei in sanguine copiam parcissimam faciunt. Bilis est adeps lymphæ mistus VIEUSSENS (i).

Neque in sanguine is odor moschatus (k) est, qui in bile: sed neque eadem terræ copia. Etsi enim non valde certa de ejus elementi ex bile educti portione experimenta habemus, manifesto tamen calculi in bile adeo frequentes, in sanguine vero ejusque polypis nunquam visi, ostendunt portionem terræ in bile superare.

Inde etiam pondus, quo cum suo multo oleo, tamen sanguinem aliquando excedit (k*).

Acrior

(b) DEMOC. CHRIST. p. 52. Spiritum tamen medium SPIELMANNUS vocat.

(b*) GALEN. *method. medend.* L. XIV.

(c) SYLV. *diff.* II. c. IX. n. 30. de Ictero p. 593. *Collect. Chem. Leid.* BONNERKOE I. p. 17. Sola continet alcali COLEBATCH. *doctrine of acids asserted.* p. 443.

(d) Ad usque $\frac{1}{8}$. five $2\frac{1}{2}$. nostri calculi, quo hic usi sumus L. V. p. 105. 106.

(e) p. 574.

(f) VISSCHER p. n. 60. Conf. L. V. p. 105.

(g) Ibid. VISSCHER.

(h) VISSCHER l. c.

(i) *Obs.* p. 215.

(k) p. 558. 560.

(k*) p. 547.

Acrior est sanguine, cum sapore sit vehementissimo, qui in cruore modice falsus sit. Etiam magis penetrabilis est, cum sanguis raro ex suis viis exsudet, bilis facillime.

Habet adeo id peculiare inter humores humanos, quod cum eadem fere aquæ copia portionem olei amari & penetrabilis majorem admistam possideat, cui sal volatilis urinosus admistus est.

Cum præterea per experimenta bilis olea aquæ reddat miscibilia (l), etiam ea dote ad saponem accedit, cum quo a Cl. viris numerata est (m), etsi utique sapo, qui ficcus sit, in eodem pondere multo plus salis continet (n). Oleum etiam, quod in sapone salis lixivi portionem æquat, superat in bile. Habet enim se ad spiritum ut 7. ad 10. (o). Sed spiritus maxima pars aqua est, ut ea portio vix adpendi possit, quæ ad sale pertinet.

Cum acor concentratus calculos felleos resolvat, non credas ab acore eos nasci. Ob vinum acidum certis locis abundare legi (p); & in bibacibus frequentes esse. Sed ostendi (q), in regione cerevisia pene sola utente maxime frequentes esse, tum nostris in feminis, quæ tamen vulgo solum aquam bibunt.

§. XXI. *Motus bilis. I. Per ductum choledochum in duodenum.*

Cum de hoc motu diversissimæ sententiæ fere a primis medicinæ temporibus per scholas regnaverint, oportebat caute in his litibus progredi, neque admittere quidquam, nisi quod fuerit irrefragabile.

Et primo ex hepate bilis per ductum hepaticum in choledochum, hinc in duodenum fluit,

Etsi hæc valde evidentia videntur, tamen, cum & olim (a), & nuper (b) sit propositum, bilem de hepate omnem prius in vesiculam divertere

(l) p. 549. 550.

(m) BOERHAAVE &c.

(n) IDEM *Elem. Chem.* II. prop. 73.

(o) In GAUBIANIS.

(p) *Journ. de medec.* T. III. n. 5.

(q) *Obs. patholog.*

(a) GALEN. *us. part.* L. I. c. 3. *Facult. nat.* L. II. c. 5.

(b) LAURENTIUS p. 315. G. COLE *secret anim.* c. 14. LISTER *de humor.*

p. 69. BRANCHUS P. I. c. 18. 19. SEGER n. 6. LIEUTAUD *physiol.* p. 142. *Eguz* p. 305.

vertere, quam ad intestinum veniat, oportet addere aliqua ex communi lege fluentium corporum sumpta.

Canalem hic habemus, ab hepate ad duodenum continuum (*c*), absque ullo angulo (*d*), aut ulla valvula, viamque rectissimam & deorsum ducentem in duodenum usque. Hæc via est, quam proponimus. Eam cur bilis de hepate non sequatur, ad versarii nostri tenentur ostendere.

Difficilius (*f*), equidem bilem ex hepate in vesiculam fluere credas, per viam sursum ducentem, valvulis impeditam, anfractuosam, ad angulum omni fere alio angulo minorem (*g*). Damus tamen fluere, sed certe per hepaticum facilius fluet in choledochum.

Porro ductus hepaticus cystico quidem major est (*h*), at minor choledochus, qui est communis utriusque truncus. Id argumento est, & hepaticam bilem, & cysticam, in choledochum convenire, cysticum vero ductum hepaticam bilem non omnem recipere.

Denique, si reponas (*i*), ductum choledochum in vivo animale ab intestino certis temporibus stringi, quod continuo admittemus, non ideo in vesiculam omnis & perpetuo fluet. Id, si fieret, equidem & hepatica bilis, & cystica, nullam haberent viam, per quam id receptaculum inaniretur, quod quidem a vero abludit. Si adeo tempus est aliquod, in quo bilis cystica libere in duodenum intestinum effluit, eodem tempore etiam bilem hepaticam æquum est, viam in intestinum habere facilem.

Neque experimenta dissentiunt. Quoties enim ductus choledochus in fine suo contractus fuit (*k*); aut a scirrhuso (*l*), pancreate coarctatus; aut ab alia quacunque causa angustior; aut demum a manu incisoris (*m*) vinculo

(*c*) p. 505.

(*d*) Conf. p. 506.

(*f*) Vide p. 582.

(*g*) p. 529.

(*h*) p. 530.

(*i*) LIEUTAUD & alii Cl. Viri.

(*k*) Mém. de l'Acad. 1704. p. 157.

(*l*) CHESLEDEN p. 166.

(*m*) CABROL. obs. p. 16.

vinculo (*n*) constrictus, aut tota vesicula excisa (*o*), aut ea alioquin inutilis est (*p*): toties etiam & ductus hepaticus intumuit, & quidquid choledochi supra vinculum fuit. Etiam aer in hepaticum porum impulsus choledochum facilius subiit (*r*). Interceptus denique a calculo ductus choledochus sub ea sede in funiculum abiit (*t*).

Iterum in vivo animale iter bilis ad duodenum ad oculum adparuit, quando ductus cysticus vinculo interceptus (*u*), aut vesicula fellea evulsa fuit (*w*). Bilis enim sub oculis incisoris choledochum ductum tumefecit (*x*), & in duodenum defluxit, idque replevit (*y*), aut in phialam, ductui choledochi appensam (*z*) stillavit. Cum callus porum choledochum constrinxisset, fuit amplissimus (*a*).

Cum denique adversarii objicere possint, adstricta legitima in vesiculam via non aliam superfuisset, etiam absque eo vinculo in aliis experimentis hepatica bilis, per suas dotes facile adgnoscentia (*b*), de ductu choledochi vivi animalis in duodenum intestinum effluxit, aut in abdomen (*c*), quando id iter interceptum fuerat, aut demum in phialam experiundi causa appensam (*d*). Presso etiam hepate bilis in idem intestinum effluit (*e*). Cum hepaticus ductus dilatatus esset præter modum, choledochus pari ratione dilatatus fuit (*f*).

Recte

(*n*) BOHN p. 232. MALPIGH. *de liene* p. 120. SEGER p. 21.
 (*o*) VERHEYEN II p. 80. FILS *de liene* p. 145. GRUDER *de ferment.* p. 211.
 EYSSA *de morb. reg.* BOHN. p. 232. & inprimis EWALD *de somno*, ubi bilis multa fuit.

(*p*) LUDWIG.

(*r*) GIERING p. 360. 361. 362.

(*t*) ALBIN. apud SAVASTO *specim. litbogones.*

(*u*) VERHEYEN I. C. MALPIGH. I. C. BOHN. p. 232.

(*w*) In cane BARTHOL. *Cent. II. hist.* 82.

(*x*) MALPIGH. *de hep.* p. 71. VERHEYEN p. 80.

(*y*) VERHEYEN, MALPIGH. *hep.* p. 72. *de liene* p. 120.

(*z*) TESSOP apud PUCHLIN. *purgant.* p. 502. 503.

(*a*) In cane BARTHOL. *Cent. II. hist.* 82.

(*b*) BOHN. p. 236. SEGERUS ipse n. 5. *Metam apoll. & escalap.* p. 15.

(*c*) MALPIGH. *hep.* p. 72. BOHN. p. 232.

(*d*) REYERHORST p. 32. MURALT *rademsc.* p. 78.

(*e*) GIERING I. C. p. 360. CALDISI p. 39.

(*f*) LUDWIG I. C.

Recte ita RUFUS (g), FALLOPIUS (h), & Julius JASOLINUS (i), & plerique (k) nuperorum, bilem per ductum choledochum perpetuo excerni docuerunt, tum qui nuper de industria inquisivit Cl. GIERING (l). Sed etiam VESALIUS (m) admiratus est, cur bilis non recta ex jecore in duodenum veniret.

§. XXII. II. Ex vesicula fellea, fluit in duodenum.

Minus est dubii in hac thesi. Pressa certe vesicula vel in vivo animale (a), vel in cadavere (b), bilis in ductum choledochum & duodenum (c) intestinum exit; ægriuscule nonnunquam, ob valvulosum ductum cysticum (d), & aer etiam vesiculæ impulsus intestina subit (e): vicissim flatus de ductu choledocho (f), aut aer de intestino redux (g), etiam spiritus vini (h), vesiculam subit, neque id facillime (i). Sæpiissime eam, suo viridissimo colore conspicuam, in ventriculis avium, pilciumque vidi.

Hinc a scirrho ductum choledochum (k) comprimente, vesicula retenta bile turgidissima fuit: & similia fiunt ductu choledocho filo intercepto

(g) Part. hom. II. p. 58.

(h) Obs. anat. p. 377. & Sal. ALBERTI I. p. 74.

(i) c. 5.

(k) RIOLAN. in LAURENT. p. 660. GZISSON c. 17. 20. BOHN. p. 243. 42. Erud. ann. 1683. BELLINUS, HEFTER Primit. Polon. II. p. 115.

(l) Select. Francf. T. III. p. 371. &c.

(m) L. V. c. 8.

(a) BARTHOL. anat. p. 150. pars ejus BOHN. p. 241. perfacile PRYER p. 33. 70.

(b) Semper vidi succedere, & facile.

(c) GIERING p. 361.

(d) IDEM p. 362.

(e) SANCTOR. in I. Fen. p. 469.

(f) GIERING p. 361.

(g) In rachitidis BUCHNER de eo morbo p. 10. 17. His bilis nulla.

(h) Tubuli hepatis concreti in homine, qui solo spiritu vini vixerat BENNETT dietet. p. 394. ex DRELLINCOURTIO.

(i) p. 364.

(k) HARDER apiar. n. 61. MIEG. Thes. anat. botan. CHESEBORN I. C. KERRING obs. 65. RIDLEY obs. p. 157. VATER divertic. bil. p. 28. & BLAS miscell. anat. p. 237. obs. 4. p. 11. Pene manifesto enim, quem dixit cysticum, fuit choledochus.

cepto (*l*). Et cum glandulæ cysticæ scirrhosæ essent, vesicula plenissima (*m*) fuit. Cum ostium ductus bilarii ad duodenum scirrhus clausum esset, vesicula fellis ampla (*m*^{*}). Addunt aliqui, stylum facilius ex vesicula in cysticum ductum duci (*n*), & valvulas ejus ductus apertas esse versus duodenum, non ita in vesiculam (*o*).

Neque penitus contemni debet choledochi ductus diameter major diametro ductus hepatici. Ejus enim prærogativæ causam oportet in cysticæ bilis adfluxu quærere, cui junctæ cum hepatica major canalis debetur, quam quidem hepaticæ soli.

§. XXIII. *Ex hepate in vesiculam.*

Possit id iter improbabile videri, solas rationes aquilegum audienti. Cum enim ductus cysticus cum hepatico parallelus (*a*) fere sit, & ad angulum minimum cum eo coeat, possit videri, infinites faciliorem & ex hepate & ex vesicula in duodenum iter esse, quam ex folliculo in jecur aut vicissim. Videtur etiam ductum bilis ex hepate advenientis adeo parvum angulum cum cystico ductu facere, ut in ea parte bilis, quæ hunc cysticum ductum subeat, vix quidquam supersit virium (*b*).

Et tamen hepate in cadavere humano pressa, bilis facillime (*c*) in vesiculam venit, ut ipse repetito vidi (*c*^{*}).

Aer in ductum hepaticum missus, & ipse eam viam non difficulter sequitur (*d*).

Sed & bilis in vivo animale ex hepate adeo certo vesiculam subit, ut ea revincta cysticus ductus versus hepar mire intumescat (*e*), ex-
que

(*l*) SEGER p. 21.

(*m*) BERTRANDI p. 34.

(*m*^{*}) MIEG. thes. anat. bot. & in ea, puto, ob moram calculi 18.

(*n*) SCHELHAMMER physiolog. p. CCXIV.

(*o*) LORENZINI p. 23. 24. CALDESI p. 40. Naturalis hæc ex vesicula via est. GLISSON. p. 184.

(*a*) p. 529.

(*b*) L. VI. Utebatur eo argumento Cl. PALFYN anat. chir. p. 146.

(*c*) In putorio &c. CALDESI p. 39. in erinaceo FANTON. diff. anat. p. 163.

(*c*^{*}) Negat, non bene CALDESI p. 39.

(*d*) Difficilius GIBBING p. 362.

(*e*) BOHM. p. 234. BIANCHI T. I. p. 105.

que eō, qua parte ad hepar pertinet, intra sex horas uncia una bilis effluxerit, & semuncia in una hora (*f*). Visa est etiam bilis in laceratum folliculum apertum se effudisse (*g*), eumque replevisse (*h*). Cum in vesicula fellea calculi essent, dilatatus fuit ductus hepaticus (*i*), & cum vesicula destructa foret, & ductus cysticus filo interceptus, choledochus, qui solus nunc bilem hepaticam efferebat, major fuit (*k*), & cis vinculum cysticus intumuit. Contra, cum vesicula absque bile contracta esset, ductus tamen cysticus liber erat, ut bilis ab hepate advenire posset (*l*). Cum ductus cysticus coaluisset, hepaticus latior fuit, & recta via cum choledocho continuus (*l**).

Sed inprimis bilis de hepate in vesiculam venit, quoties via ad intestinum non patet. Potest autem intercipi, ob ductum choledochum sinumque inprimis cum pancreatico canali communem conpressum, dum intestinum flatu distenditur (*m*). Neque enim de duodeno inflato aer in ductum choledochum venit (*n*). Dudum vidit FALLOPIUS (*o*), ea ex causa bilem ad hepar venire. Cum fungis comestis (*p*), duodenum mire distentum esset, ductus choledochus quasi ligamento strangulatus fuit. Et cum ductus choledochus inflaretur, primo distentum est intestinum, denique aer in cystidem subiit (*q*).

Porro potest intestinum contrahi vi peristaltica, ut angustum, durumque fiat, & circulares fibræ undique villosam tunicam ad mutuos contractus urgeant: malim enim hac ratione uti, quam subtiliori (*r*) illo ductus per hiatus fibrarum carnearum transitu. Quare in diastole (*s*), bilem in duodenum evacuari, non in systole, in systole autem vesiculam adire (*t*),

(*f*) SEGER p. 23. 24.

(*g*) BOHN. p. 134. BIANCHI.

(*h*) LANG *physiol.* p. 9.

(*i*) LUDWIG.

(*k*) EWALD *de somno*.

(*l*) SCHMIEDEL l. c.

(*l**) ORTESCH. *diar. venet.* I. p. 102.

(*m*) GIERING p. 364. Conf. de ductus choledochi compressione] HAMBERGER *physiolog.* p. 310 311.

(*n*) l. c. GIERING p. 369. 370.

(*o*) Et alii, ut LIBUTAUD *physiol.* p. 142. *Essays* p. 305.

(*p*) *Mém. de l'Acad.* 1749.

(*q*) GIERING p. 364. neque tamen facillime.

(*r*) Duos anulos, dilatantem a fibris longitudinalibus, stringentem, a circularibus factum SEGERUS habet p. 25. 26.

(*s*) GIERING p. 371. SEGER p. 9.

re (t), scriptum est. Constrictione certe intestini, quocunque modo ita interceptum vidi vir ductum choledochum, ut neque bilis effluere posset, neque pancreaticus succus.

In ejusmodi casu, ut in colica pictonum (u), in quo intestina mire arctantur, biliaria vesicula bile turget: sic in morbo boum (w), cum duodenum inflammatum est, & a pharmaco quasi graviore (x), tumet eadem; sic a croci metallorum usu (y), & a venenis (z), quæ WERFFERUS (a) suis bestiis obtrusit.

Huc etiam icterum infantilem referas, qui rheo aufertur. Ductus choledochus videtur a coagulo caseoso obstrui (a*).

Quare communi scriptorum anatomicorum consensu bilis ab hepate in vesiculam venit: tantum ut multi, eosque inter & nos, partem aliquam eo venire statuunt, iis temporibus, quibus impeditus est bilis in duodenum exitus. Credas autem tantam bilis portionem ad vesiculam venire, quantam cysticus ductus (b) admittat.

Alii perpetuo, & omnem bilem ea via ducunt, contra quos diximus.

§. XXIV. Num alias per vias bilis ex hepate ad vesiculam veniat.

Ostendimus alio loco (a), anatomen nullos ductus admittere, qui ab hepate in vesiculam bilem ducant, præter cysticum, quem diximus; ne tamen objici possit, ignoratas nobis, & nimis forte subtiles vias aliquas occultasque latere, per quas hepar in vesiculam bilem suam mittat, neve, ut sæpe factum est, respondeant nobis adversarii, non ideo non adesse eos canales, quia oculis non patent, audiendæ sunt, quas proferunt Cl. Viri rationes.

Primum

(t) GIERING p. 373. CASSEBOHM. LORENZ. l.c. p. 22.

(u) Journ. med. 1762. m. Mars.

(w) LANGGUTH de morbo boum.

(x) HOFMAN Med. Conf. T. IV. Dec. IV. c. 7.

(y) HILD. Cent. IV. n. 79. 80.

(z) De cicut. p. 118. 143. 155. 159. 162. 180. 185. 201. 242. 243. 336.

(a) FALLOPIUS, BERGER l.c. p. 222. RIOLEANUS p. 660. LUDWIG progr. Hi ob id ipsum in exitu obstaculum: add. JASOLINUS. PETIT apud FALTYN II. p. 119. Thes. Paris. ann. 1744. editæ.

(a*) STORCH Kinderkrankheit. p. 379.

(b) VERHEYEN II. p. 79. Conf. GLEISTON p. 159. 160.

(c) p. 541.

Primum ergo ajunt, plurimis in exemplis, cum ductus cysticus a calculis clausus esset, tamen vesiculam bile plenam, & permagnam (*b*) fuisse: & cum eodem impedimento, bilem de ulcere prodiisse (*c*), quam non alia via credunt advenisse. Nam, & liceret quidem Cl. Viris eo argumento uti, in folliculo ipso nulla bilis generatur.

Ad hæc reponimus, nunquam fabricam aliquam debere ad necessitatem hypotheseos fingi, oculisque fidendum esse in iis, quæ oculi detegere possunt. Deinde ligato, quod dudum citavimus, ductu cystico (*d*), vesiculam inanem reperiri, & perinde inanem, quando hepar ob ductum cysticum obstructum, aut certe muco (*e*) plenum, aut ob proprium scirrham bilem non poterat submittere (*f*). Ita neque flatus per ductum hepaticum in folliculum penetrat, quando cysticus (*g*) ligatus fuit.

Et bilem, quæ dicitur in vesicula fuisse (*b*), cum calculus ductum cysticum clauderet, eam quidem iners fuisse feri (*i*) insipidi genus, mucive (*k*) puto, quale procul dubio vesiculæ glandulæ mucosæ (*l*) generant, & cum ductus cysticus a calculo obstrueretur, cis lapillum versus
hepar

(*b*) REINHART *de ictero* ROEDERER *progr.* ann. 1758. SENAC. *in Hæmorrh.* p. 172. FANTON. *diff. anat.* p. 263. Duarum librarum capax RAYMOND l. c. II. p. 242. 244. Septem uncias longa LUDWIG l. c. BLAS *misc.* p. 298. Per ampla MIEG. *Thes. anat.* In ea sesquipinta bilis RUYSCH *obs.* Etiam cum callus ductum cysticum comprimeret BAGZIV p. 579. Cum ductus cysticus connatus esset HENKEL VII. *Saml.* p. 22. 23. BLAS L. II. *obs.* 4.

(*c*) TACONUS *Comm. Bonon.* T. II. P. I. p. 216.

(*d*) SEGER p. 14. 20. quod egregium experimentum est, ORTELOR p. 135.

(*e*) SEGER p. 14.

(*f*) KERKRING *obs.* 82. LUDWIG. HORST *obs.* 7.

(*g*) *Primit. Polon.* II. p. 122.

(*h*) 7. 12. 14.

(*i*) Ad ignem coagulabile BENNET p. 58. LUDWIG.

(*k*) WAINWRIGHT p. 72. *Obsf. nostr.* 33. h. 1. 2. 3. 4. CORP p. 90. 91. TACONI *memor. di ffs.* II. p. 314. HOFMAN *Med. Consult.* T. II. Dec. V. *cas.* 9. Subfalsus vix amarus liquor ad libram SWIETEN III. p. 101. Cum rob comparat REINHART Amurca mera BARTH. *Act. Hafn.* T. III. *obs.* 18. Aqueus humor RUYSCH *Centur.* n. 87. LIEUT. p. 305. Serum RAYMOND l. c. Liquor a bile alienus LUDWIG. *Pituita Act. Lit. Soc. Suec.* 1756. p. 156. Nulla bilis JUCH. *de fero & bile Journ. med.* 1759. Novembr. *Phil. transf.* n. 142. *Eph. Nat. Cur.* Vol. VII. n. 3. Vix quidquam PETTERMAN.

(*l*) FANTON. *anat.* p. 111.

hepar idem bile plenus fuit, vesicula inanis (*m*). Cum vesiculâ fellea nulla appareret in cadavere, reperta est contracta, inanis, limpida, aqua plena, calculo in cellula latente (*m*^{*}). Cum calculi obstruunt ostium vesiculæ, intus non bilis, sed serum fuit (*m*^{**}). Cum calculi essent in vesica fellea & in ductibus, nulla bilis (*m*[†]) aut paucae in ea guttæ (*n*) fuerunt. Pallidum etiam pro bile serum fuisse, cum hepar induruiſſet, inanemque vesiculam (*o*), aut bilem inertem reperio (*p*), qualis etiam est in vesicula vermibus plena (*q*).

Et non negamus quidem, posse a calculo ductum cysticum exquisitè claudì (*r*): Non ideo tamen fuerit demonstratum, perfectè clausum fuisse, in iis exemplis, in quibus bilis in folliculo erat (*s*). Veram bilem in calciploſa vesicula reperi, quoties aditus per ductum cysticum apertus erat (*t*).

BLASII cysticus ductus, ut semel repetam, videtur choledochus fuisse (*u*).

FANTONUS fatitur (*w*) obturato ductu cystico in bove potissimum, vesiculam grandescere.

§. XXV. *An vesicula fellea propriam bilem generet.*

Altera præter cysticum ductum via, qua possis suspicari bilem in folliculum

(*m*) PALFYN *Ital.* II. p. 198. PETIT *Mém. Chir.* I. p. 286. FONTAN. ad VESAL. p. 21. Cum hepate maximo FANTON. *obs.* 5. LIEUTAUD *Mém. de* 1735. h. r. *Essays* p. 305. STRÖHLEIN p. 17. Fere similia habet CHESLEB. p. 166. LANCIS. *Epist. in Galer. di Minerv.* T. VII. p. 198.

(*m*^{*}) LIEUTAUD *essays* p. 306.

(*m*^{**}) TACONUS *mem di fific.* I. p. 313. 314.

(*m*[†]) *Phil. trans.* n. 142.

(*n*) BEZOLD K. *Svensk. Acad. Handling* 1752. Trim. I. Pauca & lenta SAVBERLICH, BAYNARD cum choledochus ductus conglutinatus esset. Cum hepate duro vesicula alba parva BUCHWALD *quadr. obs.* 2. NIETNER *de gland. natur.* p. 25. & cum in eo septem essent calculi DELTHEY *obs.* 8.

(*o*) HEUBERMAN T. IV. p. 35.

(*p*) *Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs.* 143. PLANCUS *de monstr.* Consumta in scirrhus hepatis vesicula KERKRING *obs.* 82.

(*q*) WIER ad HILDANUM.

(*r*) REVERHORST *in ic. & Cor. MEKEL* p. 95. BARTHOL. *Hist.* 54. Cent. II. ROEDERER.

(*s*) HENKEL.

(*t*) I. C. *Hist.* II. 13.

(*u*) L. II. *obs.* 4.

(*w*) I. C.

culum venire, ipsa est vesicula, in qua magni viri propriam bilem generari docuerunt (a).

Eam Cl. in belgio (b) viri ita ornaverunt, ut omnis omnino bilis in folliculo nata, tunc in hepar transfret, inque duodenum, etsi postea Vir ILB. (c), in hepate particulam bilis separari fassus est.

Exemplum anguillæ produci video (c*), in qua non aliam bilem ajunt esse, nisi cysticam: tum argumentum exhalationis injectæ in arteriam hepaticam aquæ, aerisve impulsæ, quæ fit in vesiculam (d).

Omnem quidem in vesicula bilem generari, opinio est dudum deserta. Tot enim tum animalia sint, quæ solo ex hepate (e) bilem separatam habeant, omnino repugnat, aliis in animalibus simillimis & congeneribus (f), hepar bilem non gignere. Neque folliculo naturam egere, ex eo ostenditur, quod vera, amarissima, bilis absque ejus adminiculo generetur, vel in nonnullorum animalium hepate (g), vel in hominis ductibus bilariis, dum mora accesserit (h).

An vero aliqua bilis portio, eaque amarior, in vesicula generetur, magis quæri potest; cum folliculos in ea videamus, & facile exhalantes arterias admittamus, etsi GALEACIO (i) ea exsudentia ostiola non contigit videre.

Sed neque hanc partem hujus liceret admittere hypotheseos, proxime priori capite propositæ: victo nempe cystico ductu in sano animali: aut in homine morbofo obstructo, non alius nisi insipidus mucus (k),
in

(a) FRANKEN *de hepate* 21. ALBINUS pater apud ARDINOIS *fund. med. anat.* Aliquam GALEACIUS *Comm. Bon.* T. II. P. 2. p. 236. aliquam perpauca BERGER p. 223. BOHN. p. 242.

(b) BACK. *de corde* f. II. c. 6. SYLV. *Disp. med.* VI. p. 27. 28. tum VIRUSSENS *tr. des liq.* p. 355. *Obs.* post VERHEYEN p. 36.

(c) *Prax. Med.* L. I. c. 44. p. 296. & similiter aliquam bilem in hepate concavo parari VIRUSS. post VERHEYEN T. I. p. 36.

(c*) Ten RHYNE *art. med.* p. 122.

(d) SYLV. *Disp. med.* VI. n. 53. ORTLOF n. 12. FRANKEN l. c. HALES *hemastat.* p. 129.

(e) p. 519. 520.

(f) p. 521.

(g) p. 544.

(h) Ibid. LUDWIG *progr.*

(i) *Comm. Bonon.*

(k) WAINEWRIGHT, BIANCHI p. 978. 1089. Mucus subniger, CAJESS p. 47. cum valvulæ deletæ essent.

(l) p. 374.

in vesicula reperitur, quum oporteret copiosam & sincerissimam bilem in folliculo esse, postquam blandior hepatica bilis a vesicula averfa fuit.

Ita nobiscum Cl. GIERING (l), SEGERUS, alique (m). Mucum certe mollem lenemve in glandulas depositum, & exhalabilem ab arteriolis aquam in hanc vesiculam credo deponi, ut in urinariam. Quam rationem ipsam olim protuli, dari animalia vesicula bilem fundente, absque canali, qui ab hepate eam bilem adferat, eam nunc antiquo rectius, ex comparatis animalium exemplis (n) doctior.

Manifestum contra mihi videtur, etiam collato vesicæ urinariæ exemplo, bilariam vesiculam receptaculi loco esse, in quo tamdiu per jejunia animalis, in laxum folliculum collectus, is liquor adfervetur, donec uberior copia, quæ sufficiat, sub ipsa necessaria coquendi cibi tempora effundatur.

Neque dubito, moram, exhalationem venosam, calorem, vicini intestini coli putredinosum halitum, humorum humanorum stagnantium ad putredinem naturalem inclinationem, hepaticam bilem aquosam, tenuemque in amarum (o), acre, viscidumque fel convertere, quales utilitates vitæ animalis requirunt. Nam eas dotes ipsa bilis stagnando acquirit (p), & adfine cerumen.

§. XXVI. IV. A vesicula ad hepar.

Hoc iter & ipsum parum probabile videtur: ob angulum acutissimum (a), quem cysticus ductus cum hepatico intercipit: ob resistenciam, quam credas cysticam bilem reperire, quando per canalem minus latum adveniens superandum habet momentum majus bilis hepaticæ, & per majorem canalem advenientis, & acceleratæ ex venosa ratione, cum totius visceris pressio ex innumeris, conjunctis, multo latioribus canalibus, bilem in unum angustiores ductum urgeat.

Et tamen pressa vesicula (b), bilis in cadavere æque facile in hepar redit,

(m) WAINEWRIGHT &c.

(n) p. 532. seqq.

(o) L. VII. p. 454.

(p) Ibid.

(a) p. 529. 530.

(b) BOHN. p. 243.

redit, ut in duodenum effluit. Idem iter in lutra legit (c); neque necesse est ligasse ductum choledochum (d).

In aliis etiam animalibus hepaticus ductus cum cystico ita unitur, ut huc & illuc, ad hepar & ad duodenum, pari libertate bilis fluat (e).

Impulsus etiam vesiculæ humor & per duodenum & per ductus hepaticos effluxit (f).

Non ideo credo in sano homine bilem cysticam ad hepar venire. Non video, ut superare possit bilis advenientis de hepate per rectam viam flumen, a quo versus duodenum depellitur.

Quando vero pertinax obstructio ductum choledochum clausit, calculusve iter ad intestinum obsedit, videtur de ipsa cystide fellea bilis in ductus hepaticos, perque eos, in venam cavam, & in universum corpus se diffundere. Id etiam iter liquor injectus in choledochum ductum legisse visus est (g).

Bilem enim cysticam esse credas, quod ea multo quam ab hepate expectaretur, magis amara, magisque tinctoria adpareat in venis & in arteriis (h); in sanguine (i), sero (k), urina (l), in saliva (m), sputo

(c) *Mém. des sav. étrang.* T. II. p. 201.

(d) Ut CALEDESI p. 45. inque putorio aliisque animalibus p. 38. 39.

(f) FANTON. *diff. anat.* p. 263.

(f) SEGER p. 10.

(g) SYLV. *diff.* VI n. 51.

(h) VESAL. *Chir.* p. 252. STORK *an.* p. 150. 151.

(i) Absque rubore WOLF *obs.* 22. Pallens viridis DAVIDS p. 40. Flavus PERMAN, SCHULZ *de ictero* p. 17.

(k) SCHWENKER p. 181. etiam amarum BIANCHI p. 76. CHEYNE *method.* p. 116. Tingens QUESNAY. Flavum se reperisse amarum nunquam STUBBE *phlebotom.* p. 116.

(l) Prima tingitur SWIETEN T. III. p. 141. Flavissima VIEUSSSENS *obs.* p. 251. COE p. 143. CAVALLERI *de morb. nolan.* VIEUSS *obs.* p. 351. PLEMP *munit. fund.* p. 97. Amara MEAD. *pois.* p. 24. 25. Amarissima WOODWARD *cases* p. 189. Tinctoria STORK. *Ess. of a societ. at Edimb.* I. BERGER. WIELIS *urin.* p. 350. SCHULZE *de ictero* p. 8. BIANCHI p. 181. QUESNAY. Acerrima, lintea erodens SALMUTH II. n. 4. Negabat tingere MALPIGHIUS *posth.* p. 253. Recte VATER *uro. mact.* p. 12. nonnunquam tingere. Niger icterus a bile nigra Eph. *Nat. Cur.* Dec. VIII. *obs.* 30.

(m) Amara *Ess. of a societ. at Edimb.* T. I. p. 310. SWIETEN l. c. Crocea VAL-
GAR. *med. ration.* p. 241.

sputo (*n*), in sudore (*o*), in aqua abdominali (*p*), in adipe (*q*); & cellulosa tela (*r*), in semine (*s*), in intestinis (*t*), & membranis; in adnata imprimis (*u*) oculi tunica, qua sede prima flavedo adparet (*w*): nonnunquam in ipsa cornea oculi tunica (*x*), & in tenuis meningis cerebri parte cellulosa (*y*): demum in ipsis ossibus (*z*).

Non ideo omnis icterus est a cystica bile. Credas omnino longe plerumque esse ab hepatica, retrorsum revoluta, quoties eadem obstaculum habeat in ductu choledochi (*a*). Huc icterus nuper natorum (*a*^{*}) pertinet, quem vulgo, & recte puto, choledochi ductui per caseosa concrementa obstructo tribuunt (*a*^{**}), in calidis insulis frequens (*a*[†]). Non tingit oculos ob bilem forte blandiorem (*a*^{††}). Aut in hepatico (*b*),
aut

(*n*) BRASSAVOL. in apbor.

(*o*) *Essay of a societ. at Edimb.* T. I. p. 310. BORELL. *Cent. I. obs.* 68. Huc odor ictericorum violatus M E A D. *pois.* p. 14. 35.

(*p*) *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 4. 5. obs. 195. Et ipse vidi.

(*q*) M E A D. *monit.* p. 162. Facile flavescit ab ictero adeps M O R G A G N. p. 74. Pus flavesceus ex hepatis ulcere D E F I S U p. 475.

(*r*) *Edimb. Ess.* I. Ed. 4. p. 259. in febribus malignis flavus liquor

(*s*) P E T E R M A N *Dec. I. obs.* 9. Non in lacte, ut humore exotico G. V. S W I E T E N T. III. p. 141.

(*t*) G U A R I N O N I.

(*u*) L I S T E R *aq. med.* II. *Angl.* p. 125.

(*w*) C O E p. 186, 187.

(*x*) Non vidit M O R G A G N. II. p. 75. Sed ex aliis exempla refert. Inde, puto, flavescentia vident, sed raro icterici G A L E N. *symptom. caus.* L. I. F. H O F M A N.

(*y*) M O R G A G N. *ibid.* p. 74. Serum cerebri S T O R K. Cerebrum flavum F A N T O N. *obs.* XI.

(*z*) K E R K R I N G. de H A E N *rat. medend.* IV. p. 121. P E T E R M A N, S T O R C K I. C. p. 150. etiam cartilagineas P E T E R M A N. S T O R C K; & ossium membranas V A L I S N E R. *oper.* T. III. p. 197.

(*a*) B O N N E T *obs.* 11. 12. 13. 14. 15. *Ess. of Edimb.* T. I. p. 314. In eo ductu tumor & calculus P E T E R M A N. A steatomate amplectente ductus bilarios a collo vesiculæ ad intestinum icterus H E N K E L II. *Saml.* p. 22. Ostium scirrhi clausum M I E G. *Thes. anat. bot.* ad finem adstrictum C A B R O L. *obs.* 10. Scirrhus comprimens ostium *Eph. Nat. Cur.* VIII. *obs.* 30. A strictura ductus choledochi ex fungo venenato *Mém. de l'Acad.* 1749. A pancreate cartilagineo comprimente ductum choledochum B A R T O L E T T I p. 267. 268. A ductu choledochi obstructo toto *Eph. Nat. Cur.* Vol. VIII. *obs.* 70. A calculis ductum choledochum obstruentibus C O I T E R p. 122. A pancreate, duodeno & jejuni parte induratis, hinc ostio intestinali ductus choledochi obstructo *Ess. of a Societ. at Edimb.* I. Ed. 4. p. 265. 266.

(*a*^{*}) S Y L V I V S. H E C Q U E T *Méd. des pauvres* II. p. 271. M O N R O *Edimb. Ess.* II. p. 243. B A G L I V. *Prax. med.* T. I. p. 83.

(*a*^{**}) M O N R O. B A G L I V.

(*a*[†]) Barbados H I L L A R Y p. 61.

(*a*^{††}) *Edimb. Ess.* I. Ed. 4. p. 259.

(*b*) M O R G A G N. *sed. & caus. morb.* II. p. 86. l. c. Finis constrictus C A B R O L. *obs.* 1.

aut in ipso scirrhus hepate (c), aut in ejus ulcere (d), aut demum ipsa in vesicula mali causa est, inquam secundum naturæ legem bilis hepatica divertit. Nam etiam in equo, vesicula destituta, icterus est (e).

Frequenter certe (f): etsi non semper (g), cum ejusmodi lapillis icterus conjungitur (h), & iis calculis eductis sanatur (i), aut per anum expulsis (k), quos libera nunc bilis sequitur (l), aut alioquin bile per alvum fluente (m).

Hepati-

(c) ARET. *diar.* l. c. 5. CABL. *tard. affect.* l. III. c. 4. 5. LEIGH. *Exerc.* V. p. 125. VESAL. p. 628. SCHAARSCHMIDT 1740. n. 31. DODON. *prax.* p. 592. BOERHAAV. ex v. SWIETEN l. p. 355. LANCIS. *Diff.* III. PISONI *spicil.* p. 149. WOODWARD *cases* p. 196. 197. *Selec.* Francf. Vol. IV. CAMER. *hepat. defunct. existit.* LANCIS. *Galer. di Minerv.* T. III. p. 198. KARKRINGI *obs.* 82. In ictero nigro Sel. Francf. Vol. IV.

(d) LA MOTTE *obs.* 134. DODON *post. hist. vitis* c. 15. Ab hepate inflammato ARNETAEUS, FANTON.

(e) GIBSON p. 297. in oculo conspicuus.

(f) Frequenter SANCTOR. *meth. vitand. error.* p. 354. HOFMAN *bilis. med.* & *venem.* BAGLIV. p. 433. Add. exempla GUIDETI apud BIANCHUM *hist. hepat.* 321. T. II. p. 328. CHESELD p. 166. COE p. 186. 187. Plerumque veram esse causam icteri *Ess. of Edimb.* l. p. 265. DUVERNEY.

(g) MORGAGN. l. c. II. p. 45. 84. *Scd. caus.* II. p. 217. 355. 443. PECHLIN l. *obs.* 48. VALCARENCHI *med. rat.* l. c. p. 1137. RIOLAN. p. 127. F. SYLVIVS. PETERMAN. Neque in exemplis BIZZOLO *de cholelith.* WEPFER *cicut.* p. 176. *apoplex.* p. 356. RUSSEL p. 163. *Phil. transf.* Vol. 50. P. II. p. 546. 547. VALISNERI *oper.* T. III. p. 595. STORK *ann.* l. p. 129. RAYMOND II p. 242. 244. VIDAL. *Journ. des Sav.* 1723. Jan. Non fuit ictericus F. WILHELMUS elector, cum suo calculo felleo gallæ æquali BIERWIRTH *struct. hepat.* Neque cum 180. calculis alius GMELIN p. 7.

(h) Fere semper COE p. 123. Add. POZZI p. 69. G. v. SWIETEN T. III. p. 107. PANAROL *Pentec.* V. *obs.* 22. BIRLEBAULT *Journ. med.* 1756. BONNET *sep.* T. III. S. 8. n. 36. S. 18. *obs.* 4. 8. 25. Addit. *obs.* II. BLEGNY *Zod. Gall.* l. p. 95. BORELL *obs.* 4. *Cent.* l. MARCHETTI p. 27. *Phil. transf.* n. 142. & 306. HILD. *Cent.* l. *obs.* 60. ROBINSON *of the stone.* COITER p. 122. GIUDER l. c. KUNDMAN p. 908. TACON p. 316. PETERMAN *Journ. de med.* 1756. m. Nov. *Journ. Sav.* 1697. n. 30. MEERMAN *Eph. Nat. Cur.* Vol. VIII. *obs.* 70. *Ess. of Edimb.* T. II. n. 28. 29. SCHNEIDER *catarrh.* L. III. ORTESCHI *diar. vener.* p. 213. PRESSEUX *obs. med.* p. 69. 70. TROTTER *de lethargo.* RUSSEL *tab. gland.* p. 163. BAGLIV. p. 433. VALISNER. *oper.* T. III. p. 197. 198. TIMÆUS L. III. *cas.* 28. STORK *ann.* l. p. 150. BUCHNER *misc.* 1729. p. 52. Cum calculis vesiculae icterus COE *concret.* p. 221. 223. VESAL. *Chir.* p. 152. PETIT *Mém. de l'Acad. de Chir.* T. I. p. 260. 261. Icterus funestus, cum calculis in vesicula G. v. SWIETEN III. p. 107. Calculi in vesicula, & in ductibus bilariis MATANI *excerpt. lit.* 1761. P. IV.

(i) VARNIER *Journ. med.* T. III. n. 1. CHESELD. p. 166.

(k) Sel. ALBERTI *Orat.* II. LENTIL. apud BIANCHI p. 189. 190. *Ess. of a Societ. at Edimb.* II. n. 28. *Phil. transf.* n. 306. [RUSSEL. SOB'ALIT PETERMAN *scrutin. icter.* HOOKE *Exp.* p. 79. *Eph. Nat. Cur.* Vol. X. *obs.* 26. *Journ. des Savans* 1725. m. Janv. PETIT *Mém. de l'Acad.* l. p. 308. *Assemblée de Beziers* 1731. 6. Dec. SCHURIG *liebel.* p. 167. FISCHER *de calc.* p. 3. 4. CHESLIDEN p. 166. LA METRIE

Hepaticum eo in casu ductum cum cystico obstrui credit Cl. AINS-
LIE ob viciniam parallelam (*n*). Cysticus certe ductus obstructus solus
icterum fecit (*o*).

Alias strictura in concursu cystici & hepatici ductus fuit (*p*), aut de-
mum in cystico, calculis pleno (*q*), angusto (*q*^{*}). Magnum autem
esse oportet calculum, qui iter intercipiat (*q*^{**}). Est ubi cum scirrhus he-
patis calculus felleus conjungitur (*r*), aut hepatis scirrhus vesiculam &
ductus bilarios compressit, ut in ea 145 essent lapilli (*r*^{*}).

Denique neque bilis iter obstructum (*s*) solum (*t*), est causa icteri:
non certe ejusmodi, quem oculi medici possint ostendere. Nascitur
enim icterus, & bilis adeo retrograda in sanguinem refluit plurimas ob
causas, quarum aliquæ vix corporeæ sunt, ut ex ira (*u*), quæ etiam
in chamæleonte cutem vitiare (*w*) videtur. In lampetra ajunt vesicu-
lam fellis mole augeri (*x*) quando irascitur. Hac moeror profundior,
terror

METRIE obs. 66. *Comm. in Boerb. T. III. p. 391.* VIRUSSENS obs. p. 251. TA-
CON *Mém. di fific. T. II. p. 314. 315.* GEUDER *ferment. p. 108.* SCHACHT *ager*
ictericus phthisi laborans BETZOLD n. 2. *Journ. med. 1760. Aout.* VIDAL. *Journ.*
San. 1723. Jan. Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 9. obs. 190. Comm. Nor. 1740. heb. 19.
G. V. SWIETEN III. p. 132. 133. SCHUEZE in se ipso apud HEFTER *Primit.*
Polon. II. p. 115. HORNUNG in cista. *Phil. transf. n. 306.* TACON. p. 314. 315.
A medicamento BIANCHI p. 321. HORNUNG. RUSSEL p. 163. Per vomitum.
Comm. Litt. 1737. heb. 36. COR p. 74.

(*l*) HOOKER &c. Sola bilis ad tres pintas PETIT *Mém. de l'Acad. de Chir.*
T. I. p. 261.

(*m*) PETIT p. 260. 261. cum fluctuatio fuisset ad sedem vesiculæ PRCHLIN
obs. p. 138.

(*n*) Ictér. p. 10. 11.

(*o*) CAVALLERI *de morb. nolan. in morbo. Connatus* HENKEL VII.
p. 22. 23. Pene clausus ad cervicem crassa membrana GAL. MIN. VII. p. 229. 230.

(*p*) MRA D. *monit. med. p. 162. Eph. Nat. Cur. Vol. X. obs. 91.* Vesicula fellei
ob eam causam nihil emittebat.

(*q*) MORGAGN. l. c. p. 67. WEPFER *apoplex. p. 356.*

(*q*^{*}) In eo immobilis calculus, & parca in vesicula bilis STORK I. p. 150.

(*q*^{**}) VALISNERI T. III. p. 197. 198.

(*r*) VERSAL. *Chin. p. 152.* TACONUS *Mém. di fific. II. p. 313. 314. 316.* WOLF
obs. 22. p. 76. MATANI *Excerpt. Lit. 1761. IV.*

(*r*^{*}) TACONI p. 316. seq.

(*s*) ARETAEUS *diuturn. II. c. 5. Ess. of a Societ. at Edimb. I. p. 260.* DUYER-
MEY T. II. p. 229.

(*t*) PRCHLINI. obs. 58. *Ess. of Edimb. I. p. 262.*

(*x*) In iracunda calculi vesiculæ 200. FABRIE. *pragr. ad Diss. HOIMANNI.*

(*w*) HASSELQUIST p. 297. 298.

(*x*) RICHTER *Ichthyothecol. p. 367.*

terror (y), vulnus cerebri (z), febris acuta, vulnus a stlopo illatum (a), tumor in pleura natus (b): comesti fructus solani (c), demum ipse viperæ morsus, a quo cutis cum periculo flavescit (d), quod subitum malum (e) est.

In harum causarum nonnullis, ut in febre acuta, a vulnere cerebri, possit subesse latens hepatis inflammatio, quam abscessus ex ejusmodi in capite læsionibus supervenientes prodant (f), aut refluxus sanguinis, cujus causa non satis nota est (f*).

In aliis malis bilis motus videtur incitari. Nam etiam ad intestina, adque ventriculum ex ira confluit (g), per experimentorum fidem.

In aliis credas tardari bilem, & ejus motum lentescere, ut angustas & rugosas vias cysticas superare nequeat, ut in dolore animi.

In nonnullis suspicari possis, ductus choledochi exitum arctatum fuisse (h).

§. XXVII. Ea via est præter naturam.

Non ideo potest aut cum veteribus (a), aut cum Francisco SELVIO recipi, partem aliquam bilis in sano homine per hepar in sanguinem venosum refluere (b).

Nunquam

(y) MORGAG. *sed. morb.* II. p. 73.

(z) Fractura cranii *Mém. de Chir.* III. p. 506. MORGAGN. II. p. 288. cum pure inter os & duram vulnera cerebri ARCHAUS L. V. c. 6.

(a) BARTHOLINUS *Hist.* 85. Cent. VI.

(b) *Hist. de l'Acad.* 1722. p. 18.

(c) WAINEWRIGHT p. 27. In isto casu strictura ductus choledochi potuit subesse.

(d) GALEN. MARCELL. EMPIR. I. c. 9. MEAD. *de venen* p. 9. CARDAN. *aphor.* 312. POUTEAU *melang.* p. 155. VERCELLONI ad BIANCHI T. II. p. 786. lethali iste eventu. FRANK. *Anmerk.* II. p. 244.

(e) Intra horam MEAD.

(f) *Mém. de Chir.* III. p. 484. seq. 507. seqq.

(f*) Cum apoplectici sanguinis effusione, hepar inflatum, turgidum, gangrænosum. In phrenitico hepar inflammatum, & icterus FANTON. *obs.* II. Nuper cum viri optime meriti trepano calvam terebrarent, ut maniacis mederentur, perierunt omnes ex inflammatione, uti relatum est, viscerum abdominis.

(g) FELICE *Dissert.* p. 38. In iracunda supra 100. vesiculæ calculi FABRIC. *Progr.* ad HOFMAN.

(h) Ut a fructibus solani.

(a) AVICENNA L. I. *Fen.* I. *doctr.* 4.

(b) *Diss.* VI. p. 35. &c.

Nunquam enim sine morbo, plerumque cum vehemente convulsione bilis eam viam sibi aperit. Nimis sæpe vidi, & etiam nunc video, homines, quibus biliaræ viæ obstructæ sunt, & calculo quidem potissimum. Iis hominibus, aliquamdiu absque ullo dolore (*b**), calculi in vesicula habitant (*c*): Verum denique bilis collecta vias suas nimium distendit, & colici dolores (*e*) vehementissimi, & sanguinis ad caput compulsio (*f*), & ad mortem usque diræ anxietates superveniunt, quæ cum vomitu repetito (*g*) frequentes vices repetunt.

Ea symptomata in nonnullis ægris tacite evanescent, forte, quod in suas fæces non curiose inquirant, dum retenta bilis erumpit (*h*).

In aliis calculus per anum eductus (*i*), uti diximus, finem facit paroxismi

(*b**) Non ergo perpetuus circa cartilaginem mucronatam dolor adest, ut Cl. TACONI l. c. p. 324. *Ess. of Edimb.* II. n. 28. Negat in latus sinistrum posse decumbere COE p. 144.

(*c*) De VARIIS calc. bilar. p. 24. STRIN lithograph. p. 45.

(*e*) Eum dolorem & ejus accessiones jam CÆLIUS vidit *tard.* L. III. c. 4. Inter nuperos exempla habent HOFMAN *med. syst.* IV. S. II. c. 3. *bil. med. & venen. Med. cons.* V. IX. Dec. II. c. 10. MORTON *phthisiolog.* L. III. c. 13. GLISSON p. 265. BOERHAAVE *Prælect.* T. III. p. 163. KALTSCHMIEDT *progr.* GÖCKEL *Cent.* II. obs. 99. VALISNER. *consil.* n. 9 & *oper.* T. III. p. 595. 596. RHOD. c. 3 l. c. SCHURIG *lith.* p. 167. 239. 240. PETERMAN, LISTER l. c. COE *introduc.* p. 45. VIEUSSENS p. 449. RUSSEL *tub. gland.* p. 163. 166. VIEUSSENS obs. p. 449. &c. DUVERNEY T. II. p. 225. FISCHER *de calculo* 43. *Journ. med.* 1756. mens. Nov. ORTESCHI *diar. venet.* p. 283. MEZGER *de lithogenes.* SABATIER *Journ. med.* 1758. m. Nov. TACONI p. 315. *Act. Edimb.* II. n. 29. *Obss. med. fascic. obs.* II. RHOD *Cent.* III. *Eph. Nat. Cur.* Vol. X. obs. 26. *Mém. de Chir.* I. p. 308. 502. *Phil. trans.* Vol. L. P. 2. p. 545. & n. 282. BIANCHI *hist. hep.* p. 484. RIDLEY obs. n. 24. HARDER *ap. obs.* 59. *Journ. Sav.* 1723. Janv. *Comm. Nor.* 1733. h. 36. Funestum exemplum VALENTIN. *Chir. med.* p. 229.

(*f*) Inde hæmorrhagiæ narium funestæ COE p. 222. 223. Hæmorrhagia obnoxius, cui calculi 81. in vesicula COLLOT. p. 6.

(*g*) COITER l. c. GREULICH, TACONI, HAHN, PETIT p. 32. NEIFELD Nuci moschatae æqualis ORTESCHI *ibid.* & ovi gallinacei mole HEISTER *anat.* 1726. mens. Aug. Raro tamen majores ea via calculi prodeunt ORTESCHI *diar.* p. 287.

(*h*) PETIT *Acad. Chir.* I. p. 260. 261. DUVERNEY II. p. 225. Per vomitum *Ess. of a Societ. at Edimb.* I. p. 266. COITER. GREULICH. Quadraginta libræ bilis per vomitum & clysteris ope egestæ VALENTIN *Chir. Med.* p. 229.

(*i*) *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 9. 10. obs. 90. Vol. X. obs. 26. MEZGER *de lithogenes.* NEIFELD p. 203. BETZOLD n. 2. VIEUSSENS obs. p. 234. *Journ. de medec.* 1760. m. Aug. *Comm. Litt.* 1737. h. 36. PETIT *Mém. de l'Acad.* I. p. 108. FISCHER l. c. G. V. SWIFTEN p. 134. *Journ. Sav.* ann. 1723. Janv. *Obss. med.* XI. TACON. p. 314. 315. PETERMAN. SABATIER. G. HORST COE p. 108. ARNOULT *in act. Trivult.* p. 1110. *Phil. trans.* l. c. SCHURIG. RUSSELL p. 63. *Edimb. Ess.* T. II. n. 28.

RIDLEY

roxysmi (*k*). Neque pauci sunt, quibus per latus vesicula ab ulcere aperta calculos (*l*) emittit, pari cum orthostadia. Calculi fellei ex tumore umbilici (*m*). Calculus moriformis exiguus per ulcus prope umbilicum (*n*). Vesicula fellis adhærens in abdomine fecit fonticulum, per quem (*o*), lymphæ flavescentes stillavit. Post excretiones biliosas vesicula adhærens, plena calculo pariter adhærente absque bile (*p*). Calculus felleus rupit tegumenta in abdominis & per hypochondria exiit (*q*). Per ruptum abscessum abdominis exhibant angulosi calculi (*q**). Scirrhus in hypochondrio. Subinde, sponte aperta vesicula, bilis effluxit, & per intervalla recidivæ redierunt fistulæ, alterne apertæ & clausæ (*r*). Abscessus epigastrii, per quem sensim numerosi calculi exierunt (*s*).

Primum legi apud CHESELDENUM (*t*), & erupisse calculos & salutari-
ter fuisse excisos.

Multam

Calculi 200. in longo morbo salutari eventu per alvum educti VOGEL v. *Anmerk.* & supra 400. RUSSEL p. 163. adde BILLERBAULT *Journ. de medec.* 1756. m. Nov. & 1760. m. Aoust TITSINGH *steensnyden* p. 16. 17. qui magnas vocat tesserat Ex vesicula lapillos esse, quos intestina emittunt BIRCH T. IV. p. 371.

(*k*) BETZOLD. SWIBTEN *Eph. Nat. Cur. Phil. transf.* l. c. PETERMAN. SCHURIG. RUSSEL.

(*l*) TACONI *Mém. di fist.* II. p. 315. *Mém. de Chir.* l. c. I. p. 298. 300 NEBEL coagul. bil. WISLICHEN *lapid. bilios. lymph. Select. Francof. Vol. IV.* KNIGHT. *on catbolic.* p. 121. 122. VALISNER *ess. var.* T. III. p. 338. *Fränk. Anmerk.* IV. p. 480. *Journ. de med.* 1757. m. May. *Comm. Nor.* 1743. n. 1. ANEL. *malad. extraord.* p. 64. *Mém. de Berl.* XI. p. 31. *Eph. Nat. Cur. Vol. VI.* obs. 69. *Vol. VIII.* obs. 10. Ex intestino, cum una cibi exirent, LITTRE *hist de* 1704. n. 15. Ex ventriculo *Phil. transf.* T. L. P. II. p. 549.

(*m*) HAGEDORN *Cent. II.* Ad 130. BLANCAARD *oper.* p. 390. Sic VALISNER. *observ.* T. III. p. 338. II. p. 53.

(*n*) *Fränk. Anmerk.* T. IV. p. 480.

(*o*) *Sel. Francof. Vol. IV.*

(*p*) *Mém. de Chir.* I. p. 286.

(*q*) ELLER *Mém. de Berlin.* T. XI. p. 31.

(*q**) WISLICHEN. *lapid. bilios. lymphat.*

(*r*) *Mém. de l'Acad. de Chir.* I. p. 298.

(*s*) *Eph. Nat. Cur. Vol. X.* obs. 91.

(*t*) p. 166.

Multam hic laudem meruit *J. Lud. PETIT* (u), qui vidit posse chirurgum naturam imitari, dirissimoque malo ægrum liberare; dedit idem signa ex situ, fluctuatione (w) &c. & monuit, ut vesicula incidi possit necesse esse, ut tumor (x) circumscriptus sit & adhæreat. Neque imprudenter primum ægrum dimisit, non ausus novum inventum in homine periclitari (y). Inde proposuit aperturam vesiculæ, tum styli (z) introductionem (a), & demum calculum exemit, non periculoso eventu (b).

Eum nuper alii *Cl. Viri* (c) sunt imitati, & potissimum etiam *Cl. Vir J. Zacharias VOGEL* (d).

Iterum in aliis, qui huc potissimum pertinent, icterus erumpens est pro levamine (e).

Mireris sæpe ut possint ovi columbini æquales calculi per anum, adeoque per ductum choledochum, descendere (f).

Sed neque longa plerumque pax est. Nam fellis canales denuo repleti similia tormina reducunt (g), & aliquoties ægri similibus crisibus liberantur, ut omnino non abs re has periodicas colicarum & supervenientis malaciæ vices pro signis certioribus (h), bilarii calculi *Clari Viri* habuerint. Solent

(u) *Mém. de Chir. T. I.*

(w) p. 266. 267.

(x) p. 265.

(y) p. 257.

(z) p. 290.

(a) p. 292.

(b) p. 293. 300.

(c) *Journ. med. 1757. m. Mars. 1759. m. Maj. & T. III. n. 1. (ni fallor).*

(d) *IV. Anmerk. Hamburger Magazin T. XIV. add. N. Eph. Nat. Cur. Dec. II. obs. 61. 68. 69.*

(e) *BARTHOL. Hist. 62. Cent. V. Cent. III. hist. 4. RIDLEY. LISTER aq. med. II. p. 128 G. di Parm. 1688. p. 68. BRUNO de bile p. 35. DUVERNEY postb. T. II. p. 225. RHOD Cent. III. n. 19. PETERMAN. SCHURIG. RUSSEL. KALTSCHMIDT Ess. of. a Societ. at Edimb. II. n. 28. PASTA in aphor. p. 214. Post colicam icterus RHOD Cent. III. n. 19.*

(f) *VIEUSSSENS. FISCHER. HEISTER ann. Jul. 1726. Aug. Ovi mole A5k. Philexotic. & ovo columbino major Journ. med. 1756. Grandis lamellatus pondere drachmarum 18½. de ano eductus Mém. de Chir. T. III. p. 55. 56. Ovi gallinacei mole per vomitum, & alius per alvum HEISTER. Aliud exemplum MEERMANN III. Per anum, sequente multa bile HOOKE Exp. p. 79.*

(g) *FISCHER. BIANCHI l. c. &c. HOFMAN. PETERMAN Scrutin. icter. Journ. med. 1756. KALTSCHMIDT progr. ORTESCHI p. 283. Quarta die DUVERNEY l. c. MATANI l. c.*

(h) *BAGLIV. Prax. Med. L. I. p. 83. GUIDETTI apud BIANCHUM bist. hep. p. 322. G. v. SWISTEN III. p. 132. 133.*

Solent ad finem erosa forte vesicula, aut hepate in partem mali tracto: ex diuturna phthisi (i) febrique perire (k), ut non raro vidi.

Dolorum sedem credas esse inprimis in ipso (l) transitu per duodenum, deinde in toto eorum calculorum ductu (m): illud præferas, quod etiam parvi calculi, piso non majores, dum transibant, dolores summos fecerint (n).

§. XXVIII. *Bilis in hepate ex vena portarum generatur.*

Per subtractionem ad verum hic conati sumus accedere. Siquidem ergo bilis ex vesicula non nascitur (a), neque ab ea in hepar sani hominis convehitur (b); siquidem porro ab hepate ad intestinum, aque eodem ad vesiculam venit (c), ut per ductum suum in idem intestinum redeat; superest, ut ejus in hepate unicus fons sit, universo quidem, etiam ex membranis (d). Cum porro advehentia vasa sanguinea in hepate tria sint, vena umbilicalis (e), vena portarum (f) & hepatica arteria (g), quæri oportet, num ex arteria potius, num ex venis bilis decedat.

Ex arteriis bilem nasci analogia (h) suadere possit, cum ubique ex eo vasorum genere proprii cuique parti humores in vasa excretoria secedant. Addi licet, ex arteria in ductus bilarios apertam viam esse (i). Et cerumen, qui succus bilis est simillimus, ex arteriis omnium carotide parari. Ea sententia olim SYLVIO placuit, pro ea particula bilis, quam hepatis reliquerat: dicitur etiam nunc magno viro placere, cujus merito summa auctoritas fuerit.

Res

(i) A CASTRO pest. Rom. p. 78.

(k) STORK ann. II. p. 153. Phil. transf. n. 300. Fränk. Anmerk. T. III. p. 340. seq.

(l) Ibi dolor fuit Hist. de l'Acad. 1710. n. 3.

(m) VIEUSSENS obs. p. 449. VALISNER. T. III. p. 525. 526.

(n) COR p. 108. SCHURIC l. 6.

(a) p. 586. seqq.

(b) p. 589.

(c) p. 573. 582.

(d) p. 504.

(e) p. 479.

(f) p. 489.

(g) p. 472.

(h) SYLVIVS eo argumento usus est.

(i) p. 508.

Res demonstrationem quidem non admittit. Cæterum rationes proferre liceat, cur venæ portarum causa videatur probabilior.

Ea vena multa habet peculiaria, eaque omnia ad bilem generandam idonea videntur.

Sanguinem habet, etsi experimenta nondum nos convincunt, tamen per suas causas ejusdem indolis particulis plenior, quæ in bile abundant. Oleo primum, quod non potest non ab omentis (*k*), mesenterio, & mesocolis (*l*), abunde revehi.

Deinde sub putrido humore, qui videatur eam ad alcalinam naturam adque putredinem concipiendam aptam indolem (*m*) adjuvare posse, quæ est in bile. Nam, ut alias ostendimus, venæ ad portas euntes de ventriculo (*n*), de intestinis, & de crassis quidem potissimum, denique de abdominali cavo (*o*), subætudum, & vehementer denique alcaliscentem humorem referunt. Dum enim fæces alvi in crassis intestinis siccantur, fætida & putrida (*p*), aqua per venas hæmorrhoides in portarum venam venit.

Dudum autem est animadvertum, amara (*q*) reddi olea, quæcunque initia putredinis senserunt, ut de butyro, de oleo cocto, de aliis est notissimum.

Nunc porro bilis viscidior est, quam plerique humores humani. Est autem etiam ejus proprietatis in vena portarum peculiaris causa. Notum est, eam venam sanguinem suum ab arteriis minimis, latissime sparsis, habere, ut adeo in principiis suis lente moveatur. Non quidem 14613. (*r*), lentius quam sanguinem aorticum moveri putem, ut in aliquot horis vix unciam progrediatur. Nam etiam injecta in vivis animalibus vincula, & potissimum microscopium (*s*), ad intuenda vasa mesenterica ranarum adhibita, ostendunt, de eo lentore nimis magnifice Cl. Viros sensisse.

Nunc

(*k*) p. 495.

(*l*) p. 496.

(*m*) p. 557. FIZES p. 132. LOSSECKE *physiol.* p. 173.

(*n*) L. XVIII. p. 338.

(*o*) p. 342.

(*p*) L. XXIV.

(*q*) L. VII. p. 462. GLISSON &c.

(*r*) KEIL *secret. anim.* p. 93. in editione anglica 27682es & p. 41. 42. 43. nemp 66 X 177. add. QUESNAY *æcon.* p. 234. 235.

Nunc quidem, dum is late collectus sanguis in venam ad portas confluit, recuperat aliquam partem suæ celeritatis (t), tantam quanta ratio est venæ portarum ad simul sumpta arteriarum lumina (u), quorum sanguinem advehit, mesentericæ utriusque, & coeliacæ. Debet ea ratio se habere ut 5625. ad 2316. (w), non penitus uti 5. ad 2. adeoque fons celeritatis in hepate, & supremus gradus plusquam duplo minor est, quam in aliis visceribus, is enim fons est in venæ portarum trunco.

Sed nunc inmensum est, quod de ea celeritate in hepate decedit, quando ea vena ex portis per universum hepar in ramos innumerabiles dividitur. Mensura iniri non potest. Si vero divisiones totidem esse tibi sumas, ac sunt in arteriis, si in quaque divisione luminis conjuncti ramorum rationem tibi sumas, quæ est in arteriis; fiet, ut in 20. divisionibus celeritas venæ portarum, quæ erat velocitatis arteriosæ minor quam subdupla, reducatur ad portionem (y), certe perparvam, dignitatis 20. numeri 2, ad dignitatem 20. numeri 3. ductam in celeritatem arteriosam. Cl. D A V I D, qui sanguinem in hepate per frictionem arteriosam calefcere & decomponi scripsit, quod ego intelligo pro putredine, non ostendit, frictionem esse in ratione celeritatis transfluentis liquidi, adeoque in hepate exiguam (z).

Neque hæ meræ theoriz sunt. Ab omni tempore animadversum est, super omnia alia viscera hepar scirrhis esse obnoxium (a), ut & ossea in eo concrementa (b), & saxea durities non rara sit (c).

Sed

(t) L. VI. p. 195. 196. *Opusc. anat.* I. p. 206.

(u) L. VI. p. 324. 325. 326.

(w) L. VI. p. 344.

(x) p. 488.

(y) L. VI. p. 171.

(z) *De la saignée* p. 222.

(a) GALEN. *meth. med.* L. XIII. D. SIMOR. *parerg.* p. 31. 250. Sæpe BARTHOL. *disq. in lymphat. solut. defens.* in RIOL. p. 142-143. In cachexia scirrhus hepatis ID. WOLF *obs.* 22. LIBOTAUD *Prax.* p. 91. Hepar magnum, durum, plenum tuberculis etiam lapideis BURCHARD *de bile* p. 83. In hydrope scirrhus hepatis PAU *obs.* 28. DODON *prax.* p. 592. PANAROL *Pentecost.* IV. *obs.* 24. HILD. III. p. 53. ZACUT. *la Mottr obs.* 120. ANEL. *lib. propr.* p. 45. HARDER *apiar.* p. 218. *Mém. de Berlin* T. XI. p. 32. BECKET *obs.* 34. PETZOLD *obs.* 77. KLAUNIG *obs.* 11. BUDRUS *cas.* 35. de HAEN *rat. med.* T. IV. p. 90. FABRIC. *progr. ann* 1759. p. 14. *Bresl Saml.* 1721. m. Jan. 1724 p. 132. 433. STORK *ann.* I. p. 145. 132. HOME *facts.* G. v. SWIETEN I. p. 855. *Ess. of a Societ. at Edimb.* II. n. 30. LEIGH. *Exerc.* V. p. 125. post icterum nigrum. PISONI *spicil.* & ipse demum vidi, & sæpius, & *Journ. de Trev.* 1707. m. Janv. STORK *ann.* p. 132. Hepar in hydrope compactum de HAEN V. p. 51. Magnum

PETZOLD

Sed & steatomata (d) in hepate frequentia sunt, collecto ibi adipe, & restaguante: & hydatides (e) sæpissime visæ: & membrana crassa cartilaginea (f): & sanguis in hepate collectus (g), & plena vasa mesenterica cum vena cava vacua esset.

Notum

BETZOLD *obs.* 88. FABRIC. *progr.* 1759. In hydropse pectoris PETZOLD *obs.* 61. NARDI *hort. Genial.* L. VI. Hydropem pro jecoris morbo habet ERASISTRATUS apud CELSUM III. c. 21. & WAINWRIGHT p. 21. In ascite plerumque adfectum esse LIBAUD *precis.* p. 416. Post dolores colicos hepatis scirrhus, puto biliosos RIOLAN. p. 110. In diarrhœa alba BIRRLING *advers.* n. 51. In melancholia CHIFFLET *obs.* 38. In rachitide hepar grande ZELLER. *strict. glandul.* In atrophia GOBLIKE *Obs. Phys. Med.* III. HILD. *Nuz. der Anat.* TISSOT *Epist.* p. 28. 29. ubi lapideum. HEURMAN T. IV. p. 35. BECK *de palpit. cord.* p. 34. Post febres MADAI *Wechselfieber* p. 70. & vena portarum tumidissima SENAC. *febr. interm.* p. 129. Post perpetuos vomitus *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. I. obs.* 103. In fluxu hepatico epidemico *Act. Baltb.* ann. 1701. p. 118. Add. ad eos scirrhos HILDAN. L. III. *obs.* 50. BUCHWALL *quadriga obs.* n. 2. FABRIC. *progr.* KERKING *obs.* 82 & in ictero p. 591.

(b) DEIDIER *Cons.* T. III. p. 122. 105. *physiol.* p. 41. 42.

(c) TISSOT *Epist.* p. 28. 29. CÆL. *tard.* L. III. c. 5. Hepar plenum calcariis tumoribus TITSINGH *rust. uuren.* p. 289. Hepar sabulo indurato plenum CAMERAR. *extisp. hepat. defunct.* In equis tubercula GIBSON p. 301.

(d) STORK p. 130. 134. II. p. 260. ut 9. lib. penderet FANTON. *obs.* 73. Ovi mole in hepate steatomata WENKER *de vuln. ventric.* In ILL. Viro J. PUATO jecur steatomatibus abfessum erat, absque ictero ORTESCHI *diar.* p. 76. Tumor ad hepar cysticus quasi melle plenus parte in os nutata VALSALV. L. III. n. 9. In diabete frequentia esse steatomata. MEAD. *pois.* p. 33.

(e) Sæpe reperit GALENUS *meth. med.* L. VII. n. 55. In exteriori ambitu MANGET *bibl.* p. 624. SBARAGLIA p. 31. CHESELDEN p. 212. FANTON. *diff. anat.* p. 68. In ipso hepate BIANCHI p. 154. *Bresl. Saml.* 1725. *Aug.* VALSALV. *Diff.* III. n. 7. 8. ejusque cavea COURTIAL *Journ. Sav.* 1688. n. 24 de HÆN *rat. medend.* VII. p. 126. Maximæ hydatides *Gal. min.* VII. p. 198. LITRE *hist. de* 1704. *obs.* 18. HEURMAN II. p. 317. MORAND 1719. *hist.* p. 38. *Phil. trans.* n. 475. ad 4. quartas aquæ continentes PACCHION *Epist.* p. 191. Aliquot sibi ordinibus incumbentes bullæ BIANCHI p. 139. Sphæricæ duplici membrana factæ &c. VALSALV. *Ep.* II. LINDEN *physiolog.* p. 108. n. 9. Humore bilioso repletæ VALIS. n. 8. & lymphæ n. 7. Racemosæ racemis propria membrana obvolutis ACT. HÆN. *Vol.* III. n. 76. Ad anum descendunt ex hepate per ductum choledochum VALSALV. n. 10. & puto LINDEN *select.* p. 184.

In bove hydatides hepatis VALSALV. *Diff.* II. p. 47. sed intus sebum. Maxima novem librarum FANTON. *Diff.* In lue boum *Act. Hafn.* III. *obs.* 76. *Bresl. Saml.* 1725. m. Aug. & ovi struthiocameli æqualis in bove CALDESI p. 58. In ovibus morboris frequentes LINDEN *physiol.* p. 108. Hydatidis plena vermibus WAINWRIGHT p. 34. In equis ranunculo pastis hepar vesiculis plenum le NOBLE p. 12. In equi hepate BARTHO-LIN. p. 130.

(f) G. v. SWIETEN III. p. 88. CHESELDEN p. 212. In hydropico mesenterium, pericardium, intestina crassiora SINOPEI *prorag.* p. 50 51.

(g) Cum calculis felleis *Eph. Nat. Cur. Vol.* VIII. *obs.* 70. Cum hydatidibus, & sanguinis in eam effusi 5. gallons CHESELDEN p. 212.

(h) SPIGEL *semiter.*

Notum est præterea, quam facile in hepate hominis (*i*), & animalium (*k*), saginatorum adeps enormi copia colligatur, ut inde bilis vires minuuntur (*l*).

Quare si motus sanguinis in hepate lentissimus est, fient, quæ alias ostendimus, trahent se particulæ (*m*) pingues, quæ bilem generant, & is lentor conjunctus cum circuitu tardiore, aptissimus erit generando viscido humori (*n*) qualis est in bile.

Multa ergo præcipua vena portarum habet, ex quibus persuadearis, ab ea bilem secerni, quæ omnia non sunt in arteria, cui sanguis idem est, qui in renibus, & idem pari celeritate movetur.

Sed etiam experimento constitit, cum arteria hepatis vinculo intercepta fuisset, bilem perinde natam fuisse (*o*).

§. XXIX. *Vires quæ sanguinis per hepar motum accelerant.*

Si lentus in hepate sanguinis motus est (*a*), si impediti canales, & reticulo (*b*) scrobiculoso pleni: si vesicula bilem recipit, in qua motus omnis perit, & bilis in quietem reducitur: si viscida (*c*) ipsa, & minime forte inter fluentes humores meabilis; si periculum obstructionis maximum, fuit certe ex creatoris sapientia, vires moventes alias præter cor hepati largiri.

Earum aliæ constantes sunt, aliæ ad certa tempora restringuntur.

Perpetuus est motus respirationis. Hepar, uti dudum monuimus, pene totum

(*i*) Cum victu lauto augetur moles hepatis & totum abdomen replet CHRYNE *disseas. of body and mind* p. 188. Ex adipe suffocati C. GEMMA.

(*k*) ROBINSON *of food and disch.* p. 109. 110. Hepar avibus cortinis, quam feris majus ID. majus feli domesticæ, quam feræ, corpus magis exercenti BUFFON T. VI. p. 27. An ergo hepar magnum carnivoris SCHRADER p. 9.

(*l*) FLOYER p. 112. Bilis macilentæ ovis acrior & profundius colorata ROBINSON *of medic.* p. 198.

(*m*) L. VII. p. 449. 452.

(*n*) L. VII. p. 462. *Prim. Polon.* III. p. 40. SPOLETI *in opusculo Venetiis an.* 1685. edito, quod nunquam vidi.

(*o*) MALPIGH. *de liene* p. 120.

(*a*) p. 598. 599.

(*b*) p. 506. 507. 530. 531.

(*c*) p. 545.

totum diaphragmate continetur, tamquam cavo modulo. Id diaphragma in omni inspiratione descendit, urget hepar (*d*), deorsumque pellit, deque plenissimo viscere humores omnes exprimit, vi quidem in respiratione vulgari modica; majori quando per cursum, laborem, vel nixum eadem incitatur, maxima in vomitu, in tussi.

Quare adparet, ut motu musculoſo demto, animalium hepata in immensum excrescant (*e*), & in carceribus per nostram observationem (*f*), & in desidiſis calculi (*g*) bilarii coalescant, ut vicissim motu musculari excitato obſtructiones jecoris solvantur (*h*) & hepar reddatur minus.

Huc referas, quod negat bilem in pueris ad intestina descendere ILL. de BUFFON (*l*). Huc etiam, quod apertis musculis abdominis vasa mesenterica intumescant & varicibus (*m*) varietantur.

Non autem oportuerat hanc potentiam respirationis adeo manifestam in juvando circuitu per portas rejecisse (*n*):

Per expirationem hepar pariter urgetur, dum costæ ad se invicem accedentes hypochondria arctant: & vesicula fellea ab expiratione inanitur. Quare etiam, dato emetico medicamento, hepar scirrhum depletum icterum subitum fecit (*n*^{*}): in aliis vero ægris, vel a medicamento (*n*[†]), calculi & bilis ictericorum promoventur; vel per vomitum ab ipsa natura productum, quo fere semper paroxysmi biliosæ colicæ solvuntur. Tanta in vomente (*o*), in vesiculam est pressio, ut vesicula

(*d*) SPIGEL p. 217. GLISSON p. 36. DARLINCOURT *canicid.* VII. WAINWRIGHT p. 21. *Exper. nostr. Opusc. minor.* 15. 32. 34. 37. 41. 44. 50. 51. 52. 54. 55.

(*e*) p. 455.

(*f*) Ut ipse vidi.

(*g*) ADOLPHI *oper.* p. 667. ROBINSON *food and discharg.*

(*h*) Senes, feminæ, homines sedentarii *Script. Societ. Danic.* II. p. 386.

(*l*) *Hist. natur.* T. II. p. 456.

(*m*) SWAMMERDAM *respir.* p. 104.

(*n*) HAMBERGER *physiol.* p. 301. seqq.

(*n*^{*}) SINAC. *Ess. de phys.* p. 170.

(*n*[†]) CHEYNE *diseases* &c. p. 189. Hinc in ictero emetica laudat HORMAN *Med. Cons.* T. V. Dec. IV. c. 7.

(*o*) A vomitu bilis iter vehementer acceleratur ejusque enormis vis subito egeritur; ad tres libras in febre petechiali VALCARENGHI *med. rat.* p. 268. etiam ad 15. libras cum bonis ægri rebus RAYMOND *malad. danger.* II. p. 47.

cula rupta visa sit (*p*). In expiratione certe bilem effluxisse vidi (*q*). Dum muscoli abdominis hepar retrorsum pellunt, vesiculam certe expriment. In nixu rapidius fluit, tunc enim diaphragma resistit. In homine, periodica convulsione pulmonis laborante, in ipso paroxysmo magna copia bilis effundebatur (*r*). Laxatur idem in utriusque actionis intervallis.

Videtur respirationis effectus in hepar, quam in vesiculam promptior esse. In omni vomitu ventriculi primum contenta projiciuntur, tunc flava bilis, semper autem novissima, quæ saturato colore, & amaro, & viscore se demonstrat ex cystide fluere. Ita in navibus videas, ita in morbis. Ex ordine reddebatur pallida, vitellina, æruginosa bilis & isatodes (*s*). Impedita via cystici ductus, eademque angusta, hujus phænomeni causa fuisse potest. Celerius eadem profluit, quo cysticus ductus angustior est, quam vesicula.

Habet autem vesicula fellea suam peculiarem compressionem a visceribus cibum recipientibus; a ventriculo potissimum flatu turgente (*t*), ab intestino duodeno, quod proxime vesiculam contingit, & a colo (*u*) cui eadem incumbit. Hi enim tubi dilatari nequeunt, quin vesicula exprimatur. Non quod hepar nihil ab iis causis patiatur, nam certe & ipse ventriculus (*w*), & colon distentum hepar urgent.

Hæ vires non sunt perpetuæ (*x*) : ita bilis & tempus nata est, quo in vesicula perficiatur, & tempus, quo ex ea prodeat melior : extra tempus ejus compressionis quiescit eadem, & videtur resorptione venosa (*y*), calore, fotu subputrido, inspissari, alcalescere, amarescere (*z*).

Etsi adeo non (*a*) velim unice per digestionis tempora vesiculam
evacuari

(*p*) SALMUTH I. *obs.* 43. DRUSING *de usu bilis app.* p. 374. Etiam rupta cum in ductu cystico esset introsusceptio MEKKEN *obs.* 73.

(*q*) *De respir.* p. 55. tum SEGER p. 30. & in duodenum ut ego, & in vesiculam, cum ventriculus a vi diaphragmatis descenderet.

(*r*) SIMSON p. 166.

(*s*) COBER *Silesiac.* V. p. 18.

(*t*) p. 524. GIANELLA *orat.* p. XVI. non semper.

(*u*) p. 523.

(*w*) WAINWRIGHT p. 3.

(*x*) BOHN p. 243. VERBIER H. p. 105. Bis de die vesiculam repleti, bis inaniri JASOLIN. c. 6.

(*y*) p. 528.

(*z*) p. 546.

(*a*) BOHN. p. 243.

evacuari, tamen non potest negari, quin a pleno ventriculo (b), & quidem tantum bilis adveniat, quantum copia ciborum requirit, ut enim premitur vesicula, ita bilem dat (c).

Non certe inficetum est monitum, bilem acriorem, cysticam, tunc adfluere, quando massa ciborum intestinum replet, alias ex sua penetrabili natura tormina facturam (d).

Quare in animalibus famelicis (e) bilis vesicula non inanitur (f).

Video secundum alios Cl. Viros bilem, quando vesiculam replevit, suum receptaculum ad contractionem stimulare (g), ita crispari fundum, hinc motum in reliquam vesiculam se diffudisse, bilemque prodisse, cum butyro antimonii tangeretur (h). Sed etiam vim contractilem ductus choledochi (k), & introsusceptionem (l) ductus cystici huc referunt (m).

Quibus ego (n) parum utique tribuo, cum ductus & vesicula a solo veneno ad motum cieantur (o), cumque fibras conspicuas nullas possideant. Nemo certe in quadrupede, aut folliculum se constrinxisse vidit, aut eos ductus. Et omnino aliqui bilem exprimi negaverunt (i).

§. XXX. *Copia bilis secreta.*

In his mensuris nihil quidquam est perpetui. Qui portione ductuum bilis ad venam portarum usus est BORELLUS (a), non bilem sed sanguinem invenit, qui fluere de ramo venæ portarum ejusdem cum cystico ductu diametri. Eam mensuram fecit librarum 34. quod vehementer nimium videtur.

Qui

(b) GIERING p. 376. BIANCHI P. I. c. 19. GORTER de fure p. 28.

(c) LIEUTAUD *essays*. p. 314.

(d) GIERING p. 882.

(e) p. 525.

(f) Frequens est, etsi non perpetuum, ut vidi, & MORGAGNIUS *adv.* II. p. 55.

(g) BOHN. p. 245. BORDU p. 426.

(h) PAGANI & BONIOLI p. 193.

(i) BORDU.

(k) FANTON. *anat.* p. 262. in columba.

(l) MEKERN *obs.* 43.

(m) Neque SIEGERUS p. 29.

(n) p. 526.

(o) Ibid. p. 527.

(a) L. II. c. 40. *prop.* 48. p. 307.

Qui experimenta aut fecerunt, aut adnotarunt, possint videri propius ad verum accessisse, & in cane quidem *Petrus TECKOPIUS* (b), brevi tempore [sed non definito] uncias tres quatuorve hepaticæ bilis folius obtinuit; *GRAAFIUS* ex cane pariter sex drachmas in octo horis (c); Porro *J KEIL* ex molosso drachmas duas (d) in hora; deinde *MAURITIUS van REVERHORST* (e), ex choledochoductu prima & secunda hora ad semuncem: & paulo minus tribus horis proximis, ut æstimaret ad sex in 24. horis uncias. *J. G. HEUERMAN* (f) quinque vel sex uncias ex cane in 24. horis collegit. *Cl. SEGERUS* ex solo ductu cystico (g), intra sex horas plus uncia, intra semihoram drachmas duas habuit, cui experimento plus tribuit, quam reliquis. In homine, cui latus apertum bilem ex vesicula emittebat, *CAJETANUS TACCONEUS* (h) cysticæ bilis folius 4. uncias vidit eodem tempore fluxisse.

Parcus admodum *BIANCHIUS* (i) fuit, qui intra 24. horas unciam unam duasve numerat; uncias aliquot *NICOLAI* (k). *Paucas drachmas LISTERUS* (l).

Recte certe & ad experimentorum normam *MALPIGHIUS* copiam non exiguum esse docuit, cum *SEGERUS* bilem celeriter sibi de tubulo in cystidem iunxisse succedere viderit: & vesiculam in cane inanem altero die bile repletam *WEPPERUS* (m). Et in homine, cui periodici dolores colici quinto die redibant, per icterum finem inventuri, videtur totum systema vasorum biliariorum intra eum diem ad summam & intolerabilem distensionem retenta bile intumuisse (n). Sed etiam magnitudo hepatis, tanto renibus superior, aut salivalibus glandulis, uberem secretionem promittit, etiam si omnia lentiora feceris.

Propius

(b) Aud *PRACHLIN* p. 502.

(c) *Succ. pancreat.* p. 66.

(d) *Secret. anim.* p. 71. *compensat.* p. 77.

(e) *De circul. bil* p. 32.

(f) *Physiolog.* T. III p. 776.

(g) p. 23. 24.

(h) *Mém. de física II.* p. 309.

(i) c. 41.

(k) *Mat. med.* p. 177. 179.

(l) *Fund. med.* II. p. 118.

(m) *Cicut.* p. 252.

(n) *Ex TACENO.*

Propius nequeo ad verum accedere: si tamen canis pondus humani sub quadruplum ex REVERHORS TI experimento ad humanos calculos traduxeris, poterit bilis copia in 24. horis nata ad 24. uncias pervenire, cujus credas sextam (o) partem in cystidem recipi, quinque reliquas ad intestinum deponi.

In morbis abundior generatur. In febre petechiali bilis meracæ tres libræ rejectæ (p) leguntur, & enormis bilis copia in febre flava egesta.

Acceleratur autem is motus potissimum ex ira, quæ subitas quandoque alvi laxationes & diarrhoeas salubri effectum facit. Ex ira mors, & rupta vesicula bilis (p*). Morsus viperæ eandem fere vim exercet, & biliosos vomitus facit (q). Ostendi, quam celeriter & quanta copia in morbis vomitu edatur (q*).

Est in situ universi corporis discrimen. Homo, erecto trunco corporis, aut stans, aut sedens, habet vesiculam transversam (r), collo paulum ascendente (s); & eo magis inferiorem fundum, quo fetui propior est. Ei ergo homini vesicula se paulo difficilius deplet. Contra homini supino (t) vesicula ex fundo descendit, ut facillime se evacuet.

Ita etiam in homine in sinistra (u) decumbente melius inanitur, cum etiam tunc fundum habeat superiorem.

Contra laxari credit Cl. DUVERNEY, & ductum etiam laxiorem esse, quando in dextrum latus decumbimus (x).

§. XXXI. Quo bilis abeat.

Ex duodeno intestino, aut semper, aut sæpe tamen, portio bilis in ventriculum (a) redit, perpetuo quidem in nonnullis animalibus (b). Major vero pars ad intestina se convertit, eorumque totum ductum sequitur,

(o) VALCARENGHI l. c.

(p) HEUCHER p. 373.

(p*) p. 602.

(q) POUTRAU *melang.* p. 155.

(q*) p. 602.

(r) p. 523. 460.

(s) Ibid.

(t) Quia retrorsum tendit.

(u) Quia sinistrorsum.

(x) II. p. 233.

(a) p. 307.

(b) p. 308.

quitur, ut & intestina undique tingat, tenuia quidem magis, & fæces ipsas alvinas flavo suo colore imbuat, infantibus lætiori, saturato in adultis, perque totum syrma intestini sequatur.

Etsi enim de ea bilis vi tingente aliqui dubitarunt (c), ob fæcum alvi dulcedinem, aut fatuum potius saporem: res tamen ex antiquissima illa adnotatione manifesta est, per quam fæces ictericorum albæ (d), argillacæ, aut certe cineræ (e) sunt. Cum calculis vesiculæ albæ esse solent (f), fellis enim tinctura carent. Hinc educto bilario calculo fæces prius albæ (g), nunc naturalem colorem recuperant. Et infantum albæ fæces, rheo dato apertoque ductu choledochi tinguntur (h).

In nonnullis equidem corporibus ictericorum flavæ sunt (i), nihil enim impedit, quin in exemplo, bilis hepatica ab obstructa cystide averfa, partim ad duodenum intestinum veniat, partim in sanguinem redeat. Etiam in pueris, quibus acor abundat, & per vomitum viridia (k) rejiciuntur, & virides sunt fæces alvi, quæ quidem cum experimentis satis consentiunt (l).

Dulcedo fatua per putredinem ex omnibus omnino saporibus nascitur, & tamen vestigia bilis in stercore humano manifesta LEEUWENHOECKIUS reperit (m), & ipsum amarorem, si quando acrior erat, BOERHAAVIUS (n).

De intestinis pars utique cum excrementis disperit. Pars a magnis viris creditur per venas potissimum mesentericas (o), etiam per vasa lactea

(c) HELMONT in virgine furiosa, & in pueris, cum propria excrementa devorarent *Sexupl. digest.* n. 36. 37. Addidisset ex LAMPRIPIO COMMODUM, ex nuperis ΠΑΡΑΒΕΛΛΟΝ ΕΚΑΤΟΦΑΓΟΣ.

(d) HIPPOC. *Cac.* I. n. 38. 70. ARETÆUS *diut.* I. c. 15. RUFUS II. p. 58. CÆLIUS *tard.* L. III. c. 5. RHAZE *divis.* p. 49. *Munit. fund.* PLEMP. p. 97. KERKING *ebf.* 32. *Ess. of a Societ. at Elimb.* I. p. 261. GEUDER *ferment.* p. 108. *Hist. morb. uratislav.* 1699. p. 16. BORRICH *Sent.* III. *Epist.* 97. REVERHORST p. 40.

(e) VIEUSSENS *ebf.* p. 228. *Morb. uratislav.* 1699. p. 16.

(f) TACCON *Comm. Litt. Nor.* 1742. *bebd.* 32. add. 1740. *bebd.* 19. GEUDER. *Coe* p. 143.

(g) *Comm. Litt. Nor.* 1740. *bebd.* 19.

(h) SENNET *infant. curat.* c. 22. &c.

(i) RIOLAN. *encbirid.* p. 132. MEAD. *pois.* p. 32. qui eo in casu diarrhoeam conjungi monet, de HARN T. IV. p. 121.

(k) Add. FLOYER p. 115. HUXHAM *de colica damna.* p. 20.

(l) p. 553. 554.

(m) *Epist. Physiolog.* p. 374. 376.

(n) *Disp. inaugur.* p. III. 195.

(o) BOERHAAVE J. R. M. n. 106. M. V. REVERHORST p. 36. ZENDRINI *de cortice chin.* p. 23. seq.

ctea (*p*), resorberi, & ad sanguinem redire, cum aliqua quasi naturæ parsimonia, ut semel nata bilis sæpius usibus humanis inserviat, acrior ex consuetudine cum fecibus alvinis, & ex fotu perpetui caloris.

Res in controversiam vocata est (*q*), neque satis certo potest defini. Occurrit statim acrem esse bilem, & si verum est, intestina ad excretionem stimulare, stimulatorum etiam villos contractiles, in quibus vascula sunt resorbentia, quos ostendemus utique acrimoniæ impatientes propria vi se claudere, ne subeat.

Etiam hic liceret reponere, bilem, quæ resorbetur, nunc non acrem esse, vimque suam nimiam amisisse.

Mesenterium flavum vidit LIEBERKUHNIIUS (*r*), vasa lactea bile plena GALEACIUS (*s*).

§. XXXII. *Bilis utilitas.*

Tantum viscus (*a*), & vena propria ad hos unice fines destinata (*b*), peculiaris fabricæ, in pene omnibus animalibus repetita (*c*), non possunt non ad magnas utilitates a natura destinari.

Prima videtur, inservire dissolutioni ciborum. Intrita nempe cum cibo bilis per alternas motus peristaltici vices, accurate & cum muco, & cum oleo, & cum aqua miscetur (*d*), eaque omnia alioquin hostiliter se repulsura, in unum homogeneous magma solvit. Lac in ventriculo acidum & coactum perfecte colliquat, ut sub ductus bilarii insertionem nullum coagulum supersit. Sed etiam facit, ut ex aqua & adipe emulsio nasci possit, quæ chylus dicitur. Pisces, quibus neque diaphragmatis vires ullæ sunt, neque musculorum abdominis, neque calor, neque robur musculorum ventriculi, tamen (*e*) difficillimos cibos coquunt; sed iis magna hepata sunt, & bilis est acerrima (*f*). Ipsa ossa putat Cl. DOSSIE a bile dissolvi, in cane, cujus fel ab acore admisto minus debilitatur (*f**).

Sed

(*p*) ZENDERINI.

(*q*) LISTER *aq. medicat. angl.* II. p. 116. BIANCHI c. 16.

(*r*) *De villos. tun. intest.*

(*s*) *Comm. Bonon.* T. II. P. I. p. 157. 158.

(*a*) p. 454. 455.

(*b*) p. 495.

(*c*) Ibid.

(*d*) p. 549.

(*e*) p. 312. 313.

(*f*) p. 547.

(*f**) L. p. 488.

Sed etiam experiendo constitit, supra bilis accessionem materiem intestino contentam magis grumofam, inferius constanter fluidam esse (*g*). Etiam in limacibus panis devoratus digeritur, qua hepar ventriculo cohæret (*h*). Et bilem peculiariter oleosa solvere, tum ex prioribus illis (*i*) adparet, tum ex peculiari morbo.

In ægro icterico fæces albæ erant, super natante pinguedine [cui solvens liquor defuerat]: cum vero medicamentis exhibitis calculus per anum decessisset, porro fæces oleosæ esse desierunt (*k*). Diarrhœæ chylosæ a calculis (*l*).

Porro in cane, cum intestinum duodenum lino interceptum fuisset, intestinum [*m*] supra vinculum grumis griseis plenum fuit, inferius massa homogenea. Et caseosas esse puerorum fæces, quibus albæ sunt, a non subactio oleo, notissimum est. Et in ictericis argillacea sunt tenacitate. Neque dici debebat, in duodeno lactea vasa esse ante admistam bilem, cum adeo frequenter ea etiam in ventriculum veniat [*n*].

Non credo adeo absque experimento Cl. Viros oleosa a bile dixisse cum aqua misceri [*o*].

Villos lacteos abstergere, ne obstruantur, Cl. Viri est opinio, quæ non valde a priori diffidet [*p*].

Altera pars officii bilis videtur ad acidi subactionem pertinere, quod in cibis animalium herbivororum, etiam sæpe in carnivoris, dominatur, canibus [*q*] etiam & felibus, & cujus tamen vix vestigium in fæcibus alvinis superest. HELMONTII hæc sententia fuit, non absque experimento sagacis viri [*r*].

Sic

[*g*] *Mém. avant* 1699. II. p. 24. du HAMEL p. 249.

[*h*] GAUTIER *obss.* T. III. p. 484.

[*i*] p. 549. 550.

[*k*] GRUDER *de ferment.* p. 108.

[*l*] BIERLING *adv.* n. 51.

[*m*] ASTRUC. *digest.* p. 249.

[*n*] BERGER *de flux chylos.* p. 5. Negat J. Henricus SCHULZE supra insertionem ejus ductus reperiri de ictero 13. & SCHMIDT *de bile* n. 10.

[*o*] Ad Cl. RAMSAY.

[*p*] COLE *of secretion* p. 252.

[*q*] p. 316. FLOYER *præternat state of hum.* p. 122.

[*r*] *Sextupl. digest.* n. 21. Acidum in similem bili-salsam & volatilem naturam converti. Inde BOERHAAVE, FLOYER &c.

Sic etiam puerorum fæces acidum spirant, quando albæ sunt & caseosæ.

Dominabatur acor in cadavere, cum nulla bilis adesset [s].

Non ideo continuo, etsi utique alcalinæ naturæ proxima est, destruit totam ad acidum cibi propensionem, nam in chylo ea superest.

Denique antiquissimi jam medici docuerunt, bilem intestina ad contractionem stimulare, & clysteris naturalis loco esse [t].

Hæc iterum ex morbis demonstrantur. Pertinacissime alvus pigrescit, quando ex quacunque causa bilis vel nulla advenit, vel justo certe debilior.

Ex calculis bilariis [u], aut obstructo ductu [w] bilis, ex hepatis scirrho [x], & abscessu [x*]: ex ictero [y]: ex vulnere demum vesiculæ felleæ, nulla clysterum vi alvus liberari potuit [z], & ex averso ad vomitus bilis itinere [z*].

Etiam tympanites a destructo motu peristaltico nascitur. Sed in eo hydropice calculus in vesicula moschatæ mole visus est [a], & hepar maximum 36. lib. cum abscessibus [a*]. In elephanto, cum bilis deficeret, alvus sicca fuit [b]. Et contra intestina valde contracta, cum bilis plurima [b*] foret.

Cysticæ vero bilis hoc potissimum officium videtur. Nam aperto ductu hepatico, cum cysticus clausus esset, ob bilis fatuam dulcedinem alvus

[s] Eph. Nat. Cur. Vol. VIII. obs. 10.

[t] GALENUS de usu part. L. V. c. 3. 5. diet. nat. p. 241. RHASE ad MANSOR. L. I. c. 22. VESAL. L. V. c. 8. GREULICH, WILLIS phar. rat. p. 43. PECQUET Diff. p. 91.

[u] HOFMAN med. syst. T. IV. Sect. II. c. 9. PALFYN. anat. chir. Ed. Italic. T. II. p. 198. Ess. of Edimb. II. n. 30. ORTLOB. n. 17. BROMEL Act. Lit. Suec. 1726. p. 133. Ad octavum diem LUDWIG l. c. & scybala durissima Id. Eventu funesto Comm. Lit. Nor. 1738. n. 18.

[w] Fæces congestæ ab obstructo ductu cystico COTTER p. 114. BARTHOL. Hist. 43. Cent. IV.

[x] Alvus rarissima KERKRING obs. 82.

[x*] Act. Lit. Suec. 1733 p. 110.

[y] FANTON. diss. anat. p. 39. Ad mortem usque Comm. Nor. 1738. n. 18.

[z] STUART Phil. trans. n. 414. & cum vesicula nulla fuisset SCHURIC p. 232. hennetol.

[z*] VALCARENGHI med. rat. 1737. p. 105.

[a] DANGEAU ad BAGLIV p. 171.

[a*] ZACUT prax. med. mirabil. L. II. obs. 45.

[b] STUKELLY p. 96.

[b*] MORGAGN. sed. caus. II. Epist. 30.

alvus non fuit liberata [c]. Inde explices, ut icterici possint esse alvo laxa [d].

Contra bilis nimis acris, fluida, & copiosa fuit in diarrhoea [e], dysenteria [f], cholera [g], febre flava [h], lipyria [i] lue maligna [k], petechiali [l], peste [m]: etiam piscium [n], in morbo gangrænosio fecalino [o]; in morbo bovino [o*], in hydrophobia [p].

Non ideo hæc unica causa est motus peristaltici, qui fit in infectis, quibus nullum est hepar, neque bilis ulla. Sed motus omnes infectis vividiores sunt, quam majoribus animalibus, et stimulo minus indigent.

Quare videtur ad coctionem ciborum omnino bona bilis requiri.

Credas etiam ventriculum ab ea stimulari, ut famem percipiat [p*]. Nam ab ictericis plerumque appetitus abest, & nausea nascitur [q], & digestio debilis [r], & peculiaris languor [s], quem in nullo alterius

[c] TACONI *hep. affect.* l. c. p. 329.

[d] PISONI *spicileg. curat.* p. 157. qui ab ea observatione contra receptam opinionem ratiocinetur.

[e] MALPIGH. *posth.* p. 21. DIEMERBROECK p. 31. Etiam ductus pancreaticus eo in casu bile plenus GRAAF p. 25. In fluxu hepatico VALISN. III. p. 167.

[f] SPIGEL p. 58. Eum morbum bili tribuit DEGENERUS: adde BARTHOL. *hist.* 80. Cent. III. Multoties se ipsa major vesicula SPIGEL.

[g] PECHLIN *purg.* p. 109.

[h] *Ess. of Edimb.* II. p. 384. In febribus biliosis americanæ tropicæ acerrima & abundantissima BISSET *medic. constit.* p. 212.

[i] BARRERE *nov.* p. 133. seq.

[k] *Journ. med.* 1758. Tertianæ maligna CLEGHORNE p. 165.

[l] Bilis meracæ tribus libris rejectis sanata VALCAERENGHI l. c.

[m] SOULIER *de la peste* p. 264. 261. COUZIER *ibid.* p. 402. SCHREIBER *obs.* 12. ut vesicula rumperetur p. 201.

(n) SCHEUCHZER ad DEIDIER p. 934.

[o] *Disp.* P. D. LONGOLII p. 32.

[o*] Fætida, æruginosa GOELICKER *de ea lue.* Nigra & corrupta RAUDOTI p. 22. Vesicula fellis maxima GIANRELLA *Phil. transf.* n. 356. *Gal. min.* VII. p. 120. BORROM *epidem.* p. 27. SALCHOW. *Mém. de l'Acad.* 1748. p. 137. PLANQUE III. p. 31. Pro 8. & 11. unciis uncie 12. 15. STIEF *Hamb. Magaz.* l. c. p. 398. ad octo libras BUCHWALD *Act. Dan.* II. p. 393. Quadruplo major MANGER *reflex.* p. 161. Triplo SAUVAGES *mém.* p. 16. triplo, quadruplo GOELIKE.

[p] FANTON. *Diff. anat.* p. 39. CHIFFLET *obs.* 41.

[p*] Nam etiam medicamenta amara appetitum excitant, ut aloë, alia.

[q] LANCIS. *Diff.* X. in HO. ALBANO. VIRIDET *bon chyle* p. 632.

[r] A calculis felleis Eph. Nat. Cur. Vol. IX. *obs.* 106.

[s] VIRIDET *bon chyle* p. 632. SCHURIG *lithol.*

rius visceris morbo tantum adnotavi. Idem eventus est calculorum biliariorum [s*].

Et contra famelicis animalibus magna vesicula, bilis acris & amarissima [t]. Ab amplissimo hepate appetitus egregius [u], & bulimus [w].

§. XXXIII. Num sanguinem dissolvat.

Hæc fere sunt, quæ certa fide de bilis utilitate innotuerunt. Inde fit, procul dubio, ut deficiente bile vel inerte, vel ex hepatis ulcere [a], vel ex calculis felleam vesiculam replentibus, cibus nunc parum recte coctis, aquosus primum corpus languor occupet [b], deinde plenus & perfectus hydrops [c].

Non quod bilis acrimonia sua sanguinem, & humores omnes solvat [d], ut quidem creditum est. Eam enim violentiam ab amara & acri bile expectes. Sed in hydropicis & cachecticis eadem plerumque iners est [e], aut pauca [f], aut omnino nulla [g], etiam ictericis sæpe subsalsa & vix amara [h].

Rectius existimes, cibus minus coctis, oleo cum aqua non rite misto, non compacto in gelatinosam lympham mucosam, discedere partem tenuiorem,

[s*] PRÆSTIUX *obs. med.* p. 69. 70. hic quidem cum ulcere hepatis. Post nauseam crustæ lapideæ per fæces CONTULI *lap. & podagr.* p. 60.

[t] p. 525 &c

[u] SPIGEL p. 217. Falconi BARTOL. *dub. contr. Lymph. Sol.* p. 157.

[w] CORNELIUS GEMMA.

[a] LEIGH *Exerc. V.* p. 131. 132. FONTAN. *Analect.* p. 90. *Act. Lit. Suec.* 1713. p. 110. *Zod. Med. Gall. I.* p. 127. BARTHOL. *Cent. IV. hist.* 25. Hepar in hydrope ascite fere adfectum est LIEUT. *precis.* p. 416.

[b] Cachexia WEPFER *apopl.* p. 142. LIEUTAUD *ibid.* p. 91.

[c] Hydrops. *comm. Lit.* 1742. *hebd.* 32. *Phil. transf.* n. 299. FONTANUS ad VESAL. p. 21. SAUBERLICH *Act. Erud. Suppl. T. X. S. IX.* SACHS *lapid.* p. 102. HOFMAN *Med. cons. T. II. D. V. c. 9.* *Hist. morb. uratis.* p. 211. BAGLIV. p. 577. in Card. NORRIS. *Ess. of a Societ. at Edimb.* II. n. 30.

[d] ANC. *Mem. II.* p. 92. DIPPEL. p. 63. SEGRÆ. n. 19. Caninam bilem ossa solvere DOSSIE p. 488.

[e] HOFMAN. LIEUTAUD *precis I. c.* Frequenter *Phil. transf.* n. 133. *Ess. of a Societ. at Edimb.* II. n. 38. VATER *hepar insom.* Tenulis IDEM *ibid.*

[f] SAUBERLICH. *Act. erud. Suppl. X. S. IX.*

[g] FONTAN. HOFMAN *acid. viscid.* p. 9. 10. K. *Svenska Wetensk. Acad. Handl.* 1752. *Trim.* I.

[h] De cystide sermo est G. v. SWIETEN III. p. 107. Mucus *Bresl. Saml.* 1724. p. 432. vide p. 543. 544. &c.

rem, in cellulofas telas, in urinæ vias [*i*], denique in caveas corporis humani.

Non ideo non aliæ hydropis [*k*] causæ sunt, idemque morbus cum fano [*l*] hepate conjungitur, ut ipse non semel vidi; five quacunque via sanguinis nimium amissum fuerit [*m*]; five scirrhus aliud præcipuum viscus occupaverit; five nimia venus, five convulsiones hystericae corpus debilitaverint; five vasa lymphatica a quacunque causa [*m**] impedita fuerint succum resorbtum revehere [*n*].

§. XXXIV. *An aliæ sint bilis dotes.*

Non penitus improbabilis conjectura fuerit, plus esse in bile, & propiorem ad vitam sustentandam utilitatem. Vulnere nempe vesiculæ, cum non alia parte corporis læsa, funesta fuerunt, aut celeriter omnino [*a*], aut aliquot post dies [*b*], & pleraque animalia [*c*], quibus incisores vesiculam experiundi causa exciderunt, & ipsa interierunt. Insomnem etiam fuisse lego [*d*], cui vesiculam vulnus aperuerat.

Videtur autem ad adeo velocem mortem solam in coquendis cibis diminutionem aliquam non sufficere: neque sudores frigidos & animi deliquia

[*i*] Diabetes ex vitio bilis fere fit MEAD. of pois. p. 33.

[*k*] CÆLIUS tard. L. III c. 8.

[*l*] BUDDER L. IV. c. V. WILLIS stupend. abd. tum PETZOLD obs 65. BAGLIV Diff. p. 577. COCCHI Lagni di Pisa p. 262. LEIGH. natur. hist. of Lancashire II p. 76. KEAUNIG obs. 15. ut tamen nimis magnum esset. SCHNEIDER de liene Thes 37. BONTKOR Thée p. 207. SEVERIN. abscess. noviss. MAUCORDATUS p. 334. Fluxus alvi crementus VATER hepar. inf.

[*m*] L. II p. 150.

[*m**] Sæpe in hydropse viscera solidiora SAVIARD obs 93. Ex hydatidum immenso numero per omnia viscera ZINGVARDIN Anmerkungen p. 35.

[*n*] In L. II. p. 168.

[*n**] M. CORN hipp morb. anal. p. 316.

[*a*] AMMAN hora 27ma. Intra paucas horas ALBERTI.

[*b*] ORLIOB l. c. n. 17. AMMAN prax. p. 254. STUART Phil. transf. n. 414. BIERWIRTH struct. hepar. p. 19. ALBERTI Jurisprud. med. leg. T. VI. p. 309. BIANCHI p. 491.

[*c*] BORN. I. ALBERTI, quem continuo citavimus.

[*d*] STUART ibid.

liquia, ex ea causa supervenire, quæ post vesiculæ vulnera a Cl. Viris adnotata sunt [e].

Ea phænomena ut explicent Cl. Viri, suas offerunt hypotheses: SYLVIVS quidem [f], in sanguinem resumptam bilem repetito in corde dextro confluere, alereque adeo vitalem cordis ignem: hinc sanguinem fetus [g], ob bilem inertem non effervescente, esseque bilem oleum pro lampade cordis [h]. Vel etiam absque eo fervore bilem in sanguinem redeuntem corpori universo animalis sensum, calorem, vigorem impartire [i], causam esse pene omnis in eo corpore motus, etiam cordis, & somni, & quæ alia.

Verum hæc omnia nimia sunt, cum in sano animale bilis in sanguinem non redeat, & lenta, ut narravimus, ab obstructo hepate, aut inutili vesicula, mors sequatur, sive calculis obsessa nihil ad intestina dimiserit [k], sive ulcere aperta bilem siverit de lateris vulnere elabi.

Quare eas a vulnerata vesicula mortes a summa acrimonia putridæ bilis [l] forte repetas, quam ILL. Auctor citat, & historia chirurgi confirmat, cui manus intumuerunt, & mors epileptica vitæ finem fuit, cum bilis, de læsa vesicula effusæ, aliquantum in digiti sui vulnusculum recepisset [m].

Quare animalia vesicula fellis excisa omnino aliquando' superfuerunt [n], & cum BOHNIO duo canes ab extirpata vesicula periissent, tertius per aliquot hebdomades supervixit, cui ductus cysticus lino interceptus fuerat, neque bilis effluerat [o].

Balsamicam naturam HELMONTIANAM omitto, quæ cum putrescibili bilis indole nequeat consistere.

§. XXXV.

[e] BIERWIRTH.

[f] Diff. X. n. 55. 56. vide L. nostr. VI. p. 288. DUCCHINI p. 247.

[g] SWAMMERDAM respir. p. 113.

[h] DUCCHINI.

[i] WOODWARD cases. p. 201. & conf. BYEFIELD letter to WOODWARD Lond. 1719. 8.

[k] p. 569. &c.

[l] G. V. SWIETEN T. III. p. 500.

[m] ORTLOF l. c.

[n] CRAMER apud HAMER medic. renunciat. n. 40.

[o] BOHN lethalat. vuln. p. 154.

§. XXXV. *Non bilis sit excrementum.*

Nimium aliqui bilem laudaverunt; sequuntur qui nimium deprefferunt. Eo omnes eos scriptores refero, qui bilem dixerunt esse excrementum [a] de chylo separatum, dum per hepatis vires in sanguinem coquitur.

Nuper etiam aliqui huic humori omnem utilitatem negarunt [b].

Aliqui etiam causam morborum fecerunt, ut a bile morborum acutorum [c], podagræ [d], & calculorum [e] origo, & corruptela sanguinis [f] repeti posset.

Neque penitus improbable videri possit, sanguinem per bilaria vasa aliquam particularum ad putredinem vergentium partem deponere.

Et tamen non ausim, etiam hanc admittere accusationem. Retenta enim bile, ut vidimus, sanguis non ideo aut putrescit aut alcalinus fit: sed longi sequuntur morbi, quales a coagulo, a lentore, ab acido aucto demum expectes [g].

Excrementum vero id solum recte dixeris, quod excernitur. Bilem, si natura voluisset de sanguine expurgare, effudisset in vicinia intestini recti [h]; ne chylum sua admittance temeraret. Sed in omnibus animalibus bilis in principium intestini adfunditur, ut nihil fere alimenti ad sanguinem veniat, quod cum ea non mistum sit. In vipera non [h*] est venenatum [i].

S E C T.

[a] Auctor *περί γενεών* L. IV. p. 59. ARISTOTELES *part. anim.* L. V. c. 2. p. 77. *Isag. anat.* c. 20. GALENUS *us. part.* L. V. c. 3. etiam PARACELSUS, qui floribus cheiri hoc excrementum jubet tollere; & de altera parte bilis, quæ in duodenum ablegatur NEN- TER *physiolog.* p. 170. COLBATCH *doctrine of acids assert.* p. 443.

[b] LISTER *font. med. Angl.* II. p. 116. qui etiam ad chylum faciendum inutilem dixit.

[c] ARISTOTELES l. c.

[d] PINELLI *de podagr.* p. 54.

[e] IDEM *ibid.*

[f] BERINGER *in disp. Heidelb. defensa* 1740.

[g] p. 612. &c.

[h] PERRAULT *Ess.* III. p. 220. BOERHAAVE.

[h*] Venenatum putabat ALDROVANDUS *Dracon. & serpent.* p. 118.

[i] VESLING *Epist.* IV. MODIENA ad SEVERIN *piper.* p. 358. SEVERIN. experi- mento facto p. 288.

S E C T I O I V.

H E P A T I S U T I L I T A T E S.

§. I.

PRima, quæ inquirenti se offert, est omnino generatio bilis, tamquam succi, absque quo cibi coqui nequeunt.

Facile etiam adparet, hepar diaphragma replere, & sustentare, ut & in expiratione plenus sit ejus fornix, & inter inspirandum diaphragmatis descendens pressionem excipiat, adque subjecta viscera, ventriculum, colon renes, alia perferat.

Sed etiam calore [a] sui sanguinis, qui est plurimus, ventriculum, & colon intestinum fovere diximus.

Neque tamen penitus in his quasi minutioribus officiis mens adquiescit, quæ tantum viscus, tam late per animalium diversas classes dominans, lubenter credat, ad maximas vitæ humanæ utilitatis natum esse.

Ergo GALENUS [b] totaque antiquitas, ad usque RUDBECKII & BARTHOLINI tempora, nobilissimum officium viscerum maximo detulerunt. Chylum nempe de intestinis per venas mesentericas, cum nondum viæ lacteæ innotuissent ad hepar venire [c]. Ibi a facultate propria chylum quasi coqui, & partem excrementitiam bilis nomine ad intestinum ferri. Partem utilem a ruberrima visceris carne in sanguinem perfici [d]; quem porro hepar in GALENICA hypothese, & cordi traderet per venam cavam, per diaphragma penetrantem; & deorsum per inferiorem venam cavam visceribus mitteret, membrisque reliquis. Hepar ergo venis sanguinem dare [e], & radicem esse venarum [f].

Neque

[a] p. 295.

[b] HIPPOCR. & PLAT. decret. L. VI. c. 45.

[c] De usu part. L. IV. c. 19. 20.

[d] Ibid. c. 12.

[e] AETIUS Acut. cur. II. c. 7.

[f] AETIUS ibid. diuturn. I. c. 13. GALEN. hipp. & PLAT. decret. L. VI. & alibi OALIBAS. p. 216. HIPPOCR. περί τροφής Sanguinis est fons jecur AETIUS cur. diuturn. I. c. 5.

Neque subito ea opinio everfa fuit, etfi vafa lactea detecta fuerunt, quæ chylum forberent. ASSELLIUS eadem ad hepar more majorum duxit.

In eo dissentiebat ARISTOTELES [g], quod venarum, perinde uti arteriarum, originem ex corde deduceret, quæ etiam ERASISTRATI, & inter nuperos ANDRÆ CÆSALPINI [h], & C. HOEMANNI opinio fuit [i].

Verum interim *Guilielmus* HARVEIUS partem ejus theoriæ diruit, cum sanguinem quidem de hepate ad cor per venam cavam venire admitteret, cæterum sanguinem partium infra hepar positarum ita negaret ab hepate venire, ut ostenderet, ad hepar potius confluere.

Neque longa mora fuit, quando PECQUETUS ostendit, vafa lactea, quæ in hepar crederentur chylum ducere, ea quidem in ductum thoracicum & in venam subclaviam tendere. Chylum adeo ad hepar omnino non venire.

Denique BARTHOLINUS [k] invenit, & RUDBECKIUS, quæ vafa in hepate pro lacteis habita fuissent, ea vere lymphatica esse, & ab hepate lympham avehere, in hepar autem omnino nihil ducere [l].

Ita hepar, cum ab intestinis succum alimentarium non accipiat, neque coquere potest, neque in sanguinem convertere.

Restitit aliquamdiu BILSIUS [m], qui vasorum lymphaticorum itinera invertit, ut pars chyli a ductu thoracico ad hepar, perinde ut ad alias partes iret.

Alio modo SWAMMERDAMIUS [n], utique chyli partem, neque eam exigua, per venas mesentericas ad hepar tendere contendit, ut quidem hætenus veterum sententiam sublevaret.

Verum cum lympham ad hepar non venire dudum sit ostensum, &
cum

[g] *Hist. anim.* L. III. c. 4. &c. POLLUX p. 261.

[h] *Quæst. peripatet.* L. V. c. 3.

[i] *Thorac.* L. II. c. 23. 26. &c.

[k] In libb. *de vasis lymphaticis; hepatis desperata causa: Exsequia: Epitaphium.*

[l] Conf. potissimum GLISSONIUM p. 314.

[m] Conf. L. III. p. 253.

[n] Not. in prodr. J. v. HORNÆ p. 10. 29. Repete L. XXIV.

cum per venas mesentericas alii nihil de intestinis forberi malint, alii certe non chylum: cum præterea fabrica jecoris nihil habeat, quod peculiariter ad sanguificationem videatur idoneum esse: cum rubor hepati non magis proprius [o] sit, quam alteri visceri, & absit ab hepate fetus, & nonnullorum animalium [p], quibus sanguis pulcherrime rubet; ob has causas nunc quidem hæc veterum opinio tota derelicta jacet.

Magna cæterum hæc fuit rerum conversio, & late per ipsas morborum causas & curationes omnia commutavit.

§. II. *An non sanguinis circuitum hepar moderetur.*

Quando mecum reputo, nullum bilis in fetu usum esse, cum cibum vel nullum capiat, si Cl. Viris credimus [a], vel certe ejusmodi, ut nulla vi digerente indigeat; quando porro in eo tamen fetu hepar video grandissimum, non ut pulmo quidem futuris destinatum nati hominis usibus exiguum: non possum non suspicari, præter bilis secretionem esse hepatis peculiarem utilitatem, quæ ad fetum propius spectet.

Et continuo occurrit meditati, sanguinem ab uterina placenta redeuntem, cum sanguine intestinorum, lienis, ventriculi, pancreatis, & omentorum omnium, ingens certe sanguinis flumen efficere.

Id non licebat conjunctum in cavam venam inmittere: nimis inde amplam futuram, ut vel tantum torrentem male contineret, vel viribus eam venam donari oporteret, quæ non sint venosi ordinis, & moraturæ fuissent sanguinem de pedibus refluxum.

Neque oportebat sanguinem viscerum chylopojeticorum separatum ad venam cavam mittere, quod in adulto homine bilis melior perfectio ejusmodi posceret sanguinem, in quo horum omnium viscerum sanguis conjungeretur.

In fetu adeo satis certum est, hepar servire frangendo sanguinis ab umbilicali fune redeuntis impetui, ut per hepar, arterioso more distribu-

tus,

[o] GLISSON l. c.

[p] BRONZER de Lampetra.

[a] De iis agitur L. XXIX. Aliam etiam hepatis utilitatem esse, quod in cochleis non amarum sit (SWAMMERDAM p. 123.) olim conjectura fuit MARTINI LISTERE cochl. p. 50.

tus, multa parte sui impetus per frictiones [*b*] necessarias amissa, lentior per venas reduces in venam cavam rediret, sitque hepar tutelæ auriculæ dextræ præpositum, quæ tantæ sanguinis innitentis pressioni male resisteret, nisi eam hepar debilitaret. Neque credo, male huc pulli exemplum referri, in quo periculum ejus pressioni confirmatur. Frequens enim in avibus [*c*], dum ovo continentur, & funestus morbus est, nimia ejus auriculæ distentio.

Ab adulto homine magna pars necessariæ hujus in sanguinis impetu diminutionis abest, cum totum illud maximæ venæ umbilicalis flumen nunc siccum sit [*d*].

Siquidem tamen etiam vena portarum multum de celeritate sui sanguinis amittit, dum per hepar universum ramos suos dispergit [*e*]; si ostensum est, vere ejus venæ sanguinem lentius fluere [*f*], etiam ejus lentoris sua erit utilitas; eadem, ut videtur, quam in fetu, ut nempe sanguis systematis viscerum chylopojeticorum minori cum impetu in venam cavam, proximamque dextram cordis auriculam nitatur.

Alias utilitates hepatis prætereo, ut lymphæ esse colum [*g*].

[*b*] L. VI. p. 192.

[*c*] *Format. du poulet.* II. p. 195.

[*d*] p. 482. 483.

[*e*] p. 489. seqq.

[*f*] p. 599.

[*g*] *VIRUSSENS obs.* p. 218.



I N D E X

ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

T O M I S E X T I

LIBER XVIII.

C I B I I T E R A D V E N T R I C U L U M .

S E C T I O I .

M A N D U C A T I O .

1. N ecessitas ciborum	pag. 1	Temporalis	pag. 12
2. N Cibus in os sumitur	2	10. Masseter	13
3. N Ibi cum subigi oportet	3	Exterior	ibid.
4. Organa quibus adteritur	ibid.	Profundior	14
Maxilla superior . ut mobilis sit	ibid.	11. Pterygoideus internus	ibid.
Tamen imprimis maxilla inferior	4	12. Vires musculorum levatorum	15. 16
Canalis incisivus	ibid.	magnæ , per exempla & pondera.	16
Non vere cavus est	5	13. Vires ad latus deducentes	16
An in bestiis	ibid.	Pterygoideus externus	16. 17
Alia ad os maxillæ superioris	ibid.	Musculi qui os aperiunt	17
5. Maxilla inferior	ibid.	14. Colli latissimus	17. 18
Unicum ejus os	6	15. Dentes in universum	19
Figura	ibid.	In animalibus	21
Processus	ibid.	16. Eorum fabrica in universum	21. 22
Canalis	ibid.	Sensus	22
6. Ossis temporum ad recipiendam		Incrementum	23
maxillam sedes cartilagine crustata	7	Crusta durior	ibid.
meniscus interpositus	7. 8	Fibrosa	ibid.
Ejus variata sedes in manducando	8	Alveolus	24
Num maxilla inferior ad cavam partem		17. Dentium classes	ibid.
ossis temporum adaptetur.	ibid.	Incisores	25
Num ad eminentiam transversam	ibid.	Eorum fabrica	25. 26
Utrinque	9	Utilitas	26
7. Ligamentum laterale	ibid.	18. Canini	ibid.
Alia	10	Fabrica	27
8. Motus maxillæ inferioris	ibid.	19. Molares	ibid.
Deorsum lenius	ibid.	Anteriores	28
Valide	ibid.	Posteriores	29
Antrorsum	ibid.	Dentium varietates	ibid.
Retrorsum	ibid.	20. Arteriæ dentium	30
Ad latera	11	Superiorum. I. Ab alveolari	ibid.
9. Levatores musculi	12	II. Ab infraorbitali	30. 31
		Inferiorum.	31
		Venæ	31
		Nervi	31. seq.
			21. Buccæ

21. Buccæ	pag. 32	9. Liquor oris exhalans	pag. 52
Labiorum fissura	ibid.	10. Saliva in universum	52. 53
Genæ	ibid.	Neque acida est	53
Ligamenta labiorum	ibid.	Neque alcalina	54
Os buccale	ibid.	Ejus phænomena cum admittis corpo-	
Os minus	33	ribus	54
22. Musculi buccarum	ibid.	Analysis	55
Nasales labii sepeioris	ibid.	Aer	ibid.
Levatores alarum nasi & labii supe-		Aqua	ibid.
rioris	ibid.	Lixiviosus liquor	ibid.
Levator labii superioris proprius	ibid.	Oleum	ibid.
Alius vicinus musculus	34	Terra	ibid.
Fasciculus ab orbiculari palpebrarum	ibid.	Ab ea frequentes salivæ calculi	56
23. Zygomaticus major	ibid.	21. Motus salivæ	ibid.
Minor	ibid.	In parotide, glandula maxillari, sub-	
24. Levator labiorum communis	ibid.	linguali	57
Risorius	ibid.	Nam a sola irritatione fluat	ibid.
Triangularis	36	Tamen etiam a compressione	58
25. Transversus menti	ibid.	12. Qua copia saliva excernatur	ibid.
Quadratus	ibid.	Copia aucta	59
Levator menti	ibid.	diminuta	ibid.
26. Buccinator	37	mensuræ per experimenta sumtæ	ibid.
triplex ejus origo	ibid.	abundantia ex morbis	60
27. Orbicularis labiorum	38	13. Utilitas	61
Fibræ ab osse natæ superiores	39	Cum detrimento expuitur	ibid.
Interiores	ibid.	Utilitas salivæ a morbis abundius ex-	
28. Manducatio ipsa	ibid.	pulsæ	62
ejus necessitas	40	14. Resorptio, quæ in ore fit	63

S E C T. I I.

S E C T. I I I.

S A L I V A. 40. 41

D E G L U T I T I O.

1. Humor oris varius	41. seq.	1. In universum	63
2. Glandulæ salivales	42	2. Velum palatinum	63. 64
Parotis	ibid.	Uvula	64. 65
Glandula accessoria	42. 43	3. Arcus faucium anterior	65
3. Ductus stenonianus	43	— — posterior	ibid.
Adteritur stenonio	ibid.	Tonsillæ	ibid.
Ductus ascessorius	44	Sinus majores	ibid.
Insertio	45	— minores	ibid.
4. Glandula maxillaris	ibid.	Tonsillæ secundæ	ibid.
Sublingualis	ibid.	4. Pharynx	66. seq.
5. Ductus excretorius glandulæ maxil-		ejus fabrica, in universum	67
laris	46. 47	latera	ibid.
6. Et glandulæ sublingualis major	47. 48	vicinia anterior	68
Minores	49	5. Musculi pharyngis	68. seq.
Alii	ibid.	Pterygopharyngæi	68. 69
7. Glandulæ buccales	ibid.	6. Fibræ a buccinatore	69
Molares	50	Mylopharyngæi	ibid.
Palatinæ	ibid.	7. Glossopharyngæi	70
8. An & alii ductus salivam generent	51	8. Hyopharyngæi	ibid.
De COSCHWIZIANO ductu	52	9. Thyreopharyngæi	ibid.
De NUCKIANO	ibid.	I i i i 3	Crico-

Cricopharyngæi	pag. 72
20. Stylopharyngæi	72. 73
21. Levatores pharyngis alii	73
Num dentur cephalopharyngæi	73. 74
& salpingopharyngæi	74
22. Pharyngopalatini	74. seq.
Origo	75
arcus	ibid.
columnæ	ibid.
actio	76
23. Glossopalatini	77
24. Levatores palati molles	78
25. Circumflexi palati	79
Origo	ibid.
tendo circumflexus	79. 80
musculus accessorius	80
26. Azygos	80. 81
27. Glandulæ pharyngææ	82
28. Arteriæ pharyngis	83
— propriæ	ibid.
— palati molles	ibid.
— tonsillares	84
— palati duri	ibid.
— buccarum	ibid.
29. Venæ pharyngis	84. 85
Minor	84
major	85
aliæ	ibid.
Buccales	ibid.
30. Nervi ab octavo pare	ibid.
— ab intercostali	ibid.
— a tertio quinti paris ramo	ibid.
Nervi buccarum	86
31. Iter cibi per os	ibid.
Linguae officium	87
32. Larynx clauditur	87. 88
dum elevatur	ibid.
Quid lingua conferat	88
Clauditur Glottis	89
Ne tussis fiat	ibid.
num aliquid de potu in asperam arte-	
riam veniat	89. 90
De minimis guttulis non recusatur	90
33. Cibus in pharyngem recipitur	ibid.
& potus	91
34. Cibus in gulam pellitur	91. seq.
& pharynx constringitur	ibid.
Quare vitia veli palatini periculosa	
sint	92. 93
Quare non semper	93
35. Deglutitio operose peragitur	ibid.

& multa vi muscutorum

94

Muci utilitas

95

& epidermidis

ibid.

S E C T, I V.

O E S O P H A G U S.

1. Varietates in animalibus	95. 96
Iter secundum vertebrae	96
per collum	ibid.
per pectus	ibid.
per abdomen	97
2. Fabrica carnea œsophagi	ibid.
exteriore fibræ	ibid.
interiores	ibid.
In bestiis spirales	ibid.
Non in homine	98
Gula valde dilatabilis	ibid.
3. Cellulosa tela externa	98
Tunica nervea	98. seq.
Sensilis est	99
epidermis seu villosa	ibid.
4. Arteriolæ exhalantes	100
Glandulæ conglobatæ adjacentes	ibid.
Earum frequens scirrhus	101
Glandulæ veræ seu cryptæ	101. 102
5. Arteriæ œsophageæ	102
in collo	ibid.
in superiori parte thoracis	103
in inferiori	ibid.
in abdomine	ibid.
distributio arteriolarum	ibid.
6. Venæ œsophagi	103. 104
trunculi varii	104
in collo	ibid.
pectore	ibid.
abdomine	ibid.
Vasa lymphatica	ibid.
7. Nervi	ibid.
a recurrente nervo	ibid.
a trunco vago	ibid.
8. Actio œsophagi	105
promovere cibum	ibid.
omnino contrahitur	105. 106
9. Motus a diaphragmate	106
Stringitur inter inspirandum gula	ibid.
Sphincter nullus est	107
Consensus inter ventriculum & dia-	
phragma	ibid.

LIBER XIX. VENTRICULUS.

SECTIO I.

FABRICA.

- | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------|
| 1. Quæ animalia ventriculum nata
sint | pag. 108. 109 | stratum intimum | pag. 127. 128 |
| Aliqua intestino carent | 110 | Quæ ligamenta dicta sint | 128 |
| 2. Ventriculus simplex & multiplex | ibid. | 7. Ventriculus animalium, quadrupedum | ibid. |
| Avibus triplex | ibid. | avium granivorarum | 129 |
| Ingluvies | 110. 111 | describitur | 130 |
| Quibus data sit | 111 | 8. Cellulosa tela secunda | ibid. |
| etiam rapacibus | 112 | in ea morbosæ concretæ | 131 |
| Quibus nulla sit | ibid. | 9. Nervea tunica | ibid. |
| Bulbus œsophagi | 112. seq. | 10. Cellulosa tertia | ibid. |
| in quibus speciebus reperiatur | 113 | Sedes inflammationis | 132. seq. |
| Ventriculus carnosus | 114 | 11. Villosa | 133 |
| aves in quibus reperitur | ibid. | est epidermis | ibid. |
| ventriculus membranaceus | ibid. | 12. Plicæ ventriculi | ibid. |
| magis validus | 115 | stellatæ, quæ ex œsophago descendunt | 134 |
| firmissimus | 115. 116 | longitudinem sequentes | ibid. |
| Ventriculus quadrupedum | 116 | Anulus pylori | 135 |
| unicus | ibid. | an claudat pylorum | 136 |
| multiplex | 117 | 13. Rugæ minimæ ventriculi | ibid. |
| 2. Situs ventriculi humani | 137. seq. | Villi | 137 |
| Situs morbosus | 118 | exhalant liquorem arteriosum | ibid. |
| Vicinia varia | ibid. | Papillæ | ibid. |
| Orificia | 119 | in homine dubiæ | 138 |
| Situs mutabilis | 120 | 14. Glandulæ ventriculi | ibid. |
| in cadavere | ibid. | in avibus | ibid. |
| vivo homine | ibid. | in quadrupedibus | 139 |
| ventriculo pleno | 121 | serpentibus & insectis | ibid. |
| 3. Ventriculi figura | ibid. | in homine | 139. 140 |
| amplitudo | 122 | 15. Ventriculi succus | 140 |
| angusti ventriculi | 123 | admiscentur ei peregrinæ dotes | ibid. |
| ampli | ibid. | acida natura | 141 |
| 4. Fabrica ventriculi | 123. seq. | ex corrupto cibo | ibid. |
| Peritonæum seu tunica prima | 124 | & putrida | ibid. |
| unde absit | ibid. | & bilis | 142 |
| 5. Cellulosa tela prima | ibid. | Purus ventriculi succus, ut se habeat | 142. 143 |
| Glandulæ conglobatæ | 125 | Experimenta Cl. Rast in ovemulo | ibid. |
| superiores | ibid. | Compositus est ex variis | 144 |
| inferiores | ibid. | 16. Arteriæ ventriculi | seq. |
| qua cellulosa tela laxa sit & stricta | 126. seq. | Cœliacæ truncus | ibid. |
| 6. Fibræ musculosæ ventriculi | ibid. | divisio | ibid. |
| Stratum extimum inter duo orificia | ibid. | Coronaria major | 145. 146 |
| descendentes | 127 | 17. Splenica | 146 |
| sinistrorsum redeunt | ibid. | Ex ea gastroepiploica sinistra | ibid. |
| stratum transversum | ibid. | Brevis | 148 |
| | | Arteria ventriculi posterior | ibid. |
| | | Splenicæ diameter | 149 |
| | | 18. Hepa- | |

18. Hepatica

pag. 149

Coronaria minor

150

Gastricoduodenalis

ibid.

Pylorica superior

ibid.

inferior

ibid.

Pancreaticoduodenalis

ibid.

Transversa pancreatis

ibid.

Duodenalis

151

Gastroepiploica dextra

ibid.

Epiploica dextra

ibid.

Duodena superior

152

19. Arteriarum ventriculi communia

ibid.

multæ sunt

ibid.

Vasorum distributio per tunicas ventriculi

153

Vasa exhalantia arteriosa

ibid.

Venosa

ibid.

20. Venæ ventriculi

153. seqq.

ex splenica

154

ex trunco venæ portarum

ibid.

ex gastrocólica

ibid.

Aliæ

ibid.

Venæ breves

154. seqq.

An sanguinem dent in ventriculum

155

Qui dare sibi persuaferint

ibid.

Morbus niger

156

Non dant

ibid.

Neque acor in sanguine earum venarum est

ibid.

21. Nervi ventriculi

157

Inde acris sensus

ibid.

acrior, quam cuti

158

& linguæ

ibid.

Inflammatio ab acribus

ibid.

a frigore

159

& flatu

ibid.

Opium ventriculi sensum tollit

ibid.

Homines minus sensibilis ventriculi

ibid.

Sic animalia

160

ut consuetudo venena reddat tolerabilia

ibid.

22. Vasa lymphatica ventriculi

ibid.

hominis

ibid.

animalium

161

an & lactea vasa

162

non constat

ibid.

23. Pori inorganici

ibid.

ducentes in ventriculum

ibid.

ex ventriculo

ibid.

non a vasis resectis

ibid.

veri pori sunt

ibid.

In vivo animale non videntur patere

164

S E C T I O I I.

F A M E S E T S I T I S.

2. Necessitas cibi & potus pag. 164. 165

3. Ob amissam partem corporis anima-

lis

165. 166

& virium

ibid.

4. Ob acrimoniam spontaneam humorum

166. 167

Pereunt homines ex fame

168

5. Aliqui tamen serius intereunt

168. 169

Insecta hiemale per frigus

169

Insecta in ultima metamorphosi

ibid.

Quadrupeda frigida

ibid.

Quadrupeda calida in hibernaculis

170

etiam alia calida animalia

ibid.

6. Demum passim homines

171

Exempla certa habentur

ibid.

ad diem octavum usque

ibid.

ad diem quadragesimum

172

ad octavum mensem

173

ad decem annos

174

& ultra

175

7. Inter abstinentes plurimæ hystericæ

ibid.

etiam stultæ

ibid.

& lectulariæ

ibid.

Fæces, perspiratio, urina vix ulla

175. 176

Plerique asiti potus habuerunt usum

176

8. Magna est necessitas diluendi sanguinis

177

Ideo sitis animali data

ibid.

Aliqua animalia potu abstinent

ibid.

etiam homines nonnulli

178

Quare ii sitim toleraverint

179

9. Celerior est sitis necessitas

ibid.

Quæ sitim augeant

ibid.

Natura est in siccitate oris

180

faucium

ibid.

etiam ventriculi

ibid.

Incisiones eorum qui siti perierunt.

ibid.

10. Aqua sola non nutrit

181

inde cibi necessitas

ibid.

& famis

ibid.

11. Phænomena famis

182

& intolerabilis crudelitas

ibid.

Ventriculus arctatur

183

12. Causæ quæ famem augent

ibid.

Robur animalis

184

vermes

ibid.

acida

ibid.

aliæ causæ

ibid.

homines

homines nimia famis	p. 184
fames est a tritu jugorum ventriculi	185
De succo gastrico ambigitur	186
13. Quæ famem auferant	ibid.
cibus ipse	ibid.
tum quæ sensum ventriculi delent	187
& putrida varia	ibid.
Nausea quid sit	ibid.

S E C T I O I I I.

C I B U S E T P O T U S.

1. Auscultare oportet fami	188
& siti	ibid.
Salubria etiam sunt, quæ valide appetuntur	188. 189
etiam quæ absurda videntur	189
2. Homo est omnivorus	ibid.
Fabrica instrumenti in homine cibos subigentis ambigit inter herbivora & carnivora	ibid.
dentibus	190
intestinis	ibid.
cæco	ibid.
Tamen etiam alia animalia fere utroque victu utuntur	ibid.
etiam herbivora carnes non detrectant	191
neque enim natura vegetabilis adeo multum ab animale diffidet	ibid.
Farinæ indoles	192
pars amylacea, quæ ad acorem vergit	ibid.
pars gelatinosa, quæ ad urinosum qua sint in variis farinis portione	193
3. Cibus vegetabilis	194
primævi fuit hominis	ibid.
& fructuum potissimum arboreorum	195
deinde aliorum, quæ vegetant	ibid.
radicum	ibid.
Cerealium	196
lactis	ibid.
exempla eorum, qui solis plantis se sustentarunt	197
lacte solo	198
integræ gentes victu vegetabili	ibid.
4. Cur tamen ad carnes sit ventum	199
Eti victus vegetabilis bene alit	ibid.
debilitat tamen	200

& minus habet asibilis materici	pag 200
minus dat roboris	201
& morbos aliquos facit	ibid.
inque borealibus regionibus vix est parabilis	202
5. Pisces prius in usum tracti	203
Eorum natura	203
Multi homines solis piscibus vivunt	203. 204
etiam eorum ovis	204
& garo	204. 205
etiam insectis	205
Noxa victus pisculenti	ibid.
6. Ut sit ad carniū usum ventum	206
Eduntur animalium herbivororum carnes	ibid.
carnivororum non facile	207
Aves quæ in cibum recipiuntur	ibid.
& rejiciuntur	ibid.
7. Carniū commoda	207. 208
nutriunt magis	208
& plus dant roboris	ibid.
Porro homines, qui crudis solisve carnibus vixerint, validi sunt	209. 210
8. Victus carnei vitia	ibid.
acrimonia putrescens	211
scorbutus	ibid.
vitia adipis	212
9. Cibus mistus	ibid.
Vegetabilia vitia victus carnosī minuerunt	ibid.
oportet utrumque victum contemperare	ibid.
in calidis regionibus plus adhibere vegetabilis	213
in frigidis plus carniū	ibid.
Consuetudo quid possit	ibid.
10. Fossilia non alunt	213. 214
nisi animalcula aliqua	214
non hominem	ibid.
Metalla non alunt	215
Ferrum quidem ad sanguinem venit	ibid.
& hydrargyrus	ibid.
de auro & argento dubitatur	216
Plumbum venenum habet	ibid.
& cuprum	ibid.
11. Sal marinus	ibid.
est de fossili regno	217
Ejus terra	ibid.
acidum elementum	ibid.
Ad	

Ad solem coctus	pag. 217	Vitriolum	pag. 335
ad ignem, iste deterior	218	Cuprum	ibid.
in condendis carnibus usus	ibid.	Bitumen	ibid.
plerique mortales sale utuntur	ibid.	Sulfur	ibid.
qui abstineant	219	Ferrum	ibid.
12. Condimenta acida	220	Elementa plantarum & animalium pu- tridorum	ibid.
eorum benefica natura	ibid.	19. An omnia ex aqua generentur	236
saccharum	ibid.	Experimenta quibus id vincitur	237
Mel	221	Ex sola aqua plantæ vivunt	236. 237
Butyrum	ibid.	Aqua transit in terram salelem & oleum	ibid.
Fumus lignorum	ibid.	Qui omnia ex aqua derivent	238
13. Ciborum præparatio	ibid.	20. Aqua est potus naturalis	239
qui ea abstineant	222	& saluberrimus	ibid.
Cruda alunt	ibid.	etiam cruda & frigida	240
etiam valenter	ibid.	Cur aliquando frigida nocuerit	ibid.
nocent tamen aere plurimo	222. 223	Solo frigore	241
Carnes ut tenerescant	223	non elemento aqueo	ibid.
gratia ab igne	224	21. Cocta deterior fit	ibid.
afflatio	ibid.	Aquæ impuræ noxa	242
elixatio	ibid.	& aquæ calidæ	ibid.
Aromata	ibid.	aquæ depuratio	243
aromata Europæa	225	aquarum diversarum ratio diversa	ibid.
Calida condimenta	ibid.	22. Vinum	244
14. Potus. Aqua	225. seq.	uti inventum fit	ibid.
ex pluvia provenit	225. 226	ex quibus fructibus paretur	245
Aquæ pluviae indoles	226	23. Ejus qualitates	ibid.
Roris	227	roborat	246
Nivalis aquæ	ibid.	inebriat	ibid.
hæc bona	ibid.	creditur podagram facere	ibid.
Rupestris	228	24. Cerevisia	247
Frigore non congelabilis	ibid.	ubi inventa	248
levissima	ibid.	ut paretur	ibid.
Pondus aquæ	229	ejus indoles	249
15. Aquæ fluviales	ibid.	utilitas	ibid.
puteales	ibid.	vitia	249
duræ quibus multum sedimenti	230	25. Acetum	250
molles quibus parum	ibid.	ejus utilitas	251
16. Aqua est genus vitri	231	26. Spiritus vini	ibid.
certo calore fusilis	ibid.	ejus vires	252
sponte se adtrahit	ibid.	calescit	ibid.
calore dilatatur	ibid.	coagulat	ibid.
frigore contrahitur	ibid.	indurat	253
emittit vapores elasticos	ibid.	Magnæ ejus noxæ	254
17. Admixta ad aquam elementa pere- grina	232. seq.	neque coctionem adjuvat	ibid.
Ignis	ibid.	27. Cibi & potus mensura	254
Aer	233	cibi paucitas reddit salubrem	254. 255
18. Terra varii generis	ibid.	Exempla mensuræ cibi	ibid.
Sal marinus	234	Sobrietas ALOYSII CORNARI	256
Nitrum	ibid.	utilitas ejus sobrietatis	ibid.
Nitrum calcarium	ibid.	28. Mensura potus sensim considerata	ibid.
Sales lixiviosi	ibid.	varia in variis	257
Acor	335	5. Mensura	

29. Mensura cibi
in prandio major

257. 258
258

SECTIO IV.

PHÆNOMENA VIVI VENTRICULI.

1. Ordo dicendorum	258
2. Pressio diaphragmatis	259
3. Musculorum abdominis	259. 260
In vomitu evidens	260
4. Ventriculi ipsius	260. seq.
Est irritabilis	261
Ostia clausa	ibid.
Natura nervea ad irritabilem confert	262
5. Mensura contractionis	seq.
qui parvam faciant	ibid.
nimis parvam fecerunt aliqui	262. 263
accuratissime constringitur	263
& aciculas promovet	264
atque calculos figurat contractione sua	265. 266
6. Vis contractilis in avibus præpotens	266. seq.
Experimenta minora	266. 267
& maxima	267. 268
Vires æstimatæ ad pondus 534. l.	268
Calculi devorati	269
num ad tritum	269. 270
7. Motus peristalticus ventriculi carni- vori	270
multo debilior est	271. 272
adeft tamen	273
absque aeris stimulo	ibid.
Distentus in debilibus stomachus	274
8. Non tamen robur habet, quod ei tri- buatur	ibid.
quantum in cane valeat	274. 275
in homine	275
9. Ejus phænomena	seq.
Alternæ contractiones & laxationes	275
Contractio varia	276
Angustatio	ibid.
decurtatio	ibid.
10. Contractio secundum certum ductum	ibid.
deorsum ad pylorum	ibid.
Motus mistus ex eo & ex motu fur- sum agente	277
Causa in pylori resistentia	ibid.
Pyloro laxo, cibo exit	278
adjuvatur erectione duodeni	ibid.

11. Quo tempore cibus de ventriculo
 exeat

p 279

valde lente si crudus

ibid.

fere in ordine ut coctus est & sub-
 actus

ibid.

Experimenta WALÆI

280

— J. VIRIDET

ibid.

— B. S. ALBINI

ibid.

— L. de BILS

ibid.

aliis præ aliis celerius ventriculus va-
 cuatur

281

12. Motus antiperistalticus

ibid.

Ructus

ibid.

Initium motus in duodeno

282

pyloro

ibid.

ventriculo

ibid.

Singultus

283.

13. Causæ vomendi

ibid.

plenitudo ventriculi

ibid.

obstaculum exituro cibo

284

incitatio ventriculi

285. 286

etiam mechanica

286

& a stimulo persubtili

287

14. Diaphragmatis in vomitu partes

ibid.

num cum solum faciat

ibid.

certe concurrat ad faciendum

288

num musculi abdominis

ibid.

Quid a ventriculo sit

289

& quid a respirationis instrumento

ibid.

Quare utriusque causæ suæ sunt partes

290

& voluntatis est in vomitum impe-

rium

ibid.

non tamen unicum

ibid.

Ut aves vomant

290. 291

& pisces

ibid.

& quadrupeda carnivora

ibid.

herbivora difficulter vomant

292

15. Ruminatio

292. seq.

est cornigerorum

ibid.

Causa ruminandi

293

Angustia itineris ad tertium ventri-
 culum

ibid.

Non potest transire cibus nisi sub-
 actus

ibid.

Potus tamen transit

294

De aliis animalibus ruminantibus

294. 295

etiam hominibus

ibid.

16. Aliæ causæ coctionis ciborum

295

calor

ibid.

ejus gradus

ibid.

17. Aer deglutitus

296

ut resolvat cibos

ibid.

K k k k 2

Aeris

- | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|----------|
| Aeris in fermentatione actio | pag. 297 | granivoris | pag. 316 |
| & in putredine | ibid. | carnivoris | ibid. |
| Distendit aer ventriculum | 298 | Acor cum putredine perinde regnat | ibid. |
| ut crepet | ibid. | inde phaenomena aeris erosi | 317 |
| cur non frequenter | ibid. | ferrique | ibid. |
| ob vitium resolutionem | ibid. | etiam in homine | 318 |
| Distentus ventriculus premit vesiculam | ibid. | 28. §. II. Fermentatio suboritur | ibid. |
| fellis | ibid. | In herbivoris | 319 |
| hinc plena est, quando alvus inanis | 299 | etiam in carnivoris nonnullis | ibid. |
| ex fame, inedia | ibid. | aer generatur | ibid. |
| ob morbos | ibid. | & vapor inflammabilis | 320 |
| Premitt etiam renem | ibid. | etiam absque vini spiritu | ibid. |
| lienem | ibid. | per experimenta | ibid. |
| pancreas | ibid. | Sed raro fermentatio perficitur | 221 |
| hepar | ibid. | 29. §. III. Putredo | ibid. |
| magis in debilibus | 300 | In animalibus ventriculi contenta fa- | |
| 18. Vapor in ventriculum resorbtus | ibid. | tent | 322 |
| ex eo exhalans | ibid. | nonnunquam in homine | ibid. |
| 19. Saliva | ibid. | etiam in herbivoris | ibid. |
| Mucus | ibid. | Veteres qui dixerunt, cibum, putre- | |
| unde copiosior | ibid. | scendo, coquere | ibid. |
| 20. Succus gastricus | 301 | non penitus abs re | ibid. |
| copia ejus incerta | ibid. | in homine sano cibi non putrescunt | 323 |
| sed magna | ibid. | neque inde calor | ibid. |
| 21. Apoendices pyloricæ piscium | seq. | 30. Rancida degeneratio | 324 |
| non sunt cibi receptacula | 302 | oleosorum | ibid. |
| Numerus in variis speciebus | 303. 304. 305 | eorum abusus | 324. 325 |
| etiam infectis | 306 | 31. Cibus in massam informem misce- | |
| 22. Bilis etiam in ventriculum venit | 307 | antur | 325 |
| & vomitu redditur | ibid. | & figuræ ciborum delentur | ibid. |
| in quibusdam etiam animalibus in ven- | | etiam calculus in ventriculo nasci- | |
| triculum ductus bilarius se immit | 308 | tur | 326 |
| etiam in homine | 308. 309 | | |
| nisi error est | 309 | | |
| etiam pancreaticus succus in ventri- | | | |
| culum venit | ibid. | | |
| 23. An spiritus admisceatur | 309. 310 | | |
| 24. Mutationes cibi, quæ fiunt in ven- | | | |
| triculo | 310 | | |
| emolliuntur | ibid. | | |
| dissolvuntur membranæ | 311 | | |
| & omnia in pulvem abeunt | ibid. | | |
| in carnivoris avibus ossa ipsa conta- | | | |
| bescunt | 312 | | |
| & in piscibus | ibid. | | |
| Oesophagi minor potestas | 313 | | |
| 25. Tamen aliqua | 314 | | |
| fibras tamen in quadrupedibus non | | | |
| destrui | ibid. | | |
| 26. Succus extrahitur | 315 | | |
| 27. Ut corrumpatur in ventriculo cibus | ibid. | | |
| acescit | ibid. | | |
| in herbivoris | ibid. | | |

S E C T I O V.

C A U S Æ C O C T I O N I S
C I B O R U M.

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Liquor macerans | 327 |
| absque eo nullum animal cibum co- | |
| quit | ibid. |
| tritu potest carere | ibid. |
| etiam mora | ibid. |
| Is liquor fit ex succo gastrico | 328 |
| & muco | ibid. |
| Muci etiam in solutione ciborum par- | |
| tes sunt | ibid. |
| etiam mitia solvere apta sunt | 329 |
| Saliva | ibid. |
| 2. Vires corruptionis spontaneæ | ibid. |
| Acoris | 330 |
| non est vera causa coctionis | ibid. |
| 3. Putredo | |

- | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|-----------|
| 3. Putredo resolvit partes solidas | pag. 331 | inde nomen coctionis | pag. 335 |
| Sed in ventriculo non plena obtinet | ibid. | tamen ejus non maxima est necessi- | |
| 4. Tritus | 332 | tas | 336 |
| in avibus efficax | ibid. | 6. repudiantur ciborum reliquiæ | ibid. |
| tamen cum maceratione conjunctus | ibid. | 7. Alia ventriculi munia | ibid. |
| in avibus insectivoris minor | 333 | resorbere humorem tenuem | ibid. |
| iterum in carnivoris minor | ibid. | Unique locum habet | 337 |
| & in quadrupedibus carnivoris non | | quare ab obstructo pyloro non statim | |
| magnus | ibid. | mors | ibid. |
| nec homini | 334 | Valvulæ ad resorptionem succi factæ | 337. 338. |
| tamen aliquis | ibid. | tenuæ est quod resorbetur | 338 |
| Non abest tritus totus a coctione cibi | ibid. | non sufficit ad alendum | 339 |
| neque id ostendunt morbi | ibid. | 8. Num in ventriculo sedes sit ani- | |
| neque succus ventriculi solus cibos | | mæ | ibid. |
| coquit | 335 | certe tener sensus est. | ibid. |
| 5. Calor | ibid. | | |
| infectis facit famem | 335 | | |

LIBER XX. VELAMENTA ABDOMINIS.

S E C T I O I.

M E M B R A N Æ.

- | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|-----------|
| 1. P eritonæi in universum descriptio | pag. 340 | finis cæcus in feminis | pag. 349 |
| Sensu caret | ibid. | in viris | 350 |
| Extus telam cellulosa circumpositum | | 4. Ligamenta in universum | ibid. |
| habet | 341 | 5. Ligamenta hepatis | 350. seq. |
| Simplex membrana est | ibid. | Ligamentum suspensorium | 351 |
| neque duplicaturæ vox bona est | ibid. | dextrum | 351. 352 |
| 2. Humor peritonæi | 342 | Continuatio peritonæi | 352 |
| exhalat de superficie viscerum | ibid. | Ligamentum sinistrum | ibid. |
| & peritonæi | ibid. | secundum | ibid. |
| non ponitur in glandolis | 343 | Adhæsiō cellulosa seu ligamentum co- | |
| quæ nullæ sint | ibid. | ronarium | ibid. |
| resorbetur in venulas | ibid. | Plica a pancreate ad hepar | 353 |
| In eum via est inorganica | 344 | a rene ad hepar | ibid. |
| de ventriculo, & intestinis | ibid. | Omentum minus | ibid. |
| Is humor viscera mobilia reddit | ibid. | Peritonæum se super hepar diffundit | ibid. |
| incoissatur | ibid. | animalibus hepar minus firmum | 354 |
| inde vitiosæ adhæsiōes viscerum | ibid. | 6. Peritonæum se gulæ circumjicit | ibid. |
| exempla | 345. 346 | Dextrum vinculum œsophagi | ibid. |
| 3. Peritonæi descriptio & ambitus | 347 | Sinistrum | ibid. |
| Potest totum nudari | ibid. | Verticale ligamentum lienis | ibid. |
| incipit a septo transverso | 347. 348 | posterius lienis | ibid. |
| per lumbos descendit & ilia | 348 | a liene ad renem | 355 |
| ut se habeat in pelvi | 349 | a rene ad colon | ibid. |
| Ligamenta semilunaria | ibid. | Ligamentum latum ovarii | ibid. |
| —— lata | ibid. | 7. Mesenteria | ibid. |
| | | Mesocolon iliaceum | ibid. |
| | | —— sinistrum | 356 |
| | | 8. Mesocolon transversum | ibid. |
| | | in universum | 357 |
| | | Ligamentum sustentans lienem | ibid. |

Lamina superior mesocoli transversi	pag. 357	Animalia quadrupeda omentum ha-	pag. 371
inferior	ibid.	bent	ibid.
Inter utramque est duodeni pars	ibid.	omnia	ibid.
& pancreas	ibid.	& sola	ibid.
Lamina superior habetur pro omenti		17. Mesocoli cavea laminis ejus com-	
lamina posteriori	358	prehensa	372
Id admitti nequit	ibid.	Appendices epiploicæ	ibid.
9. Mesocolon dextrum	359	18. Cellulosæ telæ peritonæo circumpo-	
Mesenteriolum appendiculæ cæcæ	359	sitæ	373
10. Mesenterium	ibid.	Appendix in scrotum ducens	ibid.
ut nascatur	ibid.	Foramina non vera	ibid.
ejus amplitudo	360	Cellulosæ circumjectæ	374
laminæ	ibid.	Adeps renalis	374. 375
11. Non est sensibile	ibid.	alius	375.
nec irritabile	ibid.	Fasciculi cellulosi ad alias partes con-	
cellulosa ejus pars	ibid.	tinuati	ibid.
Glandulæ mesentericæ	361	cum aorta	ibid.
sæpe scirrhusæ	ibid.	gula	ibid.
& inde atrophica	ibid.	in lumbos	ibid.
Pancreas aselli	362	scrotum	ibid.
unde natum	ibid.	femur	ibid.
12. Peritonæi processus secundi generis.		nates	ibid.
OMENTA	ibid.	cum urethra	ibid.
in universum	363	Herniarum in universum natura	376
cæca sunt & humores continent	ibid.	Abcessuum communicatio	ibid.
sunt duplices membranæ	ibid.	19. Peritonæi vasa	ibid.
vasculosæ	ibid.	Mesenterii	377
Adeps secundum vascula	364	Mesocoli	ibid.
Glandulæ conglobatæ	ibid.	20. Arteriæ omenti Colicogastrici & la-	
an vasa lymphatica	ibid.	minæ anterioris	ibid.
13. Omentum communis portæ	ibid.	posterioris	ibid.
Inventor hujus portæ	365	Hepaticogastrici omenti	378
14. Omenta sigillatim	ibid.	Colici	ibid.
Hepaticogastricum seu minus	ibid.	Venæ omenti	ibid.
initium in dextro latere	ibid.	Sudant arteriæ	ibid.
finis in sinistro	ibid.	21. Nervi omenti	ibid.
Vestigia apud veteres	366	mesenterii	379
Inventor	ibid.	Vasa lymphatica omenti	ibid.
15. Omentum majus. Colicogastricum	367		
sedes quam tenet	ibid.		
tenue	ibid.		
crassum	ibid.		
morbosum	ibid.		
Laminæ duæ	368		
anterior	ibid.		
posterior	ibid.		
finis sinister	ibid.		
dexter	369		
saccus medius	370		
16. Omentum colicum	ibid.		
Cl. LIEUTAUD de eo omento me-	ibid.		
rita	ibid.		

S E C T I O I I.

H A R U M P A R T I U M
U T I L I T A S.

1. Peritonæum coerces partes abdomine	
contentas	380
vapore suo frictionem mollit	ibid.
impedit coalitum	ibid.
ligamentis viscera sustinet	ibid.
2. Mesenterii utilitas	381
in omnibus animalibus reperitur	ibid.
intestina cum mobilitate continet	ibid.
3. Omen-	

3. Omenti utilitas	pag. 381	nam ad portas congerit	pag. 382
Animalia, quæ eo destituuntur, habent ejus vice adipem	ibid.	argumenta pro ea theoria	383
mobilitatem intestinorum tuetur	382	objectiones	383. 384
& impedit ne conserveant	ibid.	tamen probabilis videtur	384
Sanguinem adipe prægnantem in ve-		humorem resorbet	ibid.

L I B E R X X I. L I E N.

S E C T I O I.

V I S C E R I S F A B R I C A.

1. Quibus in animalibus reperiatur	pag. 385	Simplex est	pag. 400
Quadrupedibus calidi sanguinis	ibid.	perspirat	ibid.
Analogum quid in avibus	ibid.	8. Arteriæ lienis	ibid.
quadrupedibus frigidis	386	major, splenica	ibid.
piscibus	ibid.	ejus diameter insignis	ibid.
Ut diversum a liene	386. 387	robur	401
2. Numerus	ibid.	Arteriæ aliæ lienis	ibid.
Nonnullis animalibus duo dicuntur esse	ibid.	9. Vena splenica	ibid.
duo in homine non rarissimi	387	diameter	402
etiam numerosiores	388	iter	ibid.
3. Figura in homine	388. 389	Rami præter lienem	403
etiam ludit, lobis incisa	389	Aliæ venæ lienis	ibid.
in animalibus varia	390	Iter humorum per eam venam laxum	ibid.
4. Situs	ibid.	Sanguis a liene ad hepar venit	404
in homine	ibid.	non habet valvulas	ibid.
cum ventriculo mutabilis	ibid.	nec venæ arterias in suum cavum	ibid.
A diaphragmate deorsum premitur	392	recipiunt	ibid.
descendit per morbos	ibid.	10. Sanguis lienalis	ibid.
in animalibus	393	plus habet aquæ	405
5. Magnitudo	ibid.	& salis volatilis	ibid.
incerta	ibid.	olei crassi minus	ibid.
mutatur a ventriculo	ibid.	Plurimum sanguinem continet lien	ibid.
eoque tumente, lien minor est	ibid.	11. Nervi lienis	406
& vicissim	ibid.	parvi	ibid.
ejus pondus variam	394	Lien parum sentit	ibid.
magnum aliquando	395	neque irritabilis est	ibid.
In morbis magnum	ibid.	12. Vasa lymphatica	ibid.
per libras	396	in vitulis	ibid.
scirrhus frequens	397	in aliis animalibus	ibid.
membrana ossea	ibid.	in homine	ibid.
Lien mollis & putrido similis	ibid.	13. Ductus excretorius	ibid.
raro suppuratur	398	non confirmatur	408
Lien parvus	ibid.	14. Fabrica lienis interior	ibid.
6. Natura spongiæ	ibid.	Vasa	ibid.
Calor	399	Cellulosa tela	ibid.
pondus cum aqua comparatum	ibid.	Cellulosa tela alia, exterior perito-	
7. Membrana lienis	400	næ	409
		Hæ fibræ & cellulæ lienis	ibid.
		In eas aer per vasa penetrat	ibid.
		15. Lien vituli	410
		Fibræ manifestiores	ibid.
		In eas, ex vena aperta, via	ibid.
		Fibræ	

Fibræ lienis vitulini	pag. 410. 411
rejectæ ab humana fabrica	411
16. Acini lienis	ibid.
in animalibus	ibid.
esse cavos	412
vasculosos	ibid.
renovati sunt a Cl. nupero scriptore	ibid.
Eorum vasculosa fabrica	413
17. Quæ contra acinos dicta sint	ibid.
Meros esse vasculorum glomeros	414

S E C T I O I I.

P A R T I U M U T I L I T A S.

1. Proœmium	414
2. Sanguis in liene pro hepate mu- tatur	415
tenuior est	ibid.
& magis lixiviosus	ibid.
Quare sit ejusmodi	416
A majori portione ramorum ad truncos	ibid.
hinc acrior	ibid.
3. Lien, vacuo ventriculo, laxatur & sanguine repletur	417
Inter plenum ventriculum & dia- phragma conquassatur	418

4. An alias habeat utilitates	pag. 418
An possit ex morbis aliquid disci	419
non habet perpetuam ad hepar ratio- nem	ibid.
neque in hydrope semper magnus	420
aut scirrhus	ibid.
neque in morbo hypochondriaco	ibid.
Difficultas argumenti a morbis sumti	ibid.
5. An possit utilitas lienis disci ex vitiis, quæ ejus evulsionem sequuntur,	421
frequenter evulsus fuit	ibid.
in homine	ibid.
& in bestiis	ibid.
non pereunt animalia	422
Qui inde morbi fiant	ibid.
Videtur hepar nonnihil pati	ibid.
6. Hypotheses	ibid.
Num tamen aliquis succus in liene secernatur	ibid.
num acidus	424
num atra bilis	ibid.
alteriusve generis	ibid.
Aliæ conjecturæ	425
Nihil habent firmi	ibid.
Iterum aliæ	425. 426
Num lien inutilis sit	426

L I B E R X X I I. P A N C R E A S.

1. V Eteribus notum	pag. 427
Ut se habeat in avibus	
piscibus	
quadrupedibus frigidis	
& calidis	428
homine	
Caput pancreatis	ibid.
Situs	429
inter laminas mesocoli	ibid.
Magnitudo	430
Pondus	ibid.
2. Fabrica	ibid.
Glandula est conglobata	ibid.
frequenter scirrhusa	431
3. Vasa	ibid.
Arteriæ variæ	ibid.
Pancreaticus arcus anterior	ibid.
posterior	ibid.
Pancreatica transversa	432
superior	ibid.
aliæ minores	ibid.

Venæ	pag. 433
Nervi	ibid.
4. Ductus excretorius	ibid.
notus antiquis	ibid.
renovatus a M. HOFMAN	434
& J. G. WIRSUNG	ibid.
a quibus porro ornatus sit	ibid.
reperitur in quadrupedibus	ibid.
etiam frigidis	435
avibus	435. 436
forte & piscibus	436
5. In homine fabrica	seq.
Ductus principis historia	437
ductus minor	ibid.
insertio in intestinum	ibid.
Sinus cum ductu choledochi commu- nis	ibid.
Rima qua aperitur	438
absque valvula	ibid.
Quid sit bilis diverticulum	439
Simplex in homine	ibid.
quadrup-	

quadrupedibus nonnullis	pag. 439	ejus copia	pag. 446
avibus	439. 440	fuit perpetuo	447
piscibus	440	Hypothesis de succo SYLVIANA	ibid.
6. Duplex in aliis	ibid.	acidum esse	ibid.
in homine	441	& cum bile fervere	ibid.
in quadrupedibus	442	Per experimenta	448
in avibus	ibid.	Qui putarint acidum se reperisse	ibid.
triplex in iisdem	ibid.	Nuperrimi ejus hypotheseos adseclæ	ibid.
7. Conjunctio cum ductu bilario	ibid.	10. Qui primi contra has hypotheses	
in homine	ibid.	scripserint	449
in quadrupedibus	443	Non est acidus	450
avibus	ibid.	Quare neque cum bile fervet	ibid.
piscibus	ibid.	Experimentum SCHUYLII nihil de-	
Diversa utrorumque oñia	444	monstrat	ibid.
longa distantia	ibid.	Pancreas extirpatur absque magnis ani-	
Ut se habeant tres ductus pancrea-		malis malis	451
tici	445	Quænam sit verior ejus succi utilitas	452
Qui longe a pyloro inferantur	ibid.	cysticam bilem acrem & viscidam	
8. Succus pancreaticus	445 seq.	diluere	ibid.
ægre obtinetur	445	Etiam massam ciborum tenuare	453
& tamen salivæ adfinis est	446	alia	ibid.

LIB. XXIII. HEPAR ET BILIS.

SECTIO I.

HEPAR IPSUM.

1. I N quibus animalibus reperiatur	pag. 454	varietates in situ	pag. 460
magnum homini	455	per respirationem	ibid.
non tamen maximum	ibid.	4. Hepar in quibus animalibus sim-	
pondus in homine varium	ibid.	plex	461. 462
circa 45. uncias	ibid.	homine	461
Duplex hepar	456	& paucis fere herbivoris	462
& nullum	ibid.	Multilobum in carnivoris	463
2. Color varius in variis animalibus	ibid.	ut in piscibus se habeat	464
etiam in ejusdem animalis fetu	457	in avibus	ibid.
3. Situs	ibid.	oviparis frigidis	465
in fetu	ibid.	Nihil inde potest erui de finibus	ibid.
in adulto homine	458	5. Hepatis figura in universum	466
per partes; Ut ad septum transver-		posterior massa	ibid.
sam se habeat	459	anterior margo	ibid.
ad colon	ibid.	6. Pars gibba	467
renem	ibid.	lobi magni	ibid.
ventriculum	ibid.	dexter	ibid.
Porro de situ	460	sinister	ibid.
		7. Pars sima	ibid.
		Faciecula colica	468
		renalis	ibid.
		fissura horizontalis	ibid.
		pars quæ venam umbilicalem continet	ibid.
		quæ	

quæ ductum venosum	468	Tum ductus venosus	pag. 483. 484
Sulcus transversus	469	Aliquando a partu aliquandiu pa-	ibid.
Fossa vesiculæ felleæ	ibid.	ret	ibid.
Semicanalis venæ portarum	ibid.	Ob eam hepar in fetu majus	485
Portæ	469. 470	Minus in puero & adulto	ibid.
Sulcus venæ cavæ	470	13. 3. Vena portarum	ibid.
aliæ rimæ	ibid.	Nomina	ibid.
8. Lobuli hepatis	471	Ejus magnæ radices	486
posterior	ibid.	Vena mesenterica	ibid.
pars ejus radiata	ibid.	Ramus gastrocolicus	ibid.
pars papillaris	ibid.	Ramus circumcurrens arcum duodeni	ibid.
insula est	472	Epiploica dextra	ibid.
Lobulus anonymus	ibid.	Gastroepiploica dextra	ibid.
Lobi varii aberrantes	ibid.	Colica media	487
9. Vasa 1. adducentia	ibid.	Rami minores mesentericæ	ibid.
1. arteriæ hepaticæ	ibid.	Colica sinistra	ibid.
1. a coeliaca	473	Splenica	ibid.
Princeps truncus hepaticus	ibid.	Truncus venæ portarum	488
ramus dexter	ibid.	Ejus rami	ibid.
Arteria cystica	474	Et diametri	ibid.
finis trunci dextri	ibid.	14. Venæ portarum rami sigillatim	489
Ramuli ad superficiem	475	Dexter	490
Sinistra arteria hepatica	ibid.	Sinister	ibid.
ejus rami	476	Ejus furculi	ibid.
Surculi superficiales	ibid.	Minores anastomoses cum ramis venæ	
Arteria superficialis media	476	cavæ	491
Hepatica arteria non parva est	ibid.	15. Quæ peculiaris sint in vena por-	
10. 2. Aliæ arteriæ hepatis	477	tarum	ibid.
a mesenterica	ibid.	Robur inter omnia vasa maximum	491
a mammaria prima	478	Capsula GLISSONII	ibid.
altera	ibid.	Sive cellulosa tela venam ambeuns	493
a phrenica dextra	ibid.	Nimium hæc ornantur	493. 494
a sinistra	478. 479	Neque est cor abdominale	494
a capsularibus	479	Qui verum agnoverint	ibid.
a spermaticis	ibid.	16. Sanguis venæ portarum	495
ab epigastrica	ibid.	Est miscellaneus	ibid.
11. 2. Vena umbilicalis	479. seq.	Plenus adipe	ibid.
advenit ad ligamentum suspensorium	480	Vapore putrido ab intestinis re-	
in sulcum horizontalem	ibid.	forbito	ibid.
ejus tumor in eo sulco	ibid.	Vapore abdominali	496
ex eo tumore rami hepatici	ibid.	Sanguine lienali	ibid.
ad venam umbilicalem pertinent	481	Num experimenta aliquam diversam	
Ductus venosus	ibid.	hujus sanguinis indolem demon-	
An aliquid valvulosi in principio &		strent	ibid.
sine sit	481. 482	Argumenta adfirmantium	ibid.
parvus est	482	Per experimenta nondum constat	497
multo minor quam vena umbilicali	ibid.	17. Vasa de hepate avehentia.	498. seq.
Omnino sanguis venæ umbilicalis in		I. Vena cava	498
fetu per hepar trajicitur.	483	Foramen in septo transverso	ibid.
12. Vena umbilicalis in adulto claudi-		Etiam duo	ibid.
tur	ibid.	Rami hepatici	ibid.
Aliquanto serius nonnunquam, neque		Valvulæ ad eorum ostia	ibid.
statim a partu	483. 484	Iter sanguinis per venam portarum	499
		In	

In ramos venæ cavæ	pag. 499
Et venam cavam	ibid.
Et cor	500
Sic ex arteria hepatica	ibid.
Plures sunt rami venæ portarum quam cavæ	ibid.
Acceleratur sanguis in cava	501
18. II. Vasa lymphatica	ibid.
Primum in hepate visa	ibid.
In parte hepatis cava	502
In parte gibba	503
Liquorem habent etiam ab arteria	ibid.
Et vena portarum	ibid.
19. III. Ductus bilarii in universum	504
Ad essentiam pertinent hepatis	ibid.
Eorum trunci	505
Ductus bilarius hepaticus	505
Choledochus	ibid.
Ostium in duodeno	ibid.
Fabrica	ibid.
Non est irritabilis	507
Videtur acriter sentire	ibid.
20. Ex vena portarum humor	508
In ductum bilarium transit	ibid.
Etiam ex arteria hepatica	ibid.
21. Aliæ anastomoses inter venam portarum	508. 509
Et arteriam hepaticam	ibid.
Inter ductus bilarios, & venam cavam	ibid.
Inter eosdem & vasa lymphatica	510
Inter eosdem & cellulofam telam	ibid.
22. Nervi hepatis dextri	ibid.
Sinistri	511
23. Membrana externa	ibid.
Subjecta cellulosa tela	ibid.
24. Fasciculi vasorum hepatis	512
Cellulosa vagina peculiaris	ibid.
Communis	ibid.
Caro hepatis	ibid.
Firmior est & fero computrescit	513
25. Hepatis acini	ibid.
In homine	ibid.
Et animalibus	514
Quibus partibus acinus constat	ibid.
26. Num cavi sint	515
Sintve glandulosi	ibid.
Ita MALPIGHII	ibid.
Esse glandulas per morbos plenas aqua	516
Gypso	ibid.
Bile	ibid.
Manifestas glandulas	ibid.

Bilis viscida	pag. 517
27. Contra hepatis glandulas	ibid.
Acini sunt lobuli	ibid.
Noduli nulli intercepti inter arteriam & ductum	518
Cryptas non posse utiliter in solidam massam congeri.	ibid.

S E C T. II.

V E S I C U L A F E L L I S.

1. Desideratur in nonnullis animalibus	519
Subinde in homine	520
Quare bilis absque vesicula potest parari	ibid.
Cur aliqua animalia vesicula careant	521
Non omnibus deest, quibus negatur	522
Conjecturæ	ibid.
2. Situs vesiculæ	523
Figura pyriformis	ibid.
In se ipsam curvatur	524
Duæ fuerunt	ibid.
Magnitudo per morbos augetur	525
3. Fabrica. Membrana extima	ibid.
Cellulosa tela prima	526
Membrana quam musculosam dicunt	ibid.
Irritabilitas modica	527
Sensus sat acer	ibid.
Cellulosa secunda	ibid.
Nervea	ibid.
Cellulosa tertia	ibid.
Interna	ibid.
Reticulata	ibid.
Folliculi mucosi	ibid.
Vascula exhalantia	528
Pori inorganici	ibid.
4. Ductus cysticus	ibid.
Conjunctio cum hepatico	529
Fabrica humana	ibid.
Contortio in ductus exitu	ibid.
Angulus cum hepatico	ibid.
Fabrica ductus cystici	530
Valvulæ	530. 531
Ut in avibus se habeat	531
Fiscibus	532
5. Vesicula ab hepate libera	ibid.
Ductus ex hepate in cystidem	ibid.
Ductus ex hepatico in cystidem	533
Eadem per gradus paulum mutata fabrica est	ibid.

- in omnibus animalibus p. 534.
 6. Canales hepaticystici quadrupedum ibid.
 Ductus ex hepate grandes in vesiculam
 inmissi 535
 Et ex ductu hepatico 535. 536
 7. An in homine ejusmodi ductus sint 537
 Qui admiserint 537. 538
 9. Dubia cur nondum admittant Cl.
 Viri 539
 Neque ego 540. 541

S E C T. I I I.

B I L I S.

1. Num detur duplex bilis 542
 Hepatica mitis ibid.
 Cystica amarior ibid.
 Experimenta adfirmantium ibid.
 Negantium rationes 544
 2. Bilis indoles 545 seq.
 Viscida est ibid.
 In morbis viscidior ibid.
 Pondus magnum 546
 3. Amara est 546. 547
 Non acida 547
 Per morbos insipida ibid.
 4. Color viridis 547. 548
 Flavus 548
 Expallescit in morbis ibid.
 5. Pars exhalans 549
 6. Miscela cum aliis humoribus ibid.
 Aqua ibid.
 Oleo ibid.
 Solvit adiposa 550
 Inde medicata est 551
 Per morbos venenata 551
 7. Ut se ad acorem habeat 552
 Cum eo meraco cogitur ibid.
 Etiam in spiritibus acidis 553
 Coit cum vini spiritu 555
 Cum alcali vix mutatur 556
 Sibi relicta putrescit 557
 Sed factor in moschi odorem mitescit ibid.
 10. Sapor bilis 559. 560
 11. Calculi bilarii 560. seq.
 Mollia concrementa 561
 Duri 562
 Genera duo. Crustacei calculi ibid.
 Calculi figurati, lamellati 563
 In variis animalibus 564
 12. In homine ibid.
 Frequentes sunt ibid.

- Novus tamen morbus est, aut nuper
 adnotatus pag. 565
 Classes duæ Grandes subrotundi ibid.
 Eorum dotes ibid.
 Crystallina species 567
 Ad ignem, ut se habeant 567. 568
 Calculi minores angulosi 568
 Numerosi ibid.
 In ductu cystico ibid.
 Et hepatico 570
 Ipsoque hepate ibid.
 13. Analysis bilis 570. seq.
 Aer in bile 570. 571
 Copiosus ibid.
 14. Aquæ maxima ubertas inest 571
 15. Spiritus bilis 572
 16. Oleum 572. 573
 Duorum generum 573
 17. Sal volatilis parcissimus 574
 18. Carbo ibid.
 19. Calculorum felleorum analysi 575. 576
 20. In bile non est acor. 576. 577
 Non tamen alcalina est 577
 Sed olei ratio superat ibid.
 Et terræ ibid.
 Acrimonia vincit 578
 Saponacea est ibid.
 Calculi non ab acore ibid.
 De bilis motu 578
 I. Venit de ductu choledochi in duo-
 denum 579
 Per experimenta, ibid.
 Et morbos ibid.
 Et vincula 580
 21. II. Ex vesicula fellea in duodenum
 intestinum 581. 582
 22. III. Ex hepate in vesiculam 582
 Per morbos id ostenditur ibid.
 Iter ad intestinum potest stringi 583. 584
 23. Num bilis per ductus occultos ex
 hepate venit in vesiculam 584
 Bilis in sanguinem retrorsum redit 592. 593
 Causæ variæ 593
 27. IV. Neque tamen secundum naturam
 bilis in hepar redit ibid.
 Symptomata bilis a suo, vero itinere
 aversæ 594
 demum eas aperientis ibid.
 Vesiculæ ulcera spontanea a calculis 595
 Et incisio 596
 Calculi magni ad intestina descenden-
 tes ibid.
 Ubi doloris sit sedes 597
 28. Bilis

28. Bilis ex quo vase generetur	pag. 597
Num ex arteria hepatica	ibid.
Potius ex vena portarum	598
Cujus sanguis bili sit propior	ibid.
Num valde lentus sit sanguinis per eam venam motus	598. 599
Nimii hic lentor æstimatus est	ibid.
Tamen sanguis lentius per hepar fluit	599. 600
Ut ex morbis ostenditur	600
Scirrhis	ibid.
Hydatidibus	ibid.
29. Vires, quæ sanguinis iter per hepar accelerant	601
Respiratio	ibid.
Inspiratio	602
Exspiratio	ibid.
Vomitibus	ibid.
Ut patiat a diaphragmate hepar	603
Et vesicula	ibid.
Tum ista ab aliis causis	ibid.
Et ventriculo	ibid.
An etiam a propria membrana stringatur	604
30. Qua copia secernatur	ibid.
Calculi varii	604. 605
Celeriter generantur	605
Et in morbis	606
Ab ira	ibid.
Discrimen a corporis situ	ibid.
31. Quo bilis abeat	ibid.
In ventriculum	ibid.
Intestina	ibid.
Ad anum usque	607
An resorbeatur per villos intestinales	ibid.

Res satis dubia videtur	608
32. Ejus utilitas	ibid.
Solvere mucum	ibid.
— oleum	ibid.
Per experimenta in vivis animantibus	609
Acidum videtur subigere	ibid.
per experimenta	610
& morbos	ibid.
Cystica magis	ibid.
Motus peristalticus etiam absque bile nascitur	611
An famem faciat in ventriculo	612
33. Num dissolvat sanguinem	ibid.
non videtur	ibid.
neque id morbi ostendunt	613
34. Suspiceris plus esse in bile	ibid.
ob mortes subitas a viis bilis læsis	ibid.
Forte pereunt ob acrimoniam bilis	614
35. Num bilis sit excrementum	615
non videtur	ibid.

S E C T I O I V.

H E P A T I S U T I L I T A T E S.

1. Calor	616
Num sanguinem coquat	ibid.
qui docuerint	616. 617
Contra quæ dicta sint	ibid.
Non videtur	618
2. Sed videtur sanguinis ad cor redeuntis impetum minuere	ibid.
in fetu potissimum	ibid.
etiam in adulto homine	619

Figuræ ad Tom. VI. spectantes.

FIG. I.

*Ventriculus & duodenum suo in situ
ex infante.*

- A. Ventriculus.
- B. Sedes antri pylori.
- C. Initium pylori.
- D. E. F. Duodeni Pars transversa.
- E. Ejus pars prima.
- F. Pars descendens.
- G. Colon intestinum.
- H. Duodeni finis & initium jejuni.
- I. Pars mesocoli tegentis pancreas.
- K. Lobus hepatis dexter.
- L. Sinister a ventriculo remotus.
- M. Vesicula.
- N. Ejus ductus.
- O. Hepaticus ductus.
- P. Arteria hepatis.
- Q. Ramus dexter.
- R. Sinister.
- S. Fossa umbilicalis.

FIG. II.

Hepar in situ tenens Epigastrii partem.

- A. Lobus dexter.
- B. Sinister.
- C. Sedes ligamenti lati.
- D. Pars cava, ejusque fovea renalis.
- E. Vesicula fellis.
- F. Ren.
- G. Ventriculus sub hepate eminens.
- H. Vasa Gastroepiploica & arcus major.
- I. Sedes valvulæ pylori.
- J. Duodenum oriens.
- K. Pancreas.
- L. Mesenterium resectum.
- M. Vena mesenterica.
- N. Arteria.
- O. Intestinum duodenum.
- P. Vena cava.
- Q. Aorta.

FIG. III.

Hepar ex facie cava.

- A. Lobus dexter.
- B. Peritonæum relinquens hepar ad ambitum ligamenti coronarii.
- C. Finis anterior.
- D. Fissura recipiens venæ portarum ramum dextrum.
- E. Vesicula fellea.
- F. Ductus cysticus reclinatus.
- G. Lobulus accessorius.
- H. Peritonæum conjicit se super vesiculam.
- I. Lobuli anonymi facies obversa fissuræ transversæ.
- K. Lobus sinister.
- L. Ligamentum.
- M. Lobi sinistri crepido ad ductum venosum spectans.
- N. Lobulus lobi sinistri.
- O. Processus caudatus.
- P. Pars integra lobi SPIGELII.
- Q. Papilla ejus.
- R. Vena cava tecta processu caudato.
- S. Arteria eo loco erumpens ex phrenicis.
- T. Vena portarum in portis.
- V. Ramus dexter.
- X. Sinister.
- Y. Pars tecta lobulo.
- Z. Ramus ad eum lobulum.
- a. Ductus venosus in sua fossa.
- b. Truncus venæ umbilicalis hepate textus.
- c. Ramus ad sinistrum lobum.
- d. Alius.
- e. Rami ad lobum anonymum.
- f. Vena umbilicalis pergens antrorsum.
- g. Emersa de hepate.

Errata.

- Pag. 23. lin penultim. pro *contracta* leg. *contractus*.
 — 68. §. V. l. 2. pro *Pterygopharyngæi* l. *Pterygopharyngæi*.
 — 96. l. 7. pro *cartilagineorum* l. *cartilagineorum*.
 — 101. l. 5. pro *differentissima* l. *diversissima*.
 — 112. l. 9. pro *eas* l. *eæ*.
 — 165. l. 10. pro *regende* l. *regendum*.
 — — 15. pro *obnoxior* l. *obnoxios*.
 — 194. n. 3. l. 6. leg *Nullum edulem cibum præter baccas Europa sponte protulit.*
 — 207. l. 13. post *detrectant* adde *animalis*.
 — 338. l. 2. ante (*m*) adde *Lama*.
 — 341. not. (*m*) pro *qua* l. *quibus*.
 — 357. l. 6. super ultimam pro *proprio* l. *propria*.
 — 364. deleantur superflue duæ lineæ *lymphatica vasa &c.*
 In titulo not. (*i*) 13. pro *communia* l. *communis*.
 — 368. not. (*m*) pro *onat* l. *anat*.
 — 376. l. 12. pro *plenum* l. *plenum*.
 — 380. l. 4. supra ultimam pro *abeant* l. *abirent*.
 — 389. l. 6. super ultimam pro *variât* l. *variatur*.
 — 459. not. (*g*) pro *conf. eund.* f. 2. & 9. lege f. 2.
 — 490. l. 5. super ultimam pro *portarum* l. *jecoris*.
 — 582. tit. n. 23. Adde ante *Ex hepate* n. 111.
 — 615. tit. n. 35. *Non* l. *Num.*

FINIS TOMI SEXTI.

L A U S A N N Æ,

Ex Typographia ANTONII CHAPUIS.

1898

1898

1898

1898

1898

1898

1898

1898

1898

1898

1898


1898

1898

1898


1898

F. 1.




T. VI.

G. P. Trautner sc. Norimb.



F. 2.

G. P. J. sc.



F. 3.

T. VI.

G. P. J. sc.

